

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

Y.L. ARSLONOV, T.A. NAZAROV, A.A. BOBOMURODOV

ICHKI KASALLIKLAR

Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2013

*Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi ilmiy-metodik
birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash
tomonidan nashrga tavsiya etilgan.*

Ushbu o'quv qo'llanma tibbiyot kollejlari o'quvchilari hamda oliy ma'lumotli hamshiralari tayyorlash uchun mo'ljallangan. Kitobda terapiyaga oid barcha ma'lumotlar, ya'ni odam ichki a'zolarida uchraydigan kasalliklar, ularning kelib chiqish sabablari, oldini olish, davolash yo'llari, parvarish paytida hamshira bajarishi lozim bo'lgan vazifalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Taqribchilar: R.Sh. YO'L DOSHEV — Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i, tibbiyot fanlari doktori; M. TILOVOV — Qarshi tibbiyot kollejinining oliy toifali o'qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent; Sh. TOG'AYEV — Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filiali direktori, tibbiyot fanlari doktori, professor.

SO‘ZBOSHI

Mustaqil respublikamizda barcha sohalardagi kabi tibbiyotda ham tub o‘zgarishlar bo‘lib o‘tmoqda. Sog‘liqni saqlash tizimidagi olib borilayotgan islohotlar hozirgi zamон o‘rta tibbiyot xodimi oldiga davr bilan hamnafas faoliyatni malakali amalga oshirish talabini qo‘yayotir. Hozirgi kunda ko‘plab qishloq shifokorlik punktlari, kunduzgi va oilaviy shifoxonalar xizmati, MMAX (maxsus malakali ambulatoriya xizmati), shoshilinch tibbiy yordam markazlari ishi rivojlanmoqda. Aholi sog‘lig‘ini saqlash borasidagi muammolarni ijobjiy hal etishda o‘rta tibbiyot xodimi xizmatini tubdan o‘zgartirib, ularning salohiyatini oshirishga e’tibor kuchaytiliyapti.

Bugungi kunda ta’lim-tarbiya oldiga juda ulkan vazifalar qo‘yilgan. Shu bilan birga, kadrlar malakasini yaxshilashga ham katta e’tibor qaratilmoqda. O‘quvchilarga bilim berishning yangi usullarini joriy etish bugungi kunning muhim talablaridan biridir. Bu esa o‘qituvchidan tinmay izlanish va ijodkorlikni talab qiladi. Tibbiyot kollejlari zimmasiga jahon andozalariga mos keladigan tibbiyot xodimlarini tayyorlashdek muhim vazifa yuklatilgan vaqtida, o‘quvchilarni kerakli adabiyotlar bilan ham to‘liq ta’minlash o‘ta muhimdir. Ko‘pgina tibbiyot kollejlari o‘qituvchilarini tomonidan yaratilayotgan o‘quv qo‘llanma va darsliklar ham bunga misol bo‘la oladi.

Tibbiyot kollejlarda o‘quvchilar «Ichki kasalliklar» (terapiya) fanini o‘rganishda ko‘p yillar mobaynida tarjima qilingan adabiyotlardan foydalanib kelishgan. Mazkur o‘quv qo‘llanmada O‘zbekiston sharoitida ba‘zi bir ichki a‘zolar kasalliklarining kechish xususiyatlari haqida ma’lumotlar berilgan.

Mualliflar ushbu fanning rivojlanish tarixi, bemorlarni tekshirishning asosiy usullari, eng yangi ma’lumotlarni va bu tekshirishlarda o‘rta tibbiyot xodimlarining qatnasha olishini hisobga olgan

holda mavzularni bayon qilishgan. Nafas, qon aylanish a'zolari kasalliklari, hazm yo'llari kasalliklari, endokrin sistema va moddalar almashinuvining buzilishida yuzaga keladigan xastaliklar haqida asosiy ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, o'quv qo'llanmada avitaminozlar, allergik kasalliklar, zaharlanishlar va ularga shoshilinch yordam ko'rsatish masalalari yoritilgan. O'quv qo'llanmada ichki a'zolar kasalliklari tashxisini erta aniqlashga yordam beradigan zamonaviy tekshirish usullari bayon qilingan.

O'quv qo'llanmadagi materiallar hozirgi zamon tibbiyot fanining yutuqlariga tayanib, o'quvchilarni dunyoqarashini rivojlan-tirishda mehnatni ilmiy tashkil etishni nazarda tutib, davolash muassasalari bilan uzviy bog'liq holda olindi. O'quv qo'llanmada umumiyl amaliyot feldsherining kundalik faoliyatida kerak bo'ladigan bir qator ma'lumotlar ham ko'zda tutilgan.

I-bob. «ICHKI KASALLIKLAR» FANINING RIVOJLANISH TARIXI

1.1. Tibbiyotdagi rivojlanish davrlari

Tibbiyot — kishilar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmuyi. Tibbiyot insoniyatning nazariy va amaliy faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Har bir kishi o'z sog'lig'ini saqlash va uni mustahkamlash, shuningdek, betob bo'lib qolganida tezda tuzalishni istaydi. Kasallikni aniqlash, uning oldini olish va davolashda zamonaviy usullarni qo'llash inson hayotini saqlab qolish, shuningdek, ilgari davolab bo'lmaydigan kasalliklarni davolash imkonini berdi.

Lekin tibbiyot o'z oldiga qo'ygan hamma maqsadlariga erishdi, deb bo'lmaydi. Hali ham kishilar orasida uzoq umr ko'rmay, og'ir xastaliklar va uning yomon oqibatlaridan bevaqt nobud bo'lish, barvaqt qarish hollari uchrab turibdi. Ma'lumki, kishining sog'lig'i ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liq, chunki kasallikka ko'pincha kishi hayot tarzining noto'g'ri yo'lga qo'yilganligi, o'z salomatligini himoya qila bilmaslik, salomatlikka zararli omillarga bilar-bilmay ruju etish va shaxsiy gigiyena qoidalariga rivoja qilmaslik, noto'g'ri ovqatlanish kabi omillar sabab bo'ladi.

Tibbiyotning qanday ahvolda bo'lishi va rivojlanish darajasi, mazmuni va usullari, avvalo, ijtimoiy tuzum va moddiy sharoitlar bilan belgilanadi. Tibbiyot fanlari umumiyligi biologiya, genetika, anatomiya, fiziologiya kabi tabiiy fanlar va shuningdek, fizika, kimyo fanlari bilan chambarchas bog'langan. Tibbiyot o'zining ko'p asrlik tarixida juda murakkab yo'lni bosib o'tdi. Bu asosan, kasallikni aniqlash, oldini olish, davolash, uning kelib chiqish sabablari va rivojlanish mexanizmlarini o'rganish, shuningdek, har bir shaxs yoki butun jamoa sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va ularni takomillash-tirishga oid talaygina bilim va tajribalardan iboratdir.

Zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi uzoq tarixiy davrlarni va turli qarashlarni o'z ichiga olib, turli kasalliklar, ularni davolash

va oldini olish haqidagi bilimlar asosi qadimdan xalq ommasining tajriba va kuzatishlariga bog'liq bo'ladi. Tabobat kurtaklari odam paydo bo'lgan davrdan boshlab vujudga kelgan. «Tibbiy faoliyat — dastlabki odam bilan tengdosh», deb yozgan edi I.P. Pavlov.

I davr. Ibtidoiy odam yashagan davr tibbiyoti. Ibtidoiy odam yashagan joylar va qabrlarni qazish, tarixiy davrni o'ziga xosligi tufayli hozir ham taraqqiyotning eng oddiy bosqichida bo'lgan ayrim etnik guruhlarni o'rganish uzoq o'tmishtagi kasallik va uni davolash haqidagi bilimlar manbayi bo'lib xizmat qiladi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan minglarcha yillik kuzatish va tajribalar evaziga tabiblik yuzaga kelgan. Og'riqni qoldirish, qon oqishini to'xtatish, qayd qildirish kabi tasodifiy qilingan muolaja va vositalarning nafi bo'lgan. Qo'llanilgan vositadan og'riq qolgan, qon oqishi to'xtagan yoki qayd qildirilgan bemor biroz yengil tortgan, bora-bora odamlar bu ishni bajargan tabibdan yordam so'rashga odatlanishgan.

Kasallikni davolash va undan saqlanishga oid topilgan empirik muolajalar ibtidoiy odamning odatiy tusiga kira borgan, natijada sekin-asta xalq tabobati shakllangan. Ana shu davo va oldini oluvchi tadbirlar ichida dorivor o'simliklar va tabiiy omillar (suv, havo, quyosh) dan foydalanish, uncha katta bo'lmagan jarrohlik (badanga kirgan yot jismlarni olib tashlash, qon chiqarish) usullari va boshqalarni qo'llash rusum bo'lgan.

II davr. Quldorlik jamiyatidagi tibbiyot. Quldorlik jamiyatida, asosan, uqalash, suv muolajalari, badantarbiya va boshqalarga ko'proq e'tibor berilgan. Jarrohlik usullari, masalan, kesarcha operatsiya (qorin devori va bachadonni yorib homilani olish) hamda boshqa uncha og'ir bo'lmagan operatsiyalar qilingan. Bu davr shifokorlik san'atining shakllanishida tibbiyotning otasi sanalmish Gippokratning (miloddan avvalgi 460—377-yil) hissasi nihoyatda katta, u ko'pgina kasalliklarning tashqi belgilarni, xastalikning kelib chiqishida turmush tarzi, atrof-muhit va iqlimning ta'sirini tavsif etdi. Temperament va gavda tuzilishi tiplari haqidagi ta'limoti bilan bemorni davolash va unga tashxis qo'yishda individual yondashishga asos soldi.

Albatta, o'sha davrda davo ishlari hali ilmiy asosda bo'lmagan, davo ayrim organlar va ularning fiziologik funksiyasini aniq bilishga asoslanmay, organizmdagi to'rt xil xilt (shilliq, qon, sariq va qora safro) ning o'zgarishiga qarab belgilangan. Odam tanasining tuzilishi va funksiyasini o'rganishga oid dastlabki o'rganishlar miloddan

avvalgi III asrdayoq paydo bo'lgan. Aleksandriyalik hakim Gerofil va Erasistrat murdani yorib ko'rishib, hayvonlarda turli tajribalar o'tkazishgan.

Tibbiyotning taraqqiyotida Rim hakimi Galenning xizmatlari nihoyatda katta. U anatomiya, fiziologiya, umumiy patologiya, terapiya, akusherlik, gigiyena, dorishunoslikka oid ma'lumotlar to'plagan va tibbiyotni ilmiy tizimga solishga harakat qilgan.

III davr. O'rta asr taraqqiyotida tibbiyot. O'rta asrlarda G'arbiy Yevropada tibbiyot ilmiy tomonidan deyarli taraqqiy etmadi. Bu davrda jamiyatda nasroniylik cherkovining mavqeyi ortdi. Toat-ibodat dori-darmonlarga qaraganda samaraliroq davolash vositasi deb qaralar, jasadni yorib o'rganish esa gunohi azim hisoblanar edi. Lekin shunga qaramay, bu davrda ham tibbiyotga oid amaliy tajribalar to'plana bordi.

O'rta asrlarda tabobat ilmi Sharqda, jumladan, O'rta Osiyoda rivojlana boshladi. Yunon, sanskrit va boshqa qadimiy sharq tillarida yozilgan tibbiy asarlarni ko'pchiligi, jumladan, Aristotel, Dioskorid va Galenning dorishunoslikka oid asarlari shu davrda suryoniy va arab tiliga tarjima qilindi. Abu Hanifa ad-Dinavoriy, Abu Mansur Somoni, Muhammad ibn Yusuf Iloqiy, Muhammad ibn Bahrom Kolonisiy, Ali ibn Umar Najibuddin Samarcandiy kabi mashhur tabib va hakimlar turli kasalliklarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish va davosiga hamda dorishunoslikka oid ilmiy asarlari va amaliy ishlari bilan Sharqda tibbiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar.

Sharqning mashhur tabibi, ensiklopedist olimi Abu Bakr ar-Roziy (865—925)ning tabobat sohasidagi asarlari, umuman, jahon tibbiyotining rivojlanish va boyishida g'oyatda ulkan ahamiyat kasb etdi. Olimning tabobat qobusnomasi hisoblangan 25 jiddi «Al-Hoviy» nomi bilan tanilgan katta to'plam («Al-Jomi' al-Kabir va qad urifa bi-i Hoviy») kitobi hozingacha G'arb va Sharq tibbiyotida mashhurdir. Abu Rayhon Beruniy (973—1048)ning «Tibbiyotda dorishunoslik» («Kitob al-saydana fi-t-tib») asari esa o'sha davr tahobatining eng katta yutug'idir. Bu asar O'rta Osiyo dorishunoslik ilmiga asos bo'ldi.

O'rta asrning buyuk tabibi, qomusiy olim Abu Ali ibn Sino (Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali) (980—1037) G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhurdir. Ibn Sinoning tabobatda qilgan ishlari uning nomini bir necha asrlarga shu fan sohasi bilan chambarchas bog'ladi. Olimning tabobat taraqqiyotidagi buyuk xizmati shundaki, u o'zigacha o'tgan turli xalq namoyandalari

tomonidan asrlar davomida tib ilmi sohasida to‘plangan ma’lumotlarni saralab, muayyan bir tartibga soldi va ularni o‘z tajribalari bilan boyitgan holda ma’lum nazariya va qonun-qoida asosida umumlashtirdi. Bunga uning «Tib qonunlari» va bu asarning jahon tib ilmi tarixida tutgan mavqeyi hamda qozongan shuhrati yorqin dalildir.

Ibn Sinoning ilmiy ishlari o’sha davr tabobatini bir necha asrlarga ilgarilatib, ayrim sohalarda, hatto hozirgi zamon tibbiyotiga yaqinlashtirdi ham. Olim yashagan davrda bu sohada antik olimlarning, xususan, Gippokrat, Galen Diaskorid va boshqalarning ta’limoti ustuvor edi. Ibn Sino o’tkir diagnost sifatida nom qozondi. Uning ba’zi tashxis usullari hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Perkussiyani, xususan, assit va meteorizmn farqlashda, istisqoni aniqlashda qo‘llangan. Bu usul 600 yildan keyin venalik tabib Leopold Auenbrugger (1722—1809) tomonidan qayta kashf qilinib, yana 50 yildan so‘ng amaliyatga kirgan. Olim qon tuflash holatlari va nafas olish turlarini chuqur o‘rganib, ulardan tashxisda foydalangan.

Ibn Sino turli kasalliklarning differensial diagnostikasida va gavdaning umumiyl holatini aniqlashda tomir urishi, siyidik va najasga qarab olinadigan belgilarga katta e’tibor beradi. Masalan, diabet (qand) kasalligini u siydikning holati, shu jumladan, undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi. Diabet kasalligida siyidikda qand moddasi bo‘lishini 1775-yilda ingliz olimi Dobson aniqlagan. Tabobat tarixida birinchi bo‘lib Ibn Sino vabo bilan o‘latni farqlagan, yuqumli kasalliklar bilan og‘rihan bemorlarni boshqalardan ajralgan holda saqlash kerakligini ta’kidlagan. Meningit, oshqozon yarasi, sariq kasalligi, plevrit, moxov, zaxm, qizamiq, suvchechak, kuydirgi kabi kasalliklarning belgilari va kechish jarayonini to‘g‘ri tasvirlab bergan.

Bemorlarni davolashda olim uch narsaga — tartib (parhez), dorilar bilan davolash va turli tibbiy tadbirlarni qo‘llash (qon olish, banka qo‘yish, zuluk solish, huqna va h.k.)ga ahamiyat berish kerakligini aytadi. Kasallikni davolashda ovqatlanish, ya’ni parhezni muhim omillardan deb hisoblaydi va har bir kasallikka oid ovqatlanish tartibini beradi. Kasallikni davolashda Ibn Sino shaxsiy gigiyena, uyqu va jismoniy mashqlarning ahamiyati kattaligini uqtirgan. Uning bir kasallikni boshqa bir kasallikni chaqirish yo‘li bilan davolash usuli diqqatga sazovordir. Masalan, u tutqanoqni davolashda to‘rt kunlik isitma bilan og‘rishni foydali deb biladi. Avstriyalik psixiatr

Y. Vagner-Yaureg (1857—1940) shunday usulni qo'llab, zaxm kasalligini bezgakni yuqtirish orqali davolagani uchun 1927-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.

Ibn Sino dorishunoslik sohasida chuqur tadqiqotlar olib borgan. U antik olimlarning farmatsiyasi asosida musulmon Sharqida paydo bo'lgan yangi farmatsiyaning shakllanishiga yakun yasadi. Tabobatda sano, kofur (kamfora), rovoch, tamrhindiy (Hind xurmosi) kabi dorilarning ishlatalishi, asal o'mnida ko'p dorilarning qand (shakar) asosida tayyorlanishi ham Ibn Sinoning xizmatidir. Uning dorivor o'simliklarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash usullari hozirgi dorishunoslikdagi usullarga juda yaqindir. Dori tayinlashda bemorning mizoji (issiq, sovuq, ho'l, quruq), yoshi, iqlim sharoitini hisobga olish zarurligini ta'minlaydi.

Ibn Sinoning tibga oid yozgan asarlarining 30 dan ortig'i bizgacha yetib kelgan, ularning orasida «Qonun» kabi tibbiy ensiklopediya bilan bir qatorda, tibning ayrim nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan turli hajmdagi «Urjuza fi-t-tibb» («Tibbiy urjuza»), «Daf al-madorr al-kulliya an-al-abdon al-insoniya» («Inson badaniga yetishgan barcha zararlarni yo'qotish»), «Kitob al-qulanj» («Qulanj haqidagi kitob»), «Maqola fi-n-nabz» («Tomir urishi haqida maqola»), «Risola fi-l-boh» («Shahvoniq quvvat haqida risola»), «Risola fi tadbiri al-musofirin» («Safardagilarning tadbiri haqida risola»), «Risola fi xifz as-sihha» («Sog'liqni saqlash haqida risola»), «Risola fi-s-sikanjubin» («Sikanjubin haqida risola»), «Risola fi-l-fasd» («Qon olish haqida risola»), «Risola fi-l-hindabo» («Sachratqi haqida risola») kabi risolalari ham bor.

Sulton Ali tabib Xurosniy «Kasalliklarni davolash bo'yicha qo'llanma» («Dastur al-iloi») asari bilan hirotlik tabib Muhammad ibn Yusuf Yusufiy al-Haraviy ham qator tibbiy asarlari va amaliy ishlari bilan, Abdulg'oziyxon ibn Arab Muhammadxon Xorazmiy muhim tibbiy asarlari, jumladan, «Inson uchun foydali dorilar» («Manofi' al-inson») asari bilan XV—XVI asrlarda tabobat ilmini rivojlanishiga katta hissa qo'shdidi.

IV davr. Kapitalistik davrdagi tibbiyat. XVI—XIX asrlarda tibbiyat G'arbiy Yevropada yangidan rivoj topdi. Anatomiyaning asoschisi A. Vezaliiy murdanibor tekshirish bilan odam organizmining tuzilishi, organlar funksiyasini ilmiy jihatdan aniq asoslab berdi. Ingliz shifokori U. Garvey odamning qon aylanish sistemasi haqidagi ta'limotni yaratib (1628-yil) fiziologiyaga poydevor qo'ydi. Fizikaning taraqqiyoti natijasida mikroskop kashf etildi va hujayra,

to'qima, a'zo va sistemalarining nafis tuzilishini o'rganish imkoniyati tug'ildi.

XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asr boshlarida obyektiv tekshirish usullari palpatsiya, perkussiya, laboratoriya diagnostikasi ishlab chiqilishi tufayli amaliy tibbiyot taraqqiy etdi. XVIII asrda qo'llanilgan klinik tekshiruv natijalarini murdani yorib tekshirishdan olingan ma'lumotlar bilan taqqoslash uslubi kasallik belgilari organ va to'qimalarining tuzilishdagi o'zgarishlarga bog'liq ekanligini isbotlashga imkon berdi. Bu tadqiqotlar zaminida keyinchalik patologik anatomiya va gistologiya vujudga keldi.

XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asr boshlarida yashagan xorazmlik tabib al-Karukiy Hazoraspiv o'z asarida kishi a'zolarining har xil kasalliklari va ularni dorilar bilan davolash usullarini bayon etgan; mashhur tabib Mahmud Hakim Yaypaniy Ho'qandiy esa o'z davrigacha sharq tabobati qo'lga kiritgan yutuqlarga shaxsiy tibbiy tajribalarini qo'shgan holda o'pka, yurak, sut bezi, me'da, jigar, ichak, buyrak, qovuq kabi a'zolari kasallangan, shishgan, toshmalar toshgan, mo'y-tirnoqlari kasallangan bemorlar, jarohatlangan va yara chiqqan, biror suyagi singan, zaharlangan, zaharli hayvonlar chaqqan kishilarni davolash ustida ish olib borgan.

Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bu yo'nalishda tibbiyot gurkirab rivojlandi. I. M. Sechenovning «Bosh miya reflekslari» (1863-yil) asari shifokor va fiziologlarda dunyoqarashning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Rus olimlari S. P. Botkin, I. M. Sechenov, I. P. Pavlov, G.A. Zaxarin (kasallikni aniqlashda bemordan so'rab ma'lumot yig'ish uslubini ishlab chiqqan), A.A. Ostroumov tadqiqotlari tufayli markaziy asab tizimi va butun organizmning faoliyati qonunlari nazariyi ta'riflab berildi. I.P. Pavlovning ovqat hazm qilish sistemasi fiziologiyasiga oid ishlari Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Uning oliv nerv faoliyati haqidagi ta'limoti barcha klinik fanlarning rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Matvey Yakovlevich Mudrov (1776—1831) — rus terapevtlar maktabining asoschilaridan biri. U bemorlarni so'rab-surishtirish va kasallik tarixini tuzishni Rossiyada birinchi bo'lib rusum qildi, bemorni klinik jihatdan tekshirish sxemasini ishlab chiqdi. M.Y. Mudrov kasallikni emas, balki kasalni davolash kerak, deb ta'kidlar va har kimga individual, ya'ni alohida-alohida davo qilishni yoqlab chiqar edi. U shifokorning asosiy vazifasi — kasallikni aniqlash va sabablarini bilib olish, har tomonlama davolash profilaktika chora-tadbirlarini o'tkazishdir deb hisoblar

edi. U Saratov va Peterburgda vaboga qarshi kurashda faol ishtirok qildi. Peterburgda vabodan vafot etdi.

Grigoriy Antonovich Zaxarin (1829—1897) — Moskva terapevtlar maktabining asoschisi. O'zining asarlari va klinik faoliyatida odamning tevarak-atrofdagi muhit bilan o'zaro munosabatlariiga hal qiluvchi ahamiyat berdi. U bemorni surishtirishning o'ziga xos uslubini ishlab chiqdi. Surishtirish uslubini tekshirishning boshqa uslublari (metodlari) bilan qo'shish, unga bemor organizmidagi anatomik o'zgarishlarni juda aniq bilib olish uchun imkon berdi. U laboratoriya va asboblar bilan bajariladigan uslublardan foydalandi va bularni qo'shimcha uslublar deb qaradi.

Davolashni u kompleks chora-tadbirlardan: gigiyena talablariga mos hayot kechirish iqlim bilan davolash (klimatoterapiya) va dori-darmonlar bilan yordam berishdan iborat deb bildi. Sil to'g'risidagi ta'limotga uning tomonidan ko'pgina yangiliklar kiritildi. Qimiz bilan davolashni amalda joriy qildi, fizioterapiya uslublarini shifobaxsh ta'sirini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Sergey Petrovich Botkin (1832—1889) — klinik tibbiyotdagi fiziologik yo'nalishning asoschisi. S.P. Botkin kasalliklarning patogenesizini tekshirishda, asosan, organizmning fiziologik aloqalarini o'rganish kerakligini birinchi bo'lib isbot qilib berdi. U sariq kasalligining yuqumli xastaliklar jumlasiga kirishini birinchi bo'lib aniqladi. Hozirgi vaqtda bu kasallik Botkin kasalligi deb ataladi. S.P. Botkin ko'pgina patologik jarayonlar organizmda nerv yo'llari bo'ylab reflektor tarzda o'tadi, degan qoidani oldinga surdi. U ter chiqarish markazini, taloqqa reflektor ta'sir ko'rsatish markazini tajriba yo'lli bilan kashf etdi va limfa aylanishi hamda qon yaratish markazlari bor, degan taxminni bildirib, turli organlardagi oqsil spetsifik tarzda tuzilgan degan fikrni birinchi bo'lib bayon qildi.

Aleksey Aleksandrovich Ostroumov (1844—1908) — mashhur rus terapevt-klinisisti. U yurakning I toni ketib chiqishi jihatidan klapanlarga bog'liq ekanligini birinchi bo'lib isbot qildi. Boshqa tadqiqotlari bilan tomirlarning devorlarida ham tomir toraytiruvchi, ham tomir kengaytiruvchi nervlar bortligini ko'rsatib berdi: ba'zi shishlar va ter ajralishining nevrogen xarakterda bo'lishini aniqladi.

Vasiliy Parfenovich Obrazsov (1851—1920) — yirik rus terapevt-klinisisti. Qorin bo'shlig'idagi organlarni fizik usul (palpatsiya usuli) bilan tekshirish uslubining yaratuvchisi. V.P. Obrazsov ko'krak qafasini bitta barmoq bilan bevosita tukillatib ko'rish uslubi

(metodi)ni ishlab chiqdiki, bu uslub tibbiyot amaliyotida keng ishlataladigan bo'lib qoldi.

Stetoskop yordami bilan eshitib ko'rilmaga, yurakdag'i payqab bo'lmaydigan tovush o'zgarishlarini to'g'ridan to'g'ri qulqutib eshitib aniqlash mumkinligini (galop ritmi normal III ton va boshqalarni) isbot qilib berdi. 1909-yili V.P. Obrazsov N.D. Strajesko bilan birgalikda yurak arteriyalari tiqilib qolgan degan tashxisni tirik kishiga qo'ydi va miokard infarktining klinik manzarasini bayon qilib berdi.

Maksim Petrovich Konchalovskiy (1875—1942). Asosiy asarlari hazm organlari patologiyasi, revmatizm va gematologiyaga bag'ishlangan. Kasallikni organizmning muhit sharoitlariga moslashuvchanligining buzilishidir, deb bilar edi. Trombopeniyalarda ko'rildigani jgut simptomini birinchi bo'lib bayon qildi (1910-yilda).

Nikolay Dmitriyevich Strajesko (1876—1952). Qon aylanish patologiyasi masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlari, stenokardiya va miokard infarkti, revmatizm, sepsis, me'da-ichak yo'li kasalliklari to'g'risidagi ta'limoti, ayniqsa, mashhurdir. U qorin bo'shlig'i organlari kasalliklarining fizik diagnostikasi prinsiplarini ishlab chiqdi, kolitlar, yara kasalligi, buyrak va o't pufagi kasalliklarining diagnostikasi bilan terapiyasini mukammallashtirdi. Qon aylanishi yetishmovchiligining yangi klassifikatsiyasini V.X. Vasilenko bilan birgalikda ishlab chiqdi.

Mixail Vasilyevich Chernorutskiy (1884—1957) — ichki organlar kasalliklarining patogenezi va klinikasida odam konstitusional xususiyatlarning rolini o'rganishga ko'p vaqtini bag'ishlagan. U revmatizm muammosiga, kasallikning avj olishi hamda taxminida nerv sistemasi, irlsiy omillar rolini o'rganishga katta ahamiyat berdi: allergiya muammosini muvaffaqiyat bilan ishlab chiqdi, revmatizm, o'tkir nefritlar, seroz plevritlar patogenizida allergyaning ahamiyatini o'rgandi.

Georgiy Fedorovich Lang (1875—1948). Uning asosiy ishlari yurak-qon tomirlar patologiyasi masalalariga bag'ishlanadi. Ichki kasalliklar to'g'risidagi ta'limotni rivojlantirishda G. F. Lang nerv sistemasining funksional o'zgarishlariga katta ahamiyat berdi va kasalliklarning kelib chiqishini I.P. Pavlovning fiziologik ta'limoti nuqtayi nazaridan talqin qildi. U gipertoniya kasalligini kelib chiqishida bosh miya po'stlog'idagi funksional o'zgarishlar (xususan, uning uzoq vaqt haddan tashqari zo'riqishi) yetakchi ahamiyatga

ega deb ko'rsatib berdi. G.F. Lang yurak-qon tomirlar kasalliklarining zamonaviy klassifikatsiyasini ishlab chiqdi. U gemitologiyada funksional yo'nalishni yaratdi, shu yo'nalish nuqtayi nazaridan olganda, bir qancha qon kasalliklari, qonning parchalanishi va hosil bo'lish jarayonlari nerv regulatsiyasining buzilishiga bog'liqdir.

Aleksandr Leonidovich Myasnikov (1899—1965)—ichki tibbiyotning eng muhim muammolariga: jigar patologiyasi, gipertoniya kasalligiga ko'p e'tibor bergan olimdir. A.L. Myasnikovning gipertoniya kasalligi mohiyat e'tibori bilan po'stloq dinamikasi va visseral o'zaro munosabatlarining murakkab tarzda buzilishining ifodasıdır, degan konsepsiysi hozirgi zamonning tegishli davolash profilaktika chora-tadbirlari kompleksi asosida yotadi. A.L. Myasnikov ateroskleroz muammosini o'rganishga katta hissa qo'shdi, shu kasallikda xolesterin almashinuvining buzilishi to'g'risidagi masalani o'z hamkorlari bilan birgalikda ishlab chiqdi. U aterosklerozning koronar yetishmovchilik va miokard infarkti singari asoratlariga alohida e'tibor berdi.

Vladimir Nikitich Vinogradov (1882—1964). U tekshirish uslublarini mukammallashtirish, profilaktika prinsiplari va faol terapiyanı tinmay hayotga tatbiq etib keldi. Ilk bor mashhur kasallik tarixi sxemasini yaratdi. V.N. Vinogradov beqiyos tashxischi edi. U dastlab o'z klinikasida qonning minutlik hajmini aniqlash, bronxoskopiya, gastroskopiya, yurakni kateterlash, radioaktiv izatoplar usuli va boshqa diagnostik uslublarni birinchi bo'lib qo'lladi. V.N. Vinogradov dori-darmonlar bilan faol davo qilish usullarining haqiqiy tashabbuskori edi. U rahbarlik qilayotgan shifoxonada penitsillin surunkasiga davom etadigan septik endokardit va krupoz (zotiljam) pnevmoniyada, kampalon va B_{12} vitamini xavfli anemiya (Addison-Birmer kasalligi)da, dikumarin — miokard infarktida, AKTG — bronxial astmada, streptomitsin, ftivazid va PASK sil plevritlarida birinchi bor ishlatildi.

V.N. Vinogradov so'nggi yillarda yurak-qon tomirlar sistemasi patologiyasiga, muammosiga — gipertoniya kasalligi, miokard infarkti, ateroskleroz, revmatizm tizimiga katta e'tibor berdi. Shu munosabat bilan V.N. Vinogradov o'zi boshqarayotgan klinikada fiziologik laboratoriya tashkil etdi.

V davr. Sotsialistik tuzumdagagi tibbiyot. Bu davrdagi ichki kasalliklarning rivojlanishi sohaning yetuk bilimdonları — V.P. Obrazsov va N.D. Strajesko (Kiyev), M.P. Konchalovskiy va D.D. Pletnev

(Moskva), G.F. Lang (Leningrad) nomlari bilan bog'liq. Taniqli olimlar tibbiyotning ichki kasalliklar sohasida ish olib borishdi: stenokardiya va miokard infarkti, yurakning revmatik yallig'lanishi va qon aylanishidagi yetishmovchilik, yara kasalligi va qandli diabet hamda qon kasalliklari shular jumlasidandir. Yurak-tomir kasalliklari: nafas organlari, ovqat hazm qilish, buyrak, qon sistemasi kasalliklarini o'rganishda V.X. Vasilenko, V.N. Vinogradov, I.A. Kassirskiy, A.L. Myasnikov, Y.M. Tareyevning xizmatlari juda katta. Kardiologiyaga oid muammolarni o'rganish, ayniqsa, muhim. TFAga qarashli Butunittifoq kardiologiya markazi bu sohadagi yagona ilmiy markaz hisoblanadi. Kardioxirurgiyaning rivoj topishi A.N. Bakulev, A.P. Kupriyanov, B.V. Petrovskiy, A.A. Vishnevskiy, E.N. Meshalkin va boshqalarning nomlari bilan bog'liq. N.N. Petrov va P.A. Gersen onkologiyani rivojlantirishga katta hissa qo'shishgan.

VI davr. Mustaqil O'zbekistonda «Ichki kasalliklar» fanining rivojlanishi va taraqqiyoti. Odamlarda uchraydigan kasalliklar, ularni davolash va oldini olishni o'rganadigan klinik fanlar asosiy davolash uslubiga ko'ra, terapiya va jarrohlikka bo'linadi. Tibbiyotning bu qismlari ham o'z navbatida, ayrim a'zo, sistemalar kasalliklarini o'rganish, davolashi, ba'zi kasalliklarning ko'p uchrashi, o'ziga xosligi hamda qo'llaniladigan asosiy tekshirish va davolash uslubiga ko'ra, yana bir necha sohalarni o'z ichiga oladi. Chunonchi, terapiya, kardiologiya, revmatologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, gematologiya, endokrinologiya, geriatriya, fitiziatriya, nevropatologiya, psixiatriya, kurortologiya, fizioterapiya, davo fizkulturasi, tibbiyot radiologiyasi va rentgenologiya qismlariga bo'linib rivojlandi.

O'zbekistonda ichki kasalliklarni o'rganishda tibbiyotga oid tadqiqotlar ko'lami kengaydi. Ateroskleroz, gipertoniya, miokard infarkti, stenokardiya, revmatizm, yurakning ishemik kasalligi, yurak porogi kabi yurak-tomir kasalliklari, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari (gastrit, kolit, enterit, enterokolit va boshq.), gepatit, chillashir, pellagra va boshqa kasalliklarning kelib chiqish sabablari, tarqalishi, davosi va oldini olish masalalari chuqur o'rganildi. Punksion biopsiya, laparoskopiya, radiogematografiya, ichki a'zolar kasalliklarini maxsus apparat yordamida aniqlash tufayli ichki kasalliklarning yangi klassifikatsiyasi tuzildi. To'qimalarda parazitlik qiladigan lyambliyalarni topish va u keltirib chiqaradigan kasallik — lyambliozi kompleks davolash usuli ishlab chiqildi.

O'tkir va surunkali pnevmoniya, bronxial astma kabi kasalliklar alohida e'tibor bilan o'rganilmoqda. Anemiya, leykoz kabi

kasalliklarni o'rganish va ularni davolashda talaygina yutuqlarga erishildi. Olimlardan M.I. Slonim, I.A. Kassirskiy, N.V. Danilov, A.N. Kryukov, M.F. Mirochnik va boshqalar bergen tadqiqotlarni keyinchalik Z. I. Umidova, A.X. Xo'jayev, E.I. Otaxonov, N.I. Ismoilov, A.A. Asqarov, A.S. Mnushkin, M.H. Hamidova, R.A. Abdullayev, R.A. Katsenovich, O.B. Bahodirov, K.B. Bahodirov, G.S. Sulaymonova, K.Y. Yo'ldoshev, T.M. Qoriyev, R.A. Qoraboyeva, X.I. Yanboyeva, A.M. Ubaydullayev, U.A. Asqarov va boshqalar davom ettirib kelishmoqda.

Endokrinologiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar (Y.H. To'ravulov, S.A. Ma'sumov, P.I. Fyodorova, R.K. Islombekov, E.G. Qayumov, Sh.Sh. Ilyosov) natijasida respublikamizning ayrim tumanlarida tarqalgan qalqonsimon bez kasalliklari (xususan, buqoq) keskin kamaydi. Ichki sekretsiya bezlari, diabetoldi holatidagi kishilarda lipidlar almashinuvi va gemodinamikasi o'rganildi. Fizoterapiya va kurortologiyaga oid olib borilgan tadqiqot va izlanishlar natijasida respublikada ko'pgina mahalliy ma'danli suv va shifobaxsh iqlimli joylar — «Chimyon», «Chortoq», «Toshkent» mineral suvi, Sitorayi Mohi Xosa ishlab turibdi. Bu sohada Y.K. Mo'minov, Z.A. Dolimov, R.A. Katsenovichlarning xizmatlari katta.

1.2. Fanga katta hissa qo'shgan o'zbek olimlari

Shokir Alimovich Alimov (1912—1976) — ftiziatr, O'zbekiston FAning akademigi (1974), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi (1962), tibbiyot fanlari doktori (1951), professor (1953), SamTIni tugatgan (1935), O'zbekiston sil kasalliklari ilmiy tadqiqot institutining ordenatori (1935—1940), Toshkent shahridagi 2-sil kasalxonasining bosh shifokori (1941—1943). Sh.A. Alimov silning epidemiologiyasi, oldini olish va davosi ustida ishlab, bemorlarni mehnat bilan davolashni ilgari surdi. Uning tashabbusi bilan O'zbekistonda mehnat bilan davolash sanatoriysi, ko'plab sil dispanserlari ochildi. O'zbekiston sil kasalliklari ilmiy tekshirish instituti, Toshkent ko'chalaridan biri Sh.A. Alimov nomi bilan atalgan.

Akbar Asqarovich Asqarov (1902—1978) — terapevt, O'zbekiston FAning muxbir a'zosi (1943), tibbiyot fanlari doktori (1947), professor (1948), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1956). 1927-yili O'rta Osiyo davlat universiteti tibbiyot

fakultetini bitirgan. Toshkent tibbiyot instituti «Fakultet terapiyası» kafedrasi mudiri (1941-yildan). A.A. Asqarov ko‘p yillar davomida me’da-ichak kasalliklari etiologiyasi, klinikasi va davolash (ayniqsa, o‘zbek taomlaridan tuzilgan parhez yordamida) usullari ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan. A.A. Asqarovning ingichka ichak, yo‘g‘on ichak, o‘t pufagi va jigar kasalliklari ustida olib borgan ilmiy ishlari tibbiyot nazariyasi va amaliyotini boyitgan. Ibn Sino «Tib qonunlari» asarining o‘zbekcha nashriga mas’ul muharrir va ruscha nashrining tahrir hay‘ati a‘zosi bo‘lgan. Toshkentdagi ko‘chalardan biri uning nomiga qo‘yilgan.

Ulug‘bek Akbarovich Asqarov (1928) — terapevt, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi (1990), tibbiyot fanlari doktori (1970), professor (1970). Ilmiy ishlari antibiotika-terapiya, gemitologiya, gastroenterologiya, diyetologiya va farmakalogiya masalalariga bag‘ishlangan. U.A. Asqarov O‘zbekistonda surunkali kolitning kelib chiqishi, patogenezi, klinikasi va davolash usullarini ishlab chiqqan. Xalqaro ilmiy anjumanlar qatnashchisi.

O‘ktam Karimovna Vahobova (1928) — terapevt-kardiolog, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi (1980), tibbiyot fanlari doktori (1972), professor (1973). Samarqand davlat tibbiyot institutining pediatriya fakulteti «Ichki kasalliklar» kafedrasi mudiri, institut rektori (1982—1986). Yurak-tomir kasalliklari, yurakning ishemik kasalligi, gipertoniya va aterosklerozning epidemiologiyasi, klinikasi va zamonaviy davolash usullari, shuningdek, uglevodlar va lipidlar almashinuvining biokimyoiy ko‘rsatkichlarini aniqlashga oid ilmiy ishlari bor. «El-yurt hurmati» ordeni bilan mukofotlangan (1998).

Tursunboy Boyjonovich Eshchonov (1940) — terapevt, O‘zbekiston FAning akademigi (1995), Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi (1984), O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan sog‘liqni saqlash xodimi (1994), tibbiyot fanlari doktori (1984). O‘zbekiston dermatologiya va venerologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori (1987—1990; 1998-yildan), Qoraqalpog‘iston Sog‘liqni saqlash vaziri (1990—1997), 1997-yildan O‘zbekiston FAning vitse-prezidenti, akademianing Qoraqalpog‘iston bo‘limi rayosati raisi, Qoraqalpog‘iston davlat universiteti «Farmakologiya, klinik farmakologiya va patologik fiziologiya» kafedrasi mudiri. T.B. Eshchonovning ilmiy asarlari allergik kasalliklarning etiologiyasi, epidemiologiyasi, klinikasi va davosiga bag‘ishlangan.

Nosir Ismoilovich Ismoilov (1901—1974) — terapevt, O'zbekiston FAning muxbir a'zosi (1947), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1948), tibbiyot fanlari doktori (1947), professor (1948). 1942-yildan ToshTI ichki kasalliklar propedevtikasi kafedra mudiri. Addison-Birmer kasalligi, chillashir, pellagrada ko'mikda qon yaratilishi, me'da-ichak, yurak-tomir va qon kasalliklari ustida ilmiy ishlar olib borgan.

Karim Yo'ldoshevich Yo'ldoshev (1933—1999) — kardiolog, O'zbekiston FAning akademigi (1995), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1983), tibbiyot fanlari doktori (1971), professor (1972). Toshkent shifokorlar malakasini oshirish instituti «Kardiologiya va funksional diagnostika» kafedrasи mudiri (1973-yildan), O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinosari (1973—1982), O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Salomatlikni tiklash va fizioterapiya ilmiy tadqiqot instituti direktori (1988-yildan), O'zbekiston FA rayosati a'zosi (1996-yildan) va tibbiyot fanlari bo'llimi raisi (1996—1998). K.Y. Yo'ldoshev ichki a'zolar klinik fiziologiyasi va patologiyasi, kardiologiya, gastroenterologiya, pulmonologiya, farmakoterapiya va salomatlikni tiklash muammolari ustida tadqiqot olib borgan. K.Y. Yo'ldoshev rahbarligida yurak-qon tomirlar, nerv, ovqat hazm qilish sistemalari, nafas a'zolari, tayanch-harakat apparati kasallangan bemorlar sog'lig'ini tiklash maqsadida organizmdagi a'zolar va sistemalar funksiyasining ma'romiga fizik omillar ta'siri o'rGANildi. U sharq tabobati markazini tashkil etib, uning faoliyatiga rahbarlik qildi. Rossiya tibbiyot FAning muxbir a'zosi (1991).

Niyoz Sulaymonovich Kelginboyev (1914—1978) — terapevt, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1965), tibbiyot fanlari doktori (1963), professor (1967). Toshkent shifokorlar malakasini oshirish instituti «Terapiya» kafedrasida intern-shifokor (1936—1939), ToshTI «Patofiziologiya» kafedrasida assistent (1939), harbiy qismlarga shifokor (1940—1945), ToshTI «Gospital terapiya» kafedrasida assistent (1945—1950), dotsent (1950—1958), O'lka tibbiyoti ilmiy tadqiqot institutida farmakoterapiya laboratoriysi (1959—1967), 1967-yildan bo'llim mudiri. Ilmiy ishlari farmakologiyaga oid. Kimyogar, botanik va farmakologlar bilan hamkorlikda strofantinni topib, klinikaga joriy etgan. Yurak kasalliklarini glikozidlar bilan davolash ustida tadqiqot **o'nb borjan**.

Rauf Abdullayevich Abdullayev (1922) — terapevt, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1968), tibbiyot fanlari doktori (1958), professor (1960), SamTl «Gospital terapiya» kafedrası assistenti (1943—1945) va shu institut rektori (1945—1951), 1952-yildan Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutining terapiya kafedrasida assistant, dotsent, kafedra mudiri (1961—1992), 1992-yildan 2-terapiya kafedrasida professor-maslahatchi. Ilmiy ishlari, asosan, yurak-tomir va jigar kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish va davolash masalalariga bag'ishlangan.

Rajab Qoplonovich Islombekov (1925) — endokrinolog olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1964), tibbiyot fanlari doktori (1961), professor (1964). «Normal anatomiya» (1948—1952), «Xirurgiya» kafedralari (1952—1957) assistenti, O'lka tibbiyoti ilmiy tadqiqot instituti endokrinologiya bo'limi mudiri (1958—1967), shu institut direktori (1967—1971), Moskva endokrinologiya instituti professori (1975). R.Q. Islombekov Y.T. To'raqulov bilan hamkorlikda dunyoda birinchi bo'lib buqoq kasalligini aniqlash va davolashning yangi usulini ishlab chiqdi. Bu kashfiyat uchun ular nufuzli mukofotga sazovor bo'lishgan.

Asosiy ilmiy ishlari sog' va kasallangan qalqonsimon bezning klinikasi, morfologiyasi va gistomorfologiyasi, shuningdek, radioaktiv yod yordamida triyeotoksikozni aniqlash va davolash masalalari hamda tarqoq va tugunli toksik buqoqning radioyod terapiyasi natijalarini o'rganishga oid R.Q. Islombekovning «Tahlikali zamonlar» (Moskva, 1995-yil, o'zbek va rus tillarida) esdaligi va bir nechta kitobi nashr etilgan. Rossiya Tibbiyot fanlari akademiyasi muxbir a'zosi (1969), Xalqaro axborot akademiyasi akademigi (1994).

1.3. Kasallik haqida tushuncha

Kasallik — organizm va eng muhim ichki organlar normal funksiyasining buzilishidir. Kengroq ma'noda kasallik — tashqi va ichki muhitning zararli ta'sirotlari natijasida organizm normal yashash faoliyatining buzilishi bo'lib, organizm himoya kuchlarining safarbar etilishiga qaramasdan, moslanuvchanligining susayib ketishi bilan xarakterlanadi.

Kasallik inson organizmining umumiy dardi bo'lib, u yemiruvchi va moslashtiruvchi hodisalarining birgalikda davom etib borishi, tekin moslashtiruvchi hodisalarining kamlik qilib qolishi bilan xarakterlanadi, natijada ko'pincha mehnat qobilyatining vaqtincha yoki butunlay kamayishiga olib keladi.

1.4. Etiologiya to'g'risida tushuncha

Etiologiya – kasallik yoki patologik holatning kelib chiqish sababini anglatadi. Kasallikni keltirib chiqaradigan tashqi va ichki sahablari bor. Tashqi omillarga infektion, mexanik, fizik (harorat) va boshqa omillar kiradi.

Infeksiya. Patogen (kasallik tug'diruvchi) mikroorganizmlar (streptokakk, pnevmokakk, dizenteriya tayoqchalari va boshq.) hamda viruslar kasallik sababchisi bo'lishi mumkin. Ular sog'lom odam organizmiga yoki to'g'ridan to'g'ri bemordan, yo'talganda, aksirganda, so'lagidan, tomog'i hamda yuqori nafas yo'llaridan chiqadigan shilimshiq, balg'amni tarqatib atrofdagilarga yuqtirganda o'tadi (infektion havo – tomchi yo'li bilan o'tish) yoki qanday bo'lmasin biror mikroorganizmlar bilan ifoslangan oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga tushadi (yuvilmagan sabzavot-mevalarni yeyish, qo'llarning kir bo'lishi).

Infeksiya bemorning ajralmalari bilan ifoslangan buyumlar orqali, shuningdek, changdan ham yuqishi mumkin. Patogen mikroorganizmlar terining shikastlangan joyidan (tirnalgan, shilingan joylaridan) ichkariga o'tib, yiringli teri kasalliklari – piidermiyalarga sabab bo'lishi mumkin.

Parazitar kasalliklar tirik qo'zg'atuvchilar tufayli paydo bo'ladigan kasalliklarning katta guruhini tashkil etadi. Bularning eng ko'p tarqalgani gelmintoz (gijja kasalligi)dir. Gijjalar ko'pincha sog'lom odamning hazm yo'llariga tuxumlari tushib qolishidan yuqadi (yuvilmagan qo'llardan, gijjalar tashib yurishi mumkin bo'lgan uy hayvonlariga juda yaqin yurish natijasida). Parazitar va infektion kasalliklarning qo'zg'atuvchilarini bir qancha hollarda qonso'rар hasharotlar orqali o'tadi. Chunonchi, bezgak chivinlari bezgak qo'zg'atuvchilarini, kanallar ensefalit va boshqa kasalliklarning qo'zg'atuvchilarini yuqtiradi.

Infeksiyalar paydo bo'lib, avj olib borishida organizmga qanday bo'lmasin biror turdag'i patogen mikroorganizmlarning o'tishigina emas, balki organizmning qarshiligi ham muhim rol o'ynashini aytib o'tish kerak. Mudom to'laqonli ovqatlanmaslik, jismoniy va

asabiy zo'riqishlar, sovuq qotib yurish natijasida organizmning zaiflashib qolishi uning infekzion kasalliklarga ko'rsatadigan qarshiligidini kamaytirib boradi.

Mexanik omillar. Mexanik sabablar tufayli paydo bo'ladigan kasalliklar jumlasiga miya silkinishi, lat yeishi, jarohatlanishi, suyaklar sinishi (suyaklarning ochiq va yopiq sinishi), bo'g'inlarning chiqishi va boshqalar kiradi. Ko'krak qafasi lat yeishi tufayli travmatik plevrit (plevra yallig'lanishi), travmatik pnevmoniya (o'pka yallig'lanishi, zotiljam) paydo bo'lishi, shuningdek, plevra yorilib, plevra bo'shlig'iga havo o'tishi – pevmotoraks vujudga kelishi mumkin. Mexanik shikastlar og'ir patologik holatlarga sabab bo'lishi, masalan, umurtqa pog'onasi sinib, orqa miya uzilib ketishiga, qon tomirlari shikastlanib qon ketib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bir qadar zo'raygan og'riqqa sabab bo'ladigan mexanik shikast shokka olib kelishi mumkin (odamning o'zidan ketib, arterial bosimining keskin pasayib, rangi oppoq oqarib ketishi). Vaqtida yordam ko'rsatilmasa, shok shikastlangan odamni o'limga olib kelishi mumkin.

Fizik omillar. Bularga odamning sovuq qotishi kiradi, bu respirator kasallik paydo bo'lishi sabab bo'ladi. Yelvizak, odamning sovuqda, yomg'irda qolib ketishi organizmga yomon ta'sir ko'rsatadi. O'tkir respirator kasallikka o'z vaqtida va yetarli davo qilinmasa, u asoratli bo'lib, traxeobronxit, bo'g'inlar yallig'lanishi, nefrit va piyelit – buyrak hamda buyrak jomlarining yallig'lanishi singari kasalliklarning paydo bo'lishi ham organizmning sovuq qotishiga bog'liq, deb hisoblanadi.

Organizm haddan tashqari uzoq vaqt davomida sovuq qotganda, uning barcha funksiyalari to'xtab qoladi va odam o'ladi. Agar odam ochiq havoda harakatsiz turadigan bo'lsa (masalan, mastlik holati), 1—2°C haroratda ham haddan tashqari sovuq qotib, o'lib qolishi mumkin.

Sovuqning qanday bo'lmasin, bemor tana qismiga mahalliy ta'sir ko'rsatishi sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin. Odam sovuqda uzoq turib qolganda, oyoq namlanganda qon aylanishi izdan chiqadi, terisi oqarib, eti uvushib qolganini sezadi. Sovuq olish yengil va og'ir darajali bo'lishi mumkin. Yengil sovuq olganda qon aylanishi osongina asliga keladi, sovuq olish og'ir darajada bo'lganda esa to'qimalarda qaytarib bo'lmaydigan organik o'zgarishlar – xirurgik aralashuvni talab etadigan nekroz paydo bo'ladi.

Havo harorati yuqori bo'lganda va yaxshi shamollatilmaydigan xonada, shuningdek, ostob joyda uzoq turish, mo'tadil va sovuq iqlim zonalardan birdan issiq iqlim zonasiga o'tib qolish va bunda gigiyenik maslahatlarga amal qilmaslik badan qizib ketishiga hamda issiqlik elitib qo'yishiga olib kelishi mumkin. Atmosfera bosimining o'zgarishi ham bir qancha kasalliklarga sabab bo'ladi. Masalan, dengiz sathidan 3500–4000 metr va undan ko'proq balandlikda odam burni qonab, umuman, darmonsizlanib, boshi aylanib qolishi mumkin. Bu nafas olinadigan havodagi parsial bosimning tez pasayishi bilan xarakterlanadigan balandlik kasalligi deb ataluvchi hodisa bo'lib, yetarli mashq qilmagan alpinistlarga maxsus kislorod asboblari berilganda va yakka o'zi ancha balandlikka tez ko'tarilganda ro'y beradi.

Atmosfera bosimi baland joydan odam atmosfera bosimi normal joyga tez o'tganda, qonda erigan gazlar pufakchalar hosil qilib, organizmning hayoti uchun muhim qismlari (jumladan, bosh miya)dagи mayda-mayda tomirlar (kapillarlar)ga tijilib qoladi. Bu Kesson kasalligi bo'lib, uning oqibatida organizm hayot faoliyatining buzilishiga olib keladi.

Kimyoviy omillar. Turli kimyoviy moddalar (kislotalar, ishqorlarning konsentrangan eritmalari) mahalliy ta'sir qilganda o'sha joylar qattiq kuyib qolishi mumkin.

Katta dozalardagi kuchli alkogolli ichimliklar organizmga nihoyatda zararli ta'sir ko'rsatadi. Tarkibida sivush moylari bo'ladigan alkogolli qo'l bola ichimliklar (samagon), ayniqsa zararlidir.

Ovqatlanishning buzilishi. Etiologik omillar qatoriga ovqatlanishning buzilishi ham kiradi. Yetarlicha ovqatlanmaslik, ortiqcha ovqatlanish ham zararlidir, ovqatga yolchimaslik organizmning holdan toyib, infeksiyaga ko'rsatadigan qarshiligi kamayib ketishiga, gipo va avitaminozlar paydo bo'lishiga olib kelsa, ortiqcha ovqatlanish oziq-ovqat mahsulotlarining energetik qiymati energiya sarfidan ancha ortib ketishiga olib boradiki, bu moddalar alma-shinuvi buzilishiga, odam semirib, uni yog' bosishiga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy omillar. Ijtimoiy sharoitlarning nobop bo'lishi kasalliklar paydo bo'lishida katta rol o'ynaydi. Chunonchi, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasining bir qancha mamlakatlarida ko'p yillik mustamlakachilikning oqibati sifatida aholi turmush darajasining pasayib ketgani infeksion, parazitar kasalliklarning tarqalishiga yo'l ochib, ovqatga yolchimaslik — avitaminozga sabab bo'ladi.

Kasb-korga aloqador kasalliklarning ko'payishi korxonalarda texnika xavfsizligining buzilishi natijasidir.

Salbiy his-hayajonlarning roli. Noqulay ta'sirotlar jumlasiga odamning ruhiy-asabiy jihatiga ta'sir qiladigan salbiy his-hayajonlarni kiritish kerak. Bu ta'sirotlarning beqiyos roli mavjudligini fiziolog I.P. Pavlov aytib o'tgan. Shifokor so'zi dardga malham bo'lish bilan birga, u odamni zabun qilib qo'yishi ham mumkin. Har bir tibbiyot xodimi bermorlar bilan muloqotda shuni esda tutishi kerak. Bemorga vaqtida aytilgan shirin so'z, tez orada sog'ayib ketishini istab bildirilgan yaxshi niyat, shifokor buyurganlarini muloyimgina qilib, qunt bilan eslatib turish uning sog'ayib ketishida juda muhimdir. O'rta tibbiyot xodimi tibbiyot deontologiyasining asoslarini bilishi kerak. Gohida nuqlu hadiksiraydigan serfikr bermorning ko'nglini tinchitish, kasallikning og'irligi haqidagi noto'g'ri xayollarini yo'qqa chiqarish zarur bo'ladi. Ikkinchchi tomondan, rejimni buzib, shifokor maslahatlariga parvo qilmaydigan intizomsiz bermorni uning o'zboshimchaligi yomon oqibatlarga olib borishi mumkinligi to'g'risida qat'iy ogohlantirib qo'yish kerak.

Allergik omillar. Allergiya organizm reaktivligi o'zgarib qolganligi tufayli, uning turli moddalarga ortiqcha sezgir bo'lib qolishidir. Allergiyada organizm sezuvchanligi ortib ketishining ma'lum xususiyatlari bor. Ilgari odam qaysi omillar (allergen)ga duch kelgan bo'lsa, u shu omilga ortiqcha sezuvchan bo'lib qoladi.

Klinik jihatdan olganda, bu allergik reaksiyalar deb ataladigan reaksiyalar bilan ifodalanadi. Allergik reaksiyalarning jadal va sust boradigan xillari bor. Jadal reaksiyalarga anafilaktik shok degan og'ir patologik o'zgarish kiradi. Jadal allergik reaksiyalar, odatda, organizm allergenga duch kelganidan keyin oradan 15—20 minut o'tishi bilan boshlanadi.

Sekin boradigan allergik reaksiyalarga birmuncha kechroq — bir necha soat, kundan keyin boshlanadigan organizm reaksiyaları, masalan, bir qancha o'simlik allergenlari (gul changlari) yoki sanoat allergenlari (bo'yoqlar) ta'sir qilganda paydo bo'ladigan dermatit (teri kasalliklari) kiradi. Allergik omilning roli katta bo'ladigan kasallikkha bronxial astma misol bo'lishi mumkin.

Irsiyat. Kasallikning ba'zi alomatlari va xususiyatlari nasldan naslga o'tishi mumkin. Qandli diabet, gipertoniya, yurakning ishemiya kasalligi va boshqalar irsiy bo'ladi. Tegishli turmush va mehnat sharoitlari, ovqatlanish va mikroiqlim sharoitlarini yaratib, irsiy kasalliklarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozim.

1.5. Patogenez haqida tushuncha

Etiologiya deganda u yoki bu kasallikni keltirib chiqaradigan jami sabablar tushuniladigan bo'lsa, patogenez etiologik omillar ta'sir etgandan keyin mazkur kasallikning avj olib borish mexanizmidir. Masałan, o't-tosh kasalligi etiologiyasida uch omil: infeksiya, o'tning turib dimlanib qolishi, ovqatlanish rejimining buzilishi muhim rol o'ynaydi. Bu kasallikning patogenezi esa jigar hujayrasi – gepatotsitlarda o't hosil bo'lish jarayoni buzilib, o't pufagida ma'lum biokimyoviy o'zgarishlar va o't suyuqligi harakatining buzilishi, o't toshlarining hosil bo'lishiga bog'liq.

Krupoz pnevmoniya, ya'ni zotiljam kasalligini patogen mikroorganizm – pnevmokokklar keltirib chiqaradi. Kasallikda qon tomirlari bilan mo'l-ko'l ta'minlangan mayda-mayda o'pka pufakchalari – alveolalarda yallig'lanish natijasida o'pkada seroz suyuqlik – ekssudat to'planib qoladi. Keyinchalik bu alveolalarga qon tomirlaridan fibrin, eritrotsitlar, leykotsitlar o'tib, o'pkaning funksiyasi buziladi. Jarayonga nafas sistemasidan tashqari yurak-qon tomirlar, nerv sistemalari va boshqalar qo'shilib qoladi. Kasallikning avj olib borish mexanizmi uni keltirib chiqaradigan qo'zg'atuvchining qanday bo'lishidan qat'i nazar (pnevmmokkk, streptokokk), bir xil bo'lib qolaveradi.

Kasallik qo'zg'atuvchisiga qarshi kurashga qaratilgan davo etiologik, patogenezning turli bo'g'inlariga qaratilgan davo esa patogenetik davo deb ataladi. Muvaffaqiyatli davolash uchun ayni shu bermor organizmi xususiyatlarini yaxshi bilish, unga qanday konkret omillar zararli ta'sir qilganligini aniqlab olish zarur. Kasallikning o'zidan ko'ra, konkret bermorni davolash kerak. Davlatimiz klinisistlari tomonidan patogenetik terapiyaga asos qilib qo'yilgan qoida ana shundan iborat.

Simptom – bu biron-bir kasallikning paydo bo'lishidagi ma'lum belgi yoki alomatlarining namoyon bo'lishidir. Masałan, yo'tal, bronxlar yallig'lanishi – bronxit simptomidir. Simptomlar subyektiv (so'rab-surishtirish natijasida aniqlanadigan, masalan, gipertoniya kasalligidagi bosh og'rig'i) va obyektiv bo'lishi mumkin (masalan, yurak porogida stetoskop yoki fonendoskop yordamida yurak eshitib ko'rilganda shovqin borligi ma'lum bo'ladi). Simptomlar yuqoridagilardan tashqari, laboratoriya, rentgenologik va funksional tekshirishning boshqa usullari bilan ham aniqlanadi. Masałan, me'da-yara kasalligini rentgenologik yo'l bilan

tekshirganda me'da shilliq pardasida «nisha», ya'ni «tokcha» nomini olgan o'zgarishli joy aniqlanadi; elektrokardiogramma (EKG)dag'i tegishli o'zgarishlar miokardda infarkt bo'lganligini aniqlab olishga imkon beradi; laboratoriya tekshiruvi yordamida siyidikda qand borligini topish mumkin, bu — qandli diabet kasalligi uchun xosdir.

Sindrom — bu bir kasallikka xos bo'lgan bir necha simptomlar yig'indisidir. Bir qancha simptomlarni bir-biriga solishtirib, tahlil qilib ko'rish asosida mazkur bemorning dardi falon kasallikdir, degan xulosani chiqarish mumkin.

Tashxis (diagnoz) — klinik tekshirish usullari orqali tekshirila-yotgan kishi salomatligining ahvoli, kasalligi to'g'risidagi tibbiy xulosadir. Uni shifokor bemorni har tomonlama tekshirib ko'rganidan keyin qo'yadi. O'z vaqtida va to'g'ri davo belgilash tashxisning aniq qo'yilishiga bog'liq. Qadimgi hakimlarning: «Kimki, to'g'ri tashxis qo'ysa, o'sha yaxshi davo qiladi», degan gaptari bor. Kam ifodalangan, aksari bilinmaydigan belgilarni aniqlab olish va demak, to'g'ri tashxisni qo'yishda o'rtta tibbiyot xodimi shifokorga katta yordam ko'rsatishi mumkin. Jumladan, u o'zining bemor ustidagi barcha kuzatuvlari to'g'risida navbatchiligi paytida va navbatchilik tugagandan so'ng ham batafsil ma'lumot berishi kerak, masalan, bemor kechasi yo'talgan, ko'p terlagan (gipergidroz), peshob vaqtida siyidi boshqa rangda tushgan, og'zidan qo'lansa hid kelgan, havo yetishmayotgandek sezayotganidan noliyotgan bo'lsa, mana shularning hammasini o'rtta tibbiyot xodimi yozib borishi va shifokorga ma'lum qilishi zarur. Bemorning ahvoliga baho berishda, tashxisni aniqlash, davo buyurishda ana shu kuzatuvlar va kasallikning boshqa ko'rinishlari hisobga olinadi.

Aniq tashxis qo'yishda laboratoriya va asbob-uskunalar bilan tekshirish usullarining ahamiyati katta. Masalan, qon kasalligi anemiyada subyektiv va obyektiv simptomlar aniqlangandan so'ng qonning tarkibini aniqlash uchun laborator tekshirish usullaridan foydalananiladi, qon tahlilining natijasiga asoslangan holda aniq klinik tashxis qo'yiladi. Asbob-uskunalar va rentgenologik tekshirish natijalari asosida me'da yara kasalligida «nisha» simptomni, EKGda esa miokard infarkti kasalligiga xos belgilarning aniqlanishi va boshqalar diagnostika uchun asosiy simptomlar hisoblanadi.

Simptomlar subyektiv va obyektiv bo'ladi, subyektiv simptomlar bemorlarda so'rab-surishtirish natijasida aniqlanadi. Masalan, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, me'da, yurak sohasidagi og'riqlar va ularning xarakterlari, tarqalish joylari.

Obyektiv simptomlar ko'rish, paypaslab ko'rish, dukillatib ko'rish, eshitib ko'rish orqali aniqlanadi. Masalan, teri rangining o'zgarishi, teridagi toshmalar, oyoq-ko'llar va yuzdag'i shishlarni aniqlash, o'pkaning aniq tovushlarini o'zgarishi, yurakdagi patologik shovqinlarni eshitish va boshqalar.

1.6. Kasallikning kechishi

Kasallik hamisha ham endi boshlanishidanoq sezilarli klinik simptomlar bilan namoyon bo'lavermaydi. Kasallikning yashirin yoki latent davri bo'ladi, bunda organizm qarshilik ko'rsatib, kasallik tug'diradigan u yoki bu omilga moslashish reaksiyalarini yuzaga chiqarib turadigan bo'lgani uchun subyektiv va bir qancha hollarda obyektiv simptomlar bo'lmaydi. Masalan, organizmga radioaktiv moddalar ta'sir qilgandan keyin nur kasalligining simptomlari dastlabki vaqtida unchalik kuzatilmaydi.

Sog'ayish davrida ushbu kasallikning yetakchi simptomlari bosilib, kasallik oqibatlari qoladi (masalan, infeksiyon kasalliklardan keyin quvvatsizlik hissi, tana og'irligining kamayib ketishi).

Kasallik avj olib borishida quyidagi davrlar tafovut qilinadi:

1. Inkubatsion (yashirin, latent) davr.
2. Prodromal davr (kasallik avj olib borishida uning asosiy klinik alomatlari ma'lum bo'lishidan oldin bo'lib o'tadigan davr).
3. Kasallik rasmona avj oladigan davr.
4. Sog'ayish davri.

Kasallik qanday o'tishiga qarab: o'tkir, yarimo'tkir, surunkasiga cho'ziladigan, ya'ni surunkali bo'lishi mumkin. O'tkir kasallikka gripp (birdan boshlanib, simptomlari tez kuchayib boradi, nisbatan qisqa davom etadi) va turli zaharlardan zaharlanish kiradi. Krupoz pnevmoniya, dizenteriya, infeksiyon hepatitis (jigar yallig'lanishi) va boshqalar ham o'tkir kasalliklar jumlasiga kiradi. Yetarlicha davo qilinmaganda, o'tkir kasalliklar surunkali tarzda o'tadigan bo'lib qolishi mumkin.

Kasallikning yarimo'tkir tarzda o'tishi – bu o'tkir va surunkali turlar o'ttasida turadigan oraliq davr hisoblanadi. Kasallik surunkali tarzda o'tayotganida bemor ahvoli yaxshilanib, kasallik simptomlari vaqtincha susayib qolishi yoki yo'qolib ketishi remissiya davri deyiladi.

Retsidiv, ya'ni qo'zish deb kasallik simptomlari bir qadar uzoq vaqt bosilib turgandan keyin yana paydo bo'lishiga aytildi.

Kasalliklarning oxirida asoratlar vujudga kelishi mumkin (masalan, o't-tosh kasalligida o't pufagi yorilib, qorin pardasining yallig'lanib ketishi).

Kasallik oqibati – bu qilingan davo tufayli ko'pincha sog'ayib ketish yoki dardning uzoq vaqt qaytarilib turishi, ya'ni remissiyaga o'tishidir. Lekin ba'zi hollarda kasallik surunkali turga aylanib ketishi, bedavo kasalliklar esa o'limga olib borishi mumkin.

Davo tashxis qo'yilgandan keyin boshlanadi. Davolash hamisha kompleks usulda olib boriladi. U rejim bilan davolash turini: ambulatoriya, kasalxona yoki sanatoriyada davolanishni o'z ichiga oladi. Rejim asosida o'rindan turmay yotish va umumiy rejimlar belgilanishiga qarab, o'mida yotish rejimini buyurishda shifokor bemorga nimalar kerakligini: bemorni mutlaq tinch qo'yib, unga doim qarab turish kerakligini yoki bo'limdagi oshxonaga, hojatxonaga borish uchun unga ruxsat berilganligi, nisbatan tinchlik kerakligini aniqlab oladi va h.k.

Davoning yana bir tarkibiy qismi parhezdir: parhez bilan davolash, ya'ni diyetoterapiya davo chora-tadbirlari kompleksida katta ahamyatga ega. Dori-darmonlar bilan davolash dori moddalarini turli xil yo'llar bilan organizmga kiritishni: ichirish, teri ostiga, muskullar orasiga, venadan yuborish, shuningdek, fizioterapevtik asboblar yordamida dori yuborishni ko'zda tutadi. Fizioterapiya, davolash fizkulturasi va sanatoriy- kurortlarda davolanish kasalliklarga davo qilishda katta o'rin tutadi. Davoning mana shu barcha turlarida o'rtta tibbiyot xodimining roli, shifokor buyurganlarini to'g'ri va tez bajarib borishi nihoyat darajada katta ahamiyatga ega. Bemorni davolash o'rtta tibbiyot xodimining asosiy vazifasi hisoblanadi. O'z vaqtida va sifatli ko'rsatilmagan tibbiy yordam bemor sog'ayishini qiyinlashtiradi. Bemorni davolash uchun tibbiyotda uning har xil usullari qo'llaniladi. Tibbiyotda qo'llaniladigan davolash usullari umumiy qilib an'anaviy davolash usullari deyiladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- *etiologik davo* – kasallikning kelib chiqishi sabablarini yo'qotishga qaratilgan davo (yuqumli kasalliklarda antibiotiklar bilan davolash, hasharoqlar chaqqanida antidotlar bilan davolash);

- *patogenetik davo* – kasallikning paydo bo'lish mexanizmiga ta'sir qiladigan davo (zararlangan to'qima va hujayralarning faoliyatini tiklash);

- *simptomatik davo* – kasallikning belgisini yo'qotishga qaratilgan davo (og'riqni qoldirish, tana haroratini tushirish);

- *psixoterapeutik davo* – kasallik natijasida paydo bo‘lgan ruhiy kechinmalarni yengillatishga qaratilgan davo (bemorni tinchlantrish, uni sog‘ayishga ishontirish, qo‘rquvni yo‘qotish);
- *parhez bilan davolash*, ya’ni diyetoterapiya;
- *fizioterapeutik davo* – suv, havo, quyosh, parafin, elektr toki bilan davolash.

Noan’anaviy davolash usullariga quyidagilar kiradi: *girudoterapiya* – zuluk bilan davolash; *igloterapiya* – igna bilan davolash; *fitoterapiya* – giyohlar bilan davolash va boshqalar.

1.7. Bemorlarni parvarish qilish

Bemorlarni parvarish qilish davolashda juda muhim omiildir. O‘rtta tibbiyat xodimi bemorni shifokorning aytganlariga qarab, parvarish qilib boradi. Kasal odamning sog‘lig‘i va hayoti shifokor buyurganlarini o‘rtta tibbiyat xodimining o‘z vaqtida bajo keltirib turishiga, yaxshi parvarish qilib borishiga bog‘liq bo‘lishini esda tutish lozim.

O‘rtta tibbiyat xodimining asosiy vazifasi – shifokorning aytganlarini aniq bajo keltirish, juda keskin vaziyatda ham muloyim va vazmin bo‘lish, bemorda kasallikning tez kunlarda o‘tib ketishiga ishonch uyg‘otish, unga mehribon bo‘lish va davo rejimini buzuv-chilarga nisbatan zaruriyatga qarab qattiqqo‘l bo‘lish, shifokorning jami buyurganlarini bajarish zarurligini bermorga uqtirib turishdir.

O‘rtta tibbiyat xodimi bemorni parvarish qilish kichik tibbiyat xodimini ham jalb qilishi mumkin. Xodimning o‘zi ozodalik, puxtalik va vijdongan mehnat qilishda namuna bo‘lishi, davlatimizning asosiy ijtimoiy vazifasi inson salomatligini muhofaza qilishdan iborat ekanligi hamda kasalliklarga qarshi kurashdek oliyanob ishda o‘rtta tibbiyat xodimi muhim rol o‘ynashini hamisha esda tutishi lozim.

O‘rtta tibbiyat xodimining ishida asosiy deontologik qoida (tibbiyat deontologiyasi – kasbga aloqador burch haqidagi fandir), yuqorida aytib o‘tilganlardan tashqari, so‘z bilan dardga shifo berish va so‘z bilan boshga halo solish mumkinligini uqib olish keraklidir.

Fan-texnika evolutsiyasi o‘rtta tibbiyat xodimining ish amaliyotiga ham kirib kelgan: bemorni radioapparatura yordamida ancha naridagi postdan kuzatib borish, yorug‘lik signalizatsiyasi, bemorlarning parvarishi jarayonidagi «kichik mexanizatsiya» sistemasi o‘rtta tibbiyat xodimi mehnatini yengillatib, maqsadga muvofiq qilib qo‘yadi.

1.8. Shoshilinch yordam ko‘rsatish tizimi

Keyingi yillarda O‘zbekiston ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimida katta o‘zgarishlar ro‘y berdi. Islohotlarning eng muhim yo‘nalishlaridan biri shoshilinch tibbiyat xizmatining shakllanishidir. Turli bosqichlarda shoshilinch yordamni tashkillashtirish, diagnostika va davolash usullariga, kadrlar tayyorlash va o‘qitishga zamonaviy yondashish 15—20 yil oldin bo‘lganidan ko‘p jihatdan farq qiladi. O‘z-o‘zidan shoshilinch tibbiyat xizmati xodimlariga, shifokorlarga hamda o‘rta tibbiyat xodimlariga talablar kuchaydi. O‘rta tibbiyat xodimining roli sezilarli ortdi. Holbuki, ko‘pchilik rivojlangan mamlakatlarda gospitalizatsiyagacha bo‘lgan bosqichda shoshilinch yordam ko‘rsatish o‘rta tibbiyat xodimlari zimmasiga yuklanadi. Baxtsiz hodisalar (jarohatlanish, suyak sinishi, kuyish, zaharlanish, tok urishi va h.k.) va to‘satdan o‘tkir kasallik — hayotga xavf soladigan holatlar (hushdan ketish, yurak sanchig‘i va boshq.) ro‘y berganda, kechasi-yu kunduzi ko‘rsatiladigan yordam turi *shoshilinch yordam ko‘rsatish* deyiladi. Shoshilinch yordam hodisa yuz bergan joyda (ko‘chada, uyda, ishda), bemorni kasalxonaga olib keta turib va tez hamda shoshilinch tibbiy yordami beriladigan shifoxonalarda ko‘rsatiladi.

Kasalxonagacha shoshilinch yordam ko‘rsatish xizmatini tez tibbiyat xizmati xodimlari amalga oshiradi (shahar tez tibbiy yordam ko‘rsatish shoxobchalarida). Tez tibbiy yordam ko‘rsatish xodimlarini chaqirish uchun yagona telefon raqami (103) joriy etilgan.

Tez tibbiy yordam shoxobchasi xodimlari mehnatga qobiliyat-sizlik varaqalari, sud-tibbiy eksperti xulosalari, shuningdek, bemorlarga yoki qarindoshlariga yozma ma‘lumotlar berish huquqiga ega emas. Shoshilinch tibbiy yordam barcha davolash-profilaktika muassasalarida ko‘rsatilishi shart. Qishloq joylarda kunning istalgan paytida tez tibbiy yordam ko‘rsatish, shifokorlar va o‘rta tibbiyat xodimlari zimmasiga yuklangan. Olis va borish qiyin bo‘lgan joylarda sanitariya aviatsiyasi vositalari bilan shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatiladi.

Tez tibbiy yordam mashinalari radiolashtirilgan bo‘lib, ikki tomonlama telefon aloqasi bilan ta’minlangan, nafas va narkoz berish apparatlari, kislorod ingalatorlar va elektrokardiograflar bilan jihozlangan. Shaharda va yirik qishloq hududlarida ixtisoslashtirilgan brigadalar: reanimatsion, kardiologik, nevrologik, toksikologik, pediatriya, intensiv terapiya brigadalari tashkil etilgan. Bu — uyda va yo‘lda keta turib, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatishga imkon beradi.

2-bob. BEMORNI BEVOSITA VA BILVOSITA TEKSHIRISH USULLARI

Bemorlarni umumiy tekshirish usullari ikki qismiga bo'lib o'rGANiladi. Bular: *subyektiv va obyektiv tekshirish usullari*.

2.1. Subyektiv tekshirish usullari

Subyektiv tekshirish usullari quyidagilardan iborat:

1. «Pasport» qismiga oid ma'lumot yig'ish (bemorning ismi va sharifi, yoshi, jinsi, turar joyi (manzili), ish joyi, kasbi).

2. Bemorning shikoyatini aniqlash:

- a) asosiy shikoyati;
- b) qo'shimcha shikoyati.

3. Mazkur kasallik tarixi (*anamnesi — Anamnesis morbi*):

- a) kasallik qachon va qanday boshlandi;
- b) o'z kasalligini qaysi sababga bog'laydi;
- d) mazkur kasalligi bilan shu vaqtgacha qayerlarda davolangan va uning natijasi;

- e) oxirgi vaqtdagi ahvoli;

- f) qanday yo'l bilan kasalxonaga yotqizilgan (o'zi kelganmi, biror kishi ko'magidami yoki tez yordam mashinasidami).

4. Hayot anamnesi (*Anamnesis vitae*):

- a) bemorni ishlash va turmush sharoiti;

- b) yoshligidagi kasalliklar;

- d) irsiy kasalliklar;

- e) hayz ko'rish sikli;

- f) allergik kasalliklar;

- g) teri va tanosil kasalliklari;

- h) ruhiy kasalliklar;

- i) yuqumli kasalliklar;

- j) sil kasalliklari;

- k) onkologik kasalliklar;

- l) zararli odatlari.

Subyektiv tekshirish usullari, asosan, so'rab bilish orqali amalga oshiriladi. *So'rab bilish* – kasallikni so'rab bilish, odatda, umumiy, ya'ni «pasport» ma'lumotlarni aniqlashdan boshlanadi. Yoshning ahamiyati shundan iboratki, ayrim bir kasalliklar – bo'g'ma, difteriya, qizamiq, qisman revmatizm va boshqalar faqatgina yoshlargagina xos kasalliklardir, boshqa, masalan, ateroskleroz, yomon sifatli o'smalar, miokard infarkti, gipertoniya kasalliklari yoshi ulg'aygan, qarilarda ko'proq uchraydi. Bemor yoshining uning tashqi ko'rinishiga mos kelishi ham ahamiyatga ega.

Agar bemor o'z yoshiga qaraganda qariroq ko'rinsa, bu hol uning yaqinda og'ir, sill aqituvchi kasallikni boshidan kechirganidan yoki hozirgi vaqtida shunday kasallik bilan og'riyotganidan guvohlik beradi. Aksincha, bemor o'z yoshidan yosh ko'rinsa, bu hol unda endokrin bezlar o'zgarishi borligi haqida taxmin qilishga asos beradi.

Jins shu jihatdan ahamiyatliki, ba'zi kasalliklar, masalan, me'da yarasi kasalligi ko'pincha erkaklarda va aksincha, xolesistit, o't-tosh kasalligi, ichki sekretsiya bezlari kasalliklari ko'pincha ayollarda ko'proq uchraydi.

Bemorning turar joyi haqidagi ma'lumotlaridan ham tashxis maqsadida foydalanish mumkin, chunki ba'zi joylarda ko'pincha ma'lum kasalliklar ko'p tarqalgan bo'ladi, masalan, botqoq yerlarda bezgak, nam iqlimli joylarda revmatizm uchraydi va h.k.

Bemorning kasbini bilish ham zarur. Chang ko'p chiqib turadigan yerlarda ishlovchi kishilarda bronxitlar va pnevmokoinozlar rivojlanishi mumkin; bo'yoqchilar, matbaachilar va qo'rg'oshin bilan bog'liq bo'lgan ishlarda ishlovchilarda qo'rg'oshin sanchig'i kuzatilishi mumkin.

Bemorning shikoyati. Dastlab bemorning o'z sog'lig'idan qilgan shikoyatlarini eshitish kerak, so'ng bu shikoyatlar shifokor bergan savollarga bemorning javoblari bilan qismrlarga bo'linadi. Masalan, agar bemor yo'taldan shikoyat qilsa, u holda yo'talning quruq yoki balg'am ajralishi bilan kechishini bilib olish zarur. Agar yo'tal balg'am kechishi bilan kechsa, balg'am tarkibida qon bo'lish-bo'lmasligini, u malina jelesini yoki zang rangini eslatadimiyo'qmi, uning tarkibida yiring bormi, hidi qanday, bir sutkada qancha balg'am ajralib chiqadi, bemor ertalab uyqudan turgach, ko'p miqdorda balg'am ajratadimi, shularning hammasini aniqlab olish zarur.

Agar og'riq yo'tal paytida sodir bo'lsa, u ko'krak qafasining qaysi tomonida sezilishini yoki og'riyotgan yerning aniq o'rmini, uning xarakterini va hokazolarni aniqlab olish kerak. Olingan javoblarga qarab, tekshirilayotgan kishida o'pka kasalligi borligini taxmin qilish mumkin. Bemor ahvoli haqida to'liq tasavvur qilish uchun unga organizmning boshqa sistemalariga taalluqli bo'ilgan savollar berish kerak. Masalan, ozgina jismoniy mehnat qilganida yuragi tez-tez urmaydimi yoki nafasi qismaydimi, yurak sohasida og'riq yo'qmi, yuragi notejis urmaydimi, ovqat yegandan keyin ko'ngli aynimaydimi, jig'ildoni qaynamaydimi, kekirmaydimi, ovqatlanishdan oldin va keyin epigastral sohasida og'riq sezmaydimi, qusmaydimi, ichi ketmaydimi, qabziyat bormi va boshqalar.

Siydik-tanosil sistema bo'yicha bot-bot siyiladimi, siyish vaqtida siydik yo'llari achiishmaydimi, siydik rangi o'zgarganmi (pivo, yuvilgan go'sht suvi rangi) ayollarda hayz ko'rish siklining buzilgan-buzilmaganligi, oqchil bor-yo'qligini bilish lozim. So'ng nerv sistemasi va sezgi organlarining holati: bemorning boshi og'rishi, uyqusizlik, bosh aylanishi, xotirasining susayishi, serjahlligi, ko'rish, eshitish, hid bilish sezgilarining bor-yo'qligi aniqlanadi.

Kasallik tarixi (anamnezi – Anamnesis morbi). Kasallik haqida so'rash – kasallikning rivojlanishi haqida so'rab bilish bilan to'plangan ma'lumotlarning jamiga kasallik anamnezi deyiladi. Odatda, bemorga quyidagi savollar beriladi: «Kasallik qachon va qanday boshlandi, to'satdan yoki sekin-asta, uning dastlabki alomatlari qanday edi?», «Kasallikning turli alomatlari qanday izchillik bilan rivojlandi, bemor ahvolining og'irlashgan va yengillashgan davrlari bo'ilganmi, agar bo'ilgan bo'lsa, hemor fikricha, qanday sabablar bemor ahvolining og'irlashishiga olib kelgan?», «Shu davrgacha bemor qanday davolangan va uning samaraliligi?»

Hayot anamnezi (Anamnesis vitae). Turmushi haqida so'rash – bemorning ishlash va turmush sharoiti, u o'sgan va rivojlangan atrof-muhitning bolalikda boshdan kechirilgan kasalliklar bilan bog'liqligi, ba'zi bir kasalliklar ancha ilgari boshdan kechirilganligi, bundan tashqari mazkur kasallikning rivojlanishi va kechishiga boshqa kasalliklar, ya'ni (irsiy kasalliklar) oila a'zolarining teri-tanosil kasalligi, onkologik kasalliklar, ruhiy kasalliklar, yuqumli kasalliklar, sil kasalliklari, qandli diabet va boshqa kasalliklar bilan og'iganligi va turli zararli odatlar, masalan, ko'p chekish, ichkilik ichish, nos chekish, narkotiklar qabul qilish va boshqalar ham ta'sir qiladi.

Bemor bilan shu sohada suhbatlashish oqibatida olingan ma'lumotlarning jamiga turmush anamnezini deyiladi.

Turmush anamnezini to'plash quyidagi izchillikda boradi: dastlab tarjimayi holiga oid ma'lumotlar bilan tanishiladi, keyin nasldan o'tgan kasalliklar, jinsiy va oilaviy turmush, yashash va ishlash sharoitlari va nihoyat zararli odatlar aniqlanadi.

2.2. Obyektiv tekshirish usullari

Obyektiv tekshirish usullari ikki turga bo'linadi. Bular: *asosiy* va *qo'shimcha usullar*. Asosiy tekshirish usullariga quyidagilar kiradi:

- a) ko'zdan kechirish;
- b) palpatsiya — paypaslab ko'rish;
- d) perkussiya — tukillatib ko'rish;
- e) auskultatsiya — eshitib ko'rish.

Qo'shimcha tekshirish usullariga esa quyidagilar kiradi:

- a) asbob-uskunalar yordamida tekshirish;
- b) laboratoriya yordamida tekshirish.

Ko'zdan kechirish (inspektio) — ko'zdan kechirishda bemorning ko'rinishi va umumiylahvoli, tana tuzilishi, teri va ko'zga ko'rinish turadigan shilliq pardalar holati aniqlanadi. Bemorning ko'rinishi va umumiylahvoli quyidagicha bo'lishi mumkin: qoniqarli, o'rtacha og'irlikda, og'ir, juda og'ir.

Bemorning holatlari quyidagicha bo'lishi mumkin: aktiv (faol), passiv va majburiy. Agar bemor o'rinda yotgan bo'lsa-yu, lekin o'zi bir yonboshdan ikkinchi yonboshga ag'darilib, o'tira oladigan, o'rnidan tura oladigan bo'lsa, bunday holat aktiv (faol) deb ataladi. Bemor o'zi harakatlana olmaydigan, ag'darila olmaydigan, boshi yoki qo'lini ko'tara olmaydigan bo'lib, qanday vaziyatga solinsa, shu vaziyatda yotaveradigan bo'lsa, bemorning bunday holatini passiv holat deyiladi.

Bemor o'z iztiroblarini yengillatishga urinib, o'rinda biror xil vaziyat olsa, bunga majburiy holat deyiladi. Chunonchi, nafasi qisadigan bemorlar qo'llari bilan karavotning chetiga tiralib, oyoqlarini osiltirib majburiy vaziyatda o'tiradilar, bronxial astma kasalligida, me'da yarasi teshilganda, peritonitda, appenditsit, perikardit, plevrit va boshqa kasalliklarda bemorlar majburiy holatga tushib qolishadi.

Bemorlarning passiv holatdan aktiv holatga o'tishi bemorlarning tuzalishidan darak beradi, aksi, agarida bemorlar aktiv holatdan

passiv holatga o'tsa, bemorlarning og'irlashishi yoki kasallikning qaytalanishi kuzatiladi. Masalan, o'sma, saraton kasalliklari hor bemorlar aktiv holatdan passiv holatga o'tib qolishlari mumkin.

Koma – hayot uchun muhim bo'lgan bosh miya markazlarining shikastlanishi munosabati bilan es-hushning tamomila yo'qolishidir. Komada muskullar bo'shashib, sezuvchanlik va reflekslar yo'qolib ketadi, har qanday ta'sirotga – og'riq, yorug'lik, tovush ta'sirotlariga reaksiya bo'lmaydi. Koma miyaga qon quyilganda, qandli diabetda, jigar qattiq shikastlangan hollarda, surunkali nefrit, zaharlanish hollarida uchraydi.

Sopor – uyqu holatidir. Qattiq-qattiq chaqirib yoki turtib-turtib bemor uyg'otiladigan bo'lsa, u savollarga javob berishi mumkin, keyin yana qattiq uxbab qoladi.

Stupor – karaxtlik holati, bunda bemor atrofdagi vaziyatni g'ira-shira biladi, savollarga istar-istamas va kechikib javob beradi.

Es-hush. Bemornlarda es-hushning har xil darajada aynishi ko'riladi. Es-hushining pasayib, kirarli-chiqarli bo'lib qolishi bilan bir qatorda, markaziy nerv sistemasi qo'zg'alishi tufayli yuzaga keladigan o'zgarishlari ham ko'riladi. Yuqumli kasalliklar, zotiljam, tepkili terlama (toshmali tif'da gavda harorati ko'tarilib turgan paytda uchraydigan alahlash hollari, gallutsinatsiyalar ana shunga kiradi.

Yuz ifodasi. Bemorni ko'zdan kechirishda, uning yuz ifodasiga ahamiyat berish kerak, chunki yuz ko'rinishi, odatda, bemor ahvolini ifodalaydi. Yuzning qarimsiq ko'rinishi bemor og'ir dardga chalinganidan va aksincha, yuzning tetik, sokin ifodasi kishining ahvoli yaxshiligidan guvohlik beradi. Ba'zi hollarda yuz ifodasi kasallikni aniqlashda yordam beradi. Masalan, ertalab yuzning, ayniqsa, qovoq sohasining shishishi buyraklar kasallangan deb o'yashga asos beradi, qovoqlar kamqonlikda, trixinellez, miksedema va anginevrozlarda ham shishishi mumkin.

Yurakning og'ir kasalliklarida yuz kepcchiydi, labning shilliq pardasi, qulinqning yumshog'i, burun uchi ko'karadi, og'iz ochilib qoladi, bemor havoni tutayotgandek tuyiladi. Qorin bo'shlig'i organlari o'tkir og'ir dardga chalingan bemorlar (masalan, osh-qozon yarasi teshilganda yuz bergan peritonit) yuzi Gippokrat ta'riflagan tipik ifodaga ega bo'ladi: yuzning ko'rinishi keskin, ko'z ichga botgan, yuz ko'rinishi horg'in, terisi kulrang bo'lib, undan sovuq yopishqoq ter chiqib turadi.

Qoqshol kasalligi bilan og'rigan bemorlar yuzining ifodasi xarakterlidir. Bunda yuzning barcha mushaklari hir vaqtning o'zida

qisqarishi tufayli og'iz kishi kulayotgandagi kabi kengayib ketadi, yuzning yuqori qismida va peshanada, kishi g'am chekayotgandagi kabi ajinlar paydo bo'ladi (sardonik kulgi), sil bilan og'riyotgan hemorlarning yuz ifodasi o'ziga xos bo'ladi, rangpar, yuzning yonog'i qizarib turadi, ko'zi katta ochilgan, qorachig'i katta, skleralar ko'k rangli bo'ladi.

Endokrin kasalligi bilan og'riyotgan kishilarning yuz ifodasi xarakterlidir: masalan, yaltiroq ko'zning chaqchayib turishi va kishining biror narsadan qo'rqqanga o'xshab ko'rinishi Bazedov kasalligi uchun, ko'kish tusli yuzning dumaloq oysimon qizilligi, ayollarda, bundan tashqari, yuqori labda va iyakda tuklar o'sishi gipofiz bezi o'smasi (Isenko-Kushing kasalligi) uchun xosdir.

Pastki jag', yonoq suyagi, qosh usti ravog'inining kattalashishi, katta burun, osilgan katta quloqlar, qalin lablar akromegaliya uchun xosdir.

Parezda yoki ko'zni harakatlantiruvchi nerv falajlanganda qovoqlar osilib qoladi: qovoqning osilib qolishi bosh miyada katta o'zgarishlar sodir bo'lganini ko'rsatadi. Nistagm, ya'ni ko'z soqqa-sining gorizontal tekislikda to'xtovsiz tebranma harakati miyaning ba'zi kasalliklarida, labirint funksiyasining buzilishi bilan kechadigan qulqasaliklarida, tarqoq yoki ko'p sonli sklerozda kuza tiladi. Ko'zning qimirlamasdan, bir nuqtaga qadalib turishi meningit bilan og'rigan kasallarda kuzatiladi.

2.3. Tana tuzilishi

Bemorning umumiy ko'rinishiga qarab, gavdasining tuzilishi va skletining rivoji to'g'risida fikr yuritish mumkin. Baland, past va o'rta bo'yli odamlar tafovut qilinadi. O'rtacha olganda, erkaklarning bo'yi 160 sm.dan 180 sm.gacha, ayollarning bo'yi 150 sm.dan 160 sm.gacha boradi. 190 sm.dan baland bo'y ulkan bo'y deb, erkaklar uchun 140 sm, ayollar uchun 130 sm.dan past bo'y pakana bo'y deb ataladi.

Gavdaning tuzilishiga qarab, odamlarning uch asosiy konstitusional tipi tafovut qilinadi: *asteniklar, gipersteniklar, normosteniklar*.

Astenik tipdagi kishilarning xarakterli belgisi bo'ylama o'lcham-larning ko'ndalang o'lchamlardan ustun turishidir. Teriosti yog' klechatkasi va muskul sistemasi sust rivojlangan. Terisi yupqa, quruq va rangsiz bo'ladi. Ko'krak qafasi tor va yassi, qovurg'alar qiyishiq yo'nalgan, epigastral burchak o'tkir bo'ladi, ko'kraklar ko'krak qafasidan qochib turadi. Bo'yin, qo'l va oyoqlar uzun bo'ladi.

Giperstenik tipdagи kishilarda, aksincha, ko'ndalang o'lchamlar yaqqol ifodalangan. Bunday odamlar teriosti yog' kletchatkasining anchagina rivojlanganligi va muskullarning yo'g'on bo'lishi bilan ajralib turadi. Ko'krak qafasi kalta, keng qovurg'alarining yo'naliши gorizontal, epigastral burchak o'tmas, qorin ancha katta, bo'yin, qo'l va oyoqlar kalta bo'ladi.

Normostenik — o'rtacha tip gavdaning mutanosib tuzilganligi bilan xarakterlanadi. Bunday odamlarda teriosti yog' kletchatkasi o'rtacha rivojlangan, muskullar baquvvat, ko'krak qafasi konus-simon, epigastral burchak (pastki qovurg'alarning xanjarsimon o'simtaga birikish burchagi) to'g'ri bo'ladi. Qo'llar, oyoqlar va bo'yin uzunligi normosteniklarda tana mos keladi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan konstitutsional tiplar funksional belgilari bilan farq qiladi. Gipersteniklarda moddalar almashinuv susaygan, ular yog' to'plab borishga, almashinuv kasalliklariga moyil bo'ladi. Asteniklarda almashinuv jarayonlari aktiv ravishda kechadi, ular yog' to'qimasini, hatto normal miqdorda ham to'play olmaydi.

Asteniklar sil bilan ko'proq og'riydi. Odamning gavda tuzilishiga qarab, psixik xususiyatlarini (xarakteri, temperamenti, mizojini) va hatto, muayyan ruhiy kasalliklar (shizofreniya, epilepsiya va boshq.)ga moyilligini aniqlashga ham urinib ko'rishgan. I.P. Pavlov mana shunday xatti-harakatlarga qarshi chiqib, organizmning fiziolgik xossalarni helgilab beradigan asosiy mezon nerv sistemasi va birinchi galda uning oliv bo'limi — hosh miya po'stlog'inining funksional holati ekanligini ishonchli qilib ko'rsatib berdi.

Odamning oriq-semizligi teriosti yog' qatlami va muskulasining nechog'liq rivojlangantligiga bog'liq (eti normal sog'lom odamlarda qorindagi teri burmasi 1 sm atrofida bo'ladi). Og'irlik bilan bo'y nisbati normal bo'lganida kilogrammlar hisobida olingan og'irlik santimetrlar hisobidagi bo'y minus konstitutsiya tipiga taalluqli tuzatish qo'shilgan 100 ga taxminan teng bo'ladi (konstitutsiya tipiga taalluqli tuzatish gipersteniklarda plus 10 %, asteniklarda — minus 10 % dir).

Terini ko'zdan kechirayotganda uning rangiga, turgoriga, namligiga, qon quyilgan yerkarning borligiga, tuk qoplaming holati va venalar turiga ahamiyat berish kerak. Terining rangi, asosan, unda tomirlar qay darajada rivojlanganligiga, terining qalinligi va qonning morfologik tarkibiga bog'liq. Teridagi tomirlar turi qanchalik rivojlangan bo'lsa, bu qon unga qizil rang berib

turadi, agar teri qalin bo'lsa, kapillarlar turi yaxshi rivojlangan bo'lishiga qaramay, qizil rang unchalik sezilmaydi, chunki bu holda qon qalin teri qavati ostidan yaxshi ko'rinxaydi.

Agarda qonda uni bo'yovchi modda — gemoglobinning miqdori kam bo'lsa (kamqonlikda), kapillar to'r yaxshi rivojlanganiga yoki terining yupqaligiga qaramay, u rangpar bo'ladi. Demak, terining rangparligi kamqonlikka, undagi tomirlar to'rining yaxshi rivojlanmaganligiga, teri ustki qavatlari tiniqligining pasayishiga, shuningdek, ko'pincha, jahl chiqqanda, qo'rqqanda, hushdan ketganda yuz beradigan tomirlar spastik qisqarishiga bog'liq bo'ladi. Surunkali nefritda tomirlar spazmi turg'un bo'lgani uchun terining rangparligi doimiydir.

Terining qizilligi tomirlarning kengayishiga bog'liq bo'lib, ko'pincha yuzga quyosh va shamolning doimiyo ta'siridan yoki ko'p ichkilik ichishdan kelib chiqadi. Ba'zan kishi g'azablanganda, uyalganda, hushidan ketganda va hokazolarda teri tomirlarining reflektor kengayishi mumkin, shunda yuz terisi qizil rangga kiradi. Yuzning turg'un qizilligi isitmasi bor bemorlarda, ayniqsa, isitmasi bor kamqon bemorlarda kuzatiladi. O'pka sili bilan og'riyotgan bemorlar bunga misol bo'ladi, ularning rangpar yonoqlarida qizillik paydo bo'ladi, buni ba'zan «sil qizilligi» deb ham yuritadilar. Butun teri va ayniqsa, yuzning kuchli qizarishi ba'zi zaharli moddalar, masalan, atropin, morfin, afyun, alkogol bilan zaharlanganda kuzatiladi.

Sianoz — qonda reduksiyalangan gemoglobinning mutlaq miqdori ko'payib ketganligi munosabati bilan teri va shilliq pardalarining ko'kintir — binafsharangga kirib qolishidir. Umumiy va mahalliy sianoz tasovut qilinadi. Gavdaning yurakdan uzoqdag'i qismlari (tirnoqlar, quloq solinchaklari burun uchi)dag'i sianoz akrosianoz deb ataladi.

Umumiy sianoz yurak va o'pka yetishmovchiligidagi; venoz qon o'pkani chetlab o'tib arteril qon bilan qo'shilib ketadigan ba'zi tug'ma yurak poroklarida; gemoglobinni metgemoglobinga aylantirib qo'yadigan moddalar bilan zaharlanganda paydo bo'ladi. Tananing cheklangan qismlarida paydo bo'ladigan mahalliy sianoz venalarining tiqilib yoki bosilib qolganiga bog'liq bo'lishi mumkin.

Sariqlik (icterus) — terida o't pigmentlarining to'planib qolishi tufayli uning sarg'ayishidir. Sariq kasalligida ko'z sklerasi va qattiq tanglay hamisha sariq tusga kirib qoladiki, bu shu kasallikni boshqa sabablar (oftobda qorayish, uzoq akrixin ichish) tufayli kelib

chiqadigan teri sariqligidan ajralib turadi. Sariq tusning ocho-to'qligi och sariqdan sarg'ish-yashil yoki zafaron tusgacha bo'lishi mumkin.

Bilinar-bilinmas darajadagi sariqlik subikterlik deb ataladi. Shuni nazarda tutish kerakki, sun'iy yorug'likda sariqlik bilinmay qolishi ham mumkin.

Terining sariq tusga kirishi hamisha qonda o't pigmentlari ortiqcha bo'lganida ko'rildi. O't yo'lini o't toshi yoki o'sma bekitib qo'yib, shu yo'l orqali jigsawidan ichakka o't odatdagicha oqib tusholmaydigan bo'lib qolgan paytlarda ana shunday hodisa ro'y berishi mumkin (dimlanishdan bo'ladigan mexanik sariqlik), qondagi o't pigmentlarining miqdori jigar hujayralarining kasalliklari (gepatit)da ko'payib ketishi mumkin, bunda jigar hujayrasida hosil bo'lgan o't faqat o't yo'llariga tushibgina qolmay, balki qon tomirlariga ham o'tadi. Bu xildagi sariqlik parenximatoz sariqlik deb ataladi.

Sariqlik eritrotsitlarning zo'r berib yemirilishi natijasida organizmda o't pigmentlari ortiqcha to'planib qolganida ham paydo bo'lishi mumkin, bunda bir talay gemoglobin ajralib chiqib, undan bilirubin hosil bo'ladi (gemolitik sariqlik). Badan terisining bronza yoki to'q sariq rangda bo'lishi Addison kasalligiga (buyrakusti bezlari po'stlog'i funksiyasi yetishmovchiligidagi) xosdir.

Teriga toshma toshishi va qon quyilishi. Bemorni ko'zdan kechirish vaqtida terisida toshmalar bor-yo'qligini aniqlashga katta ahamiyat beriladi. Teri kasalliklarida, o'tkir infektion kasalliklarda juda xarakterli toshmalar uchraydi, bular tegishli qo'llanmalarda batatsil bayon qilingan. Allergik holatlarda eshakemi (*urticaria*) toshib ketishi mumkin, bunday toshma badan qichitqi o'tdan toshadigan toshmaga o'xshagan bo'ladi: qizarib ketgan teri yuzasidan yassi oqish toshma ko'tarilib turadi. Eshakemi toshganida badan qichishadi.

Dog' (*macula*) – teri tomirlarining kengayishi natijasida teridagi kichik bir joyning qizarib turishidir. Pushti-qizil rangdagi katta-katta teri dog'lari eritema deb ataladi.

Tuguncha (*papula*), do'mboqcha (*tuberculum*) teridagi osongina qo'rga unnaydigan hujayralar to'plamidir. Bunday tuzilmalar ba'zan revmatizmda uchraydi: oyoq-qo'llarda sal bezillab turadigan, kattaligi olchadek bo'lib, qizargan teri bilan qoplangan do'mboq-chalar (*erytema nodosum*) paydo bo'ladi. Teriga qon quyilishi badan lat yeganida, mayda tomirlar infeksiyalar va zaharlardan zaharlanganida, avitaminozlarda uchraydi.

Terining namligi. Terining namligi ter chiqib turishiga bog'liq. Terining haddan tashqari quruq bo'lishi organizmda suv kamchil bo'lib qolganini (masalan, ko'p ich ketganida, qandli va qandsiz diabetda), uning oziqlanishi izdan chiqqanini, odamning umuman holdan toyganini, unda miksedema borligini ko'rsatadi. Zo'r berib ter chiqishi va terining ortiqcha nam bo'lishi revmatizm, sil, Bazedov kasalligida, isitma tushiruvchi vositalar, masalan, aspirin (asetilsalitsilat kislota) ichilganida ko'rindi.

Terining turgori. Terining turgori deyilganida uning tarangligini tushunmoq kerak. Terining bu xossasi, asosan, paypaslab ko'rish yo'li bilan aniqlanadi, buning uchun ikki barmoq bilan terini burma qilib, ushlab ko'rish va so'ngra uni qo'yib yuborish kerak. Turgor normal bo'lsa, burmasi tez yozilib ketadi. Terining turgori undagi hujayra ichi suyuqligi, qon, limfa miqdoriga va teriosti yog' kletchatkasining nechog'liq rivojlanganligiga bog'liqdir.

Turgorning pasayib qolishi klinikada ahamiyatga ega deb hisoblanadi, odam cho'p-ustuxon bo'lib ozib ketganida (kaxeksiya), ko'p suyuqlik yo'qotganida (ich ketishi, pilorus yoki qizilo'n-gachning torayib qolishi) shunday bo'ladi. Teri turgori pasayib ketgan bo'lsa, qalin yoki qo'l panjasining orqa yuzasidan olingen teri burmasi hadeganda yozilavermaydi.

Soch va tirnoqlarning ahvoli. Qov va qo'ltiqda jun bo'imasligi yoki siyrakligi jinsiy bezlar funksiyasining susayganligini ko'rsatadi. Junlarning haddan tashqari qalin va jun chiqmaydigan sohalarda bo'lishi, ba'zan endokrin kasalliklar borligidan dalolat beradi. Sochning to'kilib ketishi va mo'rt bo'lishi Bazedov kasalligida, boshdagi sochning har yer-har yerdan uya-uya bo'lib to'kilishi zaxmda kuzatiladi. Sochning barvaqt to'kilib ketishi oilaviy xususiyat tariqasida uchrashi ham mumkin. Tirnoqlarning mo'rt bo'lib qolishi va qatlam-qatlam bo'lib turishi vitaminlar almashinuvi buzilganida ko'rildi.

Limfa, muskul va suyak tizimlarini tekshirish. Limfa tugunlarining nechog'liq kattalashgani, konsistensiyasi, harakatchanligi va og'rish-og'rimasligini ko'zdan kechirish hamda paypaslab ko'rish yo'li bilan aniqlanadi. Limfa tugunlarining kattalashuvi regionar (mahalliy) yoki butun sistemaga tarqalgan bo'lishi mumkin. Limfa oqib boradigan yo'l bo'yida infeksiya o'chog'i yuzaga kelgan bo'lsa, limfa tugunlari bunga reaksiya ko'rsatib kattalashib ketadi. Masalan, angina, stomatitlarda jag'osti va bo'yin tugunlari kattalashadi. Limfadenoz, limfogranulematoz, silda bir talay limfa tugunlari

kattalashib ketadi. Rak metastazlarda zich, g'adir-budur, og'ri-maydigan, teriga yopishib ketgan limfa tugunlari qo'lga unnyadi. Limfa tugunlarida yallig'lanish jarayonlari avj olib, ular yiringlab ketganida o'sha tugunlar sohasida teri qizarib, tugunlarning o'zi liqillab turadi (flyuktuatsiya). Bunday tugunlar paypaslab ko'rila-digan bo'lsa, bezillaydi.

Muskullarni ko'zdan kechirishda ularning nechog'liq rivojlan-ganligi, shuningdek, falajlar, atrofiyalar, og'riqlar bor-yo'qligi aniqlanadi. Sog'lom odam organizmida bo'shashgan holdagi muskullar ham hamisha bir qadar taranglik holatida turadi. Mana shu holat muskullar tonusi deb ataladi. Markaziy nerv sistema-sining bir qancha kasalliklari (falajlar, nevritlar, polimiyelit)da muskullar tonusining pasayishi va kuchayishi ko'riliadi.

Suyak va bo'g'irlarni tekshirishda og'riqlar, qalinlashgan joylar, deformatsiyalar, bo'g'irlarning shishgani, shuningdek, harakat-larining hajmi singari simptomlarga ahamiyat berish kerak.

Shish. Normal miqdoridan ko'payib ketgan suyuqlikning to'qimalarda va to'qima yoriqlarida yig'ilishidan shish paydo bo'ladi. Shishlar turli-tuman kasalliklarda paydo bo'lishi mumkin. Suyuqlikning to'plangan joyiga qarab, shishning turli xillarini farq-laydilar: agar suyuqlik butun organizmdagi teriosti kletchatkasida to'plansa – anasarka, qorin bo'shlig'ida to'plansa – assit, plevra bo'shlig'idagi – gidrotoraks, yurakoldi xaltasida to'plansa – gidroperikardium, miya qorinchalarida yoki o'rgimchak uyasisimon qavat ostida to'plansa – gidrosefaliya deyiladi. Ayrim organlarda suyuqlik to'plangan hollarda «shish» so'zi ishlataladi. O'pka shishi, miya shishi, moyak xaltachasi shishi va h.k.

Tananing shishgan qismlari ustida teri taranglashadi, yaltirab turadi va o'zining normal holatini yo'qtadi. Agar shishgan yer bosh barmoq bilan bosilsa, u yerda barmoqning o'rni qoladi va u sekin-asta yo'qola boshlaydi. Shishlar turli kasalliklarda paydo bo'lishi mumkin. Yurak kasalligi bilan og'riyotgan hemorlarda shish o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi: ular oyoq, bel-dumg'aza sohasi va tananing yurakdan uzoqda hamda pastroqda joylashgan boshqa joylarida paydo bo'ladi.

Qon aylanishi buzilishining boshlang'ich bosqichi bilan og'riyotgan hemorlarning oyoqlarida shish kunning oxirida paydo bo'lib, kechasi yo'qolib, yurak mushagi dekompensatsiyasi kuchayganda shish butun tanaga asta-sekin tarqala boshlaydi va bo'shliqlarda suyuqlik to'planadi.

Buyrak kasalliklarida shish o'zining joylashishiga ko'ra, yuraktomir kasalliklari bilan og'riyotgan kishilardagi shishlardan farq qiladi. Buyragi kasallanganlarda shish ertalab yuzda, qovoq sohasida paydo bo'ladi va kechga borib yo'qolishi mumkin: ba'zi hollarda shish bemorlarning butun tanasiga tarqalgan bo'ladi.

Distrofik shishlar uncha ko'p bo'lmay, faqat to'piq sohasiga tarqaladi, lekin og'ir elementar distrofiya yuz bergan hollarda esa butun tanaga tarqaladi. Shunday distrofik shishlar yomon sifatli o'smalarda, silda, surunkali yiringli jarayonlarda, ba'zi yuqumli kasalliklar, masalan, terlama, dizenteriya, bezgak va boshqalarda kuzatiladi.

2.4. Palpatsiya (ushlab ko'rish, paypaslab ko'rish)

Tekshirilayotgan organ va to'qimaning bir qator funksiyalari palpatsiya yordamida aniqlanadi, masalan, tekshirilayotgan organ yuzasining xarakteri, uning shakli, konsistensiyasi, holati, kattaligi va atrofidagi boshqa organlar hamda to'qimalar bilan o'zaro munosabati, kasal deb taxmin qilinayotgan organ joylashgan zonada haroratning yuqoriligi, teri namligi va boshqalar. Bundan tashqari, palpatsiya yordamida bemor holati – sezuvchanligi yoki og'riq aniqlanadi. Bularning borligini bemor mimikasining o'zgarishi yoki tana yoxud qo'l-oyoqning reflektor harakatiga qarab bilib olinadi.

Yuzaki va chuqur palpatsiya farq qilinadi. Yuzaki palpatsiya – cho'zilgan bir yoki har ikki qo'lning kafti bilan qilinadi: bunda tekshirilayotgan yuzaga bosilmaydi. Palpatsiyaning bu turi qorinni tekshirayotganda katta ahamiyatga ega, chunki uning yordamida qorin devorining tarangligi, og'rishi, qorin bo'shlig'idagi jigar, taloq kabi organlarning kattalashganligi, shish borligi va boshqalar aniqlanadi. Patologik jarayon joylashgan yerni aniq bilishda chuqur palpatsiyadan foydalaniladi. U barmoqlar yordamida va zaruratga qarab, kuchli bosish bilan qilinadi. V.P. Obrazsov va N.D. Strajesko usullari bo'yicha chuqur, sirg'anma, metodik palpatsiyalardan foydalaniladi. Palpatsiyaning bu turidan foydalanib, ichakning ayrim qismlarini, me'danining katta egriligini, me'dadan chiqish yo'lini va qorin bo'shlig'idagi boshqa organlarni ushlab ko'rish mumkin. Chuqur palpatsiyada, palpatsiya qilinayotgan organning chegarasi, xususiyati boshqalarni yaxshi aniqlash maqsadida, uni

qorin bo'shlig'ining orqa devoriga qisish uchun qo'lni qorin bo'shlig'iga chuqur kiritish kerak.

Sirg'anma palpatsiya deyilishining sababi shundaki, palpatsiya qilinayotgan vaqtida qo'l ham, tekshirilayotgan organ ham sirg'anma harakat qiladi. Bunda palpatsiya qilinayotgan organ harakat qilinayotgan qo'l ostida nafas ekskursiyasi vaqtida sirpanadi yoki palpatsiya qilayotgan qo'l barmoqlari harakatchan organ ustida sirpanadi. Shuni qayd qilish kerakki, nafas ekskursiyasi vaqtida qorin bo'shlig'idagi organlar ham harakat qiladi, bunda organ diafragmaga qancha yaqin joylashgan bo'lsa, uning harakati shuncha kuchli bo'ladi.

Ma'lum hollarda bimanual palpatsiya deb ataluvchi palpatsiyadan, ya'ni ikkala qo'l bilan ushlab ko'rishdan foydalaniлади. Bunda bir qo'l tekshirilayotgan soha yoki organni ma'lum holatda ushlab turadi yoki palpatsiya qilayotgan qo'lga xususiyati o'rganilayotgan organni yaqin keltiradi. Palpatsiyaning bu turidan foydalaniб organni, masalan, buyrak yoki o'smani, ba'zan ikki qo'l bilan ushlab olib, ularning shakli, kattaligi, konsistensiyasi, xususiyati, yuzasi, harakatchanligi va boshqalarini aniqlash mumkin.

Palpatsiyaning bu turidan, asosan, buyrak, jigar, taloq, o'smalarli kattalashgan bachadon va ayollarning boshqa ichki organlarini tekshirishda qo'llaniladi. Turkisimon yoki ballotirlovchi palpatsiya qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilib qolganda jigar, taloq va o'smalarni ushlab ko'rishda qo'llaniladi. O'ng qo'l barmoqlari yozilgan holda bir-biri bilan jipslashtirilib, qorin devoriga, palpatsiya qilinayotgan organ bor deb taxmin qilingan sohaga perpendikular ravishda qo'yiladi: barmoqlar qorin devoridan olinmagan holda bir necha marta qisqa va kuchli turtiladi. Odatda, bunda barmoqlar qidirilayotgan organ yoki o'smaga borib uriladi.

Palpatsiya vaqtida bemor mushaklarini maksimal darajada bo'shashtirgan holatda turishi kerak. Tekshirish maqsadiga ko'ra, bemor palpatsiya vaqtida turgan, o'tirgan va yotgan holatda bo'lishi mumkin. Yotish holatida chalqancha va yonboshlab yotish kerak. Ko'pincha bemorlarni chalqanchasiga yotqizib tekshiriladi. Bunda bemorning boshi va yelkalari birmuncha ko'tarilgan bo'lishi kerak, chunki bunda qorin mushaklari birmuncha bo'shashadi. Qo'llarni tana bo'ylab uzatib yotish kerak, oyoqlari uzatilib, agar qorin mushaklari ortiq darajada bo'shashtirilishi talab qilinsa, tos-son va tizza bo'g'inlarini qisman bukib yotiladi.

2.5. Perkussiya (urib ko'rish, tukillatib ko'rish)

Perkussiya tekshirish usuli sifatida tibbiyotga 1761-yili Auenbruger tomonidan joriy qilingan bo'lib, hozir ham undan keng foydalaniladi. Tekshiriladigan joyga to'g'ridan to'g'ri ko'r-satkich barmoqning yumshoq yostiqchasi bilan tukillatib urib ko'rish orqali perkussiya qilish mumkin, lekin barmoqni barmoqqa urib perkussiya qilish ma'qul. Bevosita va bilvosita perkussiyani farq qiladilar.

Bevosita perkussiya bermor tanasiga bir yoki juftlangan bir necha barmoq uchlari bilan urib ko'rishdan iborat. Bilvosita perkussiyada zarb to'g'ridan to'g'ri bermor tanasiga berilmaydi, balki uning ustiga qo'yilgan hiror buyum orqali urib ko'rildi. Plessimetr deb atlaluvchi bu buyum rolini birorta qattiq metall (ko'pincha metall yoki suyak) dan yasalgan plastinka o'ynaydi. Uni ushslash qulay bo'lishi uchun, yonlari sal qayrilgan bo'ladi. Plessimetrga zarb barmoq yoki uchiga rezina o'rnatilgan maxsus bolg'acha bilan beriladi.

Hozirgi vaqtda barmoqqa barmoq bilan urib ko'rishdan iborat bilvosita perkussiya keng tarqalgan. Perkussianing hu turida ko'krak qafasiga zinch qilib qo'yiladigan chap qo'l o'rta yoki ko'rsatkich barmog'ining o'rta yoki tirnoqli bo'g'ini plessimetr bo'lib xizmat qiladi. Qo'lning boshqa barmoqlari ham bermor tanasi yuzasida turishi, lekin ular bilan plessimetr – barmoq orasida ma'lum masofa bo'lishi lozim.

Plessimetr – barmoqqa zerb, odatda, o'ng qo'lning yoy shaklida bukilgan o'rta barmog'i bilan beriladi. Bunda bolg'acha rolini o'ynayotgan barmoqning plessimetr – barmoqqa perpendikular tushishiga alohida ahamiyat berish kerak.

O'ng qo'lning boshqa barmoqlari birmuncha ko'tarilgan bo'lishi kerak. Bir tekis turkilar olish uchun perkussiya qilayotgan qo'l perkussiya qilinayotgan qo'l bilan barobar harakat qilishi lozim. Perkutor turki keskin berilishi kerak, ya'ni turkidan so'ng bolg'acha – barmoq plessimetr – barmoqdan sakrab qaytib ketishi shart: aks holda, bolg'acha barmoq plessimetr – barmoqqa ushlanib qolib, yuza to'qimalar tebranishini to'xtatib qo'yadi va bu bilan tovush to'lqinlari hosil bo'lishiga xalaqit beradi. Har bir yangi joy perkussiya qilinayotganda ketma-ket berilgan 2—3 turki hosil qilinayotgan tovush haqidagi tasavvur hosil qilish imkonini beradi (1-rasm).

Sog'lom odamda gavda ustidan uch asosiy tovush: *tiniq*, *bo'g'iq* va *timpanik* tovush aniqlanadi. Bu tovushlar qattiqlik darajasi va uzoq davom etishi bilan xarakterlanadi. Turli to'qimalarining shu tariqa tovush chiqarish xossalari bir necha sabablarga: to'qimalarining elastik xossalari, organlarda havo bor-yo'qligi va organ tuzilishining bir xilligiga bog'liq.

Tiniq tovush qattiq, past bo'lib, uzoq davom etadi. Elastik to'qima va havodan iborat o'pka ustidan chiqadi. Muskullar ustidan chiqadigan perkutor tovush, aksincha, sekin, baland va kalta — bo'g'iq bo'ladi (to'qimaning bir xilda tuzilganligi va havo yo'qligi uchun).

Elastik devorli ichi bo'sh organlar (ichak, me'da) ustidan me'yorda timpanik tovush chiqadi. Bu tovush har xil tonda, birmuncha balandroq yoki bo'g'iqroq bo'lishi mumkinki, bu — organ ichidagi havo miqdoriga va elastik devorlarining nechog'liq tarang turganligiga bog'liq (masalan, ichakda bir talay gazlar to'planib qolganida baland tonli qattiq timpanik tovush chiqadi).

Perkussiya vaqtida qo'yilgan maqsadga qarab, uning ikki turini farqlaydilar:

1) qiyosiy perkussiya, huning yordamida ikki anatomik bir xil qismning perkutor tovushi taqqoslab ko'rildi;

2) topografik perkussiya, bundan maqsad anatomik har xil bo'lgan sohalarni bir-biridan ajratish va shuningdek, organlar chegarasining tana yuzasiga aksini aniqlashdir.



I-rasm. Perkussiya.


2.6. Auskultatsiya (eshitib ko'rish)

Biror element tebranishi oqibatida hosil bo'luvchi tovushlarni eshitib ko'rish yo'li bilan ichki organlarni tekshirish usuli auskultatsiya deb ataladi.

Auskultatsiyaning ikki turini farqlaydilar:

1) bevosita auskultatsiya, bunda tekshiruvchining qulog'i bemor badaniga to'g'ridan to'g'ri qo'yiladi;

2) bilvosita auskultatsiya, bunda tovush stetoskop yordamida eshitiladi. Stetoskopdan tashqari fonendoskoplar ham qo'llaniladi. Ular bemor tanasiga qo'yiladigan varonka yoki membranalı maxsus kameradan va tekshiruvchi qulog'iga tiqib qo'yadigan ikki rezina



2-rasm. Fonendoskop.

naydan iborat bo'lib, ularning bir uchida oliva bor. Fonendoskoplar tovushni kuchaytirib, uni qisman o'zgartiradi, bu ularning noqulayligidir (2-rasm).

Auskultatsiya yordamida olindigan ma'lumotlarga to'g'ri baho berish uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur. Tekshirilayotgan bemorning ko'krak qafasi ochiq bo'lishi kerak, chunki stetoskop bilan tana o'rtasida biror narsaning

bo'lishi yoki shovqinlar hosil bo'lishiga olib keladi. Hatto tananing stetoskopdan uzoqda joylashgan yeridagi kiyimning ishqalanishi eshitib ko'rيلayotgan sohada hosil bo'layotgan tovushni o'zgartirishi mumkin. Eshitib ko'rيلayotgan joylarda jun ko'p bo'lsa, u stetoskopga ishqalanib, o'pka kasalligida hosil bo'ladigan tovushlarga o'xhash tovushlar hosil qiladi.

Shuning uchun eshitib ko'rishdan avval, jun bilan qoplangan yerlarni suv bilan namlash yoki yog' surtish kerak. Bemor eshitib ko'rيلayotgan xona tinch va issiq bo'lishi kerak, chunki mushaklarning sovuqdan qisqarishi tufayli eshitilgan tovushlar patologik tovushlarga o'xshab ketishi mumkin. O'pka eshitib ko'rيلayotganda bemor og'zini yarim ohib, chuqur va bir tekis nafas olishi kerak. Tekshiruvchi ko'krak qafasining o'ng va chap tomonidagi simmetrik joylarda eshitilayotgan tovushlar xarakterini chog'ishtirib ko'rishi kerak.

Yurak eshitib ko'rيلayotganda bemor dastlab tik holatda, so'ng yotgan holatda bo'lishi zarur. Eshitib ko'rيلayotganda stetoskop ko'krak qafasiga tik qo'yilishi va uning varonkasimon kengaygan yeri tana yuzasiga zinch yopishib turishi kerak. Aks holda bemor tanasi bilan stetoskopning tanaga tegib turmagan qirrasi orasidan o'tayotgan havo tovushni kuchaytirishi va uni noto'g'ri aks ettirishi mumkin. Shu bilan birga, ko'pincha stetoskopning teri ustida sirpanishi qo'shimcha tovushlar hosil qiladi.

Stetoskopni ko'krak qafasi ustiga kuchli bosish mumkin emas, chunki bu hol ko'krak qafasining eshitib ko'rيلayotgan yeridagi tebranishga xalaqit beradi va chuqruda joylashgan to'qimalar tebranishini havoga, demak, qulooqqa ham o'tishini susaytiradi. Eshitish vaqtida stetoskopni qo'l bilan ushlab turish mumkin emas, chunki barmoqlarning salgina harakati ham qo'shimcha tovush hosil qiladi.

3-bob. BEMORLARNI TIBBIY ASBOB-USKUNALAR YORDAMIDA TEKSHIRISH

3.1. Rentgenoskopiya va rentgenografiya

Bemorni rentgenologik tekshirish qo'shimcha tekshirishning muhim usullaridan biridir, chunki ichki organlar shakli va chegarasining o'zgarishini, shuningdek, organizm to'qimalarida sodir bo'lgan patologik o'zgarishlarni uning yordamida kuzatish mumkin. Bu tekshirishlar 1896-yilda Rentgen kashf etgan apparat, nurlar hosil qiluvchi nay yordamida amalga oshiriladi. Bu nurlar turli yorug'lik nurlari kira olmaydigan turli moddalarning ichiga kirish xususiyatiga ega.

Organizmning turli to'qimalari rentgen nurlarini har xil o'tkazadi. Masalan, ko'krak qafasi organlari rentgen yordamida tekshirilganda suyak, yurak, o'pkani aniq ko'rish mumkin, chunki suyak rentgen nurlarini to'liq tutib qoladi, yurak ularning bir qisminigina, o'pka esa havo tutuvchi organ bo'lgani uchun nurlarning juda oz qismini tutib qoladi. Organizm to'qimalarida rentgen nurlari tutilishi darajasidagi bu farqlar maxsus tayyorlangan nurli ekranda ba'zi organlar shakllarini ko'rish imkonini beradi. Agar ko'krak qafasi organlarining rentgen surati olinsa, rentgenogrammada ularni bir-biridan oson farqlash mumkin.

Rentgenologik tekshirish rentgenoskopiya yoki rentgenografiya shaklida o'tkaziladi. Rentgenoskopiya – tana bir qismini nurlantirib, uni nurli ekranda olingan tasviriga qarab o'rganishidir; rentgenografiya – tana bir qismining nurga sezgir (fotografik) plastinkaga olingan tasviridir.

Nafas olish tizimi a'zolarini rentgenologik tekshirish – sog'lom odamning ko'krak qafasi rentgen nurlari yordamida tekshirilganda ekranda qovurg'alar va yorug' o'pka maydonlari ko'rindi. O'pka maydonining markazida yurak, yirik tomirlar, traxeya, qizilo'n-gach, limfa tugunlari, shuningdek, umurtqa pog'onasidan iborat o'rtadagi soya ko'rindi. Bu o'rtadagi soyaning chetlari bo'ylab o'pka ildizi soyasi deb ataluvchi va o'ng hamda chap o'pkaga boruvchi yirik tomirlardan va limfatik tugunlardan iborat uncha

ifodalanmagan soya ko'rinadi. O'pka yoki plevra kasalliklarida o'ziga xos o'zgarishlarini rentgenologik usul bilan aniqlash mumkin.

Masalan, o'pkada yallig'lanish o'chog'i bo'Igan hollarda yallig'langan joydagi to'qima qalinishadi va yonida joylashgan sog'lom o'pka to'qimasiga qaraganda rentgen nurlarini ko'proq tutib qoladi. Shuning uchun, o'pka yallig'langan joyda ekran orqali unda ifodalanmagan soya ko'rinadi. Yangi o'sma hosil bo'Igan hollarda masalan, to'qima tig'iz bo'lib qoladigan va rentgen nurlarini juda kam o'tkazadigan o'pka rakida ekranda ifodalangan soya paydo bo'ladi, chetlarining qing'ir-qiyshiqligi va qattiqligi uni xarkterli xususiyatidir.

O'pkaning o'tkir absessida ekranda shakli aniq bilinib turadigan soya ko'rinadi. Agar absess o'mida ko'pincha ichi suyuqlik bilan to'ladigan bo'shliq hosil bo'lsa, ekranda suyuqlik sathi va uning ustida havo tufayli paydo bo'Igan yorug' dog' ko'rinadi. O'pkada havo bilan to'Igan sil kavernasi bo'lsa, ekranda yorug', yumaloq dog' ko'rinadi. O'pkada emfizematoz kengayish yuz bergan hollarda ekranda o'pka ildizlari yaxshi ifodalangan yorug' o'pka maydoni ko'rinadi.

Qon aylanish tizimi a'zolarini rentgenologik tekshirishda bemorni ekranga qaratib qo'yib, uning ko'krak qafasi yoritib ko'rilsa, yurakning ba'zi bo'limlari soyasinigina ko'rish mumkin: yurakning barcha bo'limlарини ko'rish uchun bemorni yonbosh holatlarda, ya'ni birinchi qiya holatda – bemorning o'ng yelkasini ekranga qaratib qo'yib va ikkinchisi qiya holatda – bemorning chap yelkasini ekranga qaratib qo'ygan holda tekshirish zarur.

Tekshirish boshida bemor ekranga qaratib qo'yiladigan holat – bu old holatdir. Bunday holatda sog'lom odamda o'ng tomonda ikki ravoqni ko'rish mumkin, bularning ustkisini yuqori kovak venasi soyasi, pastdagisini yurakning o'ng bo'lmasi soyasi hosil qiladi: chapdan to'rt ravoq ko'rinadi, ulardan birinchisi (ustkisi) aorta soyasiga, ikkinchisi – o'pka arteriyasi soyasiga, uchinchisi – yurakning chap bo'lmasi qulochchalar soyasiga va eng pastki to'rtinchisi yurakning chap qorinchasi soyasiga to'g'ri keladi.

Agar bemor birinchi qiya holatda (o'ng yelkasini ekranga qaratib) tursa, yurakning o'ng konturi yuqori qismi chap yurak bo'lmasi soyasidan hosil bo'ladi. Bu holatda yurak soyasi bilan umurtqa pog'onasi soyasi orasida yorug' yo'l ko'rinadi, uni retrokardial bo'shliq deyiladi. Bu bo'shliq yurakning chap bo'lmasi kattalashganda, torayishi yoki butunlay bekilib qolishi mumkin.

Ikkinci qiya holatda (chap yelka ekranga qaraganda) yurakning o'ng pastki konturi o'ng qorincha hisobiga hosil bo'ladi. Yurakning hamma bo'limlari kengayadigan yurak kasalliklarida yurakning soyasi hamma tomonda kattalashadi: bunda yurak bo'lmalarining ham, qorinchalarining ham pulsatsiyasi saqlanib qoladi. Agar perikard bo'shlig'ida suyuqlik to'plansa, unda yurak soyasi keskin kattalashadi, uning konturlaridan iborat ravoqlar tekislanib, yurak pulsatsiyasi zo'rg'a bilinadi yoki butunlay bilinmay qoladi.

Aorta anevrismida pulsatsiyalanayotgan va aorta bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha soyani kuzatish mumkin: aorta sklerozida uning soyasi kengayadi va ancha tezkor bo'lib qoladi.

Ovqat hazm qilish tizimi a'zolarini rentgenologik tekshirish. Qorin bo'shlig'idagi ichi bo'sh organlar rentgen nurlarini bir xil darajada ushlab qoladi, shuning uchun yoritib ko'rildganda ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Me'da-ichak yo'lini rentgenologik tekshirishda bu organlar ichiga kontrast moddalar deb ataluvchi va rentgen nurlarini tutib qolish xususiyatiga ega bo'lgan moddalar kiritiladi. Hozirgi vaqtida shu maqsadda bariy sulfatdan keng foydalanilmoqda.

Rentgenologik tekshirishdan oldin bemor bir kun ilgari kechqurun va tekshirish o'tkaziladigan kuni ertalab tozalovchi huqqa qilinadi. Tekshirish ertalab bemor ovqat yemasdan oldin o'tkaziladi. Me'dani tekshirishda bemorga shu yerning o'zida, rentgen apparati ekranasi orqasida 50—100 g suv bilan aralashdirilgan bariy sulfat beriladi. Kontrast massani yutish paytida rentgenolog uning qizilo'ngachdan o'tishi va me'daga tushishiga ahamiyat beradi. Qizilo'ngach toraygan hollarda bariy aralashmasi toraygan yerning yuqorisida tutilib qoladi. Me'da bariy aralashmasi bilan to'lganda uning shilliq pardasi relyefi aniqlanadi.

Shilliq parda relyefi kislota kamaygan gastrit bilan og'riyotgan bemorlarda atrofiyanishi oqibatida tekislanishi yoki kislotaligi yuqori bo'lgan gastritli bemorlarda shilliq pardanining gipertrofiyalangan qavatlanishi natijasida dag'allanishi mumkin. Me'da yarasi mavjud bo'lgan hollarda kontrast modda me'dani to'ldirish bilan bir vaqtda shilliq pardadagi nuqsonli joyni ham to'ldiradi.

Shuning uchun ham rentgenologlar bunday holda, odatda, «tokcha» simptomini, ya'ni yara o'mnida me'da soyasi bo'rtig'ini topishadi. Me'dada o'sma bo'lganida kontrast aralashma uni butunlay to'ldirmaydi, shuning uchun ham me'da soyasida yetishmovchilik ro'y beradi, uni to'lish nuqsoni deb atashadi. Me'dadagi kabi o'n

ikki barmoqli ichak yarasida ham «tokcha» simptomini sezish mumkin.

Yo'g'on ichakni tekshirishda irrigoskopiyadan foydalaniadi. Bunda kontrast aralashma yo'g'on ichakka to'g'ri ichak orqali kiritiladi. Yo'g'on ichakni rentgenologik tekshirish bemor me'dani tekshirishdagidek tayyorlanadi.

O't pufagining rentgenologik tasvirida (xolesistografiya) ba'zan undagi toshlar hisobiga paydo bo'luvchi yorug'likni ko'rish mumkin. O't pufagida hosil bo'lgan ba'zi toshlar rentgen nurlarini ushlab qola olmaydi, shuning uchun oddiy rentgen tasvirida ularni aniqlab bo'lmaydi. Shuni ko'zda tutib, o't pufagining tasviri qonga bilignost yoki ichdan bilitrast berilgandan keyin olinadi, bu moddalar qondan jigar orqali ajralib, o't pufagiga tushadi. Bunday holda qora fonda tosh joylashgan yerlarda dog' ajralib turadi.

O't pufagini tekshirish suv yoki moychechak damlangan suv bilan tozalovchi huqna qilingandan so'ng nahorda o'tkaziladi. Ichakdagi gazlar miqdorini kamaytirish uchun bemorga tekshirishdan bir necha kun avval karbonsuv (uglerod)lar va kletchatkasi oz bo'lgan ovqatlar tanovul qilish, shuningdek, kuniga 100—150 ml.dan 3 marta moychechakni damlab ichish tavsya qilinadi.

Bilitrast qabul qilinadigan kun bemor to'yib ovqatlanadi, shundan keyin ovqat yeyish tekshirish tamom bo'lgunga qadar man qilinadi. Faqat ma'danli suv va shirin choy ichishga ruxsat etiladi. Soat 18—19 larda bemorga 3 g bilitrast, 9 g shakar bilan aralashtirib beriladi, bu aralashma kam miqdorlar bilan yarim soat davomida qabul qilinadi va ustidan shirin choy ichib yuboriladi.

Shundan keyin bemor bilitrastning ingichka ichakka tezroq o'tishi uchun o'ng tomonga yonboshlab yotadi. Ertasiga ertalab (bilitrast qabul qilingandan 15—17 soat o'tgach) tozalovchi huqna qilinib, rentgenologik tekshirish o'tkaziladi. Tekshirish jarayonida bemorga o't pufagining bo'shash xususiyatini o'rGANISH uchun 2—3 tuxum sarig'i beriladi.

O't pufagini venaga konstrast modda yuborib o'rGANISH uchun maxsus tayyorlash talab qilinmaydi. 30—40 ml 20 % li bilignost venaga asta-sekin yuboriladi (4—5 minut davomida), aksincha, tez yuborilganda ko'ngil aynishi, quşish, darmonsizlik yuz berishi mumkin. Kontrast modda yuborilgandan 15 minut o'tgach, o't yo'llarini to'ldiradi. Oradan 1/2 soat o'tgach, o't pufagi bir xilda yaxshi ifodalangan soyadan iborat bo'lib ko'rindi.

Buyrak va siyidik chiqarish tizimi a 'zolarini tekshirishda kontrast modda siyidik yo'li kateteri orqali buyrak jomiga bevosita yuboriladi. Buni retrograd piyelografiya deyiladi. Bundan tashqari, kontrast moddalarni venaga, peroral to'g'ri ichakka yuborish, ajratish piyelografiysi deb ataladi. Bu usul kontrast moddalarning buyrak orqali ajralishiga asoslangan. Ko'pincha vena orgali piyelografiya qilish yoki urografiya deb ataluvchi tekshirish usuli qo'llaniladi. Ba'zi retrograd piyelografiyada kontrast suyuqlik o'rniqa kislorod yoki havo yuboriladi. Tekshirishning bu usuli pnevmopiyelografiya deb ataladi.


Hozirgi vaqtida urologiyada kontrast moddalar sifatida, asosan, yod preparatlari qo'llaniladi (sergozin, kardiotrast, triyotrast). Retrograd piyelografiyada sergozinning 10—40 % li eritmasi, venaga yuborishda esa 40 % li eritmasi qo'llaniladi. Kardiotrast va triyotrast 35—70 % li eritma holida 20 ml.dan venaga yuboriladi. Piyelografiya ovqatdan oldin o'tkaziladi. Tekshirishdan bir kun oldin kechqurun va tekshirish o'tkaziladigan kuni ertalab bemorga tozalovchi huqna qilinib, 2—3 tabletka karbojen ichiriladi. So'ng kateter sistoskop yordamida siyidik yo'liga kiritiladi va buyrak jomigacha yetkaziladi, shundan so'ng sistoskop olinib, kateter esa bermor rentgen xonasiga o'tkazilayotgan vaqtida tushib ketmasligi uchun leykoplastir yordamida sonning chap tomoniga yopishdirilib qo'yiladi. Rentgen kabinetida tana haroratigacha isitilgan 7—10 ml kontrast modda shpris yordamida kateter orgali yuboriladi va tasviri olinadi.

Vena orgali piyelografiya o'tkazilganda yangi tayyorlangan sergozinning 40 % li eritmasi tana haroratigacha isitilib, bermorning tirsak venasiga asta-sekin yuborila boshlaydi. Birinchi surat kontrast modda yuborilgandan 7—8 minut o'tgach, keyingilari esa buyraklarning ajratish xususiyatiga qarab, 15—20 yoki 25—45 minut o'tgach olinadi.

Elektrokardiografiya – EKG, fonokardiografiya – FKG, ossillografiya, ballistikardiografiya – BKG, exokardiografiya, koronografiya, kapillaroskopiya, ya'ni yurak-qon tomirlar tizimi kasalliklarida qo'llaniladigan qo'shimcha tekshirish usullari darslikning tegishli bobida batafsil yoritilgan.

3.2. Endoskopiya

Endoskopiya (yunon. *endon* — ichki, ichkarida va *skopeo* — ko'raman) — qovoq, ichi bo'sh organlarni maxsus optik asbob – endoskop yordamida ko'rib tekshirish usuli. Endoskop – jarroh-



3-rasm. Endoskop va uni qo'llash.

sistema bilan ta'minlangan metall naydan iborat. Zamonaviy endoskoplarda tolali optika mavjud bo'lib, uning yordamida sog'lom yoki kasallangan organ ichki yuzasining mukammal tasvirini olish, shuningdek, bir qator davo muolajalarini o'tkazish, ya'ni gistoligik tekshirish uchun biopsiya olish, yot jismlar va kichik o'smalarini olib tashlash, polip, yaralarni kuydirish, mayda tomirlardan qon ketganda uni to'xtatish mumkin.

Endoskop ko'pgina kasallikkarni barvaqt (masalan, rentgenologik tekshirishga nisbatan oldinroq) aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, tolali optika bilan ta'minlangan endoskoplar diagnostik maqsadga muvofiqdir. Ko'pgina yirik davolash muassasalarida maxsus endoskopik bo'lim va kabinetlar tashkil etilgan.

Endoskopni mutaxassis shifokor mahalliy og'riqsizlantirish (anesteziya) yoki umumiy narkoz yo'li bilan bajaradi. Endoskopiya qilinganda bemor og'riq sezmaydi va hech qanday asoratlar yuzaga kelmaydi.

3.3. Ultratovush tashxisi (UTT)

Hozirgi vaqtida ichki a'zolar (buyrak, jigar, o't qopi, yurak, endokrin bezlar) kasalliklarini aniqlashda ultratovush bilan tekshirish keng qo'llanilmoqda. Chunki bu usul eng oxirgi fan yutuqlariga asoslangan bo'lib, bemor hamda tibbiyot xodimi uchun zararsiz usuldir.

Masalan, buyrak o'ziga xos ultratovush tuzilishiga ega. Uning tashqi tomonida parenximada exosignal yo'q. Kosacha — jom sistemada esa exosignal yuqori. Bo'ylama exogrammada normal buyrak

likda, gastroenterologiya, pulmonologiya, urologiya, ginekologiya va boshqalarda diagnostika hamda davolash maqsadida qo'llaniladi. Bronxoskopiya (bronxlarni tekshirish), gastroskopiya (me'dani tekshirish), rektromanoskopiya (to'g'ri va sigmasimon ichakni tekshirish), xistoskopiya (qovuqni tekshirish) va h.k.

Endoskop tasvirni kattalashtirib ko'rsatadigan yoritish sistemasi va ko'pincha optik

oval shaklda bo'lib, konturlari tekis va fibroz pardasi (kapsula) aniq ifodalananadi.

Kosacha — jom sistemasi zich exostrukturaga, turli shakl va o'lchamga ega. Buyrakning normal o'lchami bo'ylama qatlamlarida 10—12x3, 5—4,5 sm, ko'ndalang 5—6x3,5—4,5 sm.ga teng.

3.4. Kompyuter tomografiysi

Kompyuter tomografiysi (KT) zamonaviy diagnostik tekshirish usuli bo'lib, 1972-yilda G. Hounsfield, A. Sormac tomonidan ixtiro qilingan. Ularga bu ixtiro uchun 1979-yilda Nobel mukofoti berilgan.

KTda boshqa rentgen tekshirish usullarida ishlataladigan rentgen nurlaridan foydalaniлади. Oddiy rentgenografiyadan farqli o'laroq, KTda odam tanasining ko'ndalang kesim yuzasi rentgen nurlari yordamida suratga olinadi. Bunda odam tanasining har bir mm qavatini o'rghanish mumkin. Bunday imkoniyat oddiy rentgenografiya tekshirish usulida yo'q. KTda nurlar maxsus matritsaga yuboriladi. Matritsadagi axborot kompyuterga keladi. Kompyuterda matritsadan olingen axborot yordamida odam tanasidan o'tgan X — nurlarning yutilishi monitorda namoyon bo'ladi. Shunday qilib, ekranda nurlarning yutilishida hosil bo'ladigan har qanday kichik o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Bunday o'zgarishlarni yaxshiroq ko'rish uchun ayrim hollarda kontrast moddalardan foydalaniлади.

KT yordamida hozirgi vaqtida bosh miya, orqa miya, umurtqa pog'onasi, o'pka, ko'krak qafasi a'zolari, jigar, buyrak, me'daosti bezi, buyrakusti bezi, aorta va o'pka arteriyalarini tekshirish mumkin.

2000-yildan boshlab, KTning yangi avlod turlari paydo bo'la boshladi: spiral kompyuter tomografiysi (SKT), multispiral kompyuter tomografiysi (MSKT).

3.5. Magnit-rezonansli tomografiya (MRT)

Magnit rezonansli tomografiya tekshirish usuli yadro — magnitli rezonans prinsipiiga asoslangan. Ayrim atom yadrolari, masalan, vodorod yadrosi bir jinsli magnit maydonida magnitga o'xshab harakatlanadi. Yadrolri rezonans hosil qilish uchun odam tanasi atrofiga qisqa to'lqinli radioto'lqinlar yuboriladi.

Magnit maydonida hosil bo'lgan energiya datchiklar yordamida registratsiya qilinadi. Registratsiya natijalariga ko'ra, odam tanasi to'qimalarining kimyoviy va biologik holatiga baho beriladi. Hozirgi vaqtida YMR — tomografiya tekshirish usuli asosiy informatsion-diagnostik tekshirish usuli hisoblanadi.

3.6. Skanerlash

Diagnostika maqsadida radiosfarmatsevtik preparatlaridan foydalanishga asoslanib turib, bemorni tekshirishning bu usuli tibbiyotda radioizotoplар yordamida skanerlash deb ataladi. Bu moddalar zarar qilmaydigan juda oz miqdorlarda organizmga yuborilganidan keyin skaner deb ataladigan maxsus asbob yordamida tekshirilayotgan organning katta-kichikligi, shakli, holati va funksional ahvoli to'g'risida axborot olish mumkin.

Bemorni rentgenologik yo'l bilan tekshirish uchun biror monejlik bo'lgan hollarda skanerlashni qo'llash mumkin. Ba'zan skanerlash klinik usullarni hisobga olmaganda kasallikni aniqlab olish yoki patologik jarayonning o'rnatishini belgilab olishda yagona diagnostik usul bo'lib qoladi. Maxsus asbob skaner yordamida qog'oz yoki fotoplyonkaga a'zolar ko'rinishi suratga olinadi.



3.7. EKG olish va uni sharhlash

Elektrokardiogramma – hu yurak muskuli ishlayotganida hosil bo'lgan elektr impulslarini aks ettiruvchi egri chiziq. Elektrokardiogramma elektrokardiograf yordamida qog'ozga yoki fotoplyonkaga tushiriladi. Butun gavdaga tarqaluvchi yurak toklari (harakat toklari) EKGsi gavdaning turli qismlari (ko'krak qafasi, qo'l va oyoqlar)ga o'rnatilgan va elektrokardiografga ulangan elektrodlar bilan yozib olinadi.

Hozirgi zamon texnikasi yutuqlari tekshirilayotgan odam ancha uzoq masofada bo'lsa ham tele- yoki radiouzatkichlar yordamida EKGni yozib oladigan apparatlarni yaratish imkoniyatiga ega. Bunday usullar og'ir jismoniy sinovlarda, sportchilar, kosmonavtlar va boshqalarning yurak faoliyatini kuzatish imkonini beradi.

Sog'lom odamlar EKGsi gavda tuzilishi, yosh va boshqalarga bog'liq. Ammo normal EKGda har doim yurak muskulining ketma-ket qo'zg'alishini aks ettiruvchi tishchalar va intervallar (oraliqlar)ni farq qilish mumkin. Turli kasalliklarda EKG tishchalarining o'lchami, ularning davom etishi va yo'nalishi, intervallar (segmentlar)ning davom etishi hamda joylashishi anchagini o'zgaradi.

EKG yordamida yurak ritmining turli o'zgarishlari, yurakning ishemik kasalligi, miokard infarktining xarakteri va bosqichlari aniqlanadi. Yurak kasalliklarini EKG yordamida diagnostika qilish boshqa tekshirish usullari ichida yetakchi o'rinni egallaydi.



EKG

P=0,05" gacha
P-Q=0,17"
QRS=0,08"
QT=0,35"

Elektrokardiogrammani yozishda uch standart va oltita ko'krak ulanishlaridan foydalaniladi. I standart ulanishda elektrokardiogramma elektr toklari ulanish holatida o'ng va chap qo'lidan yozib olinadi. IIsida elektr toki, o'ng qo'l va chap oyoqdan, III sida chap qo'l va chap oyoqdan yozib olinadi.

Elektrokardiogrammani ko'krak ulanishida yozib olishda harakat toki bevosita yurak sohasida olinadi. Elektrodlarning biri o'ng qo'lga bog'lanib, hamma ko'krak ulanishlari yozib olinmaguncha

yechilmaydi. Ikkinci ko'krak elektrodi ko'krak qafasining quyidagi nuqtalariga o'rnatiladi. To'shning o'ng qirrasida to'rtinchi qovurg'a oralig'iga—birinchi ko'krak ulanishi (CR_1 yoki V_1), beshinchi qovurg'a oralig'ida to'shning chap qirrasida — ikkinchi ko'krak ulanishi (CR_2 yoki V_2); keyinchalik ko'krak elektrodi beshinchi qovurg'a oralig'idagi ma'lum tanish chiziqlar bo'ylab har doim olib qo'yib turiladi, shunday qilib, elektrodning chap to'sholdi chizig'ida joylashgani uchinchi ulanish (CR_3 yoki V_3), chap o'rta o'mrov chizig'i bo'ylab joylashgani to'rtinchi ulanish (CR_4 yoki V_4), old qo'lтиq chizig'i bo'ylab joylashgani beshinchi ulanish (CR_5 yoki V_5) va o'rta qo'lтиq chizig'i bo'ylab joylashgani oltinchi ulanish (CR_6 yoki V_6) bo'ladi.

Yurak faoliyati toklarining elektrokardiograf yordamida yozib olingan egri chizig'i elektrokardiogramma deb ataladi. Normal elektrokardiogramma yuqoriga yo'nalgan uch (B , R va T) va pastga yo'nalgan ikki (Q va S) tishchaga ega bo'ladi. P tishi yurak bo'l-malarida sodir bo'ladigan elektr hodisalarini aks ettiradi. QRS va T tishchalari qorincha kompleksini tashkil etadi.

Bunda QRS tishchalari elektrokardiogrammada qo'zg'alish to'lqini qorinchalar bo'ylab tarqalgan vaqtida yozilsa, T tishcha to'lqinning tamom bo'lgan vaqtini ko'rsatadi. P tishchasi bilan Q tishi orasida masofa bor, bu masofa $P—Q$ intervali deb ataladi. S tishchasi bilan T tishchasi orasida esa $S—T$ intervali bor. Elektrokardiogramma tishchalarining kattaligi, yo'nalishi va xarakteri turli sabablarga bog'liq bo'ladi. Normal elektrokardiogramma eng katta tishchalar ikkinchi ulanishda, undan sal kichikrog'i birinchi ulanishda va eng kichkinasi uchinchi ulanishda kuzatiladi.

4-boʻb. LABORATOR TEKSHIRISH USULLARI

4.1. Qonni laboratoriya tekshiruvi. Qon tizimining fiziologiyasi

Qon, qon yaratish tizimi. Tomirlarda beto'xtov harakatlanuvchi suyuq to'qima: hujayra va to'qimalarga yetib borib, ularning hayot faoliyatini hamda fiziologik funksiyalarini bajarilishini ta'minlaydi. Qon organizmida xilma-xil vazifalarni bajaradi: u hujayralarga kislород yetkazib beradi va karbonat angidrid gazini olib ketadi (nafas funksiyasi); ovqat hazm qilish organlaridan oziq moddalarini butun organizmga tarqatadi (oziq moddalarini tashish funksiyasi); moddalar almashinuvi mahsulotini chiqarish organlariga (buyrakka) olib boradi.

Qon organlarning gumoral aloqasini yuzaga chiqaradi, u gaz almashinuvi, nafas, suv-tuz almashinuvi, kislota-ishqor muvozanatida ishtirok etadi. Qon organizmni zararli moddalar va yot jismlardan himoya qiladi. U gavda haroratini doim bir me'yorda saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Erkaklarda o'rtacha $5 \frac{1}{2}$, ayollarda $4 \frac{1}{2}$ l.ga qon bo'ladi. Qon suyuq qism – (55 %) va shaklli elementlar (45 %) dan iborat. Qonning shaklli elementlari qon yaratish organlarida ishlaniadi. Qon va qon yaratish organlari – qon yaratish sistemasini tashkil etadi. Qon maxsus mexanizmlar orqali regulatsiya qilinadi, shuning uchun sog'lom odamda qonning tarkibi o'zgarmaydi. Organizmdagi har qanday o'zgarishlarga nisbatan qon javob reaksiyasi qaytaradi, ya'ni o'z tarkibini o'zgartiradi. Ayrim kasalliklarni, xususan, qon sistemasi kasalliklarini aniqlashda qon tarkibining o'zgarishi muhim ahamiyatga ega.


Qon plazmasi vitaminlar, fermentlar, tuzlar va moddalar alma-shinuvining oxirgi mahsulotlaridan iborat. Plazmada erigan oqsillar, jigar hujayralari va retikuloendotelial sistema hosil bo'ladi. Plazma oqsillari transport vazifasini bajaradi, kislota-ishqor muvozanatini regulatsiyalashda ishtirok etadi.

Qonning shaklli elementlari, asosan, eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlardan iborat.

Qon tarkibidagi uglevodlarga glukoza va uning almashinuv mahsulotlari kiradi. Qonda 80—100 mg % gacha glukoza, shuningdek, glikogen, fruktoza va oz miqdorda glukozamin bo‘ladi. Uglevodlar va oqsillarning almashinuv mahsulotlari (glukoza va boshqa monosaxaridlar, kislotalar, tuzlar va suv) ichak kapillarlardan oqayotgan qonga so‘riladi. Glukozaning bir qismi organ va to‘qimalarda tarqaladi. Boshqa qismi esa jigarda glikogenga aylanadi.

Qonda lipidlar aralashmasi neytral yog‘lar, erkin yog‘ kislotalari va ularning parchalanish mahsulotlaridan erkin va bog‘langan xolesterindan, shuningdek, steroid gormonlaridan iborat. Neytral yog‘lar, glitserin, yog‘ kislotalari ichak shilliq qavatidan qonga so‘riladi. Qon yog‘ emulsiyasini yog‘ to‘qimalariga yetkazadi va u yerda zaxira holda saqlanadi. Qon tarkibida mineral moddalar (asosan, natriy va xlor) ham bor.

Qon yaratish organlari. Bu organlarda qonning shaklli elementlari shakllanadi. Qizil ko‘mik, taloq va limfa tugunlari qon yaratish organlari hisoblanadi. Qizil ko‘mik asosiy qon yaratuvchi organ.



4-rasm. Qonning shaklli elementlari.

Qizil ko'mikning hamma to'qimasi qonning yetishgan hujayra elementlari bilan to'la bo'ladi. Qizil ko'mikdan farq qilib, sariq ko'mikda yog' ham bo'ladi. Ko'mikda eritrotsitlar, leykotsitlarning turli shakllari va trombotsitlar shakllanadi.

Limfa tugunlari qon yaratilishi va organizmning himoya reaksiyalarida qatnashadi, ularda, asosan, limfotsitlar rivojlanadi. Qon yaratish organlarining asosiy vazifasi qon hujayralarining yemirilishiga qaramay, ularni doimiy nisbatda saqlab turishdan iborat.

Gemopoez. Qon hosil bo'lishi gemopoez — qon shaklli elementlarining hosil bo'lish, rivojlanish va etilish jarayoni. Odam embrionida sariqlik xaltachasidagi hujayra hosil bo'ladi: homila 2 oyligida qon jigarda, 4 oyligida esa ko'mikda hosil bo'la boshlaydi. 4 oydan boshlab limfa tugunlarida limfotsitlar shakllanadi. Uch oylik homilada qizil qon tanachalari — megaloblastlar (yadroli yirik hujayralar) yetilib, yirik eritrotsitlar (megalotsitlar)ga aylanadi, ular asta-sekin normoblastlar bilan almashinadi. Yangi tug'ilgan bola va katta yoshdagи sog'lom organizmda bo'ladigan eritrotsitlar ana shu normoblastlardan vujudga keladi.


Ko'mikdagi boshlang'ich qon hujayralarining yetilib, qonning yetuk shaklli elementlariga aylanishi qon hosil qiluvchi organlarda sodir bo'ladi. Qon o'zaniga (tomirdagi qon oqimiga) qonning barcha funksiyasini bajara oladigan yetuk hujayralar tushadi. Sog'lom organizmdagi qon tarkibi va qon yaratish organlari o'zaro dinamik muvozanatda bo'ladigan yaxlit bitta sistemani tashkil qiladi. Yemirilgan qon hujayralari qon hosil qilish organlarida uzlusiz yangilanib turadi. Qon yaratilishidagi bunday muvozanat markaziy va vegetativ nerv sistemasi, gormonlar, vitaminlar, shuningdek, maxsus moddalar — gemopoetinlar tomonidan boshqariladi. Qon yo'qtganda, qonda kislород yetishmaganda, yallig'lanish jarayonlarida, infeksion kasallikkarda qon hosil bo'lishi kuchayadi, bu organizmning himoya reaksiyasidir. Bunday holat qonning reaktiv o'zgarishi deb ataladi. Qon hosil bo'lishining tezlashuvi organizmning himoya reaksiyasi bo'lganligi sababli kishi sog'ayganda qon yaratilishi ham normallashadi. Ayrim kasallikkarda (organizmda temir moddasi, B_{12} vitamini yetishmaganda, taloq kasallanganda, me'da olib tashlanganda, zaharli moddalardan zaharlanganda) qon hosil bo'lishi susayadi, kamqonlik ro'y beradi. Bundan tashqari, ko'mikda turli patologik jarayonlar paydo bo'lishi mumkin, bunda, asosan, qonda yosh (yetilmagan) shaklli elementlar ko'payadi.

4.2. Gemoglobin va uning miqdorini aniqlash

Gemoglobin, HB (yunon. *Haima* — qon va *globus* — shar) — qonda bo'ladigan nafas pigmenti. Qonga qizil tus beradi, nafas organlaridan to'qimalarga kislород, to'qimalardan nafas organlariga karbonat angidrid yetkazib beradi. Oqsilli qism—globin va temir porfilingemdan iborat. Gemoglobin kislород bilan qo'shilib, beqaror birikma hosil qiladi. Kislородning porsial bosimi birmuncha yuqori bo'ladigan o'pka kapillarida esa kislородни hujayra va to'qimalarga beradi.

Sog'lom odamning 100 g qonida 13—16 g % gemoglobin bor (erkaklarda 13—17 g % 130—170 g/l; ayollarda 12—16 g % 120—160 g/l). Ayollar qonida gemoglobin miqdori erkaklardagidan kam bo'ladi. Organizmdagi gemoglobin xossasi hayot davomida o'zgarib turadi. Gemoglobin miqdori maxsus asbob — gemometr bilan aniqlanadi. Gemoglobin miqdorini aniqlash normal sharoitda qonning nafas funksiyasini va qonda bo'ladigan bir qancha kasalliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Qonda gemoglobin ko'payib ketishi gemoglobinemiya deb ataladi, uning kamayib ketishi ko'proq anemiyada kuzatiladi.

Gemoglobin miqdorini aniqlash — qondagi gemoglobin miqdori yuqorida bayon etilganidek, Salli gemometrida yoki FEK apparati yordamida aniqlanadi.



5-rasm. Gemometr:
a—gemometr; b—shkalasi.

Salli gemometri uchta tik teshigi bo'lgan shtativdan iborat. Ikki yoni-dagi teshiklarda har ikki uchi ber-tilgan shisha naychalar joylashgan bo'lib, ularda solishtiriladigan stan-dart qo'ng'ir-sariq rangli eritma bor. Ba'zi gemometrlarda suyuqlik to'l-dirilgan naychalar o'rniga qo'ng'ir-sariq rangli shisha tayoqchalar qo'yil-gan bo'ladi.

Shtativ o'rtaсидаги тешикда dia-metri standart eritmali naychalar diametriga teng bo'lgan usi ochiq probirka qo'yilgan, u gemoglobinni aniqlashi kerak bo'lgan qonni quyish-ga mo'ljallangan (5-rasm). Bu probirka ikki qator darajaga bo'lingan: bir

tomondagi darajada pastdan 10 soni bilan boshlanib, 140 soni bilan tugaydi, ikkinchi tomondagisi esa 2 g % sonidan boshlanib, 23 g % soni bilan tugaydi. Har ikki tomondagi darajalar ham bir xil balandlikka ega. Suyuqliklar rangi yaxshi ko'rinishi uchun shtativning orqa devoriga yorug'likni tarqatib beruvchi sut rangli shisha plastinka o'rnatilgan. Har bir gemometrga pipetka qo'shib beriladi, bu pipetkani yuqori uchida 20 mm^3 raqami yozilgan bo'ladi.

Ishlash qulay bo'lishi uchun bu nayning yuqori uchiga uchligi oynadan iborat rezina naycha kiydirilgan bo'ladi.

Qondagi gemoglobin miqdori quyidagicha aniqlanadi: o'rtadagi probirkaning o'n raqamigacha xlorid kislotaning detsinormal eritmasi qo'yiladi, shundan so'ng pipetkaning 20 mm^3 belgisigacha barmoqdan qon so'rib olinadi. Qon ustini havo pufaklarisiz ko'rsatib o'tilgan belgiga yetishi bilan, mushtukni og'izdan chiqarmay, rezina nayni ikki barmoq bilan qisib turib, pipetkadagi qon miqdori 20 mm^3 .ga to'g'ri kelish-kelmasligi yana tekshiriladi. Pipetkaning pastki qismidagi qonni paxta bilan artib, uning uchini xlorid kislotaning detsinormal eritmasiga tushiriladi, bu eritma ilgari gemometrning o'rtasidagi naychada tayyorlangan bo'ladi, pufakchalar hosil bo'lmasligi uchun qon unga asta-sekin puflab kiritiladi, so'ng eritma aralashmasini bir necha marta so'rib olib, qaytadan probirkaga tushiriladi va shu yo'l bilan olingan qonning hammasi probirkaga quyiladi.

Barcha gemoglobin gematin xloridga aylanishi uchun 10 minut kutib turiladi, keyin geometr ko'tariladi va qon solinadigan probirkadagi suyuqlikning rangi standart eritma yoki bo'yalgan shisha tayoqchalar rangi bilan solishtirib ko'rildi. Deyarli hamma vaqt qon eritmasining rangi standart eritmalar rangidan to'qroq bo'ladi. Distillangan suv graduirovka qilinmagan pipetka yordamida qon eritmasi solingan pipetkaga quyila boshlanadi va shisha tayoqcha bilan aralashtirilib turiladi. Undagi suyuqlikning rangi standart probirkadagi suyuqlik rangiga yetguncha aralashtirish ishi davom ettiriladi. Bundan so'ng geometrni ko'zning to'g'risigacha ko'tarib, qon eritmasining pastki meniski qaysi darajada turgani aniqlanadi. O'ng tomonidagi tegishli son – foizini, chapdagisi esa gemoglobinning gramm foizini ko'rsatadi.

Gemoglobinni aniq tekshirish uchun hozirgi vaqtida fotoelektro-kolorimetr va spektrofotometrlardan foydalilaniladi. Gemoglobinni fotoelektrokolorimetrdan aniqlash uning ammiak, asetonsiangidrin

va boshqa moddalar bilan bo'yalgan birikmalar hosil bo'lishiga asoslangan.

Hozirgi vaqtida klinik-diagnostik laboratoriyalarda gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash uchun gemoglobinsianid usuliga asoslangan tayyor to'plamlardan qo'llanilmoqda. Har bir to'plamda standart reaktiv (nazorat) bor. Bundan tashqari, markaziy laboratoriya (masalan, viloyat kasalxonasining laboratoriysi) standart (nazorat) reaktivlar tayyorlashi va tarqatishi mumkin. Standart (nazorat) reaktivlar har safar bemor qoni tekshiruvlari o'tkazilganda ishlataladi.

Sifatli nazorat qilishning eng yaxshi usuli zarur reaktivlar yetarli miqdorda bo'lganda bemor qonini bir vaqtning o'zida ikki usulda aniqlash hisoblanadi. Agar har ikkala usulda natijalar har xil bo'lsa, bemor qonini qayta tekshirish kerak.

Gemoglobinni aniqlashning klinik-diagnostik ahamiyati: qonda gemoglobin miqdorining kamayishi kamqonlikning asosiy laboratori ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Gemoglobin miqdori kamqonlik shakli va ifodalanganligiga qarab o'zgaradi. Gemoglobin miqdori kamayganda, chuqur va to'liq tekshiruvlar o'tkazilishi kerak (eritrotsitlar sonini aniqlash, rang ko'rsatkichi, eritrotsitlar morfoloyasini o'rganish).

4.3. Eritrotsitlar. Eritrotsitlar miqdorini aniqlash

Eritrotsitlar (yunon. *erythros*— qizil, *cytus*— hujayra) qizil qon tanachalari: qonning shaklli elementlari: tarkibidagi gemoglobin qonga qizil tus beradi. Eritrotsit, asosan, organizm bilan atrof-muhit o'tasidagi gazlar almashinuvini, ya'ni nafas olishni ta'minlaydi. Kislorodni o'pkadan organizmning barcha to'qimalariga yetkazib beradi. Eritrotsit qonning boshqa funksiyalarida ham ishtirot etadi. Odam eritrotsitining diametri 7—8 mm, qalinligi 2—2,5 mm, ikki tomon botiq, yumaloq, yadrosiz hujayralardir.

Ko'mikning miyeloid to'qimalarida eritrotsit ishlanadi. Sog'lom odamning 1 mlk qonida 4—5 mln eritrotsit bor. Erkaklar qonining 1 mlk.da 4,5—5 mln, ayollar qonining 1 mlk.da esa 4—4,5 mln eritrotsitlar bo'ladi ($4,5 \cdot 10^{12}$ — $5,0 \cdot 10^{12}/\text{l}$ — $4 \cdot 10^{12}$ — $4,5 \cdot 10^{12}/\text{l}$). Eritrotsit miqdori hamisha bir xil turmaydi, ba'zi fiziologik sharoitlarda, jismoniy ish vaqtida, baland joylarga chiqilganda hamda ba'zi bir kasalliklarda ular miqdori o'zgaradi. Eritrotsitlar miqdorining ortib ketishi polisitemiya, kamayib ketishi esa eritopeniya deb ataladi.

Eritrotsitlar miqdorini sanash uchun – melanjer (aralash-tirgich)lar va to'rida mikroskop orqali shaklli elementlar sanaladigan kamera bo'lishi kerak. Eritrotsitlar sanash uchun qonni suyultiruvchi suyuqlik bilan aralashtirishda qo'llaniladigan melanjer qalin devorli shisha nay bo'lib, kapillar teshikka ega va uning yuqori qismi ichida munchoq bo'lgan noksimon kengaygan joy bor.

Qonni olishda melanjerning yuqori qismiga shisha mushtukli rezina nay o'rnatiladi va bu mushtuk orqali melanjerga qon yoki suyultiruvchi suyuqlik og'iz bilan olinadi. Eritrotsitlarni sanashda qo'llaniladigan melanjerda noksimon kengaygan joy kapillar hajmiga qaraganda 100 marta katta. Melanjer uchi bilan noksimon kengaygan joy orasidagi masofa 10 darajaga bo'lingan. Melanjer ustidan 5 daraja o'tgach 0,5 raqami, o'ninchi darajada, ya'ni noksimon kengaygan joy asosiga 1 raqami, melanjerning yuqori uchiga 101 raqami yozilgan.

Agar qonni 1 belgisigacha, suyultiruvchi suyuqlikni esa 101 belgisigacha olinsa, qon 100 marta suyulgan bo'ladi. Agar qon 0,5 belgisigacha va suyultiruvchi suyuqlik 101 belgisigacha olinsa, qon 200 marta suyuladi. Eritrotsitlar sanash kameralarida hisoblab chiqiladi, bu kameralar o'rtasi chuqurroq qilib ishlangan qalin shishadan iborat, bu chuqurlik tubiga to'r chizilgan eritrotsitlarni sanashdan oldin chuqurlik shliflangan oyna bilan zich qilib berkitiladi: bunda kameralagi chuqurlik 0,1 mm.ga teng bo'ladi.

Kamerani zich berkitish uchun shliflangan oynani uning ustiga qo'yish va qo'lning bosh barmog'i bilan uning yon yuzasiga kamalak yoylari paydo bo'lgnuncha bosish kerak. Tom–Seyss va Byurker kameralari mayjud. Hozirgi vaqtida Byurker kamerasidan keng foydalaniladi. Kamera tubiga chizilgan to'r turli sistemada: Tom, Tyurk, Byurker, Predtechenskiy, Goryayev sistemalarida bo'ladi. Biroq, Goryayev to'ri ishlash uchun eng qulay hisoblanib, boshqalarga qaraganda sanash kameralariga ko'proq chiziladi. Barcha to'rlarning tuzilish prinsipi bir xildir.

To'r katta kvadratlardan iborat: ularning har biri 16 mayda kvadratlarga bo'lingan. Kichik kvadrat tomonlarining uzunligi $1/20$ mm.ga teng: demak, har bir kichik kvadrat sathi $1/20 \cdot 1/20 = 1/400$ mm^2 .ga teng. Chunki kamera chuqurligi $1/10$ mm.ga teng bo'lGANI uchun har bir kichik kvadrat hajmi $\frac{1}{400} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{4000}$ mm^3 .ga barobar bo'ladi.

Goryayev to'ri kvadratlar to'rttadan guruhlangani bilan farq qiladi. Har tomondan ular to'rtta chiziq bilan chegaralangan bo'lib, ularning kesishadigan yerida har biri 16 mayda kvadratga bo'lingan katta kvadratlar hosil bo'ladi. Xatoga kam yo'l qo'yilishi uchun eritrotsitlar 80 ta kichik kvadratda yoki 100 katta kvadratda sanaladi. Fiziologik eritma yoki natriy xlоридning 3 % li eritmasi eritrotsitlar uchun suyultiruvchi eritma sifatida qo'llaniladi.

Eritrotsitlarni sanash uchun Frank ignasi bilan teshilgan barmoqdan melanjerning 0,5 belgisigacha qon va 101 belgisigacha suyultiruvchi eritma olinadi: bunda qon 200 marta suyuladi. So'ng melanjerning har ikki uchi barmoq orasiga qisilib, 3—5 minut davomida chayqatiladi. Melanjerning noksimon kengaygan joyidagi munchoq yordamida qon yaxshi aralashadi. Shundan so'ng kamera eritrotsitlarni sanash uchun tayyorlanadi. Butunlay quruq kamera shliflangan qoplama oyna bilan berkitiladi va kamalak yoylari (Nyuton halqalari) paydo bo'lguncha barmoq bilan ishqalanadi, so'ng kamera melanjerda suyultirilgan qon bilan to'ldiriladi.

Kamerani to'ldirishda avval kameraning noksimon kengaygan joyidagi suyuqlik bilan to'lishi uchun melanjerdan 2—3 tomchi suyuqlik tushirib yuboriladi, chunki melanjerning kapillar qismida suyultiruvchi eritma olingandan keyin qonning shaklli elementlari deyarli bo'lmaydi. Kamera melanjerda suyultirilgan qon tomchisini qoplama oyna chetiga tekkizish yo'li bilan to'ldiriladi. To'ldirilgan kamera mikroskopning buyum stolchasiga qo'yiladi va kichik kattalashtirish ostida uning to'ri topiladi: so'ng shu ko'rish maydonining o'zi yanada kattalashtiriladi va bunda to'r va eritrotsitlar yaxshi ko'rinish turadi.

So'ng sanash ishi boshlanadi. Odatda, eritrotsitlar 8 ta mayda (5 ta katta) kvadratda sanaladi. Bir hujayrani ikki marta sanamaslik uchun mayda kvadratlar ichida joylashgan barcha eritrotsitlarni ham sanash qabul qilingan.

Agar ba'zi eritrotsitlar ikki kvadrat o'rtasidagi chiziq ustida yotgan bo'lsa, ulardan faqat kvadratning yuqori o'ng yoki pastki chap chegarasida yotganlari sanaladi. Shu qoidaga rioya qilinsa, odatda, eritrotsitlar ikki marta sanalmaydi.

Eritrotsitlar miqdori quyidagicha sanaladi: aytaylik, 80 ta mayda kvadratda 480 ta eritrotsit topildi. Bir kichik kvadratning hajmi $1/4000 \text{ mm}^3$.ga teng ekanligi bizga ma'lum. Demak, mazkur suyultirilgan qonning 1 mm^3 .da qancha eritrotsit borligini aniqlash uchun 480 ni 80 ga bo'lish va 4000 ga ko'paytirish kerak. Sanashdan

avval qon 200 marta suyultirilgan edi. Demak, 1 mm³ suyultirilmagan qonda qancha eritrotsit borligini bilish uchun topilgan sonni suyultirish darjasи, ya'ni 200 ga ko'paytirish lozim. Hisobni quyidagi formula bo'yicha bajarish mumkin:

$$\frac{480 \cdot 4000 \cdot 200}{80} = \frac{384000000}{80} = 4800000.$$

Eritrotsit hamma vaqt qon 200 marta suyultirilgani har bir kichik kvadrat 1/4000 mm³.ga teng bo'lgани va 80 kichik kvadrat sanalgани uchun hisoblashda bu doimiy sonlar qisqartiriladi va 10000 soni olinadi ($4000 \cdot 200 = 800000 : 80 = 10000$). Shuni hisobga olib, 1 mm³ qondagi eritrotsitlar miqdorini tez topish uchun, odatda, laboratoriyalarda 80 kichik kvadratda topilgan eritrotsitlar soniga 4 ta nol qo'shiladi. Bizning misolda u 4800000 ni tashkil etadi.

4.4. Leykotsitlar. Leykotsitlar miqdorini aniqlash

Leykotsitlar. Oq qon tanachalari — qonning yadroli va protoplazmali rangsiz hujayralari. Yadrosining shakli har xil, shunga ko'ra, tayoqcha yadroli, segment yadroli va monotsitlarga ajratiladi. Leykotsitlar ko'mik, limfa tugunlari va taloqda hosil bo'ladi. Donali leykotsit (granulotsit)lar va donasiz leykotsit (agranulotsit)lar farq qilinadi. Qonni tekshirganda leykotsitlarning bo'yalish xususiyatiga qarab, ularni eozinofillar (kislotali bo'yoq — eozin bilan bo'yaladi), bazofillar (asosli bo'yoq — metilin ko'ki bilan bo'yaladi) va neytrofilarga (neytron bo'yoqlar bilan bo'yaladi) bo'linadi, ularning har biri ma'lum bir funksiyani bajaradi.

Leykotsitlar qon tomir o'zanidan chiqib, hujayralararo bo'shliqda o'zicha harakat qila oladi. Ular organizmning yot jismilar kirgan joyiga yetib kelib, mikroorganizmga yaqinlashgach, soxta oyoqlar chiqarib, ularni hamma tomondan o'rab oladi va yutib yuboradi. Yutilgan mikroorganizm yemirilib, leykotsit protoplazmasida hazm bo'lib ketadi. Ko'pincha bu jarayonda leykotsitlarning o'zi ham nobud bo'ladi, natijada yiring to'planadi. Organizmga kirgan zararli mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va boshq.) shuningdek, jonsiz zararlarning leykotsitlar tomonidan shu tariqa yo'q qilinishi fagositoz deb, buni amalga oshirgan leykotsitlar fagotsitlar deb ataladi.

Leykotsitlarning organizmdagi rolini va fagositoz haqidagi ta'llimotni rus olimi I.I. Mechnikov kashf etgan. Organizmni mikroorganizmlarda himoya qilishda qon yaratish organlarining roli katta, bu vaqtida ular ko'plab leykotsit ishlab chiqaradi.

Fagositozda faqat leykotsitlarga emas, balki organizmdagi boshqa hujayralar ham ishtirot etadi. Bunday hujayralar makrofaglar deyiladi. Leykotsitlar, makrofaglar, qon va to'qimalardagi boshqa aktiv moddalar faqat bakteriyalar hamda kasallik qo'zg'atuvchi agentlarni yutib yuborish bilan kifoyalanmay, balki organizmni jarohat yoki kasallik tufayli nobud bo'lgan hujayralardan, toksinlardan ham tozalaydi. Shuning uchun turli kasallikkarda qonda leykotsitlar soni ancha oshib ketadi. 1 mkl qonda, odatda, 4000—9000 leykotsit bo'ladi. Ular soni kun bo'yli o'zgarib turadi, masalan, ertalab tongda leykotsitlar kam bo'lsa, tushdan keyin ko'payadi. Leykotsitlarni ayrim turlari foiz jihatidan muayyan nisbatda bo'ladi (ahyonda o'zgarishi ham mumkin), bu nisbat leykotsitar formula deb ataladi. Bu formulani to'g'ri aniqlash klinikada kasallikka tashxis qo'yishda katta ahamiyatga ega. Leykotsitlarni ortib ketishi (9000 dan yuqori) leykositoz, kamayishi (4000 dan kam) leykopeniya deb ataladi. Limfotsitlar va monotsitlar ham leykotsitlarning bir turi — agranulotsitlarga (donasiz leykotsitlarga) kiradi.

Immunitetning vujudga kelishida limfotsitlarning roli katta: ular toksinlarni zararsizlantiradi va antitelolar hosil bo'lishida qatnashadi. Bundan tashqari, limfotsitlar gamma-globulin ishlab chiqaradigan plazmatik hujayralarga aylana oladi.

Leykotsitlar miqdorini sanashda ham melanjer (aralash-tirgich)lar va to'rida mikroskop orqali shaklli elementlar sanaladigan kamera bo'lishi kerak. Leykotsitlar miqdorini aniqlash maqsadida qonni suyultirish uchun mo'ljallangan melanjerning tuzilishi eritrotsitlarni ichida qo'llaniladigan melanjer tuzilishiga o'xshaydi. Bular orasidagi farq shundaki, buning noksimon kengaygan joyiga kapillar qismidagiga qaraganda 10 marta ko'proq suyuqlik sig'adi va uning noksimon kengaygan joyining yuqorisiga 11 raqami yozilgan bo'ladi. Demak, agar bu melanjerga 1 belgisigacha qon, 11 belgisigacha suyultiruvchi suyuqlik olinsa, unda qon faqat 10 marta, agarda qon 0,5 belgisigacha, suyuqlik esa 11 belgisigacha olinsa, qon 20 marta suyultirilgan bo'ladi.

Leykotsitlarni sanashda aralashtirgich (melanjer)ga qon I belgisigacha olinadi va suyultiruvchi eritmani I I belgisigacha yetkaziladi: bunda qon 10 marta suyuladi. Agar qonni 0,5 suyultiruvchi eritmani I I belgisigacha olinsa, qon 20 marta suyulgan bo'lar edi, lekin oddiy tekshirishlarda qonda leykotsitlar miqdori kam bo'lgani uchun bunday suyultirish talab qilinmaydi. Faqat qonda leykotsitlar miqdori juda ko'payib ketgandagina u 20 marta suyultirilishi mumkin.

Sanash kamerasi eritrotsitlarni sanashdagidek to'ldiriladi. Faqat bunda mikroskop kichik va kattalashtirilgan holda sanaladi. Aniq bo'lishi uchun leykotsitlarni 100 katta kvadratda, ya'ni 1600 kichik kvadratda sanash kerak. I mm³ qonda leykotsit borligini bilish uchun leykotsitlarning topilgan sonini 1600 ga bo'lish va 4000 hamda 10 ga ko'paytirish lozim. Agar 100 katta kvadratda, masalan, 300 leykotsit topilgan bo'lsa:

$$1 \text{ mm}^3 \cdot \text{da} = \frac{300 \cdot 4000 \cdot 10}{1600} = 7500 \text{ ta leykotsit bo'ladi.}$$

4.5. Trombotsitlar. Trombotsitlar miqdorini aniqlash

Trombotsitlar (yunon. *thrombos* — laxta va *kytos* — hujayra) — qondagi shaklli elementlardan biri trombotsit diametri 2—5 mkm keladigan tanachalar bo'lib, ular qon plastinkalari deb ataladi. 1 mkl qonda 180—320 ming trombotsit bo'ladi. Ular ko'mikda ishlanib chiqadi. Qon plastinkalari osonlik bilan yemiriladi va qonning ivishida ishtirot etadi.

Qon tomirlar jarohatlanganda trombotsitlar xuddi shu joyga to'planadi va o'zaro birikib, qonni quyultiradigan maxsus modda ajratadi: natijada laxta qon (tromb) hosil bo'ladi va qon oqishi to'xtaydi. Qon ketganda, operatsiyadan keyin organizmning himoya reaksiyasi sifatida qonda trombotsitlar soni ortadi: ba'zan trombotsitlarning ortishi yurak bo'shlilari va qon tomirlarda tromb hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin, bunday holat ko'proq venalarning varikoz kengayishi yoki ularning yallig'lanishida kuzatiladi.

Trombotsitlar soni kamayishi ham mumkin, masalan, ayrim dorilarga nisbatan sezuvchanlik yuqori bo'lganda, ba'zi kimyoviy moddalardan zaharlanganda trombotsitlarning ko'plab yemirilishi kuzatiladi, bunda salga qon oqaveradi. Trombotsitlarning kamayishi fiziologik bo'lishi ham mumkin, masalan, kishi uxlaganda, ovqatlangandan keyin, hayz ko'rganda trombotsitlar kamayadi.

Qon plastinkalari (trombotsitlar)ni sanash. Barmoqqa magniy sulfatning 14 % li eritmasi tomiziladi. So'ng barmoq igna yordamida tomchi orqali teshiladi. Qon buyum oynasining burchagi yordamida magneziy bilan aralashtirilib, surtma tayyorlanadi. Surtmalar quritilib, spirt bilan fiksatsiyalanadi va Romanovskiy – Gimza usuli bilan bo'yaladi. Surtma 2–3 soat davomida bo'yaladi. Sanash ishi mikroskopning immersion sistemasida bajariladi. 1000 dona eritrotsit sanalib, bu eritrotsitlar sanalayotganda duch kelinayotgan trombotsitlar soni qayd etiladi. Trombotsitlar miqdorini aniqlashda I mkl qondagi eritrotsitlar miqdorini aniqlash kerak.

Misol, 1000 eritrotsitga 56 ta trombotsit to'g'ri keldi. I mm³ qondagi eritrotsitlar miqdori 4500000. Agar 1000 eritrotsitga 56 ta trombotsit to'g'ri kelsa, 4500000 tada esa ular:

$$X = \frac{4500000 \cdot 56}{1000} = 252000 \text{ bo'ladi.}$$

1 mm³ qonda normada 250000 dan 350000 gacha trombotsit bor ($250 \cdot 10^9$ — $350 \cdot 10^9/\text{l}$).

4.6. Qonning rang ko'rsatkichini aniqlash

Rang ko'rsatkichini hisoblashda quyidagi tenglamadan foydalilaniladi: ayni holdagi gemoglobin miqdorining normal sharoitdagи gemoglobin miqdoriga nisbatini mazkur holdagi eritrotsitlar sonining me'yordagi eritrotsitlar soni nisbatiga bo'linadi.

Masalan, tekshirilayotgan bemorda 50 birlikda gemoglobin va 4000000 eritrotsit topilgan. Shu bemorda rang ko'rsatkichi qanday bo'ladi? Tenglamadan foydalanib, quyidagilarni olamiz:

$$\frac{50}{100} : \frac{4000000}{5000000} = \frac{50 \cdot 5000000}{100 \cdot 4000000} = \frac{50}{2 \cdot 40} = 0,62.$$

Shunday qilib, mazkur misolda rang ko'rsatkichi 0,62 ga teng, ya'ni birdan kichik ekan.

Rang ko'rsatkichini tez hisoblab chiqish uchun mazkur bemorda topilgan gemoglobin miqdorini topilgan eritrotsitlar yuz mingining ikkiga ko'paytirilganiga bo'lish kerak. Eritrotsitlar miqdori I mln.gacha bo'lgan hollarda esa masalan, I mm³.da 900000 eritrotsit, 22 birlik gemoglobin bo'lsa, rang ko'rsatkichini topish uchun topilgan gemoglobin sonini topilgan eritrotsitlar birinchi sonining ikkiga ko'paytirilganiga bo'lish kerak, ya'ni $\frac{22}{9} = \frac{22}{2} = 1,2$.

4.7. Eritrotsitlar cho'kish tezligini (EChT) aniqlash

Eritrotsitlarning cho'kish tezligi 4:1 nisbatida natriy sitrat bilan aralashtirilgan qonda aniqlanadi. Reaksiya Panchenkov apparatiga qo'yiladi. Panchenkov kapillari natriy bilan yuvib tashlanadi, so'ngra R (reakтив) harfi qo'yilgan 50 belgisigacha sitrat surtib olinadi va eritma vidal probirkasiga puflab tushiriladi. O'sha kapillarning o'zi bilan K (qon) belgisigacha ikki qayta qon olinadi va bu qon sitrat bilan aralashtiriladi.



Sitrat bilan aralashtirilgan qon boyagi kapillarga 0 belgisigacha tortib olinadi va tik qilib 1 soat shtativga qo'yib qo'yiladi. Bir soat o'tganidan keyin cho'kib qolgan eritrotsitlar ustida hosil bo'lган plazma ustunchasining kattaligi millimetrlar hisobida qayd qilinadi va bu eritrotsitlar cho'kish tezligining o'lchovi bo'lib hisoblanadi. EChT me'yorda erkaklarda 10 mm/s.ga, ayollarda — 14 mm/s.ga teng.

4.8. Qon surtmasini tayyorlash

Frank ignasi bilan nomsiz barmoq teshilgach, qon tomchisi paydo bo'lгungacha bir necha sekund kutiladi, birinchi chiqqan qon artib tashlanadi. Shundan so'ng ikki barmoq bilan yog'sizlantirilgan toza buyum oynasining ikki chetidan ushlab, uning pastki yuzasini qon tomchisiga tekkizib olinadi.

So'ng buyum oynasi qon tomchisi yuqoriga qaratilgan holda stol ustiga qo'yiladi yoki uning uzun tomonidan bosh va ko'rsatkich barmoq bilan ushlab turiladi. O'ng qo'lga silliqlangan qoplama oyna yoki buyum oynasi olinib, uni qon tomchisi oldiga 45° burchak ostida qo'yiladi. Sal harakat bilan qoplama oyna qon tomchisining chetiga tekkiziladi va qon qoplama oynaning butun eniga yoyilib ketadi.

Shundan so'ng qoplama oynani tez harakat qildirib, tomchidan qon surtmasi tayyorlanadi. Bir necha minut-



6-rasm. Buyum oynasida qon surtmasini tayyorlash.

dan so'ng, ya'ni surtma qurigach, u 3 minut davomida metil spirtida fiksatsiyalanadi: surtmani absolut spirtda yoki barobar miqdordagi etil spirti va efirdan tashkil topgan Nikiforov aralashmasida ham fiksatsiya qilsa bo'ladi. Bu fiksatsiyalovchi suyuqliklarda surtma 10—20 minut turishi kerak. Fiksatsiyadan so'ng surtma metilen sinkasi, eozin va metil spirti yoki glitserinda erigan metilenazurdan iborat Romanovskiy bo'yog'ida bo'yaladi. Bo'yoqlarning bu aralash-masi yadro, protoplazma va undagi turli kiritmalarni turli tuslarga bo'yash uchun kerak. Bu narsa shaklli elementlarning morfologik xususiyatini aniq o'rghanish imkonini beradi. Romanovskiy bo'yog'i qon surtmasiga, 20—30 minut qo'yildi. Shundan so'ng bo'yoqni surtmadan to'kib tashlab, u distillangan suv bilan yuviladi va filtr-lovchi qog'oz yordamida ohista quritiladi. Qonning bo'yagan surtmasiga bir tomchi immersion moy tomizilib, uni kattalashtirgich (mikroskopning immersion obyektivi) ostida tekshiriladi (6-rasm).

4.9. Qon guruhlari. Qon guruhini aniqlash

Qon guruhlari – bu qonning nasldan naslga o'tadigan belgilari. Ana shu belgilarni asosida barcha odamlar qoni (irqi, yoshi va jinsidan qat'i nazar) guruhlarga bo'linadi. Odamning u yoki bu qon guruhiga mansubligi uning individual biologik xususiyati bo'lib (ona qormidagi rivojlanish davridayoq shakkllana boshlaydi, keyingi butun hayoti davomida o'zgarmaydi).

Eritrotsitlar (qizil qon hujayralari) tarkibidagi izoantigenlar – izoantigen *A* va izoantigen *B*, shuningdek, me'yorda ba'zi odamlarning qon zardobida bo'ladigan izoantitelolar – izoantitelo α va izoantitelo β ko'p amaliy ahamiyatga ega omillar hisoblanadi. Odam qonida faqat turli xil izoantigenlar va izoantitelolar (masalan, *A+β* va *B+α*) bo'ladi, chunki bir xil belgidagi izoantigenlar va izoantitelolar uchrashsa (masalan, *A* va α) eritrotsitlar bir-biriga yopishib, odam o'lib qoladi.

Odamlar qonida *A* va *B* izoantigenlar, shuningdek, α va β izoantitelolar bo'lishiga qarab, ularni shartli ravishda harflar hamda raqamlar bilan ifodalab, to'rt guruhga bo'lish mumkin:

- 0 α β (I) — faqat, α , β izoantitelolari bor qon guruhi;
- *A β* (II) — tarkibida *A* izoantigeni va β izoantitelo bor qon guruhi;
- *B α* (III) — tarkibida *B* izoantigeni va α izoantitelolari bor qon guruhi.

- *ABO* (IV) — tarkibida faqat *A* va *B* izoantigenlar bor qon guruhi.

Qon guruhi haqidagi ta'limot XIX asr oxirida yuzaga kelgan. U umumiy immunologiyaning muhim qismidir. Qon guruhi haqidagi ilmlar tibbiyotning deyarli hamma sohalarida keng miqqyosda amaliy qo'llaniladi. Qon guruhini o'rganish izoantigen *A* ning bir xil belgiga ega emasligini ko'ssatdi. Izointigen *B* izoantigen *A* ga nisbatan ko'proq bir xil belgiga egaligi bilan farq qiladi. Undan tashqari, ba'zi odamlar eritrotsitida *H* va *O* kabi spetsifik antigenlar topildi. *ABO* sistemasida o'z mohiyatiga ko'ra izoantigenlardan so'ng tibbiyot amaliyotida qon guruhining *Rh* sistemasi (*Rhezus*— rezus) rezus-faktori ikkinchi o'rinda turadi, u qon guruhining eng murakkab sistemalaridan bo'lib, 20 dan ortiq izoantigendan tashkil topgan, 25 % odamlar eritrotsitlarida *Rh* sistema antigeni *Rh* — faktor mavjudligi, 15 % odamlarda uning bo'lmasligi aniqlangan. Ana shu faktorning bor yo yo'qligiga qarab odamlar shartli ravishda ikki guruhga — rezus-musbat va rezus-manfiy guruhga bo'linadi. Qonida *Rh*-faktori bo'limgan ona organizmida rivojlanayotgan homila rezus-faktori musbat otadan o'tgan antigen ta'sirida unga qarshi antitelolar hosil bo'ladi, bu antitelolar, o'z navbatida, homila eritrotsitlariga ta'sir etib, ularning gemolizi (erishi)ga sabab bo'ladi. Shunday qilib, gemolitik anemiya ko'rinishida namoyon bo'lib, ba'zan o'limga olib keladigan rezus-konflikt (ziddiyat) kelib chiqadi. Qonni rezus-manfiy odamlarga rezus-musbat qon qayta quyliganda ham rezus-konflikt kelib chiqishi mumkin.

Eritrotsitlardagi izoantigenlardan tashqari, qonning boshqa tarkibiy elementlarida ham faqat ularga xos izoantigenlar borligi aniqlanadi. Shu tariqa leykotsitlarning 40 dan ortiq antigenlarini birlashtiruvchi leykotsitar guruhlar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Odam qonining boshqa sistemalariga oid izoantigenlar *ABO* va *Rh* sistemalariga qaraganda kamroq amaliy ahamiyatga ega bo'lsa-da, sud tibbiyoti, genetika, antropologiya sohalari uchun ahamiyati katta.

Qon guruhiga xos belgilari irsiy faktorlar bilan belgilanadi, ya'ni bolalar qonining antigen xususiyatlari ota-onaning qon guruhiga bog'liq. Bu sud tibbiyotida bolaning ota-onasini aniqlab berishdek murakkab masalalarni hal qilishga imkon beradi.

Qon guruhlarini aniqlash. Qon guruhlari xona harorati 15—20°C da aniqlanadi. Qon guruhini aniqlash uchun uch guruhning tekshirilgan har qaysi guruhdan ikkitadan har xil seriya qilib olingan yangi qon zardobi kerak. Toza oq chinni likopcha olinib,

uning chetlariga uch dastlabki guruh belgilari *O(I)*, *A(II)*, *B(III)* deb maxsus qalam bilan yozib qo'yiladi. Ikkita har xil turkumdag'i tegishli guruh zardoblari shu belgilarga yonma-yon qilib, likopchaga ikki tomchidan tushiriladi. Tomchilar tushirilganidan keyin har bir tomizg'ich zardobli flakonning qaysisidan olingan bo'lsa, yana o'shanisiga solib qo'yiladi. Guruhi aniqlanishi kerak bo'lgan qonning uchta kichik tomchisi alohida shisha tayoqchalar bilan zardobga tushiriladi (zardob bilan qon nisbati 10:1 yoki 15:1 bo'ladi).

Likopchani tinmay tebratib turib, yaxshilab aralashdiriladi va 5 minut davomida kuzatib boriladi. So'ngra agglutinatsiya ro'y berган aralashma tomchilariga 1 tomchidan fiziologik eritma tomiziladi (soxta agglutinatsiyani bartaraf etish uchun), uni aralashdiriladi, qaraladi: tekshirilayotgan qon *O(I)* guruh bo'lsa, biron ta tomchida ham agglutinatsiya bo'lmaydi; qon *A(II)* guruhga mansub bo'lsa, bir nomli guruh zardoblari bilan agglutinatsiya bo'lmay, *O(I)* va *B(III)* guruh zardoblari bilan agglutinatsiya ro'y beradi. *B(III)* guruh qoni bir nomli guruh bilan agglutinatsiya bermasdan, balki *O(I)* va *A(II)* guruh zardoblari bilan agglutinatsiya beradi.

Bordi-yu tekshirilayotgan qon *AB(IV)* guruhga mansub bo'lsa, qon guruhini aniqlash uchun olingan hamma zardoblar bilan agglutinatsiya ro'y beradi. Bu *AB(IV)* guruhga mansub standart zardob bilan qo'shimcha nazorat tekshirish zarur bo'ladi. Mana shu zardob bilan agglutinatsiya ro'y bermasligi tekshirilayotgan qonning *AB(IV)* guruhga mansub deb hisoblashga imkon beradi.

4.10. Rezus-faktorning mos kelish-kelmasligini sinash

Sitratsiz probirkaga retsipyent qonidan 2—3 ml olinadi, qon ivib qolganidan keyin laxtasi shisha tayoqcha bilan ko'chiriladi va qon sentrifugalananadi. Shu probirkadan ikki tomchi zardobi olinib, Petri kosachasiga solinadi, unga yarim tomchi donor qoni qo'shilib, aralashdiriladi va kosacha suv hammomiga qo'yiladi (42—45°C) 10 minutdan keyin kosacha olinib, ohista tebratib turilgan holda yorug'likka tutib qaraladi. Agglutinatsiya paydo bo'lishi ushbu qonni quyish mumkin emasligini ko'rsatadi.

4.11. Retikulotsitlarni bo'yash va sanash

Retikulotsitlar — sitoplazmasida ko'k rangli nozik turi va donalari bo'ladiqan yosh eritrotsitlardir. Bu hujayralar qizil qon yaratilishi aktivligini xarakterlab beradi.

Retikulotsitlar sonini aniqlash uchun supravital (tirikligicha) bo'yash usulidan foydalaniladi. Buyum oynalariga mutlaq spirtdag'i brilliantkrezilblau bo'yoq surtmalari qilinadi, so'ngra bo'yoq bilan qoplangan oynaga odatdagicha qon surtmasi surilib, u 3—5 minut nam kameraga qo'yiladi, shundan keyin quritilib, immersion obyektivli mikroskop bilan tekshiriladi. Me'yorda 1000 eritrotsit orasida 8—10 retikulotsit uchraydi, ularning sonini eritrotsitlarga nisbatan foizlar (0,8—1 %) yoki promille (8—10 %) hisobida ifodalash mumkin.

Retikulotsitlar-ko'mikda eritrotsitlar zo'r berib ishlanib chiqayotganini xarakterlab beradigan hujayralardir. Giperxrom anemiyada («xavfli anemiyada»), gemolitik anemiyada va boshqa kasallikkarda ular periferik qonda ko'p miqdorda paydo bo'ladi. Periferik qonda retikulotsitlar miqdorining kamayib ketishi yoki ularning butunlay bo'lmasligi giperxrom anemiya qo'zigan paytda ko'rildi.

4.12. Qalin tomchi tayyorlash

Bezgak plazmodiyllari bor-yo'qligiga qonni tekshirib ko'rish uchun qalin tomchi tayyorlanadi. Odatdag'i usul bilan barmoqning yumshoq joyidan qon olinadi. Igna sanchilgan joydan chiqqan qon tomchisiga buyum oynasining yuzi tekkiziladi.

Ayrim-ayrim holda tushirilgan 2—3 tomchi qon boshqa oynaning burchagi bilan surkatiлади. Quruq surtma ustiga 30—40 minutga Romanovskiy bo'yog'i qo'yiladi (surtmani fiksatsiya qilmasdan turib), so'ngra bo'yalgan tomchi ohista suv bilan chayiladi va preparat tik holida quritiladi.

4.13. Qon ivuvchanligini aniqlash

Qon ivuvchanligi pasayib qolganda, ko'p qon ketadi. Shoshilinch yordam ko'rsatishga chaqiriq bo'lganida yoki navbatchilik vaqtida ko'pincha ana shunday hodisaga duch kelib turiladi. Bunday hollarda navbatchi tibbiyat xodimi qon ivish vaqtini aniqlaydi.

Qon ivish vaqtida deganda qon ivuvchi sistemaning faollik ko'rsatganligi tushuniladi. Bu ko'rsatkich qonning yot yuzaga tekkan vaqtidan boshlab, to qon laxtasi paydo bo'lguncha oradan o'tadigan vaqtga teng bo'ladi. Steril igna sanchilganida chiqqan birinchi qon tomchisi artib olinganidan keyin, tutib turilgan iliq buyum oynasiga 8—10 tomchi qon tushirib yig'iladi.

Bunda fibrin paydo bo‘la boshlaydigan qon ivish boshlanadigan paytdan to fibrin laxta bo‘lib, to‘la cho‘kib tushadigan qon batamom qoladigan paytgacha oradan o‘tadigan vaqt qayd qilinadi (har 30 sekundda shu qondan ingichka shisha tayoqcha yurgizib, uni ohista ko‘tarib ko‘riladi). Mana shu qonning ivish vaqtি bo‘ladi, bu vaqt me’yorda 5—6 daqiqani tashkil etadi.

4.14. Siyidik tahlili

Siyidik — moddalar almashinuvi mahsuloti. Qonning buyrakda filtrlanishidan hosil bo‘ladi. Kimyoviy tarkibi juda murakkab bo‘lib, unda 150 dan ortiq komponent, shu jumladan, suv, organizm uchun kerak bo‘limgan moddalar almashinuvni mahsulotlari (mochevina, siyidik kislotasi), erigan holdagi mineral tuzlar, turli zaharli moddalar bor. Odatda, och sariq rangli, biroz ammiak hidi kelib turadigan tiniq suyuqlik bo‘lib, solishtirma og‘irligi 1002—1030 atrosida o‘zgarib turadi (me’yorda o‘rtacha hisobda 1015—1018). Katta yoshdagi odam bir sutkada taxminan 1500 ml siyidik ajratadi.

Siyidik reaksiyasi kislotali yoki kuchsiz kislotali. Fizik-kimyoviy xossasining o‘zgarishi turli tashqi omillar (havoning namligi, harorati, jismoniy zo‘riqish va boshq.) va ovqat turiga bog‘liq, masalan, quruq ovqat iste’mol qilinganda yoki qattiq terlaganda siyidikning rangi tim sariq va solishtirma og‘irligi yuqori bo‘ladi.

Ko‘p go‘shtli mahsulotlar, sho‘rva, dukkakli o‘simliklar, tuxum iste’mol qilish organizmda ko‘plab siyidik kislotasi tuzlari hosil bo‘lishiga va siyidikning kuchli oksidlanishiga olib keladi. Sut va o‘simlik mahsulotlari iste’mol qilinganda esa fosfat birikmalari ko‘p hosil bo‘ladi va siyidik ishqoriy bo‘lib qoladi. Kisloto-ishqor muvozanatidagi keskin o‘zgarishlar tosh hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Ba’zi dorilar va oziq moddalar ta’sirida siyidikning rangi o‘zgarishi mumkin, masalan, lavlagi va amidopirindan qizil, akrixin, biomitsindan och sariq rangga kiradi. Siyidikning ko‘rsatib o‘tilgan o‘zgarishlari vaqtincha xarakterga ega bo‘lib, ularni keltirib chiqargan sabablar bartaraf etilgach, tarkibi va fizik xossalari qayta tiklanadi.

Siyidik fizik-kimyoviy xossalaring ko‘rsatilgan omillariga bog‘liq bo‘limgan holda o‘zgarishi organizmdagi ba’zi o‘zgarishlardan darak beradi. Masalan, tim sariq yoki yashilroq siyidik ajralishi jigar funksiyasining buzilganligini, «go‘sht seli» rangidagi siyidik

organlarning jiddiy kasallanganligini ko'rsatadi. Siydkda oqsil paydo bo'lishi buyrak va qovuq yallig'langanligidan, qand bo'lishi esa qandli diabet borligidan dalolat beradi. Shuning uchun siydikni tekshirish ko'pgina kasallikkarni aniqlashda katta ahamiyatga ega.

Siydik tahlili — buyrak funksiyalarining buziłganligini, shuningdek, turli organlarning shikastlanishiiga aloqador bo'lgan moddalar almashinuvining ba'zi o'zgarishlarini aniqlash imkonini beradi. Odatdag'i (klinik) siydik tahlili barcha kasallikkarda o'tkaziladi. U siydikning fizik xossalari (rangi, hidi, reaksiysi, tiniqligi, solishtirma og'irligi)ni kimyoviy tarkibi (normal siydik uchun xarakterli bo'limgan oqsil, bilirubin, qand kabi komponentlarni aniqlash)ni, shuningdek, cho'kmani mikroskopik (qonning shakilli elementlari — leykotsitlar va eritrotsitlar hamda boshqa hujayralarning mavjudligini) tekshirishni o'z ichiga oladi. Tahlil uchun olinadigan siydik toza idishga solinib, og'zi yaxshilab berkitiladi. Klinik tahlil uchun nahorgi siydikdan 100—200 ml olinadi. Siydikni yig'ishdan oldin tashqi jinsiy organlarni yuvish lozim.


Siydikning rangi va tiniqligi ko'z bilan ko'rib aniqlanadi. Bunda siydikni silindrga olib, oq narsa ustiga qo'yiladi. Normal siydik och sariqdan qora-ko'ng'irranggacha bo'ladi. Uning rangi tarkibida pigmentlar bo'lishiga bog'liqdir. Agar siydikka organizmda ko'p miqdorda hosil bo'lgan yoki tashqaridan yuborilgan pigmentlar tushsa, uning rangi o'ziga xos bo'ladi, agar siydikka o't pigmentlari aralashsa, u pivo rangini oladi (sariq-yashil rangdan to'q jigarranggacha), agarda qon pigmentlari (gematuriya, gemoglobinuriya) aralashsa, bu holda u go'sht yuvindisi rangiga kiradi.

Buyrak, siydik yo'llari o'tkir yallig'langanda, siydik-tosh kasalligida, buyrak va siydik chiqarish yo'llarida o'sma paydo bo'lganda siydik shunday rangga kirishi mumkin. Bemorlarga beriladigan ba'zi dorilar ham siydik rangini o'zgartirishi mumkin. Masalan, metilen sinkasi siydik rangini yashil yoki ko'k qilib ko'rsatadi, ichilgan santonin nordon muhitda uni tillarangga, ishqorli muhitda esa qizil rangga bo'yaydi va h.k.

Siydik tiniqligi o'tuvchi yorug'lik nurlarida, toza idishda aniqlanadi. Sog'lom odamlar siydigi tiniq bo'ladi. Unda bakteriya ko'p miqdorda rivojlanagan bo'lsa, u loyqa bo'lib qoladi. Leykotsitlar, eritrotsitlar, buyrak va siydik chiqarish yo'llari epiteliysi, buyrak silindralarining ko'p miqdorda bo'lishi siydik loyqalanishiga sabab bo'ladi.

Siydik hidi organoleptik usul bilan aniqlanadi. Uzoq turib qolganda mochevinaning parchalanishi tufayli siydik ammiak hidini oladi. Diabetda esa u ba'zan aseton hidiga ega bo'ladi (ivitilgan olma hidini eslatadi).

4.15. Siydikning solishtirma og'irligini aniqlash



Siydikning solishtirma og'irligi urometr asbobi bilan aniqlanadi. Qulay bo'lishi uchun ikkita urometrdan foydalilanadi. Ulardan biri 1000 dan 1025 gacha, ikkinchisi 1026 dan 1050 darajagacha bo'lingan. Solishtirma og'irlilikni aniqlashda siydik silindrga quyiladi va unga avval kichik darajalarga bo'lingan urometr solinadi. U silindr devoriga tegmay suzib yurishi kerak. Bunda tekshirilayotgan siydikning pastki meniski urometrning qaysi dara-jasiga to'g'ri kelishi aniqlanadi.

Shu daraja ustunidagi raqam siydikning solishtirma og'irligini ko'rsatadi. Agar kichik belgili urometr siydikka solinganda, uning butun shkalasi siydik yuzasidan yuqoriga joylashsa, bu hol mazkur siydikning solishtirma og'irligi 1025 dan yuqori ekanligini ko'rsatadi.

7-rasm. Urometr. Bunday holda shu siydikka silindrga 1026 dan 1050 darajaga bo'lingan urometr tushiriladi. Avval-gidek siydikning solishtirma og'irligi urometr shkalasi raqami turgan pastki menisk bo'yicha aniqlanadi.

4.16. Siydikdagi oqsil miqdorini aniqlash

Oqsil miqdori Roberte-Stolnikov usuli bilan aniqlanadi. Bu usul Geller sinamasiga, ya'ni tarkibidagi oqsil bo'lgan tekshiriluvchi suyuqlik bilan nitrat kislota chegarasida oqsil halqasi paydo bo'lishiga asoslangan, 3-minutning oxiriga kelib paydo bo'lgan yupqa, ammo ro'y-rost ko'rinish turadigan halqa tekshirilayotgan siydikda 0,033 g/l oqsil borligini ko'rsatadi. 1—2 ml nitrat kislota ustiga filtrlangan siydik qatlama qilib ohista tushiriladi.

Siydik qatlama qilib tushirilgandan keyin 2 minutdan ertaroq oqsil halqasi paydo bo'lsa, siydikni suv bilan suyultirish kerak. Suyul-tirilgan siydik qatlama qilib tushirilganida 2-minut bilan 3-minut

orasida halqa hosil bo'lishi topiladi. Oqsil miqdori 0,033 g/l ni suyultirish darajasiga ko'paytirish yo'li bilan hisoblab chiqariladi.

Hozirgi vaqtida oqsil konsentratsiyasini fotoelektrokolorimetriya yordami bilan aniqlash keng rusum bo'lmoqda. Buning uchun sulfosalitsilat kislota bilan qilinadigan sinamadan foydalaniladi ($1,25 \text{ ml}$ filtrlangan siyidikka 3% sulfosalitsilat kislotadan 5 ml gacha qo'shiladi) va loyqalanish darjasini fotoelektrokolorimetrda o'changanadi. Konsentratsiyasi ma'lum bo'lgan oqsil uchun oldidan tuzilgan egri chiziqqa qarab hisob qilib chiqiladi.

Oqsilni aniqlash. Normal siyidikda oqsil amalda bo'lmaydi. Siyidikda oqsil bo'lishi proteinuriya deb ataladi (yoki albuminuriya). Proteinuriyalari buyrakka aloqador bo'lmasdan, siyidik chiqarish yo'llarining shikastlanganligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Buyrakka aloqador proteinuriyalari ularni keltirib chiqargan sabablarga qarab, funksional (alimentar, sovuqqa, hayajonlanishga, jismoniy zo'riqishga, dimlanishga aloqador) proteinuriya bilan organik proteinuriyalarga (nefritlar, nefrosklerozlar) bo'linadi. Buyrakka aloqador bo'limgan proteinuriyalari siyidik chiqarish yo'llari, jinsi organlar, prostata bezining yallig'lanishi jarayonlarida ko'rildi.

Siydikdagi oqsilni aniqlash uchun qilinadigan sinamani qo'yishdan avval, siyidikni juda tiniq bo'lguncha filtrdan o'tkazish zarur.

Azot kislotali sinama-probirkaga 2—3 tomchi konsentrangan azot kislotasi quyiladi, so'ng tekshirilayotgan siyidik pipetkaga olinib, probirka devori bo'ylab azot kislotasiga sekin tomiziladi. $0,3$ miqdorda oqsil bo'lgan taqirda 2—3 minutdan so'ng azot kislotasi bo'ladi. Agar tekshirilayotgan siyidikda oqsil ko'p miqdorda bo'lsa, qalin oq halqa siyidik kislotaga tegishi bilan paydo bo'ladi.

4.17. Siyidikni biokimyoiy tekshirish

Siyidikda qand paydo bo'lishi glikozuriya deb ataladi. Glikozuriya fiziologik bo'lishi mumkin. Bu shunga bog'liqliki, agar buyrakning kanalcha apparati shikastlanmagan bo'lsa, glikozuriya faqat giperglykemiyada (qonda glukoza konsentratsiyasi oshib ketganida) ko'rildi. Demak, ko'p miqdor qand iste'mol qilinganidan keyin, shuningdek, qattiq hayajonlanishdan so'ng glikozuriya kuzatilishi mumkin. Patologik glikozuriya uglevodlar almashinuvni buzilishi tufayli ro'y bergen qandli diabetda, shuningdek, ba'zi jigar, gipofiz

kasalliklari, tireotoksikozda ko'riladi. Siydkdagi qand miqdonini aniqlashning eng ko'p tarqalgan usuli polyarimetrik usuldir. U glu-koza eritmasining qutblangan nur tekisligini o'ng tomonga sura olish xossasiga asoslangan.

Qutblangan nur deb maxsus Nikol prizmasi orqali o'tkazilgan nurga aytildi. Qutblangan nurning burilish burchagi siydk-glukoza konsentratsiyasiga proporsionaldir.

Polyarimetrik usul. Qaynatib, keyin filtrlash yo'li bilan oqsildan xoli qilingan kislota reaksiyali tiniq siydk polyarimetr nayiga to'ldiriladi (havo pufakchalarisiz), keyin bu nay apparatga qo'yiladi. Qorong'ilanish quyuqligining o'zgarishiga qarab, qutblangan nurning burilish burchagi aniqlanadi, bu burchak asbob shkala-sidagi darajalar bilan ifodalanadi. 1° burilish burchagi 1 % li glu-koza eritmasiga to'g'ri keladi.

Gaynes sinamasi. Mis sulfat, o'yuvchi kaliy va glitserindan iborat 3—4 ml reaktivga 8—12 tomchi siydk qo'shiladi (modifikatsiyasi: 1 tomchi siydk 9 tomchi reaktiv) va qaynatiladi. Qand bo'lsa, suyuqlik sariq yoki qizil rangga kirib, cho'kma ko'rindi.

Nilander sinamasi. Siydkka 2:1 nisbatda Nilander reaktivni (2 g vismut nitrat 4 g segnet tuzi bilan birga hovonchada yanchiladi, 100 ml 10 % li o'yuvchi natriy eritmasida eritilib, filtrlanadi) qo'shiladi va 3 minut qaynatiladi. Qand bo'lsa, siydk jigarrangdan qoragacha bo'lgan tusga kiradi.

So'nggi vaqtarda glikotest deb ataladigan indikator qog'oz-chalari usuli keng rusum bo'lib qoldi, bu usul fermentativ reaksiyaga asoslangan.

Maxsus reaktiv singdirilgan indikator qog'oz tekshiriladigan siydkka tushiriladi. Qog'ozdag'i sariq yo'l rangi o'zgarib, yashil yoki ko'k rangga aylanib qolsa, demak, sinama musbat chiqqan bo'ladi. Rang quyuqligini rangdor standart shkala bilan solishtirib ko'rib, siydkdagi glukoza konsentratsiyasini taxminan aniqlasa bo'ladi. Ertalabki siydk tekshirilganida qand miqdonini aniqlash uchun reaksiya qo'yiladi: reaksiya musbat natija bo'lsa, sutkalik siydk yig'iladi va undan qand konsentratsiyasi aniqlanadi.

Lange sinamasi 5—6 ml siydkka bir necha tomchi reaktiv (natriy nitroprussidning 30 % li sirka kislottedagi 6 % li eritmasi) qo'shiladi va ustidan ammiak qatlam qilib tushiriladi. Sinama musbat natija bersa, suyuqliklar o'rtasidagi chegarada binafsharangli halqa paydo bo'ladi. Keton tanalari yog' almashinuvni buzilganda siydkda paydo bo'ladi. Keton tanalari (aseton, asetosirka kislota, β -oksimoy

kislota) yog'lar parchalanishining oksidlanmay qolgan mahsulotidir. Ular qandli diabetda (uglevodlar almashinuvining buzilishi), jigarda va ba'zi buyrak kasalliklarida paydo bo'ladi va h.k.

Sog'lom odamning sutkalik siydigida bo'ladigan glukoza miqdori shu qadar kamki, odatdagi usullar bilan aniqlanmaydi. Siydkda glukoza borligini aniqlashga mo'ljallangan sifat sinamalarining ko'pchiligi glukozaning qaytaruvchanlik xususiyatiga asoslangan.

Siydkda aseton borligi Lange sinamasi yordamida aniqlanadi. Dastlab nitroprussid natriyning to'yingan eritmasi tayyorlanadi. Buning uchun probirkaga distillangan 1—2 ml suv quyilib, ustiga nitroprussid natriyning bir necha kristali tashlanadi. Shundan so'ng probirka yaxshilab chayqatiladi. Agar kristallar to'la erib ketsa, yana bir necha kristall tashlanib, tag'in chayqatiladi. Solingan kristallar erimay qolguncha bu ish takrorlanadi.

Kristallarning erimay qolishi nitroprussid natriy eritmasining to'yinganligini ko'rsatadi. So'ng boshqa probirkaga 15 ml yangi (yaxshilab filtrlangan) siydk quyilib, unga 1 ml muz sirka kislotosi va nitroprussid natriyning to'yingan eritmasidan 5 tomchi quyiladi, so'ng probirkadagi suyuqliklar aralashtiriladi, keyin ammiak probirka devori bo'ylab ularning ustiga qo'yiladi. Agar siydkda aseton ko'p miqdorda bo'lsa, suyuqlik bilan ammiak chegarasida binafsharangli halqa hosil bo'ladi. Halqa qanchalik tez hosil bo'lib, u qancha qalin bo'lsa, asetonning siydkdagi miqdori shunchalik ko'p bo'ladi.

Bilirubin va urobilinni aniqlash. Jigar va o't yo'llari kasalliklarida qonda bilirubin ko'p miqdorda to'planadi va u buyrak orqali siydk bilan ajralib chiqsa boshlaydi.

Siydkda bilirubin borligini ko'pincha Rozin sinamasi bilan aniqlanadi. Probirkaga 8—10 ml siydk quyilib, unga yodning 1 % li eritmasi yoki Lyugol eritmasi probirka devori bo'ylab tomchilab qo'yiladi. Agar siydkda bilirubin bo'lsa, suyuqliklar chegarasida turg'un yashil halqa hosil bo'ladi.

Ba'zi kasalliklarda siydkda urobilin uchraydi. Uni Shlezinger reaksiyasi yordamida aniqlash mumkin. Bu reaksiya quyidagidan iborat: siydkdagi urobilinogenni urobilinga aylantirish uchun 10 ml siydkka yodning detsinormal eritmasidan 1 tomchisi quyiladi, so'ng barobar miqdorda 10 % li rux asetatning spirtdagi eritmasi qo'shilib, aralashma filtrlanadi. Agar siydkda urobilin me'yordagidan ko'proq bo'lsa, filtrat qora fonda ko'rilmagan yashil fluoresensiya seziladi.

Siydik cho'kmalari. Qisqa vaqt ichida siydkli idish tubida tekshiriladigan cho'kma hosil bo'lishi mumkin. Biroq, ko'pincha cho'kmani tez olish uchun siydk konussimon probirkada sentrifugalanganadi. Sentrifugalangandan so'ng cho'kma ustidagi siydk qavati asta-sekin to'kib tashlanadi, so'ng pipetka bilan cho'kmadan bir tomchi olinib, buyum oynasiga qo'yiladi va qoplama oyna bilan berkitiladi. Cho'kma mikroskop ostida sal kattalashtirilgan holda ko'rildi. Mikroskop ostida ko'rinvuchi cho'kma tashkil topgan va tashkil topmagan elementlardan iborat bo'ladi. Siydk cho'kmasining tashkil topmagan elementlariga turli kristallik va amorf tuzlar kiradi, bularning ba'zilari nordon reaksiyalı siydkda, boshqalari esa ishqor reaksiyalı siydkda uchraydi.

1. Nordon siydk cho'kmasida uratlar — siydk kislotasi tuzlari uchraydi, ular oddiy ko'zga pushti rang cho'kma shaklida ko'rindi. Uratlar cho'kmasi siydk uzoq turib qolganda, ayniqsa, sovuqda turganda hosil bo'ladi. Siydk asta-sekin qizdirilganda uratlar erib ketadi. Mikroskop ostida uratlar mayda pigmentlangan donachalar sifatida ko'rindi.

Siydk kislotasi cho'kmada uratlar bilan yoki ularsiz uchraydi. Siydk kislotasi kristallari mikroskop ostida sariq-qo'ng'irrangli romb shakliga ega bo'ladi. Ba'zan ular qayroq tosh, qumsoat, bochkaga, bog' va boshqa shakkarga ega bo'ladi. Bularning barchasi, rombsimon kristallar kabi sariq-qo'ng'irrangli bo'ladi.

Kalsiy fosfat kristallari kichik jadval yoki pona shakliga egadir. Ular ko'pincha o'tkir uchlari bilan o'rtaga rozetkasimon to'planadi. Ular ko'pincha yakka holda ham uchraydi.

2. Ishqorli siydk cho'kmasida to'da-to'da, rangsiz donachalar shaklidagi amorf fosfatlar ko'rindi. Tripelfosfatlar uch, to'rt yoki oltiburchakli prizma shakliga ega bo'lib, cho'zinchoq yashik qop-qog'ini eslatadi.

Ammoniy urat siydk kislotasining ishqorli sharoitda cho'kuvchi birdan bir tuzidir. Uning sariq-qo'ng'irrangli shar shakliga ega kristallarida tikanakka o'xhash o'simtalari bor. Tashqi ko'rinish bo'yicha kuchala mevasini eslatadi.

Kalsiy korbonat juda kam uchrab, 4—6 ta va undan ko'proq to'p yoki ikkitadan joylashgan gimnastika toshi shaklida ko'rindi. Siydkda faqat patologik hollarda uchrovchi tashkil bo'limgan cho'kmalardan sistin, leysin, tirozin, xolesterintarni ko'rsatish mumkin.

Sistin kristallari mikroskop ostida to'g'ri oltiburchakli rangsiz jadvallarni eslatib, bir-biriga keng yuzlari bilan tutashgan bo'ladi. Ba'zan alohida kristallar holida ham joylashadi. Leysin va tirozin kristallari, odatda, birgalikda uchraydi. Leysin kristallari yaltiroq ko'ndalang konsentrik nurlar tarqatuvchi sharlar ko'rinishiga ega bo'ladi, tirozin kristallari — uzun yaltiroq igna shaklida bo'lib, tutam yulduz shaklida to'planadi.

Xolesterin siyidkda kamdan kam uchraydi. Uning kristallari ingichka rangsiz, chetlari qirqilgan rombsimon jadval shaklga egadir. Siyidkda yog' mayda yorug'likni kuchli sindirish xususiyatiga ega bo'lgan shar shaklida ko'rindi. Epitelial hujayralar, yakka leykotsitlar, eritrotsitlar, siyidk silindrlari, o'sma hujayralar uretral ipler, hayvon parazitlari, patogen bakteriyalar, buyrak jomi, siyidk yo'llari, qovuqda yallig'lanish jarayoni borligini ko'rsatadi.

Buyraklarning funksional sinamasi. Buyraklarni funksional tekshirishda bir qator sinamalar, masalan, suyultirish sinamasi yoki suv sinamasi tavsiya etilgan. Bunda bemor qovug'ini bo'shatgandan so'ng, erta bilan nonushtadan oldin 30 minut davomida 1500 ml suv yoki suyuq damlangan issiq choy ichadi. Shundan so'ng 4 soat davomida har 30 minutda yig'iladi. Sog'lom buyraklar ichilgan suvni ko'rsatilgan vaqt ichida siyidk bilan chiqarib yuboradi.

Konsentratsion sinamada yoki quruq ovqat yeish sinamasida ertalab bemor qovug'ini bo'shatgandan so'ng, bir sutka davomida o'rinda yotib, faqat quruq taom iste'mol qiladi. Siyidgi har 2 soatda yig'iladi. Sog'lom odamning har bir idishidagi siyidgi oz miqdorda (30—50 ml bo'ladi), uning solishtirma og'irligi yuqori, ba'zi bankalarda 1028—1030 ga yetadi.

4.18. Zimnitskiy sinamasi

Bu sinama boshqalaridan ko'proq qo'llaniladi. U tayyorgarliksiz, suv yuklamasi berilmasdan, bemor muayyan rejimda bo'lib, odatdagicha ovqatlanayotgan vaqtida o'tkaziladi va shunga ko'ra, unga monelik qiladigan hollar bo'lmaydi.

Bir kun avval tegishli etiketkalari bo'lgan 8 ta flakon (maxsus idish) tayyorlab qo'yiladi. Ertalab soat 6 da bemorga siyish taklif qilinadi va birinchi olingan siyidk to'kib tashlanadi. So'ngra 3 soat oralatib, sutka mobaynida 8 siyidk porsiyasi yig'iladi. I porsiyasi ertalab soat 9 da, II porsiyasi soat 12 da, III porsiyasi soat 15 da, IV porsiyasi soat 18 da, V porsiyasi soat 21 da, VI porsiyasi soat

24 da, VII porsiyasi soat 3 da, VIII porsiyasi keyingi sutkaning ertasi soat 6 da yig'iladi. Har bir porsiyadagi siyidik miqdori va solishtirma og'irligi o'lchanadi. Sog'lom odamda solishtirma og'irlik turli porsiyalarda anchagina turadi (1012—1025). Ulardagi siyidik miqdori ham o'zgarib turadi. Buyrak yetishmovchiligi hodisalarida solishtirma og'irlik va ajratilgan siyidik miqdori juda kam o'zgargani holda, ko'pincha nikturiya kuzatiladi.

4.19. Siyidikni Ambyurje usuli bo'yicha tekshirish

Bunday usulda tekshirish uchun 3 soat ichida chiqadigan siyidik yig'iladi. Bemorni soat 6 da turg'izib siydiriladi, soat 9 da siyidik tekshirish uchun laboratoriyyaga yuboriladi. Bunda 1 daqiqa ichida ajralgan eritrotsit va leykotsitlar soni aniqlanadi. Nechiporenko usuli bo'yicha 5—10 ml siyidik laboratoriyyaga jo'natiladi. Bu yerda 1 ml sentrifugalangan siyidikdagi leykotsit va buyrak epiteliysining hujayralar miqdori aniqlanadi. Addis-Kakovskiy sinamasi 12 soat davomida, masalan, soat 21 dan soat 9 gacha o'tkaziladi, ya'ni shu vaqt mobaynida yig'ilgan siyidikning hammasi laboratoriyyaga yuboriladi.

4.20. Siyidikni Nechiporenko usuli bo'yicha tekshirish

Siyidikni qunt bilan gigiyenik tozalashdan so'ng, istalgan vaqtda yig'ish mumkin. Biroq laboratoriyyaga ertalabki siyidikni yetkazgan ma'qul. Siyidik unsurlari hisoblash kamerasida sanaladi. Ularning miqdori 1 ml.ga taqsimlanadi. 1 ml siyidikda leykotsitlar miqdori 400 gacha, eritrotsitlar miqdori 1000 tagacha topiladi.

4.21. Siyidikni Addis-Kakovskiy usuli bo'yicha tekshirish

Siyidikni olishdan avval tashqi jinsiy a'zolar yaxshilab yuvilishi lozim. Oldin shisha bankaga konservant—bir necha timol kristallchasi yoki 2 kristallga formaldegid yoki 0,5 ml xloroform solinadi. Bu usul bo'yicha siyidikni 10 soat ichida yig'ish lozim. Soat 22 da bemordan qovuqni bo'shatish va tunda siymaslik so'raladi. Ertalab soat 8 da ertalabki siyidikning hammasi laboratoriyanadan olingan maxsus idishga yig'iladi. Idishga bemorning familiyasi, ismi, yoshi, bo'lim va palata raqami, tekshirishning maqsadi, hamshiraning familiyasi va sana yozilgan yorliq yopishtiriladi.

4.22. Balg‘amni tekshirish

Balg‘am nafas organlaridan chiqadigan patologik ajralmadir. Balg‘am paydo bo‘lishining o‘zi hamisha kasallik borligidan dalolat beradi. Balg‘amning miqdorini va xossalari aniqlashning katta diagnostik ahamiyati bor. Balg‘amning miqdori turlicha o‘tkir bronxitda yoki o‘pka yallig‘lanishi boshlanayotganda bir necha tupurim bo‘lsa, o‘pkadagi yallig‘lanish jarayonlarida (abscess, gangrena, bronxoektaqlar) sutkasiga 1—2 l.gacha boradi. Odatda, balg‘amning hidi bo‘lmaydi, o‘pkada yiringli jarayon ro‘y bersa, balg‘am sassiq yoki qo‘lansa hidli bo‘ladi. Balg‘amning quyuq-suyuqligi, rangi uning tarkibiga bog‘liq. Shilimshiqli, seroz, yiringli, shilimshiq-yiringli, seroz-yiringli va qon aralash balg‘am farq qilinadi. O‘pka yallig‘lanishi, bronxial astma, bronxitning boshlanish davrida rangsiz, tiniq yopishqoq shilimshiqli balg‘am ajraladi. O‘pkaga shish kelganda ajraladigan balg‘am suyuq, seroz, tiniq va ko‘pikli bo‘ladi. O‘pkada yiringli jarayonlar bo‘lsa, ko‘kimir yiringli, yurak va o‘pkaning turli kasalliklarida qon aralash balg‘am ajraladi.

Balg‘amda qonning hujayra elementlari, o‘sma hujayralari, eng sodda jonivorlar, exinokokk, askarida lichinkalari va o‘simlik parazitlari (zamburug‘lar), bakteriyalar bo‘lishi mumkin. Bakteriyani tekshirish natijalariga qarab kasallik (xususan, nafas yo‘llari kasalliklari) aniqlanadi. Shilimshiq balg‘am rangsiz, tiniq, yopishqoq. Boshlanayotgan bronxitda, o‘pka yallig‘langanda, bronxial astmada paydo bo‘ladi.

Seroz balg‘am suyuq, tiniq, ko‘piksimon. Yurak astmasida va o‘pka shishida qon bilan pushti rangga bo‘yalishi mumkin. Yiringli balg‘amning quyuq-suyuqligi qaymoqsimon-ko‘kimdir rangli. O‘pkadagi yiringlagan joy bronx bo‘shlig‘iga teshib o‘tganda paydo bo‘ladi. Shilimshiq-yiringli balg‘am bronxlar va ko‘pincha o‘pkada yallig‘lanish jarayonlari uchun xosdir.

Seroz-yiringli balg‘am tindirib qo‘yliganda uch qatlama bo‘linadi. Ustki qatlami—ko‘piksimon, aksari shilimshiq aralashgan, o‘rta qatlami—seroz-suyuq, och kulrang, pastki qatlami—yiringli ko‘kimdir-sariq rangli, unda o‘pka to‘qimasining parchalanish zarrachalari va yiring bo‘lakchalari bo‘ladi.

Qon aralash balg‘am unga tushgan qon miqdoriga va sifatiga ko‘ra turlichadir. Ba’zan bu o‘pka va nafas yo‘llaridagina emas, balki og‘iz bo‘shlig‘i va qo‘shni organlardan ham ajralib chiqishi mumkin

bo'lgan deyarli toza qondir. Balg'amda qon ipir-ipirlar yoki o'pka silida, o'pka o'smalarida bronxoektazlarda butun-butun ivindilar ko'rinishida bo'ladi. O'pkaning krupoz yallig'lanishida o'zgargan qon aralashganida balg'am zangsimon rangga kiradi.

Pushti rang balg'am ba'zan o'pka o'smalarining parchalanganidan paydo bo'ladi. O'pka assessida yemirilayotgan qon aralashib ketishidan yiringli jigarrang balg'am ajraladi.

Balg'amda oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan juda ko'p turli tuman unsurlari bo'lishi mumkin: 1) hujayra elementlari, jumladan, oq va qizil qon tanachalari, o'sma hujayralari, elastik tolalari va boshqa tuzilmalar; 2) oddiy mikroblar; 3) hayvon (exinokokk, askaridalarning lichinkalari), o'simliklarning parazitlari; 4) turli bakteriyalar.

Balg'amni mikroskopda tekshirish. Balg'am yupqa qavat qilib solingen Petri idishidan kichkina yiring parchasi topiladi. U qizdirilgan igna yoki pinset bilan buyum oynasiga olinib, yopuvchi oyna bilan asta bosib berkitiladi. Olingan preparat mikroskop ostida ko'riladi. Preparatning asosiy massasi bo'lgan shilliqdan tashqari, unda leykotsitlar ham topiladi. Yiringli balg'amda leykotsitlar miqdori juda ko'pdir. Bronxial astma xuruji vaqtida ajralgan balg'amda eozinofillar ko'p miqdorda bo'ladi.

Qon aralash balg'amda eritrotsitlar topiladi. Preparatda ko'pincha og'iz bo'shlig'i shilliq pardasidan yoki yuqqori nafas yo'llaridan ajralgan epithelial hujayralarni ham topadilar, bunda yapaloq epiteliy og'iz bo'shlig'i, tomoq va halqumdan, silindrik va lipillovchi epiteliy esa burun va chuqurroq joylashgan nafas yo'llaridan borib, aralashgan bo'ladi.

Balg'amda elastik tolalar o'pka to'qimasi parchalanganda uchraydi, masalan, gangrena, abscess, silda. Ularni mikroskop ostida oddiy surtmada ko'rish mumkin. O'pkada yangi o'smalar hosil bo'lganda balg'amda ba'zan o'sma hujayralarini topish mumkin. Yog' kislotalari, kristallari ignasimon shaklda, ular ko'pincha to'plangan, ba'zan alohida joylashgan bo'ladi. Ular o'pka absessi va gangrenasida ko'p miqdorda uchraydi. Sharko-Leyden kristallari bronxial astmada topiladi. Ular rangsiz, yaltiroq, cho'ziq romb shaklidagi uchli kristallar ko'rinishiga egadir.

Balg'amni bakteriologik tekshirishda unda o'pkaning turli kasalliklarini keltirib chiqaruvchilarini topish mumkin. O'pka silini aniqlashda balg'amda sil mikobakteriyalarini topish katta ahamiyatga ega. Buning uchun balg'amdag'i yiring parchasini pinset yoki igna

bilan olish va uni buyum oynasiga qo'yish kerak. Shundan so'ng ikkinchi buyum oynasi bilan uni ezish va ikkala oynaning bir-biriga qaragan yuzasi orasida surkash zarur. Shunday qilib, balg'amli ikkita yupqa surtma hosil bo'ladi. Olingen surtmalar havoda yoki spirtovka alangasida quritiladi. Bunda alanga oynaning surtma tegmagan tomonini qizitishi kerak. Shundan so'ng surtma fiksatsiya qilinadi, buning uchun oynaning surtmali tomonini yuqoriga qilib turib spirtovka alangasi ustidan 3—4 marta sekin o'tkaziladi.

Fiksatsiya qilingan surtma bo'yaladi. Shu maqsadda surtma ustiga oyna kattaligiga teng bo'Igan filtr qog'ozи qo'yilib, unga suyultirilmagan karbol fuksini qo'yiladi. Filtr qog'ozи bo'yoqning bir xilda tarqalishi va uning quyqasi surtmani iflos qilmasligi uchun zarur. So'ng surtmali oyna pinset bilan spirtovka alangasi ustida bug' hosil bo'Iguncha ushlab turiladi. Bunda balg'amdagi barcha bakteriyalar, shu jumladan, sil bakteriyalari ham qizil rangga bo'yaladi. Shundan so'ng surtmani oqar suv bilan yuvib, 1—2 minutga 25 % li xlorid yoki sulfat kislotali stakanga solib qo'yiladi. Bu vaqt ichida to'q bo'yagan surtma och pushti rangga kiradi. Kislota ta'sirida sil mikobakteriyasidan tashqari, barcha balg'am elementlari rangsizlanib qoladi. Endi surtmani qo'shimcha ravishda 0,1 % li metilen sinkasining suvli eritmasi bilan bo'yab, yana suv bilan yuviladi va quritiladi. Bo'yagan preparatni immersion sistemali mikroskop ostida ko'rildi. Unda sil mikobakteriyalari qizil rangga bo'yagan bo'lib, balg'amning boshqa ko'k rangga bo'yagan elementlari orasida yaxshi ko'rinish turadi. Ba'zan balg'amda sil mikobakteriyalarining kam uchrashini hisobga olib, surtmani bir necha ko'rish maydonida qarash kerak.

4.23. Najasni tekshirish

Najasni tekshirish natijalari materialni yig'ib olishga ko'p jihatdan bog'liq. Naja defekatsiyadan kechi bilan 8—12 soat keyin tekshirilishi kerak. Material toza, quruq idishga olinadi. Naja unda gija tuxumlari, qon sterkobilin bor-yo'qligini tekshirish uchun material olingenida parafinlangan stakanchalardan foydalanish maqsadiga muvofiq bo'lsa, ovqatning nechog'liq hazm bo'lganligini aniqlash uchun defekatsiyada chiqqan hamma naja yig'ib olish kerak bo'lganida kattagina shisha idish ishlatalish lozim.

Bir qancha hollarda koprologik tekshirish oldidan bemorni maxsus tayyorlash zarur bo'ladi. Tekshirishdan maqsad yashirin

qon borligini aniqlash bo'lsa, uni aniqlashga qaratilgan reaksiyaga ko'rsata oladigan masalliqlarni uch kungacha ovqatga ishlatmaslik kerak. Go'sht, baliq, ko'k sabzavotlarning hamma turlari, pomidorlar ana shunday masalliqlardir. Huqnadan va surgi dori ichilganidan keyin, shamchalar holidagi dorilar qo'yilganidan so'ng kanakunjut moyi yoki vazelin moyi hamda axlatning rangini o'zgartiradigan dorilar (temir, vismut, bariy) ichilganidan keyin tekshirishga axlat yuborish yaramaydi.

Najasni tekshirish makroskopik, mikroskopik, kimyoviy va bakteriologik tekshirishga bo'linadi. Makroskopik tekshirishda axlatning konsistensiyasi va shakliga, rangiga, hidiga, hazm bo'lmay qolgan ovqat qoldiqlari va patologik aralashmalar bor-yo'qligiga ahamiyat beriladi.

Me'yorda najas zichroq konsistensiyaga (tarkibida 80—85 % suv bor), silindrsimon shaklga ega bo'ladi. Ichak peristaltikasining zo'rayishi suv so'rili shuning buzilishiga olib keladi, shuning natijasida najas bo'tqasimon, shaksiz bo'lib qoladi. Ich qotib ketganda axlat kichik-kichik qattiq qumaloqlar ko'rinishida tushishi mumkin. Qo'y qumalog'i deb shuni aytildi. Najasning tasmasimon bo'lishi to'g'ri ichakda to'siq (o'sma, poliplar, sfinkter spazmi) borligiga aloqador bo'lishi mumkin. Najas, odatda, qo'ng'iroq-jigarrang tusda bo'ladi, bu — ichak mikroflorasi ta'sirida bilirubindan hosil bo'ladigan pigment-sterkobilin borligiga bog'liq.

Ba'zi dori moddalarini ichish va ba'zi mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida najas rangi o'zgarib qolishi mumkin. Masalan, temir, vismut, meksaform singari preparatlar axlatni qora-gungurt rangga kiritib qo'yadi. Najas rangining patologik o'zgarishlaridan uning rangsizlanib qolishini aytib o'tish kerak, o't chiqaruvchi yo'llarning tiqilib qolishi natijasida ichakka o't tushmay qolganda axlat shu tariqa rangsizlanadi. Bunday najas axolik axlat deb ataladi. Ma'da-ichak yo'lining yuqori bo'limlaridan qon ketganida, qoramoya o'xhash qop-qora axlatni ko'rsa bo'ladi. Bunday axlat melena deb ataladi.

Najas hidi oqsil parchalanishining mahsulotlari, asosan, indol va skatol miqdoriga bog'liq. Ovqat ratsionida oqsil ko'p bo'lsa, asosan, o'simlik ovqatlar iste'mol qilinganidagiga qaraganda najas hidi ko'proq bilinadigan bo'ladi. Chirish jarayonlari avj olib ketganida axlat qo'lansa hidli bo'lib qoladi. Ichakda bijg'ish jarayonlari zo'rayganida najas achimsiq hidga kiradi, bu unda moy sirkva valerianat kislota bo'lishiga bog'liq.

Mikroskopik tekshirishda hazm bo'lmay qolgan ovqat qoldiqlari to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin. Ovqatga aloqador bo'Imagan patologik aralashmalar jumlasiga shilimshiq, yiring, qon, o'sma zarralari, ichak parazitlari kiradi. Mikroskopik tekshirish uchun kichkina najas bo'lagi suvli hovonchada emulsiya holiga kelguncha eziladi, so'ngra buyum oynalariga shisha tayoqcha bilan shu emulsiya tomchilari tushiriladi va bir nechta preparat: nativ preparat, Lyugol eritmasi bilan, mentilen ko'ki bilan, sırka kislotadagi sudan III eritmasi bilan bo'yagan preparatlar tayyorlanadi. Bular mikroskopik kichik (x8) va katta (x40) obyektivi bilan tekshiriladi.

Najas mikroskop bilan tekshirilganda differensiyalanmagan mayda-mayda tuzilmalardan iborat amorf massa bo'lmish detrit fonida muskul tolalarini ko'rish mumkin, bular konturlari aniq bilinib turadigan to'g'ri to'rtburchakli yoki oval shaklda, yuzasi silliq (hazm bo'lib ketgan tolalar) yoki ko'ndalang yo'l-yo'li saqlanib qolgan (hazm bo'Imagan tolalar), sarg'ish tuzilmalar ko'rinishida bo'ladi. Ichak peristaltikasi kuchayganida, me'daosti bezi funksiyasi yetishmay qolgan, me'daning sekretor funksiyasi pasaygan paytlarda bular ko'payib ketadi (creatoreya). Axiliyada, me'daosti bezi yetishmovchiligidagi, ovqat yaxshi chaynalmay qolgan paytda yorug'likni sindiradigan tolasimon tuzilmalar ko'rinishidagi biriktiruvchi to'qima paydo bo'ladi.

Najasda uchraydigan o'simlik kletchatkasi hazm bo'lmaydigan va hazm bo'ladiganga bo'linadi. Hazm bo'lmaydigan kletchatka axlatda doimo uchrayveradi, chunki u hazm jarayonida parchalanmaydi. Bu kletchatka har xil shaklda, rangda bo'lib, ro'y-rost ko'rilib turadi.

Hazm bo'ladigan kletchatka dumaloq, nozik hujayralar ko'rinishida bo'ladi, normal axlatda uchramaydi. Peristaltika kuchayganida, anatsid holatda ichak florasingin hayot faoliyati ayniganida bunday kletchatkani topish mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan ovqat qoldiqlarini nativ preparatda ajratib olsa (differensirovka qilsa) bo'ladi. Kraxmal (amiloreya)ni topish uchun Lyugol eritmasi bilan bo'yagan preparat o'r ganiladi. Kraxmal hazm bo'lish bosqichiga qarab, binafsha yoki qizg'ish rangga bo'yaladi. Kraxmal hujayra ichida va undan tashqari bo'lishi mumkin. Amiloreya me'daosti bezi funksiyasi buzilganda ko'rishi mumkin, ko'pincha esa ichak bakterial florasi hayot faoliyatining buzilishida xarakterli bo'ladi. Najasda yog' (steatoreya), neytral yog' tomchilari, yog' kislota-

larining kristallari va tomchilari hamda yog‘ kristallari tuzlarining kristallari yoki bo‘laklari ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Neytral tomchilari ham, yog‘ kislotalarining tomchilari ham sudan III bilan bo‘alsa, metilen ko‘ki bilan faqat yog‘ kislotalarining tomchilari bo‘yaladi. Ularni bir-biridan ajratib olish (differensirovka qilish) uchun ham shundan foydalaniлади. Mikroskop bilan tekshirilayotgan preparatlarda ovqat qoldiqlaridan tashqari, shilimshiq leykotsitlar, eritrotsitlar va silindrsimon epiteliy hujayralarini topish mumkin. O‘tkir yallig‘lanish jarayonarida bu elementlar ko‘p uchraydi.

Najasdag‘i yashirin qonni aniqlash. Tekshirishdan avval bemorga 2—3 kun davomida go‘shtsiz ovqatlar berilib, milkida yara yo‘qligi tekshiriladi. Agar milkda yara bo‘lsa, yashirin qonga bo‘lgan reaksiyani qo’llab bo‘lmaydi, chunki bunda ichakka milkdan oz miqdorda qon tushib, u sinama yordamida aniqlanadi. Milklar kasal bo‘lganda tekshirishdan 2—3 kun oldin tishni cho‘tka bilan yuvish taqilanganadi.

Gvayak qatroni sinamasi. Chinni havonchaga 5 grammcha najas solinib, 10 tomchi muz sirka kislotasi, 5—10 ml suv qo‘shiladi va bo‘tqasimon konsistensiya hosil bo‘lguncha aralashtiriladi, shundan so‘ng bu aralashmani probirkaga quyib 5 ml efir qo‘shiladi. Probirkani tiqin bilan bekitib, bir necha marta to‘nkariladi. Bunda qon efir bilan birikib, najasdan ajraladi. Shundan so‘ng aralashma tinguncha kutib turiladi. So‘ng yuqorida ajralib chiqqan efir boshqa probirkaga olinib, unga 1—2 ml yangi tayyorlangan gvayakning spirtli eritmasidan va bir necha tomchi usti ochiq qoldirilgan eski skipidardan yoki 1 ml vodorod peroksididan qo‘shiladi. Najasda qon mavjud bo‘lsa, havorang hosil bo‘ladi.

Benzidin sinamasi. Probirkaga 2 ml muz sirka kislotasi quyilib, unga oz miqdorda (pichoq uchida) benzidin solinadi. Probirkadagi suyuqlik bir xil konsistensiya hosil qilguncha aralashtiriladi. So‘ng birinchi benzidinli probirkaga vodorod peroksidning 3 % li eritmasidan 20 tomchi qo‘shiladi va unga ikkinchi probirkada bir necha tomchi suyultirilgan najas solinadi. Najasda qon bo‘lsa, probirkadagi aralashma och yashil-ko‘k rangga bo‘yaladi.

Gregersen modifikasiyası. Tekshirishdan avval 5 ml 50 % li sirka kislotada 25 mg benzidin va 0,1 g vodorod peroksid eritiladi. So‘ng tekshiriladigan najas buyum oynasiga yupqa qilib surkalib, unga 1—3 tomchi yangi tayyorlangan eritma tomiziladi. Najasda

qon bo'lsa, u och yashil-ko'k rangga bo'yaladi. Bo'yoqning hosil bo'lish muddati najasdag'i qonning miqdoriga bog'liqidir.

Gvayak qatroni bilan ko'zga ko'rinnmaydigan qonni aniqlash sinamasining sezgirligi juda past. Benzidin sinamasi ancha sezgir. Laboratoriyalarda ko'pincha Gregersen modifikatsiyasidagi benzidin reaksiyasidan foydalaniladi. Ko'zga ko'rinnmaydigan qonga bo'lgan musbat reaksiya me'da-ichak yo'lida (yara kasalligida, me'da yoki ichak saratonida va polipozda) yashirin qon ketayotganini ko'rsatadi.

Najasdag'i sterkobilinni aniqlash. Najaasda sterkobilin borligini aniqlashda Shmidt reaksiyasidan foydalaniladi. U quyidagidan iborat. Petri idishi tubiga bir-biridan alohida ravishda ikki bo'lak tekshiriluvchi najaas solinadi. Ularning biriga sulemaning to'yingan (5 % li) eritmasi, ikkinchisiga — distillangan suv solinadi va 24 soat davomida termostatga qo'yib qo'yiladi. Najaasda sterkobilin bo'lsa, 24 soatdan so'ng sulema solingan bo'lak pushti rangga bo'yaladi, ikkinchisi esa o'z rangini o'zgartirmaydi. Sterkobilinga bo'lgan reaksiya manfiy bo'lsa, demak, jigardan o'n ikki barmoqli ichakka o't tushmas ekan. Bu holni o't chiqaruvchi yo'llar tosh, o'sma, askarida bilan bekilib qolganda, shuningdek, jigar parenximasida patologik jarayonar bo'lganda kuzatish mumkin.

Me'yorda najaas reaksiyasi taom turiga bog'liq — neytral, kuchsiz ishqorli yoki kuchsiz kislotali bo'lishi mumkin. Ichakda achish jarayonlari yaxshi kechganda, unda achish kislotalari to'planishi oqibatida najaas muhit kuchli nordon bo'ladi. Ichakda chirish jarayoni bo'lganda oqsillardan ammiak hosil bo'lib, u axlatda ishqoriy muhit paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Najaas muhit uning parchasiga lakkus qog'ozini tekkizish yo'li bilan aniqlanadi.

Ishqoriy muhitda qizil lakkus qog'ozini ko'karadi, nordon sharoitda esa ko'k lakkus qog'ozini qizaradi.

Gelminrozjarni aniqlash. Najaasda ichak parazitlari yakka holda (dumaloq gjijalar) yoki alohida yassi bo'g'inlar (tasmasimon gjijalar) shaklida ko'rinishi mumkin. Dumaloq gjijalardan ko'pincha askarida va ostritsalar uchraydi. Tashqi ko'rinishiga ko'ra, askaridalar yomg'ir chuvalchangini eslatadi. Ular dumaloq, pushti rang, uchlari o'tkir, bo'yi 25 sm.gacha bo'ladi. Ostritsalar oq, ingichka, uzunligi 1 sm.gacha bo'ladi. Ular, odatda, najaasning yuzasiga joylashgan bo'ladi.

Tasmali gjijalarining bo'g'inlari uzun, yassi to'rtburchak shaklida bo'lib, ularning bo'yi 1—2 sm va bir tomoni ko'tarilgan holda turadi. Tasmali gjija tashqariga chiqqanda uning bosh qismini topish

juda ahamiyatli, chunki u chiqqandan keyingina, bemor gijjaning bu turidan butunlay qutuldi deb hisoblash mumkin. Uning boshini topish uchun axlatni suv bilan yaxshilab aralashtirib, elakdan o'tkazish kerak, shundan so'ng elakda parazit bilan qolgan axlat yana bir marta yuviladi. Butun gijjalar yoki ularning bo'g'lnlari axlat bilan deyarli kam ajralgani uchun ularni topishning asosiy usuli — axlatda parazit tuxumi bor-yo'qligini tekshirishdir. Bunday tekshirish mikroskop yordamida o'tkaziladi.

Gijjalar tuxumi najasda quyidagicha topiladi. Najaasnинг turli joylaridan bir nechta bo'lagi olinib, probirkaga solinadi va unga miqdori olingan axlatdan 20 marta ko'p bo'lgan suv qo'shiladi. Probirkadagi suyuqlik shisha tayoqcha yordamida yaxshilab aralashtirilib, 2 soat qo'yib qo'yiladi. Shundan so'ng pipetka bilan probirkaga tubidagi cho'kmadan olinib, buyum oynasiga tomiziladi va yopuvchi oyna bilan berkitiladi hamda mikroskop ostida ko'rildi. Agar gijjalar tuxumi topilmasa, tekshirishni yana bir necha marta takrorlash kerak. Mikroskop ostida ko'rulganda gijjalar tuxumi yumaloq, ba'zan oval shaklida ko'rildi. Ular bir-biridan shakli, kattaligi, qobig'ining tuzilishi va rangiga qarab farq qiladi. Askarida tuxumi oval shakliga ega. U boshqa gijjalar tuxumidan tashqi qobig'ining g'adir-budurligi bilan farq qiladi. Ular jigarrang bo'lib, juda ko'p mayda donalarga ega.

Ostritsa tuxumi ham shunday kattalikka ega, oval shaklida, lekin uning qobiq konturi tekis. Tuxum ichida zarodish lichinkasi ko'riniib turadi. Buqa solityori tuxumi dumaloq, askarida tuxumidan biroz kichik qobig'ida radial chiziqlar bor. Tuxum ichida 6 ta embrional ilgakni ko'rish mumkin. Cho'chqa solityorining tuxumi buqa solityori tuxumidan hech farq qilmaydi. Keng tasmasimon gijja tuxumi boshqa tasmali gijjalar tuxumidan 2—3 marta katta va oval shakliga ega bo'lib, silliq yupqa qobiq bilan qoplangan. Uning ichi katta donali, tut mevasini eslatadi. Qilbosh tuxumi cho'ziq-oval shaklida bo'lib, uchlari sharsimon tuzilmaga ega. Qobig'i qalin, tillarangga bo'yalgan bo'ladi.

4.24. Me'da suyuqligini tekshirish

Me'da suyuqligini tekshirishda elastik rezinadan tayyorlangan yo'g'on zonddan foydalaniildi. Zondning uzunligi 70—75 sm, diametri 10—12 mm, teshigi taxminan 8 mm. Zondning me'daga

kiruvchi uchi dumaloqlashgan bo'lib, butunlay berk, undan sal yuqoriqda, bir-biriga qarama-qarshi tomonda ikkita oval teshik bor. Zondning yopiq tomoni 40 sm yuqoriqda belgi bo'lib, bu kurak tishdan me'da kardiasigacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Zond me'daga kiritilishidan oldin, yuvib qaynatiladi. Qaynatilgan zond suvda saqlanadi, chunki u ho'lligida me'daga oson kiritiladi. Agar bemorda olinadigan yasama tish bo'lsa, zond yuborishdan oldin uni olib qo'yish kerak. Zond quyidagicha kiritiladi: bemor stulga suyanib o'tiradi, bunda u boshini birmuncha oldinga engashtirib, og'zini katta ochib, tilini chiqarib turishi kerak. Tekshiruvchi bemorning yon tomonida turib, o'ng qo'li bilan zondning uch qismidan ushlaydi.

Chap qo'lining ko'rsatkich barmog'i va o'rta barmog'i yordamida ustiga toza doka qo'yilgan tilni birmuncha oldiga va pastga bosadi. Zond til ustiga qo'yilgan barmoqlar orasidan qizilo'ngachga kiritilib, 45—50 sm ichkariga asta itariladi, bunda bemor uni yutishga harakat qilishi kerak. Qaytarib tashlashning oldini olish uchun bemorga burun orqali chuqur nafas olish tavsiya etiladi. Qusuq kelgan hollarda bemorning boshini darhol oldinga egish kerak, chunki qusuq nafas yo'llariga ketib qolib, ularni bekitib qo'yishi mumkin. Toza idishga yig'ib olingan qusuq laboratoriyada tekshirilishi kerak.

Zond kiritilgandan so'ng uning erkin uchi me'daga narsalar to'planadigan idishga tushirilib qo'yiladi. Agar u darhol ajralib chiga qolmasa, bemorga kuchanish tavsiya etiladi va bir vaqtning o'zida qorinning me'dadan pastroq qismiga bosiladi. Agar bunda ham me'da ichidagi narsalar ajralmasa, zond oldi-orqaga hiroz harakat qildiriladi, shundan so'ng hemorning ko'ngli aynib, qusgisi keladi va bu hol me'da ichidagi narsalarning zond orqali chiqishiga yordam beradi.

Agar shundan keyin ham me'dadan hech narsa chiqmasa, demak, me'da ichi bo'sh bo'ladi. Odatda, nahorda me'dadan oz miqdorda 20—30 ml suyuqlik olinadi. Agar me'dadan chiqqan narsaning miqdori ko'p, masalan, 50 ml va undan ortiq bo'lsa, bu, patologik holatdan, ya'ni gipersekretsiyadan yoki me'da bo'shalishining qiyinlashganidan, me'da chiqish joyining torayganidan dalolat beradi. Oxirgi holda me'dadan chiqqan narsalar orasida 12 soat va undan ham avval yeyilgan ovqatlarni ko'rish mumkin.

Me'daga quyidagi hollarda zond kiritish mumkin emas:

- 1) bemorda aorta anevrizmasi borligi gumon qilingan hollarda, chunki zond anevrizma bosimi ta'sirida yupqalashgan qizilo'ngach devorini teshib yuborishi oqibatida, o'limga olib boruvchi qon ketish sodir bo'lishi mumkin;
- 2) o'tkir ezofagitlarda (kimyoviy va termik ta'sirlar) bunda asta kiritilmagan zond qizilo'ngach devorini teshishi va kuchli qon ketishini keltirib chiqarishi mumkin;
- 3) o'pka va yurakning og'ir kasalliklarida va umurtqa bilan ko'krak qafasi oraligida yallig'lanish jarayoni kechayotganda;
- 4) homiladorlikning oxirgi muddatlarida;
- 5) arterial bosim yuqori bo'lganda;
- 6) me'dadan qon ketganidan so'ng oradan ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa.

4.25. Me'daning sekretor funksiyasini sinov nonushtasidan keyin tahlil qilish

Me'daning sekretor funksiyasini aniqlashda bemor me'da shirasi ajralib chiqishi uchun tekshirishdan oldin ma'lum ta'sirlovchi ovqat yeishi kerak. Boas-Evaldning sinov nonushtasi keng tarqalgan qitiqlagich bo'lib, u 50 g suvi qochgan oq non yoki sirti ajratib olingan yog'siz bulka va 400 ml suv yoki xona haroratidagi uncha shirin bo'Imagan choydan iborat. Bemor sinov nonushtasini 10 minut davomida tanovul qilishi kerak. Sinov nonushtasidan keyin oradan 45 minut o'tgach, zond kiritilib, me'dadagi barcha narsalar tashqariga chiqariladi. Bunda me'dadan chiqqan narsaning miqdori, rangi, bulkaning qanchalik maydalangani, hidi, shilliq va turli aralashmalarning horligiga ahamiyat beriladi.

Me'da ichidan chiqarib olingan suyuqlik miqdori, odatda, 100—120 ml.dan oshmaydi. Agar me'dadan ko'p miqdorda suyuqlik chiqqan bo'lsa, bu yo gipersekretsiyani yoki me'da ichidagi narsaning o'n ikki barmoqli ichakka o'tishi sekinlashganini ko'r-satadi. Buning haqiqiy sababini aniqlash uchun me'da ichidan olin-gan suyuqlik darajalarga bo'lingan idishga solinib, I soat qo'yib qo'yiladi. Shundan so'ng tig'iz cho'kmanning suyuqlik qolgan qismiga bo'lgan nisbati aniqlanadi. Me'yorda cho'kma me'dadan olingan narsalarning 30—50 % ini tashkil qiladi. Agar cho'kma ancha ko'p bo'lib, 70—80 % ini tashkil qilsa, bu hol me'dadagi narsalar

evakuatsiyasi susayganini ko'rsatadi, agar cho'kma kam bo'lib, 15—20 % ni tashkil qilsa, bu hol ovqat gipersekretsiyasidan dalolat beradi. Me'da ichidan olingen suyuqlik miqdori kam, masalan, 30—40 ml bo'lsa, bu hol ularning o'n ikki barmoqli ichakka evakuatsiyasi tezlashganini yoxud me'da shirasi sekretsiyasining kamayganini ko'rsatadi.

Me'da ichidan olingen suyuqlikning rangi me'yorda och-sariq loyqa suyuqlikdir. Agar unga o't aralashgan bo'lsa, me'da shirasi kislotaliligi normal holda bo'lganda u yashil, axiliyada esa sariq rangga ega bo'ladi. Me'da ichidagi suyuqlikda qon bo'lsa, uning rangi qizil yoki qora-jigarrang bo'ladi va bu rang undagi qon miqdori hamda muhitning nordonligiga bog'liq bo'ladi.

Me'da ichidagi suyuqlik me'yorda nordonroq hidga ega. Me'dada achish jarayoni kechayotgan hollarda unda moy va sirka kislotosi bo'lganda, u kuygan yog' yoki sirka hidini beradi. Sassiq hid oqsillarning me'dada chirishidan dalolat beradi, bu hol ovqatning me'dada uzoq vaqt turib qolishi va unda xlorid kislotaning bo'lmasligi tufayli ro'y beradi. Ammiak hidi uremiyada, aseton (ivitilgan olma) hidi esa diabetda ko'p.

Bulkaning maydalanish darajasi muhim ahamiyatga ega. Me'da shirasida xlorid kislotosi va pepsin miqdori normal yoki yuqori bo'lsa, me'dadagi narsa bir xildagi bo'tqa ko'rinishiga ega bo'lib, bulkaning yaxshi maydalanganligini ko'rsatadi. Xlorid kislotosi me'da shirasida kam miqdorda bo'lsa yoki bo'lmasa, me'dadagi narsada yomon maydalangan bulkaning bo'laklari ko'rindi. Me'dadagi suyuqlikni kimyoviy tekshirish undagi umumiy kislotalilikni, erkin va bog'liq xlorid kislotosi, sut kislotosi, pepsin miqdorini va yashirish qon borligini aniqlashdan iborat.

Umumiy kislotalilikni aniqlashda stakanchaga me'daning sentrifugalangan va filtrlangan suyuqligidan 10 ml olinib, unga nordon muhitda rangsiz qoladigan, ishqorli muhitda esa pushti rangga bo'yaladigan fenoltaleinning spirtdagi 1 % li eritmasining 1—2 tomchisi indikator sifatida qo'shiladi. So'ng aralashtirib turib, natriy ishqorning detsinormal eritmasi turg'un pushti rang hosil bo'lguncha byuretkadan tomiziladi va bu hol tekshirilayotgan suyuqlikning nordon reaksiyasi to'la neytrallashganini ko'rsatadi. Byuretkadagi darajalarga qarab sarflangan natriy ishqorning miqdori aniqlanadi. Umumiy kislotalilikni 100 ml me'da suyuqligini neytrallash uchun zarur bo'lgan natriy ishqori detsinormal eritmasining kub santimetrlri raqami bilan ifodalash qabul qilingan.

Aytaylik, 10 ml me'da suyuqligi filtratdagи barcha nordon faktorlarni neytrallash uchun natriy ishqorning 5,2 detsinormal eritmasi sarflangan, bunda u 100 ml.ga o'n marta ko'p, ya'ni 52 ml sarflanishi kerak. Demak, ayni holda umumiy kislotalilik 52 ga teng. Me'yorda me'dadagi suyuqlikning umumiy kislotalilikgi 60—40 ga teng. 40 dan past bo'lgan raqamlar kislotalilikning pasayganini (gipoasiditas), 60 dan yuqorisi esa uning oshganini (giperasiditas) ko'rsatadi.

Xlorid kislutaning sinov nonushtasi oqsillari bilan bog'liq bo'limgan qismi erkin xlorid kislota deb ataladi. Erkin xlorid kislutani aniqlashda me'da suyuqligining 10ml filtrati stakanchaga quyiladi. 2—3 tomchi dimetilamidoazo-benzolning 0,5 % suvdagi eritmasi indikator sifatida qo'shiladi. Bu indikator mavjud bo'lganda erkin xlorid kislota tutuvchi suyuqlik och qizil rangga bo'yaladi. So'ng erkin xlorid kislutaning to'liq neytrallanganini ko'rsatuvchi zarg'aldoq rangga kиргунча natriy ishqorning detsinormal eritmasi tomchilab qo'shiladi. Titrlash uchun sarflangan natriy ishqorning kub santimetrdagi miqdori 10 ga ko'paytiriladi. Olingan son erkin xlorid kislota miqdorini ko'rsatadi. Me'yorda Boas-Evaldning sinov nonushtasidan keyin ajralgan erkin xlorid kislutaning miqdori 40—20 ga teng. Erkin xlorid kislutaning bo'lmasligi anatsiditas deb ataladi.

Agar me'dadan chiqarib olingan suyuqlikda xlorid kislota borligini tez aniqlash zarur bo'lsa, sifat reaksiyalardan foydalilaniladi: 1) qizil qog'ozga me'da suyuqligidan bir nechta tomchi tomiziladi. Xlorid kislota bor bo'lsa, qizil qog'oz ko'karadi; 2) me'danining tekshirilayotgan suyuqligining bir necha tomchisi shisha tayoqcha bilan predmet oynasiga olib qo'yiladi va unga bir tomchi dimetilamidoazo-benzolning 0,5 % li spirtli eritmasi qo'shiladi. Erkin xlorid kislota mavjud bo'lgan hollarda u qizil rangga, bo'l-maganda esa zarg'aldoq rangga kiradi.

Xlorid kislutaning sinov nonushtasi oqsillar yoki parchalanayotgan o'sma, ekssudat oqsillari va boshqalar bilan bog'liq qismi bog'langan xlorid kislota deb ataladi.

Bog'langan xlorid kislota miqdorini aniqlash uchun stakanchaga me'danining filtrlangan suyuqligidan 10 ml olinib, unga 2—3 tomchi 1 % li nordon alizarinsulfon natriyning suvdagi eritmasi (indikator)

qo'shiladi va tomchilab natriy ishqorning detsinormal eritmasi bilan nordon alizarinsulfat natriyning sariq rangi binafsharangga o'tguncha titrlanadi.

Aytaylik, 10 ml me'da suyuqligini titrlash uchun 3 ml natriy ishqori ketdi, bunda 100 ml ga 30 ml ketishi kerak. Shunday qilib, barcha kislotalarni bog'lash uchun (bog'langanidan tashqari) 30 ml natriy ishqori kerak. Demak, agar umumiy kislotalilik, masalan, 52 ni tashkil qilgan bo'lsa, u holda bog'langan $52 - 30 = 22$ ga teng bo'ladi. Me'da suyuqligidan erkin yoki bog'langan xlorid kislota, shuningdek, pepsin ham bo'lmasa, buni axiliya deb yuritiladi.

Pepsinni aniqlash. Probirkaga me'da suyuqligi filtratidan 10 ml olinadi va unga ivigan tuxum oqsili yoki yaxshilab yuvilgan oz miqdordagi fibrin solinadi. Probirka $37 - 38^{\circ}\text{C}$ li termostatda saqlanadi. Agar oqsil qisqa vaqt ichida erib ketsa, bu hol me'dadagi narsa tarkibida pepsin borligini ko'rsatadi.

Sut kislotasi normal me'da shirasida bo'lmaydi. U me'dada erkin xlorid kislotasi bo'lmaganda va unda ovqat turib qolganda achish jarayoni sodir bo'lganda hosil bo'ladi. Bu ikki sharoit ko'pincha me'da saratonida bo'ladi va shuning uchun me'da suyuqligida sut kislotasi bo'lishi kasallikning asosiy belgisi hisoblanadi. Nonda sut kislotasi oz miqdorda bo'ladi. Shuni hisobga olib, sut kislotasi faqatgina nahorga olingan me'da suyuqligida aniqlanadi. Sut kislotasi bir yarim xlorli temir bilan bo'ladigan sinama yordamida aniqlanadi. Probirkaga 5 ml 4 % li karbol kislotasining eritmasi quyiladi va undan ikki barobar ko'p miqdorda distillangan suv solinadi. Bu aralashmaga bir tomchi bir yarim xlorli temir solinadi, shundan so'ng eritma ko'k-ametist rangga bo'yaladi. So'ng unga tekshirila-yotgan me'da suyuqligi filtratidan bir necha tomchi tomiziladi va bu tomchilar probirkaga tubiga tushadi. Agar me'dadagi suyuqlik tarkibida sut kislotasi bo'lsa, probirkaga tubida sariq rang hosil bo'ladi.

Yashirin qonni aniqlash me'da-ichak yo'li shilliq pardasida yara bortigini (masalan, me'da yarasi va saratonida) bilish uchun katta ahamiyatga ega. Me'da suyuqligi tarkibidagi ko'zga ko'rning maydigan qon gvayak qatron reaksiyasi yordamida aniqlanadi. Bu reaksiya quyidagidan iborat: probirkaga 5—10 ml filtrlanmagan me'da suyuqligidan solinadi, unga 1—2 ml muz sirka kislotasi va 5—10 ml

efir qo'shiladi, probirkani yaxshilab chayqatib, bir necha vaqt qo'yib qo'yiladi. Bir necha vaqtidan so'ng efir qavati hosil bo'ladi va u boshqa probirkaga olinadi. Bu efir qavatiga 10 tomchi yangi 1 % li gvayak qatronining spirtdagi eritmasi va 20 tomchi eski (ozonlashgan) skipidar yoki 3—5 % li vodorod peroksid qo'shiladi. Qon bo'lgan taqdirda, bir necha minutdan so'ng qora-binafsha yoki qora rang paydo bo'ladi.

Me'da suyuqligi cho'kmasini tekshirish. Ishonchli diagnostik ma'lumot olish uchun nahorga olingan me'da suyuqligi cho'kmasini tekshirish kerak. Idish tubidan me'da suyuqligidan 1 tomchi olinib, buyum oynasiga qo'yiladi va yopuvchi oyna bilan berkitilib, mikroskop ostida tekshiriladi. Me'yorda cho'kmada yakka-yolg'iz leykotsitlar, epitelial hujayralar, hujayra yadrolari va oz miqdorda shilliq tolalari topiladi. Patologik hollarda cho'kmada ko'ndalang chiziqlari saqlanib qolgan mushak tolalari, turli kattalikdagi tomchilar shaklidagi yoki yog' kislotalari kristallari shaklidagi yog', kraxmal donalari, eritrotsitlar, ko'p miqdorda leykotsitlar, ko'p shilliq, achitqi zamburug'lar, sarsinalar, saraton hujayralari, shish zarrachalari, shilliq parda parchalari bo'ladi.

Me'da suyuqligini ingichka zond bilan tekshirish. Meda suyuqligini yo'g'on zond yordamida olish ba'zan me'da sekretsiyasi haqida to'liq tasavvur bermaydi, shuning uchun ba'zi hollarda ingichka zond bilan tekshirish (fraksion usul)dan foydalilanildi.

Ingichka zond—rezinadan yasalgan, elastik, diametri 4 mm, uzunligi 1 m, oxiri berk bo'lib, yonboshida oval teshigi bor. Uchidan 60 sm narida belgi bor. Ingichka zond bemorning faol yordamida kirgiziladi, bunda u zondni shoshmasdan yutishi va burun orqali nafas olishi kerak. Zond ko'rsatilgan belgiga yetgach (40 sm), me'da suyuqligi 20 grammli shpris yordamida so'rib olinadi. Shundan so'ng me'daga suyuq nonushta yuboriladi (300 ml suv va 0,2 g *Soffeini purgi* yoki 300 ml 5 % li vino spirti eritmasi yoxud 200 ml go'sht bulyoni), nonushtaga me'daning harakat faoliyatini o'r ganish uchun 1 % li metilen sinkasining eritmasidan bir necha tomchi qo'shilgan bo'ladi: har 10 minutda me'da suyuqligi 10 ml olinib, sinkani yo'qolish davri aniqlanadi va 30—60 minut davomida so'rib olish davom ettiriladi. Butun tekshirish jarayoni 100—110 minut davom etishi mumkin.

4.26. O'n ikki barmoqli ichak suyuqligini tekshirish (duodenal zondlash)

Duodenal suyuqlik ichak shirasi, o't, me'daosti bezi shirasi, pilorus orqali o'n ikki barmoqli ichakkaga o'tgan me'da shirasi va oz miqdordagi shilliqdan iborat.

Ba'zi kasalliklarda duodenal suyuqlikka qon, yiring, shilliq, normal tarkibidagi o't va me'daosti bezi shirasi va h.k. aralashgan bo'ladi. O'n ikki barmoqli ichak suyuqligini tekshirish muhim diagnostik ahamiyatga ega. Uni olish uchun duodenal zonddan foydalaniladi, bu zond 1,5 m uzunlikdagi ingichka rezina naychadan iborat, uning oxirida metall oliva bo'ladi. Olivadagi teshik orqali suyuqlik osonlik bilan zond ichiga kira oladi. Oliva qayerda joylashganligini bilish uchun zondda uchta belgi bor. Ularning birinchiisi olivadan 40 sm narida bo'lib, u kurak tishlardan me'da kardiasigacha bo'lgan masofani ko'rsatadi, ikkinchisi 56 sm narida, ya'ni kurak tishlaridan pilorusgacha, uchinchisi 70 sm narida, ya'ni kurak tishlaridan fater so'rg'ichigacha bo'lgan yerni ko'rsatadi. Bu naycha o'n ikki barmoqli ichakkaga nahorga kiritiladi. Kiritishdan avval zondni qaynatish va ho'llash kerak.

Duodenal zondni kiritish texnikasi quyidagicha: bemorni o'tqazib qo'yib oliva yuttiriladi, so'ng yutish harakatlari bilan zond birinchi belgigacha kiritiladi, shundan so'ng bemorni yoshboslatib yotqizgan holda uning chanog'i tagiga yostiq qo'yiladi va ikkinchi, keyin uchinchi belgigacha yutish tavsiya qilinadi. Shu holatda bemor 45—60 minut bo'lishi kerak.

Ma'lum vaqt ichida oliva me'da peristaltikasi natijasida o'n ikki barmoqli ichakkaga o'tadi. Bemor kushetkada yonboshi ko'tarilib yotgani uchun (yostiq qo'yilgani tufayli) me'da va o'n ikki barmoqli ichakkagi suyuqliklar zond orqali probirkaga oqib tusha boshlaydi. Agar zond hali me'dada bo'lsa, oqib chiqqan suyuqlik nordon reaksiyaga ega bo'ladi, buni lakmus qog'oz yordamida aniqlash mumkin (ko'k qog'oz suyuqlikka tekkizilishi bilan qizaradi). Agar zond o'n ikki barmoqli ichakkaga o'tgan bo'lsa, unda tiniq, sariqtillarangli, ishqoriy reaksiyadagi cho'ziluvchan suyuqlik chiga boshlaydi (bu suyuqlikni ko'k lakmus qog'oziga tekkizilsa, u qizarmaydi, lekin qizil lakmus qog'oz ko'karib ketadi). Bu birinchi porsiya o'n ikki barmoqli ichakdan chiqqan bo'lib, A porsiyasi deb ataladi. Agar o't pufagidagi suyuqlik tekshirilmoxchi bo'lsa,

ichakka 20—30 ml iliq 30 % li magneziy sulfat eritmasi yoki iltililgan 100 ml provan moyi yoki 30 ml 5—10 % li pepton eritmasi yuboriladi. Oradan 15—20 minut o'tgach, o't pufagining reflektor qisqarishi va Oddi sfinkterining ochilishi oqibatida pufakdag'i o't chiqa boshlaydi va u *B* porsiya deb ataladi. U *A* porsiyasiga qaraganda ancha to'q va quyuq bo'lib, o'zida ko'p miqdorda o't pigmentlarini tutadi. Bunday o't 30—40 ml ajraladi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, ancha tiniq o't porsiyasi ajrala boshlaydi, lekin u *A* porsiyasiga nisbatan to'qroq bo'ladi. Bu jigardan ajralayotgan o't bo'lib, jigar yo'llaridan chiqadi va *C* porsiyasi deb ataladi. Shundan so'ng zond ohistalik bilan chiqarib olinadi.

O'n ikki barmoqli ichakdan olingen suyuqlikning avval rangi, hidi, reaksiysi, fermentlari, oqsil moddalar, pigmentlari, o't kislotalari aniqlanib tekshiriladi. Uch porsiyani ham mikroskopda tekshirish kerak.

B porsiyasida ko'p miqdorda shilliq va leykotsitlarning bo'lishi o't pufagi yallig'langanini ko'rsatadi: shu elementlarning *C* porsiyasida bo'lishi o't yo'llarida yallig'lanish jarayoni borligidan dalolat beradi. Leykotsitlar va shilliqdan tashqari olingen porsiyalarda eritrotsitlar, epitely hujayralari, xolesterin kristallari, lyambliyalar va turli bakteriyalarni topish mumkin.

5-bob. NAFAS OLISH A'ZOLARI KASALLIKLARI

5.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumot

Organizm bilan tashqi muhit o'rtasida bo'lib turadigan gazlar almashinuvi jarayonida ishtirot etuvchi nafas sistemasi havo o'tkazuvchi a'zolar majmuyi, ya'ni burun bo'shlig'i, hiqildoq, traxeya (kekirdak), bronxlar va o'pkadan iborat (8-rasm).


Burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'ida hid bilish organi joylashgan. Burun bo'shlig'ining tog‘ay va suyakdan tuzilgan to‘sig'i uni ikkiga bo'lib turadi. Burun bo'shlig'ining to‘sig'i va devorlari ichki tomonidan shilliq parda bilan qoplangan, bu pardanering kiprikchali alohida hujayralari (hilpillovchi epiteliy hujayralari) bor. Ular nafasga olinadigan havo yo'nalishiga qarshi tebranib, undagi chang zarrachalarini shilimshiq bilan birga tashqariga chiqaradi (havoni tozalab beradi). Burun bo'shlig'iga uning yondosh bo'shliqlari ochiladi. Havo burun bo'shlig'idan o'tayotganida isiydi, namlanadi, tozalanadi va burun-halqumnga, keyin halqumning og'iz va hiqildoq qismiga tushadi. Og'izdan nafas olinganda ham bu yerga havo o'tishi mumkin. Biroq bunda havo isimaydi va tozalanmaydi.

Shuning uchun burundan nafas olish kerak. Halqumning shu qismidan havo hiqildoqqa o'tadi.

Hiqildoq nafas yo'lining burun bo'shlig'idan keyingi qismi bo'lib, ovoz paydo qiluvchi apparat vazifasini bajaradi. Nafas chiqarish vaqtida o'pkalardan qaytib chiqayotgan havo hiqildoqdagi tog‘aylar orasida tortilgan ovoz boyamlariga urilib tovush chiqaradi (9-rasm).

Kekirdak (traxeya) — hiqildoqning bevosita davomidir. Bo'yin sohasida kekirdak ko'krak bo'shlig'iga o'tib, IV—V ko'krak umurtqasi damida ikkiga — o'ng va chap bronxga bo'linadi. Bular o'pkaga kirib, oldin bo'lak, keyin segment bronxlariga tarmoqlanadi. Segment bronxları yanada maydarоq bronxlarga bo'linishda davom etib, o'ng va chap o'pkaning bronxial daraxtini hosil qiladi.

Kekirdak uzunligi 9—11 sm, diametri 15—18 mm keladigan naydan iboratdir. Kekirdakning yuqori qismi hiqildoqqa tutashgan



8-rasm. Ichki a'zolar:

1-hiqildoq; 2-qalqonsimon bez; 3-kekirdak (traxeya); 4-o'ng o'pka; 5-yuqori kovak vena; 6-aorta; 7-yurak proyeksiyasi (punktir chiziq bilan ko'rsatilgan); 8-ko'krak-qorin to'sig'i-diafragma proyeksiyasi (qizil chiziq bilan ko'rsatilgan); 9-plevra chegarasi (ko'k chiziq bilan ko'rsatilgan); 10-qovurg'a ravog'i; 11-jigar; 12-qovuq; 13-ko'tariluvchi chambar ichak; 14-ko'richak; 15-chuvalchangsimon o'simta — appendiks proyeksiyasi (punktir chiziq bilan ko'rsatilgan); 16-yonbosh ichak qovuzlog'i; 17-o'mrov suyagi; 18-kurak; 19-qovurg'a; 20-chap o'pka; 21-yurak o'rashgan joy (perikard bilan); 22-taloq; 23-me'da; 24-ko'ndalang chambar ichak; 25-och ichak qovuzlog'i; 26-charvi o'simtasi; 27-sigmasimon ichak; 28-buyrakusti bezi; 29-me'daosti bezi; 30-buyrak jomi; 31-buyrak; 32-siydik yo'lli; 33-chanoq suyagi; 34-tushuvchi chambar ichak; 35-chambar ichak tasmasi (bo'ylama muskul qatlami); 36-to'g'ri ichak; 37-urug' olib ketuvchi yo'lli; 38-urug' turadigan pufak; 39-halqum; 40-qizilo'ngachning ko'krakdag'i qismi; 41-qizilo'ngachning qorindagi qismi; 42-dumg'aza; 43-dum suyak; 44-orqa chiqaruv teshigi.

qismi ancha harakatchan bo'lib, pastki qismi, ayniqsa, ayri qismi deyarli qimirlamay turadi. Hiqildoq, shuningdek, kekirdak yuqori qismining yon tomonini qalqonsimon bezning o'ng va chap bo'laklari berkitib turadi. Kekirdakning orqa tomonida, biroz chaproqda qizilo'ngach joylashgan. Kekirdakning chap va o'ng yonlaridan bo'yining katta qon tomiri va nervlari o'tadi.


Bronxlar. Kekirdak IV—V ko'krak umurtqalararo tog'ay sohasida ayri holda ikki bronxga bo'linadi.

O'ng bronx chap bronxga qaraganda kengroq va kaltaroq, chap bronx uzunchoq (deyarli ikki barobar) va torroqdir. O'ng bronxda 6—8 ta tog'ay halqasi bo'lsa, chap bronxdagi tog'ay halqalari soni 9—12 ta. O'ng bronx deyarli tik yo'nalib kekirdakning davomi hisoblansa, chap bronx kekirdakdan chapga burchak hosil qilib chiqadi va biroz gorizontal yo'nalishga ega bo'ladi. Bronxlar, o'z navbatida, shoxlanib, katta-kichik bronxchalarga bo'linib ketadi. Bronxlarning shilliq qavati kekirdak shilliq qavatiga o'xshash tuzilgan.

O'pka — Pulmo (o'pkalar — pulmones). O'pkalar—ko'krak qafasida yurakning ikki yonida joylashgan just nafas a'zosi bo'lib, o'ng va chap o'pkalardan iborat. O'pkalar kesilgan konusning yarmiga o'xshaydi. Konusing asosi past tomondan diafragmaga tegib tursa, uchi birinchi qovurg'adan 3—4 sm yuqorida yoki o'mrov suyagidan 2—3 sm yuqoriqoda turadi. Har qaysi o'pkada uchta oldingi, ostki va orqa qirra farq qilinadi (10-rasm).


O'pkalarning medial (ko'ks oralig'iga qaragan) yuzasida, yurak o'ymasidan biroz yuqoriqoda o'pkalarga kiradigan bronx, o'pka arteriyasi va o'pkadan chiqadigan o'pka darvozasi bor. O'ng o'pka chuqur ariqchalar yordamida uch bo'lakka, chap o'pka esa ikki bo'lakka bo'linadi. O'ng o'pka chapdagiga qaraganda kattaroq va hajmi ko'p bo'lishiga qaramay, bo'yи chap o'pkaga qaraganda qisqaroq bo'ladi. Buning sababi shuki, o'ng o'pka tagida jigar joylashgan.

Bronxlarning bo'linishi — o'ng va chap o'pkalarga kirib ketylган bronxlar o'zidan maydarоq bronxlarga shoxlanadi. Har bir bronx oxiri mayda bronxlargacha bo'linib, o'pka uchi yoki asosigacha yetib boradi. O'ng o'pka asosiy uch bo'lakka, chap o'pka ikki bo'lakka bo'linadi. Bo'laklar bronxi, o'z navbatida, chap va o'ng o'pkada nechta segment bo'lsa, ana shuncha segmentlar



9-rasm. Nafas olish a'zolari (hiqildoq, traxeya, bronxlar)ning sxematik tasviri:

1—3—bronxlar (1—bosh;
2—bo'lakdagi; 3—segmentar va
ancha mayda shoxchalar);
4—o'pka; 5—traxeya.



10-rasm. O'pkaning sxematik tasviri (oldidan ko'rinishi):

1—hiqildoq; 2—traxeya (kekirdak);
3—4—chap o'pkaning yuqori va
pastki bo'lagi; 5—yurakka qaragan
kemtigi; 6—bosh bronx (o'ng va
chap); 7, 8, 9—o'ng o'pkaning
pastki, o'rtta va yuqori bo'lagi.

bronxlarga bo'linadi. Bronxlar diametri asta- sekin torayib borar ekan, bronx devorida joylashgan tog'ay halqalari ham ingichkalashib boradi, nihoyat, diametri 1 mm.ga teng bo'lgan bronxchalarda tog'ay halqasi butunlay yo'qoladi. Tog'ay halqalari yo'qolgan bronxlarda shilliq bezlar ham bo'lmaydi.

Eng mayda, oxirgi bronxiolalar deb ataluvchi bronxiolalar o'pka parenximasining birlamchi yacheylemlari bo'lgan o'pka pufaklari yoki alveolalarga ochiluvchi nafas yo'llariga bo'linadi. Alveolalar devori elastik tolalar va bir qavat o'ziga xos epithelial hujayralaridan iborat. Alveolalar kapillar tur bilan o'ralgan. Shu yerda nafas olish vaqtida

alveolalarga kirgan havo bilan alveolalarni o'ragan kapillarlarga kelgan qon o'rtasida havo almashinadi. Har bir bronxiolaga nafas yo'lli orqali bir emas, bir necha uzum boshini eslatuvchi alveola ochiladi.

Nafas yo'llari orqali alveolalari guruhi bilan tutashgan oxirgi bronxiola asinus deb ataladi. 12—18 asinuslar o'pka bo'lakchagini hosil qiladi. Bo'lakchalar bo'laklarga birkaldi va ular har bir o'pkani hosil qiladi.

Plevra va plevra bo'shlig'i — ko'krak qafasida uch mustaqil seroz bo'shliq, chunonchi, ikki yon tomonda o'pka xaltalari va o'rtada yurakni o'rabi turuvchi seroz xalta bor. O'pkani qoplagan seroz pardaga plevra, yurakni o'ragan seroz pardaga perikard deyiladi. Plevra ikki varaqli, ichki varaq — visseral varaq, tashqi varaq pariyetal varaqqa bo'linadi. Visseral plevra o'pkani bo'laklarga ajratib yoriq ariqlar ichiga kirib turadi. O'pkaning ustidan har taraflama o'rabi olgan visseral plevra o'pka darvozalariga kelganda bevosita pariyetal plevraga o'tib ketadi. Pariyetal va visseral plevralar orasida plevral bo'shliq bor. Plevra bo'shlig'ida ma'lum miqdorda suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik plevralarning bir-biriga qaragan yuzalarini ho'llab, nafas olish va chiqarishda ishqalanishni kamaytirib turadi.

O'pkada tarmoqlanib, qil tomirlarga aylanib ketadigan o'pka arteriyasi yurakning o'ng qorinchasidan o'pkaga kislorodga kambag'al venoz qonni olib keladi. Nafas natijasida alveola havosidagi kislorod qonga, qondagi karbonat angidrid esa alveoladagi havoga o'tadi. Natijada qon kislorod bilan boyib, arterial qonga aylanadi va o'pka venalaridan yurakning chap bo'lmasiga qaytib keladi. Qon aylanishining shu yo'li kichik qon aylanish doirasi deb ataladi. Gaz almashinuvi jarayonida uch asosiy faza farq qilinadi: tashqi nafas, qonning gazlarni tashib kelishi va ichki nafas (to'qima nafasi). Tashqi nafas o'pkada bo'lib turadigan hamma jarayonlarni birlashtiradi va ko'krak qafasi hamda muskullari, diafragma, o'pka hamda havo o'tkazuvchi yo'l ishtiroti bilan yuzaga chiqadi.

Ko'krak qafasining bir maromda harakat qilib turishi odam nafas olganda o'pkaga atmosfera havosi kirishini, nafas chiqarganda esa karbonat angidrid gaziga boy havoning o'pkadan chiqib ketishini ta'minlab beradi. Nafasda ko'p ishtirot etadigan muskul-diafragma bo'lib, nafas olganda qisqarib, yassilanadi, ko'krak bo'shlig'i kengayadi, ayni vaqtida ko'krak qafasi muskullari ham qisqarib, ko'krak bo'shlig'ini yanada kengaytiradi. O'pka elastik bo'lganidan ko'krak bo'shlig'i devorlariga ergashib borib, o'zi ham kengayadi. Bunda atmosfera havosi o'pkaga kirib, uni to'ldiradi, nafas olish deb shunga aytildi.

So'ngra ko'krak qafasi muskullari va diafragma bo'shashadi, ko'krak bo'shlig'inining hajmi kichrayadi, bunda o'pkadan havo chiqib ketadi, bu nafas chiqarishdir. Ana shunday nafas harakatlari katta yoshli odamda minutiga 16—18 marta bo'lib turadi.

Nafas jarayonlarini markaziy nerv sistemasining maxsus bir bo'limi — nafas markazi idora etib boradi. Qonda karbonat angidrid gazi va boshqa ba'zi mahsulotlarning to'planishi bu markazni qo'zg'atadi, natijada nafas harakatlarining tezligi hamda chuqurligi kuchayib, qon shu mahsulotlardan tozalanadi. Nafasni idora etishda adashgan nervlar ham katta rol o'ynaydi.

Odam tinch turib, nafas olganida 500 l.ga yaqin havo kiradi. Juda chuqur nafas olganida ham qo'shimcha 1500 ml atrofida havo yutish mumkin. Odam juda chuqur nafas chiqarganida esa qo'shimcha ravishda yana 1500 ga yaqin havo chiqarishi mumkin, lekin shundan keyin ham nafas sistemasida yana 1500 ml atrofida havo qoladi. Nafasga olingan havoning hammasi ham gazlar almashinuvida ishtirot etavermaydi, og'iz bo'shlig'i, burun-halqum, tomoq, traxeya, bronxlarda har safar 150 ml.ga yaqin havo qolib ketadi, zararli bo'shliq deb shunga aytildi.

5.2. Nafas olish a'zolari kasalliklarining asosiy alomatlari

Nafas olish a'zolari kasalliklarining asosiy alomatlariga nafas qisishi, yo'tal, balg'am ajralishi, qon tupurish va og'riq kiradi.

Nafas qisishi. Dispnoe, nafas chastotasi, ritm va chuqurligining buzilishi, odatda, havo yetishmasligi bilan o'tadi. O'pkadan bo'ladigan nafas qisishi ko'krak qafasi shikastlanganda, o'pka kuchli zaharlanganda, o'pka yallig'langanda, sil, bronxial astma, o'pka emfizemasi, nafas yo'llarida havo o'tishi uchun qarshilik paydo bo'lishi, o'pka to'qimasi elastikligining kamayishi yoki nafas yuzasining qisqarishi, plevra bo'shilg'ida suyuqlik borligi, plevra pardalarining bir-biri bilan yopishib qolishi, nafas mushaklari parezi, ko'krak qafasi tog'aylarining suyaklanishi va uning harakatchanligining chagaralanishi oqibatida paydo bo'lishi mumkin.

Bunday hollarda o'pkaga yetarli miqdorda havo, demak, kislород ham kirmaydi, bu qonda to'la oksidlanmagan oraliq modda almashinuvi mahsulotlarining (sut kislotasi va boshq.) hamda karbonat angidridning to'planishiga olib keladi. Bu hol nafas markazini doimo qo'zg'atib turadi va nafas qisishi bilan ifodalanadi.

1. Nafas fazalari (nafas olish va nafas chiqarish) buzilgan nafas qisishi:

a) *inspirator nafas qisishi* — nafas olishning qiyinlashuvi — yuqori nafas yo'llarida mexanik to'siq bo'lganda yuzaga keladi. Bunda nafas sekinlashadi. Agar nafas yo'llari kuchli toraygan bo'lsa, nafas shovqin bilan olinadi, havoni surishdagidek tovush-stridor paydo bo'ladi. Bunday nafasni stridoroz nafas deb ataydilar;

b) *ekspirator nafas qisishi* — nafas chiqarishning qiyinlashuvi, bu bronxiolalar spazmi (bronxial astma, bronxiolit) tufayli havoning nafas yo'llariga o'tishining qiyinlashishiga, shuningdek, o'pka to'qimasi elastikligining (o'pka emfizemasi) pasayishiga, o'pkaning sog'lom odamlarnikidek kichraya olmasligiga va buning natijasida nafas olish vaqtida kirgan havoni alveolalar to'liq chiqarib yubora olmasligiga bog'liq bo'ladi;

d) *aralash nafas qisishi* — nafas qisishida ham nafas olish, ham nafas chiqarish qiyinlashadi. Bu turdag'i nafas qisish nafas markaziga zaharli moddalarning (uremiya) ta'sirida o'pka nafas yuzasining kichrayishida, masalan, o'pka yallig'lanishida yoki pnevmotoraks vaqtida havoning, ekssudativ plevritda suyuqlikning plevra bo'shilg'ida to'planishi va o'pkani qisib qo'yishi oqibatida

kuzatiladi. Aralash nafas qisishi o'pka shishishida diafragma yuqori joylashganda ham ro'y berishi mumkin.

Asfiksiyagacha borib yetuvchi kuchli ifodalangan nafas qisishi bo'g'ilish deb ataladi. U tovush paylarining spazmida, o'pka arteriyasining yirik tarmoqlari bekilib qolganda, o'pka kuchli shishganda ro'y beradi. Xuruj bilan paydo bo'luvchi bo'g'ilish astma deb ataladi — nafas chiqarish qiyinlashadi, to'satdan sodir bo'luvchi bronxiolalar spazmi bilan o'tuvchi bronxial astma bunga misol bo'la olishi mumkin.

2. *Nafas harakatlarining chastotasi o'zgaradigan nafas qisishi:*

a) *taxipnoe* — *tezlashgan nafas*. Tezlashgan va yuzaki nafas yurakka, yurak-o'pkaga aloqador nafas qisishiga, isitma, isteriyaga aloqador nafas qisishiga xosdir;

b) *bradipnoe* — *sekinlashgan nafas*. Sustlashgan va chuqur nafas «Kussmaulning katta nafasi» — gematogen nafas qisishining bir turidir. U diabetik, jigar va boshqa komalarda moddalar almashinuvining buzilishi natijasida qonda zaharli kislotali mahsulotlar to'planishi sababli vujudga keladi. Miyaga qon quylganda nafas sustlashib va chuqurlashib qolishi mumkin (sentrogen nafas qisishi).

3. *Nafas harakatlarining ritmi buziladigan nafas qisishi:*

a) *to'lqinsimon nafas*. Nafas harakatlarining chuqurligi vaqt-vaqt bilan o'zgarib turadigan nafas;

b) *Biot nafasi*. Nafas odatdag'i, normal tipda bo'lgani holda pauzalar borlig'i bilan xarakterlanadi, bir necha nafas olishdan keyin paydo bo'luvchi pauza bilan farq qiladi. Bu nafas pauzalari turlicha vaqt davom etib, ba'zan 30 sekund va undan oshiqroqqa yetadi. Biot nafas miya o'smalari, meningit, miyaga qon quylishi, ba'zan uremiya va diabetik komalarda uchraydi;

d) *Cheyn-Stokscha nafas*. Nafas chuqurligining asta-sekin ortib borishi bilan xarakterlanadi, nafas chuqurlashib borib, maksimumga yetgach, asta-sekin kamayadi va pauzaga o'tadi. Miya kasalliklarida, qon aylanishining og'ir buzilishlarida, komalarda va narkotiklardan zaharlanishda kuzatiladi;

e) *Kussmaul tipidagi nafas qisishini* ham farqlaydilar. Bunda nafas harakatlari maromi buzilmaydi, lekin nafas chuqurligi ancha o'zgaradi. Nafas chuqur-chuqur va shovqinli bo'lib qoladi (nafas olish bilan nafas chiqarish uzoq davom etadi, keyin uzoq pauza kuzatiladi, so'ngra hammasi takrorlanadi).

Yo'tal. Bronxlar va yuqori nafas yo'llaridan yot jismlarning, yuqori nafas yo'llari, bronxlar va o'pkaning turli kasalliklarida

shilimshiq va balg'amning chiqarilishiga qaratilgan himoya-reflektor akt hisoblanadi. Yo'tal turtkisining mexanizmi chuqur nafas olish, so'ng kuchli nafas chiqarishdan iborat, bunda nafas chiqarish tovush yorig'i berk bo'lganda boshlanadi.

Xarakteriga qarab yo'talni quruq, ya'ni balg'am ajralmaydigan va ho'l balg'am ajraladigan yo'talga bo'ladilar.

Odatda, quruq yo'tal bronxitda, plevra ta'sirlanganda, milliar silda, ho'li esa bronxit va pnevmoniyalarda uchraydi.

Yo'tal muddatiga qarab, xurujsimon, vaqt-vaqtida tutadigan va to'xtovsiz yo'talish; tembriga qarab, plevritda ko'rildigani kalta va sekin, hiqildoq zararlanishi va isteriyaga xos qu-qulab yo'talish, tovush boylamlari yallig'langanda va yara bo'lganda bo'g'iq hamda xirillab yo'talish xillarga bo'linadi.

Tana ma'lum vaziyatda bo'lganda tutadigan va ko'p balg'am tushishiga sabab bo'ladigan yo'tal o'pkada bo'shliq borligidan dalolat beradi, tananing qanday vaziyatda turganiga qarab, bo'shliqning qayerda joylashganligini taxminan aniqlash mumkin. Ovqat yeish vaqtida yo'tal tutishi, ayniqsa, balg'amda ovqat zarrachalari ko'rinishi qizilo'ngach bilan traxeya o'rtasida teshik borligidan dalolat beradi. Ko'kyo'talda qotib-qotib yo'talish, entikib qattiq-qattiq nafas olish bilan bo'linib turadi, bunda bemorning yuzi ko'karib ketadi, yo'tal tutib bo'lganidan keyin ko'pincha bemor quсади.

Yo'taldan keyin ko'p miqdorda balg'am ajralsa, bu hol bronxo-ektaziya kasalligida bo'shliqning bo'shashiga, bronxga o'pka absessi yoki plevra empiyemasining ochilishiga xosdir.

Balg'am nafas yo'llarinining turli kasalliklarida ajraladi. Odam yo'talganda balg'am ajraladigan bo'lsa, darhol shifokorga ko'rinishi shart, chunki balg'am chiqishi ayrim kasalliklarning asosiy belgilariidan biridir. Balg'am miqdori har xil; bronxit va o'pka yallig'lanishining boshlang'ich shaklida bemor bir-ikki marta oz-ozdan balg'am tuflasa, o'pkaning yiringli kasalliklarida 1—2 litrgacha balg'am ajratadi.

Odatda, balg'amning hidi bo'lmaydi, o'pkada yiringli jarayon ro'y bersa, balg'am sassiq yoki qo'lansa hidli bo'ladi, balg'amning quyuq-suyuqligi, rangi (oq, zang tusli, qizg'ish) uning tarkibiga bog'liq, shilimshiqli, shilimshiq-yiringli, seroz-yiringli va qon aralash balg'am farq qilinadi. O'pka yallig'lanishi, bronxial astma, bronxitning boshlanish davrida rangsiz, tiniq, yopishqoq shilimshiqli balg'am ajraladi.

O'pkaga shish kelganda ajraladigan balg'am suyuq, seroz tiniq va ko'pikli bo'ladi, o'pkada yiringli jarayonlar bo'lsa, yiringli,

ko'kimdir, yurak va o'pkaning turli kasalliklarida qon aralash balg'am ajraladi. Balg'amda qonning hujayra elementlari, o'sma hujayralari, eng sodda jonivorlar, exinokokk, askarida lichinkalari va o'simlik parazitlari (zamburug'lar) bakteriyalar bo'lishi mumkin.

Qon tupurish. Bu nafas a'zolari kasalliklarining asosiy va jiddiy alomatlaridan biridir. U kuchli yo'tal mahalida bronxlar cho'zilib, kengayib qolgan paytlarda (bronxoektazlarda) qon tomirlarining yorilishi, o'pkadagi yiringli jarayon (abssess)lar sil, xavfli o'sma tufayli o'pka to'qimasi butunligi buzilishining natijasidir. Oz qon tupurish ham xavfli hisoblanadi, chunki u shoshilinch choratadbirlar ko'rishni talab etadigan, bemor hayotiga xavf soladigan o'pkadan qon oqishiga aylanib ketishi mumkin. O'pkadan ko'pincha kuchli yo'tal paytida qon oqadi. Qon rangi qip-qizil, ko'pikli, ishqoriy reaksiyali bo'lib, ayni vaqtida o'pkadan qon oqishidan farqli ravishda, me'dadan qon oqqanda quşish, ko'ngil aynishi kuzatiladi. Qon ovqat bilan aralashgan, to'q rangli, ba'zan ivib qoluvchan bo'ladi. Milklar va halqumdan qon oqayotganini istisno qilish maqsadida, og'iz bo'shlig'i va halqumni sinchiklab ko'zdan kechirish lozim. Milklar, bodomcha bezlari va burun hamda halqumdan oqayotgan qonsimon suyuqlik pushti, jigarrangli, shilimshiq bo'ladi.

Og'riq. Nafas organlari kasalliklarida og'riq, asosan, plevra shikastlanganda paydo bo'ladi. Faqat o'pka to'qimasi shikastlanganda, odatda, og'riq bo'lmaydi yoki kam bo'ladi. Quruq plevritlarda plevral og'riqlar yallig'langan plevra pardalarining bir-biriga ishqalanishida kuzatiladi. Og'riq bu vaqtida ko'krak qafasida bo'lib, ayniqsa, uning yonbosh qismlarida kuchli seziladi. Agar faqatgina diafragmal plevra shikastlangan bo'lsa, og'riq ko'pincha qorinda bo'ladi. Plevral og'riqlarning xarakterli belgisi, ularning nafas olish vaqtida, ayniqsa, chuqur nafas olish vaqtida kuchayishidir. Bu og'riq yo'tal vaqtida yana ham kuchayishi mumkin.

O'pka kasalliklarida kasallik plevraga o'tgan hollarda, masalan, o'pka yallig'lanishi, o'pka infarktidida og'riq paydo bo'ladi. O'pkadagi xavfli o'sma (saraton) plevraga o'sib o'tganda yoki u plevrانing o'zida paydo bo'lganda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Spontan pnevmotoraksda kuchli yo'taldan keyin uning hosil bo'lishi paytida yonboshda kuchli og'riq paydo bo'ladi va u kuchli nafas qisishi bilan o'tadi. Plevrit tuzalib ketgach, ba'zan plevra pardalari bir-biriga yopishib qoladi va ular uzoq vaqt uncha kuchli bo'lмаган, lekin vaqt-vaqt bilan kuchayib turuvchi og'riq keltirib chiqaradi.

5.3. Nafas olish a'zolari kasalliklarini tekshirish

Ko'zdan kechirish. Ko'zdan kechirish tashxis qo'yish uchun muhim bir qancha ma'lumotlarni qo'lga kiritishga imkon beradi. Chunonchi, bronxial astmada bemor o'rinda o'tirib, qo'llarini uning chetiga tirab olgan bo'lishadi. Labi, yuzi, qo'llarini ko'karib ketgani (sianoz) gazlar almashinuvi buzilganini ko'rsatadi.

Zotiljamda isitmalab yotgan kasallarning yuzi qizarih tursa, anchadan beri davom etib kelayotgan kasallikda bemorning rangi oqarib ketgan bo'ladi. Gerpes toshmasi, ya'ni uchuq ko'pincha lab yoki burun qanotlarida joylashadi va gripp, pnevmoniya, isitmada uchraydi. Burun qanotlarining kerilib turishi nafasning qiyinlashib qolganini ko'rsatadi.

Yuz kerkkanligi hadeb yo'tala berishga bog'liq bo'ladi. Bo'yining kalta bo'lishi emfizema bilan og'rigan kasallarga xarakterlidir. Bo'yin venalarining kengayib ketgantigi va urib turishi venoz bosim ko'tarilib, yurak faoliyatining ancha izdan chiqqanini ko'rsatadi. O'pka kasalliklarida ko'krak qafasi kengayib ketgan (o'pka emfizemasi bilan og'rigan hemorlarning bochkasimon ko'krak qafasi) yoki yassilanib qolgan bo'lishi mumkin (silda uchraydigan «paraliptik» ko'krak). Ko'krak qafasining bir tomonda ichga tortilib turishi surunkali pnevmonyalarda hamda plevritlardan keyin o'pka bujmayib qolgan paytlarda ko'rilsa, uning do'mbayib turishi eks-sudativ plevrit, pnevmotoraksda uchraydi. Bundan tashqari, bo'yin va gavdaning yuqori qismi shishib qolgan bo'lishi mumkin. Umurtqa pog'onasi bir tomonga (skolioz) yoki orqaga (kifoz) keskin qiyshayib qolgan bo'lsa, nafas va yurak-qon tomonlar apparati funksiyasi izdan chiqishi mumkin.

Palpatsiya ko'krak qafasini palpatsiya qilish suyak va muskullarining og'rish-og'rimasligi, bo'yin hamda qo'ltiq limfa tugunlarining kattalashganini, qovurg'alararo kamgaklarning kengayganini, to'qimalarning shishgan-shishmaganini va ovoz titrashining o'zgargan-o'zgarmaganini aniqlashga imkon beradi. Paypaslab ko'rish ko'krak qafasi tarangligi (rigidligi)ning pasayib qolganini ham bilib olishga imkon beradi. Ba'zan kasal tomonning teri burmasi sog'lom tomondagiga qaraganda qalinroq bo'ladi, bu yallig'lanish munosabati bilan yumshoq to'qimalarning shishib qolganligiga bog'liqidir.

Ovoz titrashi (fremitus vocalis)— kasalning ko'kragiga qo'lni qo'yib «bir», «to'rt», «qirq», «tort», «traktor» so'zlarini qattiq

ovoz bilan talaffuz qilganida, qo‘lga bilinadigan sezgidir. Sog‘lom odamda titrash ikki o‘pkada bir xil seziladi. O‘pka zichlashib qolganida (sil, pnevmmoniyada) ovoz titrashi kuchayadi. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planib qolganida, bronx tıqilib qolganida esa susayadi.

Perkussiya. Bir xil anatomik tuzilishga ega bo‘lgan ikki organni perkussiya qilishga qiyosiy perkussiya deyiladi, ya‘ni o‘pka bilan o‘pkaning tovushini perkussiya yordamida qiyoslash, taqqoslash.

Har xil anatomik tuzilishga ega bo‘lgan ikki organni perkussiya qilishga topografik perkussiya deyiladi. Masalan, o‘pka bilan yurak, chunki ular har xil tuzilishga ega bo‘lgan organ, topografik perkussiyada organni joylashgan joyi, chegarasi hamda kattalashgani yoki kichiklashganligi aniqlanadi.

O‘ng o‘pkaning pastki chegarasi jigar o‘tmas burchagini yuqori qirrasida birmuncha pastga joylashgan, demak, bu old tomonda VI qovurg‘aga to‘g‘ri keladi. Bunda pastki chegara o‘pka aniq tovushning o‘tmas tovushga o‘tish joyiga to‘g‘ri keladi. Chap o‘pkaning pastki chegarasi chap oldi qo‘ltiq chizig‘idan boshlab aniqlanadi, chunki undan ichkarida yurak o‘tmasligi joylashgan. O‘pkaning yuqori chegarasi oldda o‘mrovdan va orqada kurakdan yuqoriga qarab perkussiya qilish yo‘li bilan aniqlanadi. Me'yorda o‘pka uchining joylashishi oldda o‘mrovdan 3—5 sm yuqoriga, orqada VII bo‘yin umurtqasiga to‘g‘ri keladi.

Ba‘zi kasalliklarda o‘pka pastki qirrasining harakatchanligi darajasi katta (tashxis) ahamiyatga ega. Uning aktiv va passiv harakatchanligini farqlaydilar. Aktiv harakatchanlik quyidagicha aniqlanadi: oddiy tinch nafas olishda o‘pkaning pastki chegarasini aniqlab, uni qa‘lam bilan belgilab qo‘yadilar, so‘ng bemorga chuqur nafas olish va uni chiqarmay turish taklif etiladi. Bu vaqtida o‘pkaning pastki chegarasi yana aniqlanib, uning joylashgan yeri belgilanadi. Shundan so‘ng bemor chuqur nafas olishi kerak, o‘pkaning pastki chegarasi yana pastki qirrasining passiv harakatchanligi bemor tanasining holati o‘zgarganda aniqlanadi. Masalan, bemor yotgan holatdan tik holatda turganda o‘pkaning pastki qirrasi olddan 2 sm tushadi: bemor yonboshlab yotganda o‘pka pastki qirrasi erkin tomonda 3—4 sm pastga tushadi.

Me'yorda o‘pka pastki qirrasining harakatchanligi o‘rtta qo‘ltiq chizig‘i bo‘ylab 8 sm.ni tashkil qiladi (4 sm maksimal nafas olinganda va 4 sm maksimal nafas chiqarilganda). Me'yorda o‘pka uchining nafas harakatchanligi o‘rtta hisobda 1,5—2 sm.ni tashkil qiladi.

O'pkani eshitib ko'rish. O'pkani faqat ko'krak qafasining simmetrik yerlerida eshitib, olingen ma'lumotlarni solishtirib ko'rish kerak. Bemorni har qanday holatda eshitib ko'rish mumkin, sharoitga qarab va bemorning ahvolini hisobga olgan holda, bermor chuqur tinch va bir tekis nafas olishi kerak. Dastlab nafas shovqini eshitiladi.

Nafas shovqinlari o'z xarakteriga ko'ra, vezikular va bronxial shovqinlardan iborat. Bronxial nafasda «X» tovushini eslatuvchi nafas shovqini eshitiladi. U hiqildaq, traxeya, yirik bronxlarda oldda to'sh dastasida va orqada kuraklararo bo'shliqda, ayniqsa III—IV ko'rak umurtqalari qarshisida yaxshi eshitiladi. Nafas chiqarish vaqtida tovush yorig'i nafas olishdagidan ancha toraygan bo'ladi, shuning uchun nafas chiqarish fazasida tovush kuchli, qo'pol va uzunroqdir.

Vezikular nafas — ko'krak qafasining qolgan yuzasida boshqa xarakterdagи yumshoq, xuddi ichga havo tortgan vaqtida paydo bo'lувчи «F» tovushini eslatuvchi shovqin eshitiladi. Nafas olish vaqtida kuchli va uzoq hamda nafas chiqarishda kuchsiz va qisqadir.

Vezikular nafas ko'krak qafasining old yuzasida, ayniqsa, o'mrovosti sohasida yaxshi eshitiladi. Tovushning eshitilishida kurakosti sohasi ikkinchi o'rinni egallaydi. Vezikular nafas kuchli va kuchsiz bo'lishi mumkin. Kuchsiz vezikular nafasda tovushning umumiyl pasayishi sodir bo'ladi, qisqa nafas olinadi, nafas chiqarish esa ko'pincha eshitilmaydi. Vezikular nafasning kuchayishi alveolalar nafas olish vaqtida juda kengaygan hollarda, masalan, jismoniy ish vaqtida kuzatiladi.

Dag'al nafas — bu oddiy vezikular nafasga qaraganda dag'al va ko'pincha bir vaqtida kuchaygan nafasdир. U bronxitlarda, o'choqli pnevmoniyalarda, yallig'lanish ekssudati bronxlarda to'planishi oqibatida, ular teshigi bir tekis toraymaganida kuzatiladi.

Chuqur nafas chiqarishning uzayishi dag'al nafasdagи kabi bronxlardagi o'zgarishlar bilan sodir bo'lishi mumkin, shuning uchun chuqur nafas chiqarish va dag'al nafas ko'pincha birga uchraydi. Patologik bronxial nafas o'pkada qattiqlashgan kattagina uchastka hosil bo'lganda yoki rezonas hosil qiluvchi bronxlар bilan tutashadigan havo tutuvchi bo'shliq bo'lganda eshitiladi.

Xirillash va krepitatsiya. Nafas yo'llarida balg'am ajralganda yoki to'planganda o'pka xirillarydi. Bu hol bronxlар shilliq pardasi va o'pka parenximasи yallig'janganda yoki bronxlар yorig'inинг torayishiga olib keluvchi shilliq parda shishishida ro'y berishi mumkin. Sekret xarakteriga qarab, xirillash ho'l va quruq bo'ladi.

Quruq xirillash — bronxlarda osonlik bilan hosil bo'luvchi va bronxlarning bir devoridan ikkinchisiga erkin osilib o'tuvchi yopishqoq sekret iplari borligida paydo bo'ladi. Nafas vaqtida bronxlardan o'tayotgan havo ularni tebratadi va turli tovushlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Quruq xirillash bronxlarni katta va kichikligiga qarab guvillovchi, shipillovchi hushtakli yuqori tovushlar bilan chiqishi mumkin.

Ho'l xirillash — bronxlarda suyuqlik borligida paydo bo'ladi, havo pufaklarining yorilishi tovushi eshitiladi. Nafas olganda havo suyuqlik orqali o'tayotganda uning yuzasida katta yoki kichik pufaklar hosil bo'ladi va ular darhol yoriladi.

Ho'l xirillash: mayda pufakli, o'rtalik pufakli, yirik pufakli, jarangli va jarangsiz turlarga bo'linadi. Mayda va o'rtalik pufakli mayda va o'rtalik bronxlarda uchraydi. Katta pufakligi katta bronx va traxeyalarda hosil bo'ladi.

Krepitatsiya (g'ijirlovchi tovush) — faqat nafas olish cho'qqisida eshitiladi. Krepitatsiya bekilib yoki yopishib qolgan hamda o'zida ozroq suyuqlik tutuvchi alveolalarning nafas olish vaqtida havo kirishi hisobiga to'g'rilanishiga va ochilishi oqibatida paydo bo'ladi. Bir tutam sochni qulqoq oldida barmoqlar orasida ishqalab, sun'iy krepitatsiya hosil qilish mumkin.

Krepitatsiya, ayniqsa, o'pka yallig'lanishining boshlanishida, ekssudat endi alveolalarda to'plana boshlaganda (*crepitatio indux*), so'ng pnevmoniya oxirida ivigan ekssudat surila boshlanganda (*crepitatio redux*) paydo bo'ladi.

Plevranning ishqalanish shovqini normal sharoitda nafas vaqtida plevranning visseral pardasi parietal pardanining ichki yuzasi bo'ylab hech qanday shovqinsiz sirpanadi. Agar turli patologik jarayon oqibatida plevra pardalari notejis g'adir-budur yoki quruq bo'lib qolsa, ular bir-biriga ishqalanganda plevra ishqalanishi deb ataluvchi shovqin hosil bo'ladi.

Plevra ishqalanishi shovqini ko'pincha ko'krak qafasining pastki yoshboshida, o'rtalik qo'litiq chizig'i bo'ylab aniqlanadi, chunki bu yerda o'pka qirrasining ekskursiyasi eng ko'pdir.

Plevra ishqalanishi shovqini nafas olganda ham, chiqarilganda ham eshitiladi. U yuzada, qulqoqning ostida eshitiladi. Shovqin tovushi quruq, uzuq-yuluq bo'ladi. U ipak matoning ishqalanishini, ba'zan qor g'ijirlashini yoki yangi charmning g'irchillashini eslatadi.

5.4. Nafas olish a'zolarini rentgenologik tekshirish

Sog'lom odamning ko'krak qafasi, rentgen nurlari yordamida tekshirilganda ekranda qovurg'alar va yorug' o'pka maydonlari ko'rindi. O'pka maydonlarining markazida yurak, yirik tomirlar, traxeya, qizilo'ngach, limfa tugunlari, shuningdek, umurtqa pog'onasidan iborat o'rtadagi soya ko'rindi. Bu o'rtadagi soyaning chetlari bo'ylab o'pka ildizi soyasi deb ataluvchi va o'ng hamda chap o'pkaga boruvchi yirik tomirlardan va limfatik tugunlardan iborat uncha ifodalanmagan soya ko'rindi.

O'pka yoki plevra kasalliklarida o'ziga xos o'zgarishlarni rentgenologik usul bilan aniqlash mumkin. Masalan, o'pkada yallig'lanish o'chog'i bo'lgan hollarda yallig'langan joydagi to'qima qalinlashadi va yonida joylashgan sog'lom o'pka to'qimasiga qaraganda rentgen nurlarini ko'proq tutib qoladi. Shuning uchun o'pka yallig'langan joyda ekran orqali uncha ifodalanmagan soya ko'rindi. Yangi o'sma hosil bo'lgan hollarda, masalan, to'qima tig'iz bo'lib qoladigan va rentgen nurlarini juda kam o'tkazadigan o'pka saratonida ekranda yaxshi ifodalangan soya paydo bo'ladi, chetlarining qing'ir-qiyshiqligi va qattiqligi uning xarakterli xususiyatidir.

O'pkaning o'tkir absessida ekranda shakli aniq bilinib turadigan soya ko'rindi: agar absess o'mida ko'pincha ichi suyuqlik bilan to'iladigan bo'shliq hosil bo'lsa, ekranda suyuqlik sathi va uning ustida havo tufayli paydo bo'lgan yorug' dog' ko'rindi. O'pkada havo bilan to'lgan sil kavernasi bo'lsa, ekranda yorug', yumaloq dog' ko'rindi.

O'pkada emfizematoz kengayish yuz bergen hollarda ekranda o'pka ildizlari yaxshi ifodalangan yorug' o'pka maydoni ko'rindi. Ko'krak qafasini tekshirayotganda harakatchanligi diafragma harakatiga bog'liq bo'lgan o'pka chetlariga har doim ahamiyat berish kerak. Masalan, agar bemor plevrasida yallig'lanish jarayoni davom etayotgan bo'lsa, u holda o'pkaning jarohatlangan tomonida diafragma harakati birmuncha chegaralangan bo'ladi. Agar diafragma bilan plevra bir-biriga yopishib qolgan bo'lsa, nafas olish vaqtida diafragma o'sha joyda erkin pastga tusha olmaydi, chunki uni yopishgan joyi ushlab turadi. Plevra bo'shlig'ida suyuqlik mavjud bo'lgan hollarda, o'pka maydonining pastki qismida gomogen intensiv soyani kuzatish mumkin.

5.5. Bronxitlar

Bronxlar shilliq pardasining yallig'lanishi bronxit deb ataladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali bronxit farq qilinadi.

5.5.1. O'tkir bronxit

Etiologiyasi. O'tkir bronxit, odatda, traxeit va grippdan keyin rivojlanadi. Bundan tashqari, qizamiq, ko'kyo'tal, sil, disteriya kasallikni kelib chiqishida asosiy rol o'ynaydi. Bu kasallikning asosiy sabablaridan biri nafas organlari shilliq pardasiga ko'paya olish qobiliyatiga ega bo'lgan mikroblarning tushishidir. Birinchi o'ringa gripp qo'zg'atuvchilarini qo'yish kerak. Bronxitni boshqa mikroblardan pnevmokokklar va kataral mikrokokklar, kamroq hollarda streptokokklar keltirib chiqaradi. Bronxlar shilliq pardasining o'tkir yallig'lanishiga, avvalo, odamning sovqotishi, kasbkoriga aloqador zararli omillar, jumladan, sulfid, nitrat kislota bug'lari, iprit, xlor, fosgen, jangovar zaharli moddalar, shuningdek, sulfat, azot va boshqa kislotalar bug'larini kiritish mumkin. Bulardan tashqari, bronxitlarga fizik va meteorologik omillar, masalan, bronx shilliq pardasiga toshko'mir, silikat changi, to'qimachilik sanoati changlari kasallikni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi.

Klinikasi. O'tkir bronxit kasalligida bemor tomog'i qirilib, achishadi, tovushi bo'g'ilib qoladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay yo'tal tutadi. Ko'krak qafasining yuqori qismida yo'tal vaqtida og'riq kuzatiladi. Dastavval, bemorlar quruq yo'taldan shikoyat qiladilar, keyinchalik kasallik zo'rayishiga qarab yo'tal kuchayadi va shilliqli yoki shilliq-yiringli balg'am ajrala boshlaydi.

Ajralayotgan balg'am miqdori turlicha: ba'zi hollarda u kam, ba'zan esa juda ko'pdir. Kasallik boshlanishida bemorning ahvoli og'irlashadi, kamquvvatlik, charchoq paydo bo'ladi. Infeksiya kuchli bo'lгanda birinchi kundan boshlaboq, tana harorati 38—40°C gacha ko'tarilishi mumkin. Bemor o'pkasi eshitib ko'riltganda cho'ziq dag'al nafas va to'g'ri xarakterdagи xirillashlar aniqlanadi.

Bronxlarda yopishqoq sekret bo'lганida hushtaksimon va guvillovchi quruq xirillashlar eshitiladi. Bemor og'ir holatda bo'lsa, yallig'langan bronx shilliq pardasiga ko'p ekssudat to'planishi natijasida mayda va o'rta, katta pufakli ho'l xirillashlar eshitiladi.

O'tkir bronxit bir necha kundan 2—3 haftagacha davom etadi. Shundan keyin ham bir necha haftagacha bemorning holi qurib, yo'talgancha, balg'am tashlab turadi.

5.5.2. Surunkali bronxit

Etiologiyasi. Surunkali bronxit, ko'pincha o'z vaqtida davo qilinmagan va davosi oxirigacha olib borilmagan o'tkir bronxitning oqibati hisoblanadi. Surunkali bronxit kelib chiqishida chekish,sovqotish, zararli bo'g'lar, gazlar, kimyoviy moddalar, sanoat korxonalaridan chiqadigan har xil zararli omillar, shuningdek, o'pka va yurak hamda yuqori nafas yo'llarining kasalliklari assosiy rol o'ynaydi. Bundan tashqari, bu kasallik un kombinati, kimyo zavodi, mo'ynachilik sohasida, elektr payvandchilik va shaxtada ishlovchi shaxslarda kuzatiladi. Surunkali bronxitni kelib chiqishida pnevmokokklar, kataral mikrokokklar, streptokokklar muhim rol o'ynaydi.

Klinikasi. Yo'tal bilan shilliq-yiringli balg'amning ajralishi surunkali bronxitning asosiy alomatidir. Dastlab yo'tal ertalabları tutadi, vaqt o'tishi bilan kuchayadi, ba'zan xuruj qilib, bemorni faqat kunduzlari emas, balki kechasi ham bezovta qila boshlaydi. Kasallik qo'zigan yoki asorat bergen hollarda tana harorati ko'tariladi.

Surunkali bronxitning ba'zi hollarida chirigan qo'lansa hidli balg'am ko'p miqdorda ajralishi kuzatiladi. Bunday balg'am laboratoriya da tekshirilganda mikroskop ostida turli bakteriyalar (ko'p miqdordagi kokklar, duksimon tayoqchalar), shuningdek, ko'p miqdorda yog' kislotalari kristallari topiladi. Surunkali bronxitning bunday turi chirik va pudrid bronxit nomi bilan yuritilib, ko'pincha bronxlar kengayganda, o'pka gangrenasi, saratoni va aktinomikozida uchraydi. Surunkali bronxitli bemorlar tekshirilganda nafas chiqarilishi uzaygan holda dag'al nafas, shuningdek, quruq xirillash, katta va o'rta bronxlar o'zgarganda g'uvullagan tovush, mayda bronxlar shikastlanganda hushtaksimon tovush eshitiladi. Agar bronxlarda ko'p miqdorda sekret ajralsa, o'pka ustida jarangsiz mayda va o'rta pufakli ho'l xirillash eshitiladi.

Surunkali bronxit asorat berib, bir qancha patologik holatlar, aksari, o'choqli pnevmoniya (bronxopnevmoniya), bronxoektazlar, o'pka emfizemasi va boshqalar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'pka emfizemasining qo'shilishi bemorning hansirab turadigan

bo'lishiga olib keladi, ayni vaqtida, odam faqat jismoniy zo'riqishlardan hansiraydigan bo'lsa, keyinchalik tinch turgan mahallarda ham hansiraydigan bo'lib qoladi. Bemorning teri qoplamlari va ko'zga ko'rinish turadigan shilliq pardalari ko'kimtir tusga kirib, yuzi kerkib turadi.

O'tkir va surunkali bronxit rentgenda tekshirilganda bronx tasviri sal kattalashgan bo'ladi.

Davolash. Bronxitlarni davolash uchun, birinchi galda, bemorni kasalxonaga yotqizish zarur. Davosi yallig'lanish hodisalarini, shilliq hosil bo'lishini kamaytirish va shu shilimshiqni yo'tal bilan chiqarib tashlash, bronxospazmni bartaraf qilish, nafasni yaxshilash va yurakni quvvatlab turadigan dori-darmonlar berishga qaratilgan. Issiq, achchiq, qovurilgan ovqatlar, shilliq pardalarni ta'sirlantiradigan mahsulotlar va spirtli ichimliklar qat'ian man etiladi. Antibiotiklar, sefalosporinlar va sulfanilamid preparatlar buyuriladi, balg'am ko'chiruvchi vositalar (bronxolitin, pertussin, teofedrin, mukalatin, termopsis o'ti damlamasi), yo'talga qarshi dorilar (bromgeksin, tusupreks, libeksin, falimint, stoptussin, ambrobene) beriladi.

Simptomatik davo choralarini (tana haroratini tushiruvchi, og'riq qoldiruvchi, antigistamin va h.k.) amalga oshiriladi. Vitaminlar, glukoza eritmalari, ishtahani ko'taruvchi dori-darmonlar, chalg'i-tuvchi vositalar, xantal qog'ozi hamda kukuni, oyoqlarga vanna, har xil dorili o'simlik moyalaridan surkash, shifobaxsh o'simliklardan: tog' rayhoni, ko'kat (oqqaldirmoq), oq andiz berish foydalidir — bular balg'amning tez ajralishiga olib keladi.

Profilaktikasi. Bronxitlarning profilaktikasida shaharlarda hovingchang-to'zon hamda zararli gazlar bilan ifloslanishiga qarshi keng miyosda gigiyena chora-tadbirlarini amalga oshirib turishdan iboratdir. Badantarbiya, organizmni chiniqtirish, ichkilikbozlik va tamaki chekishga qarshi kurash katta ahamiyatga ega.

Surunkali bronxitga uchragan hemorlar uzoq vaqt ochiq havoda bo'lishlari zarur, sanatoriyalarda davolash fizioterapeutik muolajalaridan foydalanishlari lozim.

5.5.3. Bronzial astma

Bronzial astma infektion, allergik kasallik bo'lib, bronxlar muskulaturasi tortishib, qisqarishi natijasida odamning birdan nafasi qisib, bo'g'ilib qolishi, keyin yo'talib yopishqoq balg'am tashlashi

bilan xarakterlanadi. Nafas chiqishining qiyinlashishi bu xurujning xarakterli xususiyatidir. Bu xurujlar o'z-o'zidan qaytalaydi. Ba'zi bemorlarda ular yilning ma'lum davrida paydo bo'ladi. Xuruj soni turlicha bo'ladi. Sutka davomida bir necha martadan bir necha kun, hatto hafta davomida bir-ikki martagacha.

Xuruj intensivligi ham turlicha — nafas paytida bo'ladigan ko'ngilsiz sezgidan bo'g'ilishi kabi og'ir holatgacha bo'ladi. Kasallik endi boshlanayotganida bo'g'ilish xuruji bir necha minutdan bir necha soatgacha davom etadi. Biroq, bemorlar astmatik holatdan bir necha sutka davomida chiqa olmaydigan hollar ham ro'y beradi.

Etiologiyasi. Bronxial astma etiologiyasida allergiya — turli moddalar (allergenlar) ta'siriga organizmning odatdan tashqari sezgir bo'lib qolishi katta ahamiyatga egadir. Oziq-ovqat mahsulotlari, masalan, tuxum, shokolad, qulupnay, baliq va boshqalar, hidli moddalar, pichan, gullarning mayda-mayda zarralari, uy hayvonlarining mo'ynasi, shuningdek, bakteriyalarning parchalanish mahsulotlari allergenlar bo'lishi mumkin. Nafas organlarida infeksiya o'chog'i bo'lsa, organizmning sensibilizatsiyalanishiga yo'l ochib, kasallikning avj olib borishi va o'tishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois bronxial astma xurujlari ko'pincha respirator infeksiyadan keyin boshlanadi.

Kasb-korga aloqador ba'zi omillar ham allergen bo'lishi mumkin. Kasallik uzoq davom etganda bemorlar faqat uning sababchisi bo'lgan oqsil muddaga emas, balki bir qator boshqa ta'sirlovchilarga (sovuv havo, turli yoqimsiz hidlar, psixik qo'zg'alish va h.k.) ham sezgir bo'lib qolishadi. Astmaning sof reflektor xurujlari ham ma'lum bo'lib, ular burun, xonalar, bronxlar, ovqat hazm qilish yo'li hamda tananing boshqa yerlarida joylashadi, astmogen zonalar deb ataluvchi zonalarning ta'sirlanishi natijasida paydo bo'ladi. Yuqumli kasalliklar, yuqori nafas yo'llarinining yallig'lanishlari, zotiljam, bronxitlar ham bronxial astma paydo bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Klinikasi. Bronxial astma xuruji ko'pincha to'satdan, kechasi, hech qanday oldindan bo'ladi alomatlarsiz boshlanadi. Agar bo'g'ilish kechasi ro'y bersa, bemorlar ko'pincha ochiq oyna oldiga kelishlari yoki tashqariga chiqishlari lozim. Bu hol havo yetishmasligini biroz yengillashtiradi. Ba'zan xuruj vaqtida bemorlar nafas olishni yengillashtirish uchun karavot qirrasi yoki

oromkursiga astmatiklar uchun xos bo'lgan holatda o'tiradilar. Qo'llari bilan tizza yoki oromkursi tutqichiga tiralib, yelkani qimirlatmaslik imkoniga ega bo'lishadi va uning ko'magida yordamchi nafas mushaklaridan foydalanishadi.

Bemorlarning tashqi ko'rinishi uning iztirob chekayotganini ifodalaydi. Nafas sur'ati minutiga 8—12 ta. Bemor qisqa-qisqa nafas oladi. Nafas bo'linib-bo'linib turadi va bemor xuddi havoni og'zi bilan tutayotgandek tuyuladi. Nafasni qiynalib va cho'zib chiqaradi. Hushtak ovozini eslatuvchi xirillash uzoqdan eshitiladi. Xuruj uzoq davom etganda yuz kerkib ketadi, ter bosadi, ko'karadi, qo'l-oyoqlar muzlaydi. Xuruj oxirida yopishqoq, oynasimon balg'am ajratuvchi yo'tal paydo bo'ladi.

Xuruj vaqtida tana harorati o'zgarmaydi. Kamdan kam hollarda u 38°C gacha ko'tariladi. Tana harorati ko'tarilganda bemorning ahvoli asta-sekin yaxshilana boradi va bo'g'ilish xuruji tugaydi. Xuruj tugagandan so'ng harorat me'yorga qaytadi.

Xuruj vaqtida bemor ko'zdan kechirilsa, uning nafas olish fazasida to'xtab qolgandek tuyuluvchi kengaygan ko'krak qafasini ko'rish mumkin. O'pkaning pastki chegarasi pastga tushgan, ular ekskursiyasi kuchli chegaralangan. Perkussiya vaqtida o'pka ustida qutichasimon tovush eshitiladi. Eshitib ko'rilganda o'pkaning barcha qismida ko'p miqdorda quruq hushtaksimon xirillash mavjud bo'lib, ular, asosan, nafas chiqarish vaqtida eshitiladi.

Laboratoriya tahlili. Xuruj vaqtida balg'ama eozinofiliya hujayralari, Kurshman spirallari va Sharko-Leyden kristallari topiladi. Qonda xurujdan tashqari paytda eozinofillar miqdori ko'paygan bo'ladi.

Asorati. Agar bo'g'ilish xurujlari tez-tez qaytalanib tursa, o'pkaning turg'un emfizemasi rivojlanadi va bunga surunkali bronxit qo'shiladi. Oxirida yurak faoliyati yetishmovchiligi ro'y beradi.

Davolash. Dastlab kasallikni keltirib chiqaruvchi allergen aniq bo'lsa, shunga qarshi kurash olib borish zarur. Bronxial astmani davolashda xurujda yordam berish va xurujlararo davrda davolashni o'ziga xos tomonlari hor.

Bronxial astmaning yengil xurujlarida bemorga qulay sharoit yaratish, orqasiga yostiqlar qo'yish, derazalarni ochish, xonaga iloji boricha toza havo kirishini ta'minlash zarur. Yengil xurujlarda bemorlarga og'iz orgali bronx kengaytiruvchi moddalarni ingalatsiya yo'li bilan berish zarur (astmopent, salbutamol, berotek, atro-

vent, berodual). Xurujning har qanday holatida issiq sodali suyuqliklar ichish, oyoqqa xantalli vannalar qilish, ko'krak qafasiga xantallar qo'yish tayinlanadi. Antigistamin dorilar buyuriladi (suprastin, dimedrol). Xuruj davom etganda eufillin, esedrin buyuriladi.

Bronxial astmaning o'ttacha va og'ir turlarida bemorning holatini diqqat bilan kuzatish talab qilinadi. O'rta tibbiyot xodimi bemorni tinchlantirishi, kasallikning yaxshi oqibatlariga unda ishonch hosil qildirishi kerak. Zudlik bilan shifokorni chaqirish va u kelgunicha, kerakli yordamni berishi zarur: toza havo kelishini ta'minlash, qulay sharoit yaratish (bemor o'tirgan holatda, qo'llari bilan tizzalariga tirangan holatda). Bunday holatda bemorga namlangan kislород berish, infuzion terapiya uchun kerakli jihozlarni tayyorlab qo'yish lozim (eufillin, reopoliglukin, glukoza, kortikosteroid gormonlar, geparin, adrenalin gidroxlorid, atropin sulfat). Og'ir bemorlar uchun kortikosteroidli ingalatorlar (beklamed, bekoit) yaxshi yordam beradi. Yangi kortikosteroidli ingalator «Ingokort» uzaytirilgan ta'sir etuvchi bo'lib (12 soatgacha), undan sutkasiga 2 mahal — ertalab va kechqurun foydalanish mumkin. Shundan so'ng bemorlar og'izlarini chayqashlari kerak, chunki kortikosteroidlar og'iz bo'shlig'i kandidozini keltirib chiqarishi mumkin.

Hamshira bemorlarga ingalatordan to'g'ri foydalanish qoidalarini o'rgatishi kerak. Buning uchun bemor chuqur nafas chiqargandan so'ng ingalatorni og'ziga mahkam ushlagan holda nafas oladi va iloji boricha nafasni 10 sekund ushlab turadi.

Kasallikning remissiya bosqichida sanatoriy-kurort davolari olib boriladi. Bunda tog'li tumanlarda joylashgan sanatoriylar, ayrim hollarda yashash joyini o'zgartirish yoki uy jihozlarini almashtirish (o'rin-ko'rpalarini) ham foyda beradi. Bronxial astma bilan og'igan bemorlarga davo qilishni kasallikning xuruji vaqtida qilinadigan davo choralariga va kasallik xurujlari o'rtasida qilinadigan davoga ajratish mumkin.

Profilaktikasi. Bronxial astmaning oldini olish uchun yoshlikdan boshlab chiniqish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, suv muolajalari, havo vannalari qabul qilish kerak. Xususan, odam o'zini yuqumli kasallikkordan ehtiyyot qilishi, sifatlari ovqatlar yeb turishi, og'zini doimo toza tutishi lozim. Bemor yashaydigan xona ozoda bo'lishi, har kuni supurib-sidirish, ho'l latta bilan polni artib turish darkor.

5.6. O'tkir pnevmoniylar

O'tkir pnevmoniylar — zotiljam (krupoz), asosan, o'pka alveolalari, oraliq to'qimasi va tomirlar sistemasining (ya'ni o'pka to'qimasidagi o'tkir yallig'lanish jarayoni) o'tkir yallig'lanish kasalligidir. U erkaklarda ayollarga nisbatan taxminan 1,5 marta ko'p uchraydi, kasallik barcha yoshdagi guruhlarda kuzatiladi, biroq, bolalar, yoshi ulg'aygan va qariyalar ko'proq xastalanadi.

O'tkir pnevmoniylar bilan kasallanish hanuzgacha yuqori bo'lib kelmoqda. Xastalik aholining umumiy kasallanishi sonidan o'rta hisobda qariyb 3 % ini tashkil qiladi. Hozirgi paytda antibakterial vosita turlarining ko'p bo'lishi va kasallik nisbatan yengilroq kechishiga qaramay, o'lim hollari ham uchrab turadi.


5.6.1. O'pka zotiljami — krupoz pnevmoniya

O'tkir pnevmoniya bilan har qanday yoshdagi odam kasallanishi mumkin. Kasallik o'z vaqtida to'g'ri davolansa, asorati qolmaydi. Agar kasallik o'z vaqtida aniqlanmasa, to'g'ri davolanmasa, har xil og'ir asoratlarini keltirib chiqarishi, hatto o'llimga olib kelishi mumkin (11-rasm).

Etiologiyasi: 1. Pnevmonokklar, stafilokokklar, streptokokklar, Fridlender tayoqchasi, enterokokk, protey, ichak tayyoqchasi, viruslar — gripp, paragripp, adenoviruslar, rinosinsitial viruslar; mikoplazmalar; rikketsiyalar, Ku-rikketsiyalari; zamburug'lar keltirib chiqaradi.

2. Ko'kyo'tal, qizamiq, suvchechak, ornitoz, brutselloz, tulyaremiya, ich terlama.

3. Allergiya: gijjalarga, dorilariga, mog'or zamburug'lariga, har xil changlarga allergiya borligi.



11-rasm. Zotiljam xillarining sxematik tasviri:

- 1—normal o'pka to'qimasi (taqqoslash uchun); 2—bronx atrofining yallig'lanishi;
- 3—bo'laklar o'rtasidagi biriktiruvchi to'qimaning yallig'lanishi;
- 4—o'choqli yallig'lanish (bronkopnevmoniya); 5—o'pka bo'lagining yallig'lanishi (krupoz pnevmoniya).

4. Fizik-kimyoviy omillar — aspiratsiya, jarohat, radioaktiv nurlar ta'siri.

5. Qattiq sovuq qotish, jismoniy va ruhiy toliqish, tananing zaharlanishi hamda kasallikka qarshi kurashish qobiliyatining susayishi.

Klinikasi. Kasallik o'tkir boshlanadi. Ko'pincha hech qanday alomatsiz titroq boshlanadi, tana harorati tezda 39—40°C gacha ko'tariladi. Ko'krakning shikastlangan tomonida og'triq seziladi. U nafas yoki yo'tal vaqtida kuchayadi. Nafas yuza, tez, og'ir hollarda minutiga 40—60 gacha yetadi. Nafas vaqtida burun parragi uchib turadi. Dastlabki kunlari balg'am ajralmaydi, keyinchalik yopishqoq, ba'zan zangrangli balg'am oz miqdorda ajrala boshlaydi. Tomir urishi minutiga 100 martaga va undan ko'proqqa yetadi.

Yuz rangsiz, yonoqlarda pushti rang paydo bo'ladi, lablar biroz ko'karadi, burun va lab atrofiga uchuq toshadi. Til quriydi va karash bog'laydi. Ishtaha yo'qoladi, ichi ko'pincha to'xtab qoladi, siyidik oz ajraladi, to'yingan, zarg'aldoq-qizil rangda bo'ladi. Bemor ancha bezovta bo'ladi, alahsiraydi, ko'pincha uyqusи qochadi.

Perkussiyada yallig'langan o'pka bo'lagi ustida bo'g'iq perkutor tovush eshitiladi. Auskultatsiya qilib ko'rildganda, bronxial nafas va krepitatsiya, keyinchalik kasallikning oxirgi bosqichidagi balg'am tashlash mahalida har xil kalibrli nam xirillashlar eshitiladi. Bemorlarda yurak-tomirlar sistemasidagi o'zgarishlar, puls tezlashib, arterial bosim pasayib qolishi, o'tkir yurak yetishmovchiligining ko'rinishlari, akrosianoz, nafas qisishi, bo'g'ilish (bo'yin venalarining bo'rtib chiqishi, jigar kattalashuvi va oyoqlarga shish kelishi) kabilar yaqqol kuzatiladi.

Buyrak funksiyasida ba'zi o'zgarishlar qayd etilib, siyidikda bir oz miqdorda oqsil bo'ladi. Nerv sistemasida, odatda, pnevmoniya da hemorlarning uyqusи qochadi, boshi og'riydi. Kuchli ifodalangan intoksiatsiyada meningeal hollar (bosh og'rig'ining kuchayishi, ensa rigidligi, Kernig simtomi) paydo bo'ladi.

Og'ir hollarda meningeal alomati kuchli ifodalangan bo'ladi. Es yo'qoladi, bemor alahsiraydi, barmoqlarni to'xtovsiz harakat qildiradi, orqa miya suyuqligi loyqa bo'ladi, unda ko'p miqdorda leykotsitlar va birmuncha pnevmokokklar yoki pnevmobatsillalar topiladi.

Laboratoriya tahlili. Pnevmoniyada qonda xarakterli o'zgarishlar kuzatiladi. 1 mm³ qonda neytrofill leykositoz, ya'ni qonda leykotsitlar soni 20000—40000 ga yetadi. ($20 \cdot 10^9/l - 40 \cdot 10^9/l$),

tayoqchasimon yadrolilar yoki yosh neytrofillar miqdori ko'payadi (chapga surilish).

Eozinofillar miqdori kamayib ketadi: og'ir hollarda ular butunlay bo'lmaydi. EChT tezlashadi. Balg'amning bo'yalgan surtmasi mikroskop ostida tekshirilganda, ko'p miqdordagi pnevmokokklarni ko'rish mumkin.

Rentgenda yallig'lanish jarayoni rivojlangan o'pka bo'lagiga mos keluvchi qoraygan zona aniqlanadi.

Asorati. O'pka yallig'lanishi ko'pincha nafas organlari tomonidan — o'pka kornifikatsiyasi, o'pka absessi va gangrenasi, plevra empiyemasi va kamroq hollarda meningit, yiringli perikardit, pnevmokokkli sepsis, yiringli artrit, tromboslebit, peritonit.

5.6.2. O'choqli pnevmoniya

O'choqli pnevmoniya yoki bronxopnevmoniya, o'pkaning bir bo'lagi, ba'zan undan ham kam qismining yallig'lanishi bilan xarakterlanadi. Yallig'lanish o'choqlari ko'p bo'lib, bir yoki har ikkala o'pkada paydo bo'lishi mumkin. Yallig'lanish jarayonining, odatda, bronxit shaklida bronxlarda boshlanishi, so'ng o'pkaning bir yoki bir necha bo'lagini qoplab, alveolar to'qimaga o'tishi bu kasallik uchun xosdir. Bu infeksiyaning bronxogen deb ataluvchi tarqalish yo'lidir. Kamroq ho'llarda yallig'lanish jarayoni infeksiyaning gemotogen yoki limfogen yo'li bilan tarqalishi oqibatida boshlanadi.

O'choqli pnevmoniya mustaqil, ko'pincha, boshqa kasalliklar asorat berishi oqibatida paydo bo'ladi. Amaliy maqsadlar uchun o'choqli pnevmoniyaning quyidagi tasnifidan foydalilanadi: gripp va boshqa yuqumli kasalliklarda bo'ladigan pnevmoniya (toshmali terlama, ornitoz va boshq.), gipostatik, aspiratsion, atelektatik, travmatik va operatsiyadan keyingi pnevmoniyadir.

Etiologiyasi. Bu kasallik bronxit, gripp, yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi oqibatida vujudga keladi. Kasallikning paydo bo'lishiga, stafillkokklar, streptokokklar, pnevmokokklar, Fridlender tayoq-chasi, viruslar, mikoplazma, rikketsiyalar sabab bo'ladi. Bundan tashqari, o'tkir o'choqli zotiljam qon aylanishi buzilganda, buyrak kasalliklarida, ko'kyo'tal, ichterlama, revmatizm, kollagenoz kasalliklarida, sepsis, ayrim gazlardan zaharlanganda, narkozdan so'ng (aspiratsiya), ko'krak qafasi, qorin, bosh jarohatlanganda yuzaga kelishi mumkin. Kasallik kelib chiqishida mikroblar ko'pincha

nafas yo'llari orqali o'tib alveolalarga boradi. Bunga bronx shilliq pardalarining to'sqlik faoliyati pasayib ketganligi sabab bo'ladi.

Klinikasi. Ko'pincha kasallik qachon boshlanganligini bilib bo'lmaydi, chunki ko'pchilik hollarda u ilgaridan bemorda bo'Igan bronxit yoki yuqori nafas yo'llari kuchli yallig'lanishining davomi hisoblanadi. Kasallik bir necha kun davomida rivojlanishi va tugashi mumkin, lekin ba'zan bir necha haftaga ham cho'zilib ketadi. Bunday bemorlarning shikoyati doimiy emas. Ba'zan ular ko'krak yoki ko'rak ostidagi og'riqdan, kamquvvatlik, bosh og'rig'i, nafas qisishi, balg'amli yo'taldan shikoyat qilishadi. Tana harorati 38°C, ko'pincha 39—40°C ga ko'tariladi. Haroratning egri chizig'i remittatsiyalanuvchi yoki intermittatsiyalanuvchi isitmanikiga o'xshaydi. Agar bronxopnevmoniya isitmalash bilan o'tayotgan kasallik bilan birga boshlansa, harorat egri chizig'ining xarakteri va balandligi ham shunga qarab o'zgaradi.

Zaif yoki qari bemorlarda bronxopnevmoniya normal yoki subfebril harorat bilan kechishi mumkin. Obyektiv tekshirishda sianotik tusga ega bo'Igan yuz terisi va ko'rindigan shilliq pardalar gipermiyasi seziladi. Nafas harakatlari tezligi minutiga 25—30 gacha yetadi. Perkussiyada yallig'lanish zonasida ma'lum darajada ifodalangan perkutor tovushning o'tmaslanganini eshitish mumkin. O'tmaslangan joy ustida tovush titrashi kuchayadi. Shuningdek, mayda pufakli jarangli xirillash eshitiladi.

Puls tana haroratiga qarab tezlashadi, arterial qon bosimi pasayadi. Rentgen qilinganda o'pka maydonlari bo'ylab diffuz tarqalgan va ko'pincha o'zaro qo'shilib ketadigan va qorayib turgan dog'lar intensivligi turlichcha bo'Igan yo mayda, yoki yirik o'choqlar ko'rindi.

Laboratoriya tahlillarida: 1 mm³ qonda leykotsitlar 10000—15000 ($10 \cdot 10^9/l$ — $15 \cdot 10^9/l$) gacha yetadi. Sal ifodalangan neytrofilloz kuzatiladi. EChT tezlashadi.

Grippozi o'choqli pnevmoniya og'ir o'tishi va aniq ifodalangan intoksikatsiya bilan xarakterlanadi. Yo'tal vaqtida qonli balg'am ajraladi. Grippozi pnevmoniya ko'pincha o'pka absessidan iborat asorat qoldiradi.

Gipostatik pnevmoniya uzoq vaqt chalqancha yoki bir yonboshda yotishga majbur bo'Igan og'ir bemorlarda uchraydi. Odatta, u o'pkaning o'pka to'qimasi ventilatsiyasi zaiflashgan pastki bo'laklarida paydo bo'ladi. Bunda qon bilan to'la kapillarlardan alveolalarga seroz suyuqlik va eritrotsitlar o'tadi.

Aspiratsion pnevmoniya bronxlarga infeksiya yuqqan yot jismilar, masalan, ovqat bo'laklari, yiring, karioz, tish parchalari va bosh-qalar kirib qolishi oqibatida rivojlanadi. Dastlab bronxda rivojlangan yallig'lanish jarayoni o'pkaning shu bronx bilan tutash bo'lgan qismiga tarqaladi. Shunday yo'l bilan paydo bo'lgan pnevmoniya o'pka absessi rivojlanishi bilan tugashi mumkin.

Jarohatdan keyingi pnevmoniya ko'krak qafasi, yuz-jag' va bosh miya suyagi jarohatlangan kishilarda va kam hollarda oyoq-qo'l jarohatlangan bemorlarda rivojlanadi. Ko'krak qafasi va yuz-jag' shikastlanganda pnevmoniyaga ko'pincha qon, ovqat parchasi, og'iz bo'shilg'idan kirgan nekrotik va yiringli massalarning o'pkaga o'tishi va uning atelektazini keltirib chiqarishi sabab bo'ladi. Umurtqa pog'onasi, ayniqsa, yuqori qismlari jarohatlanganda nafasning buzilishi ro'y beradi, bunda nafas noto'g'ri, yuzaki bo'lib qoladi. Bularning hammasi ham atelektazga, keyinchalik esa pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Jarohatdagи pnevmoniya tana haroratining ko'tarilishi, yo'tal paydo bo'lishi yoki uning kuchayishi, nafas qisish pulsning tezlashishi asosida aniqlanadi.

Ko'pincha, bunday pnevmoniyalar joylashgan o'pkaning pastki qismlarida perkutor tovushining o'tmaslanishi va mayda pufakli jarangli xirillashlar aniqlanadi.

Asoratlari: serozli plevrit, o'pka gangrenasi, yiringli plevrit, o'pka absessi, pnevmoskleroz.

5.6.3. Krupoz va o'choqli pnevmonyalarni davolash, oldini olish

Davolash. Pnevmoniyalarni davolash infeksiyaga qarshi kurashishdan boshlanadi. Shu maqsadda antibiotiklar (ampitsillin, oksatsillin, gentamitsin, neomitsin) va sulfanilamid preparatlari, sefaloninlar (kefzol, sefozolin, seftriakson, subazon) buyuriladi.

Balg'am ko'chiruvchi vositalardan (bronxolitin, pertussin, teofedrin, mukalitin, termopsis o'ti damlamasi), yo'talga qarshi dorilar (bromgeksin, tusupreks, libeksin, falimint, stoptussin, ambrobene) beriladi. Bronxolitiklar qo'llaniladi (efedrin gidrochlorid, eufillin eritmasi, bronxolitin, teofedrin va h.k.).

Pertussin — katta yoshli odamlarga bir osh qoshiqdan kuniga uch mahal, iltilig'an sutga «Borjomi» yoki ichimlik soda (natriy gidrokarbonat) qo'shib ichish tavsija etiladi. Termopsis o'ti

(sichqon o't) damlamasi (0,6—1,0: 180,0—200,0) kuniga 2—4 mahal l osh qoshiqdan, quruq ekstrakti 0,01—0,05 g.dan beriladi. Bromgeksin 0,004 g kuniga 2—3 mahal 0,004—0,008 g.dan ichiladi. Mukaltin 0,05 g ovqatdan oldin har safar 0,05—0,1 g.dan kuniga 2—3 marta ichiladi. Vitaminlar, glukoza eritmalari, ishtahani ko'taruvchi dori-darmonlar, chalg'ituvchi vositalar, xantal qog'oz'i hamda kukuni, oyoqlarga vanna, har xil dorili o'simlik moylaridan surkash, shifobaxsh o'simliklardan tog' rayhon, ko'kat (oqqaldirmoq), oq andiz berish foydalidir — bular balg'amning tez ajralishiga olib keladi. Ajgon damlamasi (tmin); anjir, limon, behi, trup damlamasi, zaytun moylari, zig'ir moylari, isfarak damlamasi, lavlagi, maymunjon murabbosi, isiriq, malina mevalari va murabbosi, omonqora damlamasi, oq karrak, oq qaldirmoq, petrushka, sarimsoq piyoz beriladi.

Simptomatik davo choralarini amalga oshiriladi (tana haroratini tushiruvchi, og'riq qoldiruvchi, antigistamin va h.k.).

Fizioterapevtik muolajalar — diatermiya, induktotermiya, UF, ingalatsiya, UVCh, mikroto'lqinli terapiya, davolovchi jismoniy badanttarbiya mashqlari.

Profilaktikasi. Bemorlar kasallik davrida va krizisdan keyin 10 kun o'rinda yotishi kerak, nafas olishni osonlashtirish uchun bosh ostiga baland qilib yostiq qo'yiladi. Bemor o'rinda yotgan vaqtida o'zi mustaqil harakat qilishi mumkin emas, shuning uchun tuvakni bemor yotgan yerga olib kelinadi.

Bosh og'rig'i, alahsirash bilan birga, tana harorati ko'tarilganda bemor boshiga muz solingen rezinka xaltacha qo'yiladi. Og'iz bo'shlig'ini kuzatib borish, har kuni tilni va og'iz bo'shlig'i shilliq pardasini 1 % li borat kislotosi eritmasi bilan tozalash zarur.

Bemor yotgan xonani doimo ozoda tutish, tez-tez shamollatib turish, u yerda tinchlikni saqlash kerak. Bemorni ko'rgani keluvchilar soni chegaralanishi, balg'amni maxsus idishga yig'ish kerak. Najas va siyish muntazam bo'lishi lozim. Shuning uchun qabziyat yuz berganda tozalovchi huqna qo'llanishi zarur.

O'pkasi yallig'langan bemorni har kuni shifokor ko'rishi va uni o'rta tibbiyot xodimi kuzatib borishi kerak. Chunki bemorning holati ba'zan bir necha soat davomida keskin o'zgarishi mumkin. Masalan, darhol qo'llaniladigan choralarini talab qiluvchi yurakkotmir sistemasi faoliyati zaiflanishi mumkin. Kasallik og'ir kechayotganda va bemor alahsirayotganda uning karavoti oldida shaxsiy post o'rnatish kerak.

Taom mexanik va kimyoviy jihatdan ehtiyyotlovchi, vitamin-larga, ayniqsa, C vitaminiga boy bo'lishi kerak. Sut-o'simlik diyetasi tavsiya qilinadi. Hayvon oqsillarini biroz chegaralash maqsadga muvofiqdir. Taomni bermor oz-ozdan yeyishi lozim. Kasallikning dastlabki kunlarida suyuq yoki yarim suyuq taomlar — choy, qahva, sut, kisel, meva sharbatlari, bulyon, qaymoq, ilitilgan tuxum, manniy bo'tqasi, qiymalangan go'sht buyuriladi.

Sanitariya-sog'lomlashtirish tadbirlari, jismoni tarbiya, sport mashg'ulotlari, organizmni chiniqtirish, o'pka zotiljami rivojlana-digan fondagi turli xil surunkali o'pka kasalliklarini o'z vaqtida davolashdan iborat. Chekish, spirtli ichimliklar ichish, ishlab chiqarish zararli moddalari — chang-to'zon, zararli gazlar va h.k.ga qarshi kurashish kabilalar asosiy profilaktik tadbirlardan hisoblanadi.

5.7. O'pka yiringlashi

5.7.1. O'pka abssessi va gangrenasi

O'pka abssessi deb, o'pka to'qimasining chegaralanishiga moyil bo'lgan yiringli chirishiga aytildi.

O'pka gangrenasi deb, o'pka to'qimasining chegaralanmay yiringli chirishiga aytildi.

Etiologiyasi. O'pka abssessini, asosan, streptokokklar, stafilokokklar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, Fridlender tayoq-chasi, ichak tayoqchasi, viruslar, bakteriyalar keltirib chiqargan o'choqli zotiljamdan keyin rivojlanadi.

O'pka gangrenasi esa, anaerob flora: spirallar, anerob streptokokklar tufayli rivojlanadi. Sovuq qotish, tamaki chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish kasallik rivojlanishiga moyil qilib qo'yadi.

O'pka abssessi bilan gangrenasi kelib chiqishida o'tkir krupoz pnevmoniylar, yuqumli narsalarning — shilimshiq yiring, qusuq massalari va shu kabilarni mayda bronxlarga tushib qolishi katta rol o'ynaydi. Bu kasalliklar qon oqimi bilan o'pkaga infeksiyalar tushganda hamda ko'krak qafasi jarohatlanganda ham paydo bo'lishi mumkin. Abssess keltirib chiqaruvchi sabablarga va infeksiyaning o'pka to'qimasiga kirish yo'llariga qarab aspiratsion, obturatsion, metapnevmonik, gemotogen, embolik, limfogen va travmatik abssesslarni farqlaydilar.

Aspiratsion abssessning rivojlanishiga yordam beruvchi omillarga hushsiz holat, masalan, og'ir yuqumli kasalligi bo'lgan bermor-

lar, spirtli ichimliklar ichib mast bo‘lish, ba’zan umumiy narkoz ostida o’tkazilgan operatsiyalar kiradi. Metapnevmonik absesslar keyingi yillarda ancha kam uchraydi, chunki pnevmoniylar sulfanilamid preparatlar va antibiotiklar bilan yaxshi davolanmoqda.

Gemotogen-embolik absesslar ko‘pincha septikopiyemiya bilan birgalikda kechadigan kasalliklarda kuzatiladi. Ko‘pincha o‘pkaning embolik yiringlanishi tromboslebitda, septik endokarditda, osteomiyelitda, tug‘ishdan keyingi sepsisda uchraydi.

Limsfogen absesslari — ko‘ks organlarining yiringli yallig‘lanishi bilan og‘riyotgan shaxslarda, shuningdek, o‘pkaga infeksiya limsfogen yo‘l bilan kirgan yiringli fibrinoz plevritlarda yuz berishi mumkin.

Klinikasi. O‘pka yiringlaganda ikki davr farq qilinadi: birinchisi, absess yorilguncha bo‘lgan davr, ikkinchi, absess yorilgandan keyingi davr.

Birinci davr absess yorilguncha bo‘lgan davr og‘ir kechishi bilan xarakterlanadi. Bu davrda bemor tana harorati 40°C ga ko‘tarilishi, qaltirash, hansirash, bo‘shashish, ishtaha yo‘qolishi, bosh og‘rig‘i, ba’zan yonboshda og‘riq paydo bo‘lishi kabi belgilardan noliydi, tez-tez yuza nafas oladi. Kasal tomoni nafasdan orqada qoladi. Perkussiyada shikastlangan soha ustida og‘riq aniqlanadi, bu sohadagi qovurg‘alar orasini stetoskop bilan bosilganda yo‘tal refleksi kuchayadi. Bu plevrانing yallig‘lanish jarayoniga tortilishining ilk belgisidir. Puls tezlashgan — minutiga 120 tagacha, yurak tonlari bo‘g‘iqroq, auskultatsiyada qattiq, ba’zan bronxial nafas, quruq va nam xirillashlar eshitiladi. Rentgenologik yo‘l bilan tekshirib ko‘rilganda, infiltratsiyasi bor joy qorayib turadi.

Ikkinci davr yiringli bronxlar bo‘shlig‘iga yorilishidan boshlanadi. Bemorlardan bir talay (1 l.gacha va bundan ko‘proq) yiringli yoki chirik balg‘am chiqadi. Absessda balg‘am yashil rangli, hidsiz bo‘ladi. Gangrenada esa balg‘am shokolad tusida va qo‘lansa hidli bo‘ladi. Sutka ichida ajralib chiqadigan balg‘am miqdori ortishi bilan bemorlarning umumiy ahvoli sezilarli darajada yaxshilanib boradi, tana harorati esa pasayadi, intoksikatsiya holatlari astasekin pasayib, ishtaha asl holiga keladi, qonda leykotsitlar soni karmayadi va EChT sekinlashadi. Ayrim hollarda kuchli yo‘talda o‘pka ichidagi bosim anchagina oshishi natijasida absess plevra bo‘shlig‘iga yorilib plevropulmonary shok (piopevmotoraks) yoki yiring

ko'ks oralig'i bo'shlig'iga yorilganda (kamdan kam) yiringli mediastenit rivojlanishi mumkin. Balg'am miqdori va uning xarakteri bo'shliq hajmiga, yiring miqdoriga, qo'zg'atuvchisiga va absess joylashgan sohaga bog'liq bo'ladi.

O'pka gangrenasi og'ir kasallik hisoblanadi. Uning klinik kechishi, asosan, o'tkir abscessni eslatadi, biroq hamma alomatlari birmuncha yaqqol ifodalangan. Balg'am «og'iz to'lib» ajraladi, u badbo'y hidga ega, gungurt-shokolad rangli, suyuq, ko'p miqdorda turli-tuman, jumladan, anaerob mikroblarни saqlaydi. O'pka absessidagidek xarakterga ega bo'lgan harorat reaksiyasidan tashqari, o'pka gangrenasining dastlabki alomatlaridan biri jarayonga plevra ham jalb etilganligini ko'rsatuvchi yonboshdan og'riqni paydo bo'lishidir. Og'riq uzoq vaqt saqlanib qoladi. Ayniqsa, yo'tal paytida og'izdan keluvchi qo'lansa hid gangrenaning doimiy va dastlabki alomatlaridir.

Tufdonda balg'am uch qavatga ajraladi: yuqoridagisi suyuq, ko'piruvchi, o'rtadagisi — seroz, pastdagisi — uvoqsimon, undan Ditrix probkalari va o'pka to'qimasi parchalari topiladi. Balg'am, ayniqsa, ertalab ko'p miqdorda ajraladi (sutkasiga 500—800 ml). Gangrena bo'shlig'idagi narsa bronxga tushayotganda bemor ko'krak qafasining kasal bo'lagidan qattiq og'riq bilan o'tuvchi yo'tal paydo bo'ladi. Balg'am mikroskop ostida tekshirilganda parchalangan holatdagi yiring hujayralari, yog' kislotsasi ignalari, yog' tomchilar, elastik tolalari va turli bakteriyalar ko'p miqdorda topiladi. Obyektiv tekshirilganda o'pkaning shikastlangan joyi ustida perkutor tovushning o'tmaslashganligi, tovush titrashining kuchayishi va ko'p miqdordagi quruq va ho'l xirillash eshitiladi.

Rentgenologik tekshrish o'pka absessidagi dastlabki davrida butun, yaxshi chegaralangan o'pka to'qimasini ko'rsatadi. Ikkinci davrda qorong'ilashgan joyning yuqori qismida yorishgan yer, uning pastida esa tana haroratlanganda o'zgaradigan erkin suyuqlikning gorizontal joylashgan o'rni ko'rindi. Ancha keyinroq yorishgan yer yana ham aniq bo'ladi, atrofdagi soya halqasi yana ham torayadi.

Xronik absess o'zgargan o'pka to'qimasi atrofida fibroz tolalari soyasi ko'rindi. Rentgenda absessni o'pka gangrenasidan farqlash deyarli mumkin emas. Parchalanayotgan bo'shliq ichki devorning notekis, shokilasimon qirralari atrofida sekvestrlar borligini ko'rsatadi va ayniqsa, zaif, biror og'ir kasallik bilan og'igan shaxslarda gangrenoz absess borligini taxmin qilishga imkon beradi.

Bemorning 2—3 oy davomida tuzalmasligi o'pka abscessi xronik tus olganini ko'rsatadi.

O'pkaning yiringli kasalliklarida quyidagi asoratlar kuzatilishi mumkin: absessning plevra bo'shlig'iغا teshib chiqib, piopnevmotoraks hosil bo'lishi, gangrenada — og'ir ixoroz plevrit, o'pkaning shikastlangan joyida yangi abscesslarning paydo bo'lishi, o'pkadan qon ketishi, miyaning metastatik abscesslari.

Davolash. Bemorlarni kasalxonaga yotqizish, o'rinda yotish, ovqatlanish, uyqu tartiblariga amal qilish, ularni tegishlicha parvarishlash, ovqat oqsillarga, A, C, D va B guruh vitaminlariga boy bo'lishini ta'minlash lozim.

O'pka abscessini konservativ davolashda bo'shliqni uni ichidagi narsadan bo'shatish katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda bemorni sutkasiga $1/2$ —1 soat davom etadigan va bir necha marta qaytariladigan drenaj holat deb ataluvchi holatda yotqizib qo'yadilar. Bemor sog' yonboshiga boshi pastroq, oyoq qismi yuqoriroq qilib yotqiziladi. Bo'shliq yetarli bo'shamagan hollarda bronxoskopiya o'tkazilib, bronxoskopda balg'am vakuum — apparat yordamida so'rib olinadi.

Bronxoskop yoki kateter yordamida avval yiring suyuqligi tortib olinadi, keyin biron antibakterial preparat yuboriladi. Antibakterial terapiya bemorning antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlab olgandan keyin o'tkaziladi. Intoksikatsiyaga qarshi kurashish maqsadida, gemodez, poliglukin, plazma, 5 % li glukoza eritmasi va fiziologik eritmalar tayinlanadi.

Organizmnинг himoya kuchlarini oshirish maqsadida bemorlarga oqsil preparatlarini qo'yish, anabolik gormonlar, B guruh vitaminlari, askorbinat kislota, kalsiy xlorid buyuriladi. Shu bilan birga, balg'am ko'chiruvchi dorilar hamda bronxolitiklar berib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Giyohlardan qora andiz damlamasasi, yalpiz, xantal, oqqaldirmoq, navro'zgul, malina, maymunjon, mavrak, limon, limono't, kunjut, kapalakgul, isfarak, zig'ir, za'far, arg'uvon damlamalari beriladi.

Fizioterapeutik muolajalardan diatermiya, induktotermiya, UF, ingalatsiya, UVCh, mikroto'lqinli terapiya, davolovchi jismoniy badantarbiya mashqlari qo'llaniladi. Jarrohlik usulida davolash o'pkadan qon oqqanida piyepnevmotoraksda, o'pka emfizemasida, surunkali abscesslarda, shuningdek, o'smaga shubha bo'lganda o'tkaziladi.

5.7.2. Bronxoektatik kasallik

Bronxoektaziya — surunkali o'pka yiringlashi shakllaridan biri bo'lib, mayda bronxlarning kengayib ketishi bilan birga davom etadi, butun bronx devori va atrofidagi to'qimasining chuqur destruktiv o'zgarishiga uchrashi natijasida mayda bronxlarning kengayib ketishidan iborat kasallikdir.

Etiologiyasi. Kasallik ko'pincha o'pkadagi yalllig'lanish jarayonlari natijasida kelib chiqadi, lekin tug'ma bo'lishi ham mumkin. Bronxoektazlar ko'pincha chang va ta'sirlovchi gazlarning nafasga kirishi bilan aloqador bo'lgan zararli korxonalarining ishchilarida, shuningdek, surunkali bronxit bilan og'rib yurgan odamlarda topiladi.

Bronxoektaziya surunkali bronxit, pnevmoniylar, o'pka sili, o'pka absessi, pnevmoskleroz hammadan ko'p sabab bo'ladi. Mana shu kasallikkarda bronxlar shilliq pardasi bilan muskul qavatning o'zgarib qolishi tufayli bronxlar kengayib ketadi, bu bronx devoridagi elastik to'qima o'rniغا chandiq to'qima paydo bo'lishiga olib keladi. Kasallik tug'ma va turmushda orttirilgan bo'lib, katta yoshli odamlar va bolalarda qayd etiladi.

Klinikasi. Kasallik uzoq vaqtgacha zimdan o'tishi va bemor hech narsadan nolimasligi mumkin. Kasallikda uch davr tafovut qilinadi:

I davr yoki bosqich. Bemor o'zini sog'lom deb hisoblaydi: ahyon-ahyonda yo'tal tutib, shilimshiqli balg'am tashlab turadi, odatda, buni shamollash yoki chekishdan ko'rishadi. Perkussiyada va auskultatsiyada bu davrda sezilarli patologik simptomlar topilmasligi mumkin. Bronxografiyada (bronxlarning maxsus kontrast moddalar bilan to'ldirib, rentgen suratini olish) xalla-chasimon yoki silindrsimon bronxoektazlar borligi ko'rindi.

II davr yoki bosqich. Bemorlar, xususan, ertalab, yiringli balg'am tashlab, yo'talib turishini aytishadi; balg'am miqdori astasekin ko'payib boradi. Kasallik harorat ko'tarilishi va kundalik balg'am miqdorining 300—500 ml.gacha ko'payishi bilan vaqt-bevaqt qo'zib turadi. Bemorlar faqat bir yonboshda yotganim osonroq, boshqa yonboshga ag'darilib yotish yo'talning zo'rayishi va balg'am tushishiga sabab bo'ladi, deb hisoblashadi. Rentgenologik tekshirishda mayda-mayda uyalar holida qorayib turgan joylar topiladi. Bronxografiya kasallik xarakteri to'g'risida hammadan aniq tasavvur beradi, bronxografiya qilinganda kengaygan bronxlarning talaygina bo'shliqlari topiladi.

III davr yoki bosqich. Bemorda intoksikatsiya alomatlari paydo bo'ladi, harorat hamisha ko'tarilib turadi, doim birtalay (sutkasiga 1 l.gacha) qo'llansa balg'am tushishi bilan o'tadigan yo'tal tutadi.


Balg'am tindirib qo'yilganda uch qatlamga, yiring, suyuq, sekret va shilimshiq qatlamiga ajralib qoladi. Kasallarning uchdan bir qismida bronxlardan qon keladi, ba'zan bu qon tuflash yoki laxta-laxta bir talay qon kelishi ko'rinishida o'tadi. Bir qancha hollarda qon tuflash yetakchi alomat hisoblanadi.

Surunkali bronxoektaziya bilan og'rigan bemorlarda gipertrofik osteoartropatiya sindromi qayd qilinadi. Bu sindrom oyoq-qo'llarning zirqirab og'rib turishi, naysimon uzun suyaklarda periostal qatlamlar paydo bo'lishi va oxirgi falangalar ning nog'ora cho'plari ko'rinishida kolbasimon qalnlashib qolishi hamda tirnoqlarning soat oynalari shaklida bukilishidan iboratdir.

Perkussiyada o'pkaning shikastlangan bo'lagi sohasida perkutor tovushning qisqa tortib qolganligi aniqlansa, auskultatsiyada bronxial tusga ega bo'lgan dag'al nafas va har xil kolibrli xirillashlar eshitiladi.

O'pka bo'lagidagi yallig'lanish qo'zigan davrda bronxial nafas, bo'g'ilib qolgan tovush va nam xirillashlar bilan birga uchraydigan pnevmoniya simptomlari kuzatilishi mumkin. Bemorlar ozib, darmonsizlanib qoladi, hansiraydi, kechalari terlab chiqadi.

Bronxoektaziyaning III bosqichida yurak va nafas faoliyati buziladi, ko'pincha anemiya qo'shiladi. Bemorlar mehnatga yaroqsiz bo'lib qoladi.



12-rasm. Oxirgi falangalar nog'ora cho'plari ko'rinishida bo'lishi.

Asoratlari: o'pkadan takror-takror qon ketishi, pnevmoniyalarning tez-tez qo'zib turishi, sepsis, miya abscessi, buyrak kasalliklari (amiloidoz).

Davolash. Kasallikka chalingan bemorlarni vaqt-vaqtida kasalxonaga yotqizish va ularga uy sharoitida o'rinn-ko'rpa qilib yotishni tayinlash zarur. Bunday bemorlar karavotda birmuncha boshqacharoq holatda yotadilar, karavotning oyoq tomoni biroz yuqori (25—30 sm) bo'lishi kerak. Bu holat bronxoektazlarda to'planib qolgan balg'amning yaxshiroq ketishiga yordam beradi, balg'am, odatda, o'pkaning pastki bo'limlarida bo'ladi. Karavotning oyoq tomoni, odatda, 3—4 soatga ko'tarib qo'yiladi, orada esa tanaffuslar qilib turiladi.

Bronxoektatik kasallikda kundalik ovqat ratsioni oqsilga boy bo'lishi kerak. A, C, D va B vitaminlariga boy bo'lishini ta'minlash lozim. Balg'amni chiqarib tashlash uchun balg'am ko'chiradigan vositalar, jumladan, termopsis o'ti I choy qoshiqdan kuniga uch mahal ichish uchun buyuriladi.

Hozirgi vaqtda balg'amni surib olib tashlash, bronxlarni yuvish va bronxlar ichiga antibiotiklar yuborish (balg'amdag'i mikroflora xili va uning antibiotiklarga sezgirligini aniqlagandan so'ng) usuli qo'llanilmoqda. Antibiotiklar mushaklar orasiga ham yuboriladi.

Fizioterapevtik muolajalardan UVCh, ingalatsiya (penitsillin streptomitsin bilan), pankreatin ingalatsiyasi, gidroaeroionizatsiya, rentgen nuri, UF, diatermiya, induktotermiya, mikroto'lqinli terapiya, davolovchi jismoniy badantarbiya mashqlari qo'llanilishi mumkin.

Giyohlar bilan davolashda ajgon, alomat choy, anjir, gulxayri, yetmak, behi, jo'ka (arg'uvan), zig'ir, navro'zgullardan foydalaniлади.

5.8. O'pka emfizemasi va pnevmoskleroz

O'pka emfizemasi alveolalarning havo bilan cho'zilib, o'pka to'qimasasi elastikligining yo'qolib ketishi natijasida o'pka to'qimasining shishinqirab, kerikib turishidir.

Pnevmoskleroz – o'pka to'qimasiga biriktiruvchi to'qimaning o'sib kirishi natijasida o'pka funksiyasini izdan chiqarishidir.

Etiologiyasi. O'pka emfizemasi va pnevmoskleroz qanday o'tishiga qarab, o'tkir va surunkali, nechog'liq tarqalganligiga qarab esa o'choqli yoki tarqoq xillarga bo'linishi mumkin. Emfizema va pnevmoskleroz ko'pincha surunkali bronxit, bronzial astma, o'tkir

va surunkali pnevmoniya, o'pka sili bilan og'rigan hemorlarda zaharlovchi moddalar ta'sir etgan mahallarda paydo bo'ladi. Xastalik rivojlanishida, asosan, bronxlar o'tkazuvchanligining buzilishi hamda o'pka elastikligining pasayib ketishi muhim hisoblanadi. Emfizematoz o'pkaning hajmi kengayib ketadi: bunday o'pka ko'krak qafasidan ajratib olinadigan bo'lsa, elastikligini yo'qotsa ham puchaymay turaveradi. Talaygina kapillarlar atrofiyalanib ketganligi uchun o'pka kamqon bo'ladi. O'pka kengayishi bilan bir qatorda, ko'krak qafasi ham kengayib, diafragma pastga tushadi, qovurg'a tog'aylari barvaqt suyaklanadi (suyakka aylanadi). Kichik qon aylanishi doirasida ikkilamchi gipertoniya paydo bo'ladi, o'pkada gazlar almashinuvni keskin izdan chiqadi. Ko'krak qafasi va umurtqa pog'onasining deformatsiyasi bir qadar ahamiyatga ega. Mayda bronxlar yo'li torayib, dastlab o'pkaning kerkib chiqishiga, keyin esa organik o'zgarishlar paydo bo'lishiga olib keladi.

Klinikasi. O'pka emfizemasi bilan og'riganlar tobora zo'rayib borayotgan nafas qisishidan nolishadi. Ularda aksari yo'tal (quruq yo'tal yoki balg'am tashlab yo'talish) qayd qilinadi. Bemorning tashqi ko'rinishi xarakterli bo'ladi: yuzi ko'karib, kerkib turadi, bo'yni kaltalashib, bo'yin venalari bo'rtib turadi. Ko'krak qafasi oldinga orqa yo'nalishda sezilarli kengayib, ko'pincha bochkasimon shaklga kiradi. Nafas yuzalashib, nafas olish kalta va sust nafas chiqarish esa uzaygan bo'ladi va butun nafas olishning to'rtdan uch qismini egallashi mumkin.

O'pka perkussiya qilib ko'rilmaga quticha tovushiga o'xshash tovush chiqaradi. O'pka ekskursiyasi kamayadi. Auskultatsiyada nafasning susayib qolganligi ma'lum bo'ladi. Ba'zan quruq xirillashlar eshitiladi. Yurak tonlari bo'g'iqroq bo'ladi, kichik doirada bosim ko'tarilishi natijasida o'pka arteriyasida paydo bo'ladigan 11 ton aksenti seziladi.

O'pkaning tiriklik sig'imi kamayib ketadi. Yurak-tomirlar sistemasi tekshirib ko'rilmaga yurak tonlarining bo'g'iq bo'lib qolganligi, taxikardiya borligi aniqlanadi, yurak chegaralari o'ng tomonga kengaygan bo'lishi mumkin.

O'pka emfizemasi zo'rayib borgan sayin kichik qon aylanish doirasida bosim ortib horaveradi, bu o'ng qorinchaga ortiqcha zo'r kelib, uning gipertrofiyalanishiga olib keladi. Keyinchalik yurakning

shu qorinchasida yetishmovchilik paydo bo'lib, u jigarning kattalashib ketishi va badanga shish kelishi bilan birga davom etadi.

Rentgenologik tekshirish. O'pka to'qimasi tiniqligi kuchayib qolgani va o'pka arteriyasi yaqqol bilinib turganligi ko'rindi.

Davolash. O'pka emfizemasi va pnevmosklerozni davolash kasallikni keltirib chiqaruvchi sababiga bog'liq. Davolash chora-tadbirlari bronx yo'llarining o'tkazuvchanligini tiklashga qaratilgan bo'lishi kerak. Kompleks davolashda oksigenoterapiya yaxshi naf beradi. Nafas olish mashqlari o'pka ventilatsiyasini yaxshilashda yordam beradi. Davolash gimnastikasi ko'krak qafasi muskullari, diafragma va qovurg'alar harakatini yaxshilashga qaratilgan. Oqibati: asosiy kasallikning rivojlanishiga bog'liq.

Profilaktika. Kasallikning oldini olish uni o'z vaqtida aniqlash va davolashga bog'liq. Agar kasallik kasbga oid zararli omillar bilan bog'liq bo'lsa, mehnat sharoitini yaxshilash va hemorni yengiltroq ishga o'tkazish kerak. Bunday bemorlar dispanser nazoratida bo'lishi lozim. O'pka emfizemasining oldini olishda chekishga qarshi kurashish alohida ahamiyat kasb etadi.

5.9. Plevritlar

Plevrit — plevral varaqlar yallig'lanishi bilan xarakterlanadi. Har ikki o'pka tashqi tomonida visseral plevra, u bilan ko'krak qafasining ichki yuzasini qoplab turgan paretal plevra, ko'ks oralig'inining bir qismi va diafragmaning yuqori sathi orasida esa berk bo'shliq — plevra bo'shlig'i bo'lib, patologik holatlarda bu yerda suyuqlik to'planadi. Quruq va ekssudativ (ho'l) plevritlar farqlanadi.

Ekssudat xarakteriga ko'ra, fibrinoz, seroz-fibrinoz, yiringli, chirigan, eozinofilli, xolesterinli, xilyoz, soxta xilyoz plevritlar bo'ladi.

Kasallik kechish bosqichi va xususiyatlari ko'ra, o'tkir, o'rtacha o'tkir va surunkali bo'lishi mumkin. Plevra bo'shlig'iga tarqalganligiga ko'ra, plevritlar diffuz (total) yoki cheklangan (xaltachasimon) bo'lishi mumkin.

Etiologiyasi. Plevritlar, asosan, yuqumli va yuqumsiz yoki aseptik, kamroq allergiya paydo bo'ladigan boshqa kasalliklarning asorati sifatida vujudga keladi. Ko'pgina hollarda ko'p sonli bakterial-

pnevmonokokk, streptokokk, stafilokokk, virusli infeksiyalar, sil tayoqchasi, etiologik omil hisoblanadi.

Brutselloz, ich terlama zaxm, exinokokk, xavfli o'smalar, limfogranulematoz, shikastlar, plevra ichiga qon quylganda, o'pka infarktida, biriktiruvchi to'qima kasalliklarida — revmatizm, qizil yugurik, qon yaratilishi sistemasi, buyraklar, jigar va boshqa kasalliklari bo'lgan bemorlarda shakllanadi.

5.9.1. Quruq plevrit

Klinikasi. Quruq plevritning asosiy alomati nafas vaqtida yonboshida og'riq va quruq yo'tal paydo bo'lishidir. Bemor har nafas olgанида og'riq seziladi, shuning uchun ular qisqa, yuzaki nafas olishga o'tadi va bu hol nafas qisishidagidek tasavvur tug'diradi. Tana harorati yuqori yoki me'yorda bo'lishi mumkin. Harorat egri chizig'i xarakteri ma'lum darajada infeksiya tabiatini bilan belgilanadi.

Bemor ko'zdan kechirilganda, ko'krak qafasi shikastlangan, yarmining harakati biroz chegaralanganini ko'rish mumkin. Yallig'langan plevra ustini urib ko'rish ko'pincha og'riq keltirib chiqaradi.

Auskultatsiyada plevraning yallig'langan qismi ustida krepitatsiyani eslatuvchi plevra ishqalanish shovqini eshitiladi, bular orasidagi farq shundaki, krepitatsiya faqat nafas olish cho'qqisida, plevranning ishqalanish shovqini esa nafas olish va chiqarish fazalarida eshitiladi.

Quruq plevritda rentgenologik tekshirish diafragma yonida pastki yon qismlarida hammadan ko'ra ko'proq seziladigan juda yengil gomogen soya borligini ko'rsatib beradi. Kasal tomonda diafragma harakatlarining ba'zida orqada qolishi ko'rildi.

Quruq plevrit, odatda, 1—2 hafta davomida odamning sog'ayib ketishi bilan tugallanadi, og'riq bosilib, harorat normal bo'lib qoladi. Lekin bu kasallik uzoq davom etib, bitishmalar paydo bo'lishi va plevranning bir-biriga yopishib qolishiga ham olib kelishi mumkin.


5.9.2. Ekssudativ plevrit

Klinikasi. Ekssudativ plevrit bilan og'rigan kasallar nafas olish vaqtida og'riq turishi, quruq hamda og'riqqa sabab bo'ladigan yo'tal, isitma, darmon qurishidan noliydi. Kasallik ko'pincha et uvushishi va haroratning yuqori ko'tarilishi bilan birdan boshlanadi. Harorat


2–3 hafta yuqori bo'lib turishi mumkin. Plevra bo'shlig'idagi suyuqlik miqdori ortib borgan sayin og'riq bosiladi, hansirash esa kuchayadi. Shu bilan bir vaqtida darmon qurishi va umumiy holsizlik ortib boradi.

Bemor ko'zdan kechirilganda terisi oqargan bo'lib ko'rindi. Kasalning holati majburiy bo'lishi mumkin. Ekssudativ plevrit endigina avj olib kelayotgan paytda bemor, asosan, sog'lom tomonini bosib yotadi, ekssudat paydo bo'lganidan keyin esa kasal tomoni bilan yotishni afzal ko'radi, chunki bunda nafas vaqtida og'riq kamayadi. Bemorning majburan o'tirib olganligi ko'ks oralig'inining surilib qolganini yoki perikardda ekssudat borligini ko'rsatadigan alomat bo'lib xizmat qilishi mumkin. Nafas tezlashgan bo'lib, ko'pincha og'riq bilan o'tadigan quruq yo'tal tufayli uzilib turadi.

Ekssudat to'planib qolgan joyda ovoz tebranishi xiyla susayadi. Ekssudativ plevritda juda muhim alomat yurakning sog'lom tomonga surilib qolishidir. Bunda yirik tomirlarning bosilishi va surilib qolishi tobora zo'rayib boradigan gipoksiya, sianoz, qattiq hansirash, bo'yinturuq venalarining tepib turishi bilan birga davom etishi mumkin. Perkussiya qilib ko'rliganda, plevra bo'shlig'idagi suyuqlik miqdorining tez ko'payib borishi perkutor tovushning sezilarli darajada kalta tortib qolishiga sabab bo'ladi, shu bilan birga, suyuqliknинг ustki chegarasi rentgenologik tekshirishda yaxshi ko'riniib turadigan qiyshiq chiziqni (Ellis-Damuazo-Sokolov) hosil qiladi.



13-rasm. Plevrani diagnostik punksiya qilish.



14-rasm. Plevrosiparator.

Auskultatsiya ekssudativ plevrit endi avj olib kelayotganida va ekssudat surilayotganida plevraniнg ishqalanish shovqini eshitilishi mumkin. Suyuqlik to'planib qolganidan keyin ko'krak qafasining pastki qismida nafas susayib qoladi, ekssudatning yuqori chegarasi ustida ko'pincha bronxial tusga ega bo'lgan nafas eshitiladi. Bu o'pkaning ekssudat bilan bosilib qolishiga bog'liq, shuning

natijasida uning tovush o'tkazuvchanligi kuchayadi.

Laboratoriya tahlili. Leykositoz, eritrotsitlar cho'kish tezligining oshishi, eozinofiliya, limfopeniya va gemoglobinining o'zgarishi aniqlanadi. Pirke reaksiyasi (silni aniqlash uchun teriga qo'yiladigan allergik sinama) ko'pincha musbat natija beradi.

Davolash. Bemorlar ixtisoslashgan kasalxonalarga qabul qilinib, eng avvalo, o'ringa yotqizilishi kerak. Shikastlangan plevrani qimirlatmaslik uchun o'pka harakati chegaralanadi, buning uchun kasal yonboshlab yotishi yoki ko'krak qafasini chuqur nafas chiqarish fazasida qattiq bog'lab qo'yish tavsiya qilinadi.

Bemorlar ovqatni tez-tez, oz miqdorda yeb turishi kerak. Ovqat yuqori kaloriyalı, vitaminlarga, ayniqa, A hamda B, C guruh vitaminlariga boy bo'lishi lozim. Bu vitaminlar bemorlarga preparat shaklida ham buyuriladi.

Shuningdek, kislorod terapiyasi va kompleksiga asosan, nafas gimnastikasi kiradigan davolash fizkulturasi tavsiya etiladi: davolash gimnastikasi ekssudatning surilishiga yordam beradi va plevrada chandiq hosil bo'lishining oldini oladi.

Muhim davo chorasi plevrani punksiya qilish, ya'ni plevra bo'shlig'idan ekssudatni chiqarib tashlashdir. Plevra punksiyasi uchun Poten apparatidan foydalilanadi. Plevra punksiya qilinayotgan paytda o'rta tibbiyot xodimi stulda o'tirgan bemor yonida turib, shifokorga ko'maklashib boradi. Bu muolaja bajarilayotgan vaqtida bemor o'zidan ketib qolishi mumkin, bunday holda zudlik bilan yurak tomirlarini quvvatlaydigan dori-darmonlar (kamfora, kofein)dan inyeksiya qilinadi. Plevrit etiologiyasi sil deb gumon qilinganida ftivazid, tubazid, PASK preparatlari o'rnlidir.

5.10. O'pka sili

O'pka sili, ya'ni tuberkuloz yuqumli kasallik bo'lib, birinchi galda, o'pkada o'ziga xos, spetsifik o'zgarishlar paydo bo'lib borishi bilan xarakterlanadi. 1882-yilli 24-martda nemis bakteriolog Robert Koch tomonidan tuberkuloz qo'zg'atuvchisi kashf etildi. U sil qo'zg'atuvchisini bemorlar balg'amidan, vafot etganlarning tana a'zolaridan topib, uni sil mikobakteriyalari deb atadi. Hozirgacha bu bakteriya birinchi marta topgan kishining nomi bilan Koch batsillasi deb atalib kelinmoqda.

Sil tayoqchasi harakatsiz bo'lib, qayrilgan sporalar hosil qilmaydi, u bo'linish yo'li bilan ko'payadi, uning uzunligi 1—5 mk, yo'g'onligi 0,4 mk.ga teng. Odamga, sil, asosan, aerogen yo'l bilan yuqadi, ya'ni sil mikobakteriyalari organizmiga nafas yo'llari orqali kiradi. Sil mikobakteriyasi bemorning balg'ami, siyidigi va najasi orqali ajraladi.

Sil mikobakteriyalari kasaldan sog' odamga tomchi infeksiyasi yoki qurigan balg'am zarrachalarini tutuvchi chang orqali o'tadi. Yo'tal, aksirish va yaqindan turib gaplashish vaqtida ichida sil mikobakteriyalari bo'lgan yengil tomchilar xonaga tarqaladi, so'ng ular o'pka yo'llari orqali odam organizmiga kiradi, bundan tashqari, bemor yo'tal vaqtida ajratilgan tomchilar qurib, atrof havoga tarqaladi. Sil mikobakteriyalari o'pkaga nafas bilan olingan havo orqali kirib, silni yuqtiradi.

Bemor foydalangan buyumlar (dastro'mol, ich kiyim, o'rindo'rpa, yumshoq mebel, idish-tovoq va h.k.) ham kasallik yuqtiruvchi manba bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda sil bilan og'riyotgan hayvonlar suti ham kasallikni keltirib chiqaruvchi omil bo'la oladi. Bunday hollarda xastalik ichak orqaşı yuqadi.

Kasallikning tasnifi. Xalqaro ftiziatrlar syezdining 1979-yil 23-apreldagi qabul qilgan buyrug'iga muvofiq, sil quyidagicha tasniflanadi:

1. Birlamchi sil kompleksi.
2. To'sh ichidagi limfa tugunlari sili.
3. Disseminatsiyalangan (yo'yilib ketgan) o'pka sili.
4. O'pkaning yarimo'tkirk va surunkali desseminatsiyalangan sili.
5. O'choqli o'pka sili.
6. Infiltrativ o'pka sili.

7. O'pka tuberkulemasi.
8. Kavermoz o'pka sili.
9. Fibroz-kavermoz o'pka sili.
10. Sirrotik o'pka sili.
11. Sil plevriti.
12. Yuqori nafas yo'llari sili.
13. Nafas a'zolarining chang va kasb-korga aloqador o'pka kasalliklari bilan birga qo'shilgan sili.

14. Boshqa a'zo va sistemalar sili (markaziy asab sistemasi, ichak, suyak va bo'g'inlar, siyidik va tanosil a'zolari, teri, limfa tugunlari, ko'z va boshq.).

O'pka sili: yengil, o'rtacha, og'ir o'tishi mumkin. Kasallikning kompensatsiyalangan (*A*), subkompensatsiyalangan (*B*), dekom-pensatsiyalangan (*C*) turlari mavjud.

Kasallikning bemor balg'ami bilan birga sil mikobakteriyalarini ham chiqarib turadigan turi (ochiq turi) — *BK*, sil mikobakteriyalar hamisha chiqmasdan vaqt-vaqt bilan chiqib turadigan bo'lsa + *BK* deb belgilanadi. Balg'am bilan birga sil mikobakteriyalar chiqib turmaydigan kasallik turi — *BK* deb belgilanadi. Sil avj olib borganda uning infiltratsiya, parchalanish, surilish, zichlanish va ohaklanish bosqichlari farqlanadi.

O'pka silining klinikasi. O'pka sili bilan og'riyotgan hemorlar, odatda, ko'krak og'rig'i, yo'tal, qon tupurish, tana haroratining ko'tarilishi, terlash va ozishdan shikoyat qilishadi. Ba'zan bunday bemorlarning ishtahasi yo'qoladi, ichi ketadi, ularda umumiy nerv qo'zg'alishi kuzatiladi. Ayrim hollarda sil boshqa kasalliklar niqobi ostida o'tadi — cho'zilib ketgan gripp, atipik pnevmoniya va boshqalar. Shuning uchun hemordan so'ragan paytda pnevmoniya, gripp, bronxit, ekssudativ plevrit kabi ko'pincha qaytalanib turadigan kasalliklarga ahamiyat berish kerak.

Ko'zdan kechirib ko'rilmaga sil intoksikatsiyasiga xarakterli bo'lган simptomlar topiladi. Terining rangi o'chib, oqarib, ko'zning chaqnab turishi, lunjlarda isitmaga aloqador qizillik shular jumlasidandir. Silning gematogen turlarida bo'yin, qo'ltiqosti sohasi, chovdag'i limfa tugunlari kattalashadi. Perkussiyada urib ko'rilmaga ba'zi hollarda perkutor tovush bo'g'iqroq bo'lib eshitilsa (ekssudativ plevritda), boshqa hollarda quticha yoki timpanik tovush eshitiladi (o'pka emfizemasi, kavernalarda).

Auskultatsiyada turli-tuman o'zgarishlar aniqlanadi. O'pka fibrozida qattiq, infiltrativ jarayonlarda bronxial o'pka emsizemasi, ekssudativ plevritlar hamda plevra bitishmalarida esa susayib qolgan nafas qayd qilinadi. Kavernozda yirik pufakli nam xirillashlar eshitiladi. Kavernalar bronxlar bilan tutashgan bo'lsa, u vaqtida bronxial yoki amforik nafas paydo bo'ladi.

Laboratoriya tahlili. Sil pnevmoniyasi bilan og'rigan hemor qonida neytrofill leykositoz, eritrotsitlar cho'kish tezligi kuchaygan bo'ladi, eozofiliya qayd qilinadi.

Balg'amni tekshirish o'pka silini aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Tashqi ko'rinishiga qarab, u shilliq, shilliq-yiringli va hidsiz yiringli bo'ladi. Mikroskop ostida tekshirilganda, balg'amda sil mikobakteriyalari va o'pkadagi destruktiv o'zgarishlarini ko'r-satuvchi elastik tolalari topiladi.

Rentgenologik tekshirilganda o'pka to'qimasi qattiqlashganda soyalar yoki parchalanganda yorug' qismlar ko'rindi. O'tkir o'pka milliar silida rentgenogrammada mayda, o'pkaning har ikki sathida ham bir xil ifodalangan dog'lar ko'rindi.

O'pka silining kavernali turi rentgenogrammada har xil intensivlikdagi va kattalikdagi tarqoq dog'larni beradi, bu dog'lar yakka-yakka yoki ko'p sonli yorug' joylar — kavernalar bilan qo'shilib ketadi. Kavernani yorug' dog' atrofida halqasimon qora kontur borligiga qarab bilish mumkin, bu halqa kontur kapsula proyeksiyasidir. Ancha qalin pardaga ega bo'lgan eski kavernalar yorug' dog' atrofida yaxshi ko'zga tashlanadigan halqa hosil qildi.

Organizmga sil yuqqanini aniqlashda tuberkulin sinamasidan foydalaniлади. Ko'pincha teri va ter ichi sinamalari qo'llaniladi.

Teri sinamasi (Pirke sinamasi) quyidagilardan iborat: bilak terisiga bir tomchi tuberkulin tomiziladi, so'ng tomchi ichidan teriga maxsus borchik yoki igna bilan bir necha chiziq chiziladi. Nazorat uchun o'sha joy yoniga shu yo'l bilan bir necha fiziologik eritma tomiziladi. Musbat reaksiya berganda, tuberkulin tomizilgan joyda 24—48 soatdan so'ng atrofi reaktiv yallig'lanish zonasini bilan o'talgan papula paydo bo'ladi.

Teri ichiga qilinadigan Mantu sinamasi bunga qaraganda sezgirroqdir. Bunda suyultirilgan 0,1 ml tuberkulin (1:100, 1:1000 yoki 1:5000) teri ichiga yuboriladi. Tuberkulin yuborilgan yerda

24—48 soatdan keyin musbat reaksiya yuz berganda, reaktiv yallig‘lanish bilan o‘ralgan papula paydo bo‘ladi.

Bemor ahvolini keskin og‘irlashtiruvchi hiqildoq va ichak sili o‘pka silining asorati hisoblanadi. Spontan pnevmotoraks ham o‘pka sili asoratiga kiradi. U kaverna devorining yorilishi va uning plevra bo‘sning‘iga ochilishi oqibatida vujudga keladi. Kaverna devori yorilishi paytida bemorlar og‘riq va kuchli nafas qisishini sezadilar, sianoz paydo bo‘ladi. Bu hollar o‘pkaning nafas olish holatidan tez chiqishiga va ko‘ks oralig‘i organlarning bir tomonga surilishiga bog‘liqdir. Ekssudativ o‘zgarishlar bilan kechadigan turlarida taxmin yaxshi emas. O‘pkaning o‘tkir milliar sili ko‘pincha o‘lim bilan tugaydi.

Davolash. Sil profilaktikasida rentgenologik tekshirishning alohida bir turi — fluorografiya katta ahamiyat kasb etadi. Fluorografiya yordamida silning dastlabki bosqichlarini aniqlab olish mumkin. 12 yoshdan boshlab barcha har yili fluorografiya tekshiruvidan o‘tib turishi kerak.

Silga qarshi dispanserlarda sil mikobakteriyasini tashqariga chiqarib turadigan bemorlarga yaqin yurgan kishilar ustidan kuzatuv olib borilib, sog‘lom aholi yalpi tekshiruvdan o‘tkazilib turiladi. Bemorni shaxsiy gigiyena qoidalariga, jumladan, alohida sochiq, idish-tovoq, tufdondan qanday foydalanishga o‘rgatish mumkin.

Sil bilan og‘igan bemor yo‘talganda, aksirganda, og‘zini va burnini dastro‘mol bilan yopishi zarur. Bemor idishlarini alohida saqlash va ishlatilgandan keyin har safar 10 daqiqa davomida qaynatib qo‘yish kerak. Ich kiyim va choyshablarni qaynatib turilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bemor yotgan xonalar ho‘llangan yoki 5 % li xloraminga namlangan latta bilan yaxshilab artiladi. Kasal bemorni xonasi ajratilib qo‘yiladi, muntazam ravishda xonaga toza havo kiritilib turiladi. Jamoat profilaktikasi, ya‘ni mehnatkashlarning moddiy ahvolini va madaniy darajasini muntazam yaxshilash, turmush va ish sharoitini sog‘lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish lozim.

Silga qarshi maxsus tadbirlar silga qarshi dispanserlarda amalga oshiriladi. Sil bilan kasallangan kishilarini aniqlash, bunday bemorni ro‘yxatga olish va davolash: infeksiya o‘chog‘ini aniqlash va sil bilan og‘riyotganlar oilalarini muntazam kuzatib borish; aholi o‘rtasida madaniy-oqartuv ishlarini olib borish, dispanser hisobida turgan bemornarning mehnat sharoitlarini, turmushidagi

zaruratlarini o'rganish va shu jihatdan noqulay hollarning oldini olish, bemorlarga sanatoriy va kurortlarda davolanish uchun yo'llanmalar berish, sifatli ovqatlar pishiriladigan maxsus oshxonalarni tashkil qilish va h.k. ularning vazifalariga kiradi.

Sil bilan og'riyotgan bemorlarga mehnat rejimi o'rnatilishi kerak. Nogiron bemorlar ancha yengil ishlar va davlat tomonidan yordam bilan ta'minlanadilar. Bu yordam kasallik oqibatida bemor mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotsa, ijtimoiy ta'minot tomonidan unga ilgarigi ish haqi yuzasidan 100 % nafaqa to'lashdan iborat.

Xastalarning ovqati yuqori kaloriyaligi va yengil hazm bo'ladijan bo'lishi kerak. Bemor ratsioniga yuqori sifatli oqsillar, ayniqsa, hayvon oqsillari ko'p kiritiladi. Yog'lar, asosan, o'zida A va D vitaminlarini tutuvchi hamda oson hazm bo'lувчи sariyog' shaklida beriladi. Shuningdek, ratsionga kuniga 25 g o'simlik moyi ham kiritish tavsiya etiladi, chunki uning tarkibida yetarli miqdorda to'yinmagan yog' kislotalari bor. Vitamin va kalsiy tuzlariga boy ovqatlar buyuriladi. Yaxshi hazm bo'lувчи ovqat manbayi sut va sut mahsulotlaridir. O'pka sili bilan og'riyotgan bemorlarning ovqatlari ratsioni jarayonning o'zgarish darajasi va boshqa organlardagi o'zgarishlarga qarab tuziladi.

Sil kasallarni davolashda klimatoterapiya katta ahamiyatga ega. Iqlimni o'zgartirishdan, har bir joyning o'ziga xos meteorologik sharoitlaridan foydalangan holda tabiiy omillar bilan davolanish tavsiya etilgan; jumladan, ochiq havoda ko'p vaqt bo'lish, havo va quyosh vannalari, cho'milish yaxshi samara beradi.

5.11. Spetsifik profilaktika

Spetsifik profilaktika fransuz olimlari Kalmett va Geren tomonidan 1919-yili ajratib olingan vaksina bilan o'tkazilgan. Sil mikobakteriyasi maxsus oziqli muhitda o'stirilib, undan so'ng har xil muhitda qayta-qayta ekib ko'rildiganidan keyin u patogen xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Ana shunday vaksina tirik organizmga yuborilsa, kasallik kelib chiqmaydi. Organizm sil infeksiyasiga chidamli bo'lib qoladi (Kalmett-Geren batsillalari — BCG).

Teri ichiga yuboriladigan quruq vaksina miqdori chaqaloqlar va kichik yoshdag'i hamda muktabgacha yoshdag'i bolalar uchun 0,02 mg.ni, muktab yoshdagilar, o'smirlar va kattalar uchun 0,05 mg.ni tashkil qiladi. 5 yoki 7 kunlik chaqaloqlar terisi ichiga silga qarshi vaksina yuboriladi. Agar biron-bir sabab bilan bolalar

tug'ilganidan keyin dastlabki kunlarda vaksinatsiya qilinmagan bo'lsa, u holda ularni dastlabki oylarda oldindan tuberkulin bilan sinab ko'rmay vaksinatsiya o'tkazish kerak.

Quyidagi hollarda vaksinatsiya o'tkazish mumkin emas:

1) tug'ilish jarohatlarining klinik alomatlari mavjud bo'lsa;

2) tana harorati yuqori bo'lganda 37°C dan yuqori;

3) dispeptik o'zgarishlar;

4) bolaning umumiy ahvoliga ta'sir qiluvchi kasalliklar — piodermiya, puzirchatka, abscesslar, flegmonalar, otit, gripp, o'pka yallig'lanishi.

Teri ichiga yuborish usuli bilan sil yuqmagan barcha bolalar, o'smirlar, oliv o'quv yurtlari va maxsus bilim yurtlari talabalari, shuningdek, davolash-profilaktika muassasalarining 30 yoshgacha bo'lgan xodimlari (agar ular klinik jihatdan sog'lom bo'lishsa va Mantu reaksiyasi ularda manfiy natija bersa) revaksinatsiya qilinadi.

Ilgari peroral usul bilan vaksinatsiya yoki revaksinatsiya qilganlarga birinchi marta 2 yoshdan teri ichiga yuborib revaksinatsiya qilinadi, so'ng 7 yoshda, 10—11 yoshda, 13—14 yoshda, 16—17 yoshda, 22—23 yoshda va 27—30 yoshda revaksinatsiya qilinadi.

Quyidagi hollarda teri ichiga yuborish yo'llari bilan revaksinatsiya qilish mumkin emas:

1) Mantu sinovi mushbat natija bergen har qanday yoshdagи shaxslar;

2) sil bilan og'riyan yoki sil yuqqan shaxslar;

3) teri kasalliklari bilan, shuningdek, o'tkir va surunkali yuqumli kasalliklar bilan og'riyotgan allergiya holatdagi (o'tkir va yarimo'tkir fazadagi revmatizm, bronxial astma, ovqat idosinkraziyasi va boshqa idiosinkraziyalar) shaxslar.

Vaksinatsiyaning mohiyati shundaki, u immunitet hosil qilish yo'li bilan organizmning silga qarshiligini oshiradi. Ko'rsatilgan tadbirlardan tashqari, sil mikobakteriyasining tarqalishiga qarshi qaratilgan choralar ham ko'riliши kerak. Buning uchun, birinchi navbatda, balg'amni zararsizlantirish zarur. Bemorlar cho'ntaklarida maxsus tufdon olib yurishlari kerak.

Uyda emallangan tufdonlardan foydalanish mumkin, lekin ulardagи balg'am qurib, havoga chang bilan tarqalmasligi uchun unga suv quyib qo'yiladi. Balg'am ishqor eritmasidagi krebol — 60 % va ishqor eritmasidagi paraxlormetakrebol — 40 % bilan zararsizlantiriladi yoki kuydirib tashlanadi.

5.12. DOTS (JSST tavsiya qilgan silga qarshi kurashish strategiyasi) dasturi bo'yicha davolash

Silni aniqlash va davolash usullari odamzodga ko'p yillardan beri ma'lum. 100 yildan ortiq davr ichida sil kasalligini qo'zg'atuvchi mikobakteriyalarni mikroskop yordamida aniqlash mumkin, silga qarshi samarali dorilardan esa, 50 yilga yaqin vaqt ichida foydalanilyapti. Shunga qaramasdan, har yili 2 millionga yaqin odam sil tufayli dunyodan ko'z yumadi. Silni aniqlash va davolashning samarali usullari borligiga qaramasdan, bemorni, ayniqsa, yuqumli bemorlarni aniqlash va davolash tizimining yetarlicha yaxshi tashkil qilinmaganligi muammosi saqlanib qolmoqda. Bugungi kunda silga qarshi kurashishning DOTS nomi bilan ma'lum bo'lgan strategiya mavjud bo'lib, hozirgi vaqtida samarali va iqtisodiy jihatdan foydali deb tan olinib, JSST hamda Sil va o'pka kasalliklariga qarshi kurashish ittifoqi tomonidan tavsiya qilingan. DOTS (ingliz. *directly observed treatment, short-course*) – qisqa standart kimyoviy terapiyaning keskin cheklangan va nazorat ostiga olingan davolash strategiyasi.

JSST tavsiya qilgan silga qarshi kurashish strategiyasi tibbiy va ma'muriy tadbirlar majmuasi bo'lib, aholigacha yetib boruvchi silni aniqlash va davolash dasturini ishlab chiqish hamda ishlatalishga yo'naltirilgan. Bu strategiya infeksiyaning tarqalishini oldini olish bilan birga, ko'p hollarda o'lim holatlарини ko'paytiradigan va katta xarajat talab qiladigan doriga chidamli silning rivojlanishining oldini oladi.

Silning kimyoviy terapiyasi standart sxemalari JSST va Sil va o'pka kasalliklariga qarshi kurashish ittifoqi tomonidan tavsiya qilingan. Ular silni samarali davolash hamda doriga chidamli sil rivojlanishining oldini olish imkonini beradi. Har bir silga qarshi dori qisqartirilgan belgi – harf bilan belgilanadi, masalan:

- Izoniazid – *H*;
- Rifampitsin – *R*;
- Pirazinamit – *Z*;
- Etambutol – *E*;
- Streptomitsin – *S*.

Sil bemorlari kimyoviy terapiyasi ikki bosqichdan iborat: davolashning jadal bosqichi va quvvatlovchi bosqich.

Jadal bosqich – davolashning 1-bosqichida (2–3 oy) bemor unga tayinlangan davolashning rejimiga asosan 4–5 silga qarshi

dorilarni qabul qiladi va bu vaqtida *M. Tuberculosis*ning tez nobud bo‘lishi kuzatiladi. Natijada, bemor yuqumli bo‘lmay, doriga chidamlilik paydo bo‘lishining oldi olinadi. Bemor tayinlangan dorilarning hamma dozasini qabul qilishi muhimdir. Buning uchun bemor dorilarini qabul qilishini bevosita nazorat qilish kerak. Jadal bosqich davomida bemor ixtisoslashgan sil kasalxonasida davolanadi. Ba’zida davolashni ambulator sharoitda o’tkazish mumkin.

Quvvatlovchi bosqich – silni davolashning 2-bosqichida (jadal davolash bosqichiga nisbatan bu davrda qabul qilinadigan dorilar soni kamayadi) shikastlangan o’choqni zararsizlantirish uchun *M. Tuberculosis*ning persist shakkllariga ta’sir qilinadi. Bu bosqichda bemor ambulator davolanadi. Bemor o’zini yaxshiroq his qilishi va boshqa har xil sabablarga ko‘ra, davolash ustidan to‘liq nazorat o’tkazish qiyin bo‘lib qoladi. Bosqichda kimyoviy terapiya kursini uzilish xavfi ko‘payadi.

5.13. O’pka saratoni

O’pka saratoni boshqa onkologik kasalliklar ichida ko‘p uchrashi jihatidan oldingi o’rinlardan birini egallaydi. 40—60 yoshdagি odamlar kasallanadi.

Etiologiyasi noma'lum, o’pka saratoni kelib chiqishida surunkali o’pka kasalliklaridan bronxit, bronxoektatik kasalliklar, o’pkaning ishlab chiqarishga aloqador changlar bilan ta’sirlanib turishi, chekish, radioaktiv rudalar, nikel, kobalt, asbest, xrom, mishyak, avtomobillardan chiqadigan gazlar va gudronlangan yo’llarning changi bilan ta’sirlanish kasallikni rivojlantirishga qatnashadi.

Klinikasi. O’pka saratoni ilk bosqichlarida alomatsiz o’tadi. Hammadan erta paydo bo‘ladigan va doimiy alomatlari yo’tal, qon tupurish, ko‘krakni achishtiradigan yo’taldir. Yo’tal ko‘pincha kechasi bezovta qiladi. O’pka saratoniga aloqador yo’tal boshlanganda ertami, kechmi balg‘am paydo bo‘ladi. Bu balg‘am ko‘pikli va rangsiz yoki quyuq va yiringli bo‘lishi mumkin. Uning miqdori 50—100 ml.dan ortmaydi. Qon tupurish kasallarning 42—60 % ida uchraydi va bronx shilliq pardasi yoki o’smaning yara bo‘lib ketishi natijasida boshlanadi. Balg‘amda ko‘pincha qirmizi qizil qon ipir-ipirlar bo‘ladi, ahyon-ahyonda laxtalar ko‘rinishida qon tushadi. Balg‘amda qon shu qadar ko‘p bo‘ladiki, natijada u malina jelesiga o’xshash bo‘ladi.

Bemor eti uvushib turishi hamda tana haroratining ko'tarilishidan shikoyat qiladi. Hansirash kasallarning taxminan 40 % ida qayd qilinadi. Hansirash bronxlar o'tkazuvchanligining buzilishi va o'pka bo'lagining atelektazga uchrashi oqibatida kelib chiqadi. Bemorlar, odatda, harakat qilganida, jismoniy jihatdan zo'riqqanida hansirashning kuchayishidan noliydi. Bemor bilan gaplashib turilgan paytda ba'zan nafas vaqtida hushtak tovushiga o'xshash kuchsiz tovush eshitiladi. Bu tovush bronxning torayib qolganidan kelib chiqadi.

Birmuncha vaqt o'tgandan keyin ko'krak qafasida, odatda, og'riq paydo bo'ladi, og'riq o'sma plevra, traxeya, tomirlarga tarqalganidan so'ng boshlanadi. Bu og'riq, odatda, o'smaning joylashgan o'mi, damida proyeksiyalanadi-yu, lekin turli sohalarga: qorin, qo'llar, ko'krak qafasining sog'lom yarmiga irradiatsiyalanishi mumkin. O'pka saratonida ko'pincha odam o'z-o'zidan umuman darmonsizlanib, tez charchab qoladi. Mehnat qobiliyati pasayib ketadi, ozib, harorati ko'tariladi.

Bemor ko'zdan kechirilganda ko'krak qafasi sohasidagi teriosti venalari kengayib, bo'yin sohasidagi teriosti yog' kletchatkasi bir qadar shishib qolganligi kuzatiladi. Bu venalarning o'sma bilan bosilib qolganligiga bog'liqdir. Ko'krak qafasining o'sma bilan zararlangan tomoni nafas olishda orqada qoladi. O'sma o'pka atelektaziga yoki plevritga olib keladi. O'sma o'pka atelektaziga yoki plevritga olib kelgan bo'lsa, perkussiyada tovush bo'g'iqroq bo'lib chiqadi.

O'pka auskultatsiya qilib ko'rilganda katta-kichikligiga qarab, susaygan vezikular nafas eshitiladi yoki mutlaqo eshitilmay qoladi. Shuningdek, o'sma ko'ks oralig'i sohasiga o'sib kirganida u asab tolalari, qizilo'ngach, yirik tomirlarni bosib qo'yishi tufayli odamning ovozi chiqmay qoladi (afoniya). U ovqatni yaxshi yuta olmaydi (disfagiya). Bemorning yuzi, bo'ynining pastki qismiga sezilarli darajada shish keladi. Shu sohadagi teri qoplamlari qizarib turadi. Kasallik 1–2 yil davom etadi. Bemorning ahvoli asta-sekin yomonlashib, darmoni tobora qurib, ishtahasi pasayib, tana og'irligi kamayib boradi va hattoki, u cho'p bo'lib ozib ketadi.

Laboratoriya tahlili. Qonda eritrotsitlar cho'kish tezligining ortganligi, trombotsitlar sonining ko'payib ketganligi qayd qilinadi. Leykositoz kuzatiladi.

Rentgenologik tekshirishda o'sma soyasi, rak limfangiti, o'pka atelektazini topsa bo'ladi. Qavatma-qavat olinadigan rentgenografiya-tomografiyada ancha ishonchli ma'lumotlar qo'lga kiritiladi.

Bronxoskopiya bronxdagi o'smaning o'zini bronx shilliq pardasining qay tariqa o'zgarganligini topishga, shuningdek, bronxni biopsiya qilishga imkon beradi. Rak ekssudativ plevrit bilan birga davom etib borayotgan bo'lsa, u vaqtida plevral punksiya qilinadi, plevra suyuqligi esa laboratoriya tekshiruviga yuboriladi.

Davolash. O'pka saratonini davolashda sitostatik kimyoterapevtik vositalar (prospidin, siklofosfan, benzotef-etamidin, nitrozometilmochevina)dan foydalilanadi.

Nur terapiyasi, gamma-terapiya uchun mo'ljallangan turli qurilmalar, jumladan, nihoyatda kuchli tezlashtirgichlar yordamida qo'llaniladi.

Og'riqni qoldiradigan, yallig'lanishga qarshi va balg'am ko'chiradigan dori vositalari herib boriladi. Qon ketayotgan mahalda vikasol, o'pka-yurak yetishmovchiliklarida yurak glikozidlari, siyidik haydovchi dorilar ishlatiladi.

Profilaktika. O'pka saratonining profilaktikasi chekishning zararini uqtirib o'tish, havoning ifloslanishiga qarshi kurashish va o'pkaning surunkali hamda yiringli kasalliklariga davo qilishni o'z ichiga oladi.

6-boʻb. YURAK-QON TOMIRLAR TIZIMI A’ZOLARI KASALLIKLARI

6.1. Qisqacha anatomiq-fiziologik maʼlumotlar

Yurak koʼkrak qafasi — toʼsh suyagidan chap tomonda joylashgan konussimon shakldagi murakkab mushakli aʼzodir. Yurakning katta (2/3) qismi koʼkrak qafasining chap tomonida, kichik (1/3) qismi oʼng tomonida joylashgan. Yurakning kattaligi har bir kishining mushtumidek keladi deb hisoblanadi.

Yoshi kattalarda yurakning ogʼirligi gavda vaznining 1/200 qismiga teng yoki 300 g atrofida, oʼrtta yoshdagilarda yurakning uzunligi 13—14,5 sm, eni 9—10,5 sm, oldingi sathi bilan orqa sathining uzunligi 6—7 sm ga teng. Oʼrtta yashar odamning yuragi minutiga oʼrtta hisobda 70—75 marta, bir sutkada esa 100000 marta qisqara oladi. Bu shu vaqt ichida 20 tonna yukni bir metr balandlikka koʼtarish kuchiga teng demakdir. Yurak (tinch holatda) bir minutda 5,5 litr qonni haydaydi. Zoʼr berib jismoniy harakat qilinganda, bu koʼrsatkich minutiga 30 litr yetishi mumkin.

Yurakning keng asosi yuqoriga va orqa tomonga; tor qismi — uchi (choʼqqisi) pastga, oldinga, chap tomonga qaragan. Yurakda uchta: old — toʼsh va qovurgʼalarga qaragan, pastki — diafragmal va oʼpkaga, qiziloʼngachga va tushuvchi aortaga qaragan orqa oʼpka yuzalari bor.

Yurak devorlari uch qavatdan iborat. Ichki qavat endokard yurak boʼshligʼining ichkarisidan qoplangan boʼlib, uning oʼsimtalarini yurak klapanlarini tashkil etadi. Endokard yupqa, yassi, silliq endotelial toʼqimalardan tashkil topgan qatlamlardan iborat.

Oʼrtta qavat—miokard koʼndalang-targʼil muskul tolalardan tuzilgan. Tashqi qavat—epikard yurakning ustki va aortaning yurakka yaqin qismini, oʼpka dastagi hamda kovak venalarini tashkil etadi. U epitelial hujayralardan tashkil topgan. Perikard (yurakni oʼrab turadigan pardan)ning ichki va tashqi varaqlari oʼrtasidagi tor boʼshliqda turadigan seroz suyuqlik yurak ishlayotganida uning devorlari ishqalanishini kamaytiradi. Yurak uzunasiga ketgan toʼsiq

orqali va o'zaro tutashmagan ikkita (o'ng va chap) bo'lakka bo'lingan. Har ikki bo'lakning yuqori qismida o'ng va chap yurak bo'l-machalari, pastki qismida esa o'ng va chap yurak qorinchalari joylashgan. O'ng bo'lakdan venoz qon, chap bo'lakdan esa arte-rial qon oqadi. Odam yuragi to'rt kamerali bo'lib, ikkita bo'l macha va ikkita qorinchadan tarkib topgan. Ikkala bo'l macha qorinchalar bilan bo'l macha-qorincha teshiklari orqali tutashadi. Bo'l machalarning maxsus do'mboqchalari o'ng va chap yurak quloq-chalarini hosil qiladi. Qorinchalarning ichki yuzasida so'rg'ichsimon muskullar bor. O'ng bo'l machaga ikkita yuqori va pastki kovak venalar, chap bo'l machaga to'rtta o'pka venalari qo'yiladi, o'ng qorinchadan o'pka dastagi chiqib, undan o'pkaga venoz qon keladi.

O'pka dastagidan kichik qon aylanishi doirasi boshlanadi. Chap qorinchadan butun organlar uchun arterial qon tashuvchi aorta chiqadi. Aortadan katta qon aylanish doirasi boshlanadi. Bo'l macha-qorincha teshiklari tavaqali klapanlar bilan yopiladi. Chap bo'l macha bilan qorincha o'rtasidagi klapan ikki tavaqali yoki mi-tral, o'ng bo'l macha o'rtasidagi esa uch tavaqali klapanlardan iborat.

Klapanlar tavaqasining qirralari pay iplari yordamida so'rg'ichsimon muskullarga yopishgan. Ular klapanlar tavaqalarining bo'l machaga qarab burilishiga va qonning qorinchadan bo'l machaga qaytib oqishiga to'sqinlik qiladi. Aorta bilan, o'pka arteriyasi asosida yarimoysimon klapanlar joylashgan. Klapanlar shu tomirlarning yo'nalish tomoniga ochiladigan uch tavaqadan iborat. Yurak qorinchalarida bosim pasayganda ular qonga to'ladi va qirralari bir-biriga yopishib, aorta va o'pka dastagini bekitib qo'yadi. Bu bilan qonning yurakka qaytib kirishiga yo'l bermaydi.

Yurakning o'tkazuvchi, tomir va nerv sistemasi farq qilinadi. Bo'l macha bilan qorinchalarning to'g'ri ketma-ket qisqarishi o'tkazuvchi sistema orqali amalga oshadi. Bu sistema maxsus tuzilgan muskul tolalaridan iborat bo'lib, ular bo'l macha va qorinchalar miokardida tugun hamda tutamlar hosil qiladi. O'tkazuvchi sistema qo'zg'alishni sinus tugunidan yurakning barcha muskul hujayralariga o'tkazadi. Sinus tuguni o'ng bo'l macha devorida joylashgan maxsus to'qimadan paydo bo'lgan. Bu yerda ro'y bergan qo'zg'alish uchta o'tkazuvchi tutam tolalari orqali bo'l machaga va o'ng bo'l macha bilan qorincha o'rtasida joylashgan boshqa tugunchaga tarqaladi. Ana o'sha tugunchadan Gis tutami boshlanadi. Bu tutam qorinchalararo to'siqdan o'ta turib, o'ziga tegishli qorinchalarga boruvchi chap va

o'ng oyoqchalarga ajraladi. Oyoqchalar juda keng maxsus hujayralar bilan tugallanadi. Ulardan qo'zg'alish bevosita qisqaruvchi hujayralarga o'tadi.


Yurakning tomir sistemasi ikkita toj (koronar) arteriyalar va ular bilan birga boradigan venalardan iborat. Almashinuv jarayonining intensivligi tufayli yurakda kapillarlar juda ko'p bo'lib, har bir muskul tolasiga bitta kapillar to'g'ri keladi. Yurak faoliyatini nerv sistemasi rostlab turadi. Yurakka adashgan va simpatik nervlardan tolalar keladi (15-rasm).

Qo'zg'aluvchanlik, avtomatizm, o'tkazuvchanlik va qisqaruvchanlik miokardning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Miokardning hamma hujayralari qo'zg'aluvchanlik xususiyatiga ega. Avtomatizm xususiyati shundan iboratki, miokardning ba'zi hujayralari o'z-o'zidan qisqarish layoqatiga egadir. Sinus tuguni hujayralari 1 minutda eng ko'p qo'zg'aladi va yurakning bir maromda qisqarishini ta'minlaydi. Me'yorda yurak minutiga 60—80 marta qisqaradi. Miokardda impulslarni o'tkazish, hujayralarning o'zaro elektro-kimyoviy ta'sirlanishi tufayli amalga oshadi. Buning natijasida impulslar butun miokardga tarqaladi va gavdaning xohlagan joyidan yozib olish mumkin bo'lган intensivlikda elektr yurituvchi kuch paydo bo'ladi.

Yurakning elektr yurituvchi kuchi ta'sir etayotgan vaqt dagi o'zgarishni aks ettiruvchi egri chiziq elektrokardiogramma (EKG) deb ataladi (elektrokardiograf yordamida yozib olinadi).

Yurak siklik ravishda ishlaydi. Sinus tugunida impulslar paydo bo'lган vaqt siklning boshlanishi hisoblanadi. Bo'shashgan bo'l-macha va qorinchalar bu vaqtida qonga to'lgan bo'ladi. Impulslar ta'sirida bo'l machalar qisqaradi. Natijada, qorinchalarga qo'shimcha qon oqib keladi, bundan ular ta'sirlanadi. Impulslar tarqalishi bilan bo'lajak qisqarish to'lqinlari ham harakat qila boshlaydi (asinxron qisqarish fazasi) qisqarish kuchi ko'paygan zahoti, qorinchalar bosimi bo'l machalar bosimidan oshib ketadi va tavaqali klapanlar yopiladi. Shu ondan izometrik qisqarish fazasi boshlanadi. Bu faza qorinchalar bosimi aorta va yurakdan chiqqan boshqa tomirlardagi bosimdan oshgach, tugaydi va yarimoysimon klapanlar ochiladi.

Keyin qonni haydash fazasi boshlanadi, qon qorinchalardan tomirlarga otolib chiqadi. Izometrik va asinxron qisqarish fazalari va qonni haydash fazasi yurak sistolasini tashkil etadi. Qonni haydash fazasidan keyin yurak bo'shashib qoladi, tomirlardagi bosim ta'sirida yarimoysimon klapanlar yopiladi, yurakning bo'shashishi davom



15-rasm. Yurak-tomir sistemasi:

a—qon tomir sistemasi: 1—oyoq tagidagi vena ravog'i; 2—katta boldir suyagining orqa venalari; 3—katta boldir suyagining oldingi venalari; 4—taqim venasi; 5—son venasi; 6—katta teriosti venasi; 7—yonboshning tashqi venasi; 8—yonboshning ichki venasi; 9—moyak (jinsiy bez) venasi; 10—kaft-barmoqlarning o'z arteriya va venalari; 11—kaftning yuza arteriya ravog'i; 12—bilak venasi; 13—tirsak venasi; 14—tirsakning o'tiadagi venasi; 15—o'ng

buyrakning arteriya va venalari; 16—darvoza vena; 17—yelkaning teriosti venasi; 18—yelka venalari; 19—pastki qovaq vena; 20—qo'ltiq venasi; 21—o'mrovosti venasi; 22—yelka-bosh venasi; 23—tashqi ho'yinturuq venasi; 24—ichki bo'yinturuq venasi; 25—umumi yuqu arteriyasi; 26—o'mrovosti arteriyasi; 27—aorta ravog'i; 28—o'ng va chap o'pka arteriyalar; 29—o'pka dastagi; 30—yelka arteriyasi; 31—me'daning chap arteriyasi va venasi; 32—bilak arteriyasi; 33—tirsak arteriyasi; 34—yonboshning umumi yuqu arteriyasi; 35—yonboshning tashqi arterisi; 36—yonboshning ichki arteriyasi; 37—kaft ustidagi arteriya to'ri; 38—sonning chuqur arteriyasi; 39—barmoqlarning ustki tomonidagi arteriyalar; 40—son arteriyasi; 41—taqim arteriyasi; 42—orqa katta boldir arteriyasi; 43—oldingi katta boldir arteriyasi; 44—oyoq panjasи ustidagi arteriya; 45—oyoq tagining tashqi arteriyasi; 46—oyoq barmoqlari ustidagi arteriya; 47—oyoq tagining ichki arteriyasi.

b—qon aylanish sxemasi: 1—oyoq kapillarlar to'ri; 2—buyrak kapillarlar to'ri; 3—darvoza vena; 4—jigarning kapillar to'ri; 5—pastki kovak vena; 6—yurakning chap qorinchasi; 7—yurakning o'ng qorinchasi; 8—o'ng bo'lmacha; 9—chap bo'lmacha; 10—o'pka stvoli; 11—yuqori kovak vena; 12—bosh sohasidagi kapillarlar to'ri; 13—aorta; 14—o'pka venalari; 15—qo'l kapillarlar to'ri; 16—o'pka kapillarlar to'ri; 17—me'da kapillarlar to'ri; 18—taloq kapillarlar to'ri; 19—ichaklar kapillarlar to'ri.

d—yurakning ichki tuzilishi: 1—epikard (seroz parda); 2—o'ng qorinchaning muskul qavati (miokard); 3—o'ng qorinchaning so'rg'ichsimon muskullari; 4—ichki qavat (endokard); 5—pay iplar; 6—o'ng bo'lmacha bilan qorincha teshigini yopadigan uch tavaqali klapan; 7—qorinchalar o'tasidagi devorchaning pardali qismi; 8—o'ng bo'lmacha; 9—o'ng bo'lmachaning muskul qavati; 10—yuqori kovak vena; 11—aortaning yarimoysimon klapanlari; 12—aorta (ko'tariluvchi qismi); 13—yelka-bosh stvoli; 14—chap umumi yuqu arteriyasi; 15—chap o'mrovosti arteriyasi; 16—aorta ravog'i; 17—o'ng o'pka arteriyasi; 18—chap o'pka arteriyasi; 19—o'pka stvoli; 20—chap o'pka venalari; 21—chap bo'lmacha; 22—chap bo'lmacha bilan qorincha teshigini yopadigan ikki tavaqali (mitral) klapan; 23—pay iplar; 24—chap qorinchaning so'rg'ichsimon muskullari; 25—chap qorinchaning muskul qavati (miokard); 26—qorinchalar o'tasidagi devorchaning muskulli qismi; 27—etli to'sinchalar; 28—yurak cho'qqisi.

e—yurak va yirik tomirlar klapanlari (bo'lmachalar kesib olingandan keyin yuqoridan ko'rinishi): 1—ikki tavaqali (mitral) klapan; 2—chap bo'lmacha-qorincha teshigi; 3—aorta klapanining yarimoysimon qopqog'i; 4—o'pka stvoli klapanining yarimoysimon qopqog'i; 5—o'pka stvolining teshigi; 6—aorta teshigi; 7—o'ng bo'lmacha-qorincha teshigi; 8—pay halqa; 9—uch tavaqali klapan; 10—muskul qavati (miokard).

f—yurakni qon bilan ta'minlaydigan tomirlar: 1—yurakning oldingi venalari; 2—oldingi toj (koronar) arteriya; 3—yurakning o'ng qulogchasi; 4—yuqori kovak vena; 5—o'ng bo'lmacha; 6—chap bo'lmacha; 7—chap o'pka venalari; 8—aorta; 9—yurakning chap qulogchasi; 10—chap toj (koronar) arteriya; 11—yurakning o'ng venasi; 12—o'pka stvoli; 13—chap toj arteriyasining qorinchalararo oldingi tarmog'i; 14—chap qorincha; 15—yurak cho'qqisi; 16—o'ng qorincha.

etadi. Bu izometrik bo'shashish fazasi deb ataladi. Qorinchalardagi bosim bo'lmachalarda shu vaqtida yig'ilgan qon bosimidan pastga tushganda tavaqali klapanlar ochilib, qorinchalarga qon to'la boshlaydi. So'ngra keyingi sikllar boshlanadi. Izometrik bo'shashish, qorinchalarning qonga to'lish fazalari va bo'lmachalar sistolasi yurak diastolasini tashkil etadi.

6.2. Yurak-qon tomirlar tizimi a'zolari kasalliklarining umumiy alomatlari va tekshirish usullari

Yurak va qon tomirlar kasalliklarining tashxisida asosiy tekshirish usullari — surishtirish, ko'zdan kechirish, perkussiya, palpatsiya, auskultatsiya, rentgenologik, elektrokardiografik, ballistikardiografik, fonokardiografik, qon va siyidik tahlillari hamda boshqa qo'shimcha tekshirish usullari yordamida aniqlanadi.

Bemortarning shikoyatlari. Yurak-qon tomirlar kasalliklaridagi asosiy shikoyatlar jumlasiga yurak sohasida va to'sh orqasida og'riq sezish, hansirash, yurak o'ynashi, yurak ishining to'xtab-to'xtab qolishi, yo'talish, qon tuflash, badanga shish kelishi kiradi.

Og'riq. Og'riq sezgisi bosh miya po'stlog'ida shakllanib, keyin periferiyada aks etadi. Og'riq lo'qillovchi, sanchuvchi, kesuvchi, lovullatuvchi, simillovchi, timdalovchi, gohida esa kuchli xurujsimon bo'ladi. Yurak sohasidagi og'riqlar bir necha sekunddan bir necha soatgacha, hatto kunlab davom etadi. Og'riqlar to'xtab-to'xtab, gohida esa doimiy bo'ladi. Yurak sohasidagi og'riq ko'krak qafasining chap tomonida yoki to'sh orqasida bo'ladi. Og'riq birdan yoki asta-sekin boshlanadi. Og'riq bir lahzada o'tib ketishi ham mumkin. Og'riq ko'pincha yurak sohasidan tashqari chap qo'lga, chap yelkaga, bo'yin sohasiga, chap kurak ostiga, ba'zan o'ng qo'lga ham beradi. Miokard infarkti kasalligining qorin turida esa (abdominal turida) me'daosti sohasi, qorin atroflarida og'riq paydo bo'ladi. Yurak sohasida og'riq ko'pincha yurak hamda boshqa organlar kasallanganda ham uchraydi.

To'sh orqasida siqib boshlanadigan og'riq jismoniy zo'riqqanda yoki tinch holatda ham kuzatiladi. Yurak sohasidagi og'riq ko'pincha nevrozlarda yurak nerv apparatining funksional buzilishlari, ichki sekretsiya bezlari faoliyatining o'zgarishi, turli intoksikatsiyalarda kuzatiladi.

Hansirash qon aylanishi yetishmovchiligidagi ko'p uchraydigan va asosiy hisoblanadigan shikoyatdir. Hansirash kichik qon aylanishi

doirasidagi dimlanish hodisalari natijasida qonda karbonat angidrid gazining ortiqcha to'planib qolishi va kislorod miqdorining kamayib ketishidan kelib chiqadi.

Qon aylanishining yetishmovchiligi endigina boshlanib kela-yotgan davrda bemor faqat jismoniy zo'riqish vaqtida hansirashni sezadi. Yurak yetishmovchiligi zo'rayib borsa, hansirash doimiy bo'lib qoladi. Chap qorincha muskullarining o'tkir zaifligi boshlan-ganda esa nafas qisish xurujlari paydo bo'ladi.

Yurak o'ynashi yoki yurak urishi — yurakning kuchli va tez-tez, goho noravon urishidan kelib chiqadigan sezgi bo'lib, hamisha ham shu organning kasalligidan darak beradigan bevosita belgi deb hisoblanavermaydi. Yurak qisqarishlari chastotasini, ya'ni tez-ligini, asosan, reflektor ta'sirlar idora yetib boradigan bo'lgani uchun taxikardiya (yurak qisqarishlarining tezlashib ketishi) boshqa sabablar tufayli kelib chiqishi mumkin. Masalan, qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib ketganida choy, qahvaga ortiqcha ruju qo'yan odamlarda, kashandalarda shunday bo'lishi mumkin yoki me'da-ichak yo'li hamda o't yo'llari kasalliklarida reflektor yo'l bilan kelib chiqishi mumkin. Yurak o'ynashi yurak kasalliklarida yurak funksiyasining yetishmay qolayotganini, uning charchab qolganini ko'rsatadigan belgi bo'lib xizmat qiladi. Bunday noxush sezgi ko'pincha bemarlarda yurak ritmi buzilganida — paroksizmal taxikardiya, ekstrasistoliya va boshqalarda paydo bo'ladi.

Nafas qisishi. Kasal yurak har bir qisqarganida tomirlar siste-masiga normal yurakka qaraganda kamroq qon chiqaradi, shuning uchun yurak organ va to'qimalarni yetarli miqdorda qon bilan ta'minlash uchun tezroq qisqara boshlaydi.

Yurak yetishmovchilida nafas tezlashadi va bemor nafas qisishini sezadi. Avvaliga nafas faqat jismoniy ishdan so'ng qisadi, yurak yetishmovchiligi kuchayib borishi bilan u tinch holatda ham paydo bo'ladi. Qoni o'pkasida turib qolgan yurak yetishmovchiligi bilan og'riyotgan bemarlarning nafasi kuchli qisadi.

Nafas qisishi vaqtida bemorlarga havo yetishmaydi va nafas olishi qiyinlashadi. Yurak yetishmovchiligi sababli yuz bergan ro'y-rost nafas qisishida bemorning qaddini baland qilib yotqizish uning ahvolini yengillashtiradi, holbuki, odam gorizontal vaziyatda yotganida aylanib yurgan qon miqdori ko'payib, nafas muskulaturasi va yurakning ishi qiyinlashadi.

Shishlar yurak yetishmovchiligining asosiy alomatlaridan hisoblanadi. Vena va kapillarlarda bosimning ko'tarilishi, ularda qon

oqimining sekinlashishi va kapillarlar o'tkazuvchanligining oshishi, suyuqlikning zo'r berib qondan to'qimalarga o'tishiga sabab bo'ladi. Buyraklarda natriy va suv tutilib qolishi, shuningdek, buyraklar va jigar funksiyasining buzilishi oqibatida qonda oqsil miqdorining kamayishi shishlar paydo bo'lishiga imkon beradi.

Yurak yetishmovchiligining boshlanishida shishlar yashirin holda yig'ilishi mumkin. Chunonchi, organizmda yig'ilib qolgan suyuqlikni ko'zdan kechirish vaqtida payqamay qolinadi. Bu davrida og'riqning ortishi, diurezning (siyidik hosil bo'lishi va ajralishi) kamyishi, tungi diurezning kunduzgidan ustunlik qilishi (nikturiya), teri orasiga yuborilgan 0,1 ml miqdordagi fiziologik eritmaning so'rilish tezligining oshishi (Mak-Klyur-Oldrich sinamasi) bo'yicha shishlarning yig'ilishi to'g'risida xulosa chiqariladi.

Keyinchalik oyoqlarda shishlar kechga tomon paydo bo'ladi. Ertalabga yaqin esa yo'qoladi. Borib-borib tungi dam olish kifoya qilmay qoladi. Shishlar boldir, son, dumba, qorin, ko'krakning teriosti yog' kletchatkasida yig'ilá borib, tananing pastida joylashgan qismlariga osonlikcha suriladi va bemor o'tirsaga, oyoqlari shishib qoladi, chalqancha yotsa, shishlar dumg'aza, dumba va sonlarning pastki yuzasiga to'planadi, asosan, bir yonboshni bosib yotilganda, shishlar ham shunga yarasha o'sha tomonda yig'iladi.

Yurak yetishmovchiligidagi shishlar, odatda, yumshoq bo'ladi — barmoq bilan bosinganda chuqurcha qoladi. Uzoq vaqtidan buyon mavjud shishlar qattiqroq bo'ladi. Shishgan teri qon bilan yetarlichcha ta'minlanmaydi, uning harorati past bo'ladi, teri silliq, yaltiroq infeksiyaga qarshilik qobiliyati pasaygan bo'ladi. Teriosti yog' kletchatkasidan tashqari, shish ichki organlarda — jigar, o'pka, me'da va boshqa organlarda rivojlanib, ularning funksiyasi buziladi. Shish suyuqligi qorin bo'shilig'ida — assit, ko'krak bo'shilig'ida — gidrotoraks, yurak xaltasi bo'shilig'ida — gidroperikard nomini olgan holda vujudga keladi.


Yo'tal va qon tuflash o'pka infarkti yoki pnevmoniya ko'rinishida asorat boshlanganligini ko'rsatadi. Dimlanishga aloqador bronxitda yo'tal avval quruq bo'ladi, keyinchalik yo'tal vaqtida seroz balg'am tushadi, borib-borib ko'pikli bo'lib qoladi, unda ipir-ipir qon paydo bo'ladi. Balg'ama qon har xil miqdorda uchraydi — mikroskopda tekshirilganda topiladigan alohida «Yurak poroklari hujayralari»dan tortib, o'pkadan bir talay qon ketishi mumkin.

Bemorni ko'zdan kechirish. Bemorning es-hushi, vaziyatiga ahamiyat berish kerak. Yurak kasalligi munosabati bilan hansirash

boshlanganida bemor o'tirib yoki o'rinda suyanib oladi. Bemorlarni tekshirish, asosan, ularning ahvoli, teri shilliq qavatlarining rangi, shishlar bor-yo'qligi va pereferik qon tomirlarini ko'zdan kechirishdan iboratdir. Bemorlarda ko'pincha lab, lunj, burun, qulqoq supralalarining ko'karib qolgani — sianozi, qo'l-oyoq barmoqlarining ko'kargani — akrosianoz qayd qilinadiki, bu gemoglobinning yetarlicha oksidlanmayotganini yoki qon oqimi susayib, to'qimalarning kislorodni ortiqcha yutayotganini ko'rsatadi.

Yurak sohasini ko'zdan kechirish yurak uchi zARBini aniqlashdan boshlanadi. Yurak uchining zarbi me'yorda ko'zga ko'rinmasligi mumkin, lekin ko'krak qafasi astenik shaklda bo'lgan ozg'in odamlarda bu zARB, odatda, beshinchı qovurg'a orasidagi ritmik pulsatsiya ko'rinishida sezilib turadi. Chap qorincha muskullari gipertrofiyalanganda bu qisqarishlar ancha sezilarli bo'ladi va kattaroq maydonni egallaydi.

Puls (lotin. *pulsus*—turtki) — tomir urishi. Yurak qisqarishi natijasida qon tomirlarining ritmik tebranishi kengayib-torayishi. Arterial venoz va kapillar puls tafsavut etiladi. Odatda, bilak arteriyasi sohasida paypaslab bilinadigan arterial puls eng katta amaliy ahamiyatga ega. Buning uchun tekshiruvchining bilagini, bilak-kaft usti bo'g'ini sohasini qo'l bilan shunday ushlash kerakki, bosh barmoq bilakning ichki tomonida, boshqa barmoqlar esa uning yuzasidagi pulsuvchi bilak arteriyasining paypaslantiruvchi terisini bosadigan bo'lsin (16-rasm).



16-rasm. Pulsni tekshirish nuqtalari:

1—tanada; 2—qo'l (bilak)da.

Sog'lom kishilarda pulsning tezligi yurak qisqarishi tezligiga mos bo'lib, bir minutda 60—80 marta tomir urishiga teng. Yurakning bir minutda 90 martadan ortiq qisqarishi — taxikardiya, 60 martadan kam qisqarishi — bradikardiya deb ataladi. Yurakning ba'zi kasalliklarda puls yurak qisqarishi tezligidan kam bo'lishi mumkin, bu puls deficitsidir. Bolalarda kattalarga nisbatan puls ortiqroq, qizlarda o'g'il bolalarga nisbatan birmuncha ortiqroq bo'ladi. Tunda puls kunduzgiga nisbatan kamroq bo'ladi. Jismoniy mehnat qilganda, nerv-emotsional reaksiyalarda puls ortadi.

Taxikardiya qon aylanish apparatining organizmni kislородга ehtiyoji ortishiga nisbatan bo'lgan moslanuv reaksiyasi bo'lib, organ va to'qimalarning qon bilan yuqori darajada ta'minlanishiga imkon beradi. Ammo chiniqtirilgan yurakning (masalan, sportchilarda) kompensator reaksiyasi taxikardiyaning ko'tarilishi bilan emas, balki yurak qisqarishining kuchayishi bilan ifodalanadi. Bu organizm uchun ancha qulayroqdir. Yurakning ko'pgina kasalliklari tana harorati ortishi, ba'zan zaharlanishlar taxikardiyani kuchaytiradi.

Bradikardiya yurakning ba'zi kasalliklarda, zaharlanishlarda, shuningdek, bir qator dorilar ta'sirida kuzatiladi. Sog'lom odamda puls ritmik (bir tekis), ya'ni puls to'lqlarini ma'lum vaqt oralig'ida sodir bo'ladi. Yurak ritmining buzilishi aritmiya deb ataladi, bunda puls to'lqlarini bir xil vaqt oralig'ida notekis bo'ladi. Pulsning tarangligi arterial qon bosimiga bog'liq gipertoniyada g'oyatda kuchayadi, gipotoniya va yurak kasalliklarda bo'shashadi. Pulsning to'liq yoki to'liq emasligi yurak qisqarishi kuchiga bog'liq. Pulsning boshqa o'ziga xos ko'pgina xususiyatlarini bilish bemorning ahvoli haqida to'liq ma'lumot beradi.

Palpatsiya. Yurak sohasini palpatsiya qilish yurak uchi zarbi seziladigan joyni hamda shu zARBning xarakterini bilib olishga, ko'krak qafasida deformatsiya («yurak bukrisi») bor-yo'qligini aniqlashga imkon beradi. Yurak uchining zarbi ko'tarilib qolgan (aortal poroklar, gipertoniyada), manfiy (bunda qorinchalar sistolasi vaqtida ko'krak qafasi do'mbayih chiqishi o'rniiga ichga tortilib turadi — adgeziv perikarditda), yoyilgan (yurak bo'limlari kengayib ketganida) bo'lishi mumkin. Past chastotali shovqinlarning akslanishida «fremissement cataire»ni, fransuzchadan tarjima qilganda «mushuk xirillashi» ma'nosini bildiruvchi hodisani aniqlash uchun palpatsiya qilib ko'rish katta ahamiyatga ega.

Perkussiya. Yurak sohasiga urib ko'rish yo'li bilan hosil qilinadigan tovushning xarakteriga qarab, nisbiy va mutlaq yurak o'tmasligini aniqlab, uning haqiqiy chegarasini topish mumkin.

Nisbiy yurak o'tmasligi yurakning haqiqiy chegarasiga to'g'ri keladi. Yurak nisbiy o'tmasligining normal chegaralari quyida-gillardir; o'ng chegarasi, to'shning o'ng qirrasidan 0,5—1 sm narida III qovurg'aning yuqori qirrasi oldida yurak chegarasi biroz ichkariga qiyshayib, to'shning o'ng qirrasi bo'ylab birinchi qovurg'a oralig'igacha boradi. Yurakning chap chegarasi uchinchi qovurg'a oralig'ida parasternal chiziqni kesib o'tkazadi va tashqariga bo'rtgan ravoq hosil qilib, beshinchi qovurg'a oralig'igacha tushadi.

Mutlaq yurak o'tmasligi chegaralari sekin perkussiya qilish usuli bilan aniqlanadi. Sog'lom odamda mutlaq o'tmaslikning o'ng chegarasi to'sh chap qirrasidan boshlab avvaliga IV qovurg'a tog'ayining pastki qirrasi, so'ng ravoq hosil qilib chap chegaraga o'tadi. Chap chegara tashqariga tomon pastga tushib, chap parasternal chiziq bo'ylab yoki uning orasi va o'rta o'mrov bo'ylab beshinchi qovurg'a orasiga yetib boradi hamda jigar o'tmasligi chegarasiga o'tadi. Mutlaq yurak o'tmasligi yurak qanchalik o'pka bilan yopilganini ko'rsatadi. Bu o'tmaslikning hajmi yurakning kattaligiga ham, o'pka qirralarining holatiga ham bog'liq bo'ladi. Yurak surilganda hamda u kattalashganda mutlaq va nisbiy chegaralar o'tmasligi o'zgaradi. Ba'zan yurak ko'krak qafasining o'ng tomonida joylashadi — dekstrakardiya (*dekstra* — o'ng, *kar* — yurak).

Auskultatsiya — yurakni eshitib ko'rish. Bu yurak-qon tomir sistemasini tekshirishda muhim usullardan biri hisoblanadi, ayniqsa, yurak nuqsonlarini aniqlashda eshitish va unga to'g'ri tashxis qo'yish boshqa tekshirish usullariga qaraganda afzallikka ega.

Yurakni eshitishda bemor har xil vaziyatlarda — tik turgan, chalqancha va chap yonboshi bilan yotgan holda eshitib ko'rildi. Yurakni eshitganda, odatda, ikki tovush farqlanadi, sog'lom yurakda ular bir-biridan pauza bilan ajralib turadi. Birinchi tovush sistola vaqtida vujudga keladi, shuning uchun u sistolik tovush deyiladi. Ikkinci tovush diastola vaqtida hosil bo'ladi, u diastolik tovush deyiladi.

Birinchi tovush — ikki va uch tavaqali klapanlarning yopilishidan, o'ng va chap qorincha muskullarining taranglashishidan; aorta va o'pka arteriyasi devorining tebranishidan hamda bo'lmacha muskullarining taranglashishidan eshitiladi. Asosan, yurak uchida ancha kuchli va kalta birinchi tovush eshitiladi. Ikkinci tovush

yarimoysimon aorta va o'pka arteriyasi klapanlarining yopilishidan va shu tomirlar boshlanish qismining tebranishidan hosil bo'ladi. U baland va qisqa bo'ladi. Ikkinci tovush yurak asosida, o'pka arteriyasi va aorta yarimoysimon klapanlari proyeksiyalanadigan yerda ancha ravon eshitiladi. Yurak tovushlari kuchayishi-pasayishi mumkin.

Ko'krak qafasi old devori qalinchashganda, u shishganda, kishi semirganda yurak tovushlarining kuchi va aniqligi pasayadi, qo'shni organlar shikastlanganda — o'pka emfizemasi, yiringli plevrit, perikarditda, yurak mushaklarining o'zi shikastlanganda — o'tkir miokardit, kardiosklerozda ham bu hol kuzatiladi. Ko'krak qafasining old devori yupqalashganda, masalan, kishi ozganda, o'pka qirralari qisqarganda, jismoniy ish bajarilganda, asab qo'zg'al-ganda, Bazedov kasalligida yurakning barcha tovushlari kuchaygan bo'lib, aniq eshitiladi.

Yurak shovqinlari. Shovqinlarning hosil bo'lishida ikki omil — qon oqimining toraygan teshik orqali o'tishi va qon oqimi tezligining ortishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar qon bir bo'shliqdan ikkinchisiga yurak qisqarishi yetarli bo'lgan taqdirda toraygan teshik orqali o'tsa, u holda qon harakatida girdoblar hosil bo'lib, ular ushbu bo'shtiq devorini toraytiradi va shovqin hosil qiladi.

Teshik qancha tor bo'lsa, shovqin shuncha kuchli bo'ladi. Teshik torayganda qonning undan o'tishi juda sekinlashib qoladi, shuning uchun shovqin pasayishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin. Shovqin yurakning qisqarish kuchiga ham bog'liq, qisqarishlar kuchi oshganda shovqin kuchayadi, qisqarish kuchi pasayganda shovqin sekinlashadi. Qorinchalar sistolasi paytida eshitiladigan shovqinlar sistolik shovqin, qorincha diastolasi paytidagisi diastolik shovqin deb ataladi.

Sistolik shovqin ikki tavaqali va uch tavaqali klapanlar yetishmovchiligida, aorta va o'pka arteriyasi teshiklari torayganda eshitiladi. Diastolik shovqinlar yurakning o'ng va chap bo'lmacha — qorincha teshiklari torayganda, aorta va o'pka arteriyasi klapanlari yetishmovchiligida eshitiladi.

Chap bo'lmacha — qorincha teshigi torayganda shovqin, odatda, diastolaning eng oxirida, ya'ni sistola boshlanishidan oldin eshitiladi, shuning uchun bunday shovqin presistolik shovqin deb ataladi. Shovqinlar yurak tovushlari eshitiladigan nuqtalarda ham eshitiladi. Shovqinlar faqat ko'rsatilgan nuqtalardagina eshitilib qolmaydi, ular qon oqimi bo'ylab ham yaxshi tarqaladi.

Funksional shovqinlar kamqonlik, yuqumli kasalliklar, asab qo'zg'alishida paydo bo'ladi. Ular bo'lmacha-qorincha teshigini o'rab turuvchi kapillar mushaklar yoki mushak tolalarining oziqlanishi yoki innervatsiyasi buzilganda yoki qon oqimi tezlashganda, masalan, kamqonlik, tireotoksikozda paydo bo'ladi. Funksional shovqin, deyarli hamma vaqt sistolik bo'ladi. Jismoniy ish vaqtida funksional shovqin susayadi, organik shovqin esa kuchayadi. Organik shovqinlar qon oqimi bilan yaxshi o'tkaziladi, funksional uzatilmaydi yoki yomon o'tkaziladi.

Organik shovqinlar barqaror, funksional shovqin o'zgaruvchan. Organik shovqinlar yurak nuqsonining turiga qarab ancha aniq joylashadi, funksional shovqin esa hamma nuqtalarda eshitiladi, yurak asosida kuchliroq bo'ladi.

Perikard ishqalanish shovqini yurakoldi xaltasi pardalari (perikard) yallig'langanda kuzatiladi va ularda ba'zan fibrin o'tirib qoladi. Perikard bo'shlig'ida ko'p miqdorda suyuqlik to'planganda perikardial shovqin ko'pincha yo'qolmaydi, chunki bunda suyuqlik perikard bo'shlig'inining orqa tomonida va yurakning yon tomonlarida joylashgan bo'ladi. Perikard bo'shlig'ida ko'p miqdorda suyuqlik to'planganda va bu bo'shliqning hamma yerini to'ldirganda perikard ishqalanishi shovqini eshitilmaydi.

6.3. Yurak-qon tomirlar tizimi kasalliklarini asbob-uskunalar yordamida tekshirish

6.3.1. Arterial qon bosimini o'lchash texnikasi

Sog'iom odamda arterial bosim murakkab neyrogumoral regulatsiya tufayli doim bir me'yorda turadi va asosan, yurak qisqarishining kuchiga va tomirlar tonusiga bog'liq bo'ladi.

Qon bosimi qonning tomirlar sistemasi bo'ylab oqishiga imkon beradi va shu bilan organizm to'qimalarida moddalar almashinuvini ta'minlaydi. Arterial bosimning yuqori yoki past bo'lishi, asosan, yurak qisqarishlari kuchi va yurakning har qisqarganda tomirlarga haydaydigan qon miqdori, tomirlar devorining qon oqimiga ko'rsatadigan qarshiligi va kamroq darajada vaqt birligida yurak qisqarishlarining soni bilan belgilanadi. Yurakning chap qorinchasi qisqarganda (sistola) arterial bosim maksimal darajaga yetadi. Bu jarayonda yurakdan 70 ml qon oqib chiqariladi. Buncha miqdor qon birdaniga mayda qon tomirlari (ayniqsa, kapillar) orqali o'tib

ketolmaydi. Shuning uchun elastik aorta kengayadi, undagi bosim (sistolik bosim) esa ortadi. Sog'lom odamda u yirik arteriyalarda 110—130 mm simob ustuniga yetadi.

Yurak qorinchalarining qisqarishlari orasidagi pauza (ya'ni diastola) vaqtida kengaygan qon tomirlari (aorta va yirik arteriyalar)ning devori qisqara boshlab, qonni kapillarlarga haydaydi. Qon bosimi asta-sekin pasayib, diastola oxirida minimal darajaga tushadi (aorta 90 mm simob ustuni, yirik arteriyalarda 70 mm simob ustuni atrofida bo'ladi). Sistolik va diastolik bosimlar kattaligi o'rtasidagi farqni, aniqrog'i, ular o'chamidagi o'zgarishlar fargini biz puls to'lqini sifatida sezamiz. Qon tomirlaridagi bosim yurakdan uzoqlashgan sari pasayib boradi. Masalan, aortada bosim 140/90 mm simob ustuniga teng — birinchi raqam sistolik yoki yuqori, ikkinchisi esa diastolik yoki pastki bosimni anglatadi. Yirik arteriyalarda qon bosimi o'rta hisobda 110/70 mm simob ustuniga teng.


Arteriyalarda sistolik va diastolik bosimlar o'rtasida farq bo'lmaydi va qon bosim taxminan 40 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Kapillarlarda qon bosimi 10—15 mm simob ustunigacha pasayadi. Qonning venoz o'zaniga o'tishida qon bosimi yanada ko'proq kamayadi va eng yirik venalarda (yuqori va pastki kovak venalarda) qon bosimi manfiy ko'rsatkichlarga ham yetishi mumkin.

O'chash texnikasi. Arterial qon bosimini o'chashda Riva-Rochching simobli sfigmomanometridan yoki prujinali manometrdan foydalilanildi. Bu apparat quyidagi qismlardan iborat: bog'ichli uzun mato g'ilofga joylangan, 12—14 sm kenglikdagi ichi bo'sh rezina manjeta; shkalasi 250 mm.gacha bo'lgan simobli manometr (prujinali manometr); havo yuboradigan rezina ballon. Manjeta va manometr havoni chiqarish uchun xizmat qiladigan kranli ballonga rezina naychalar bilan ulanadi (17-rasm).

O'chash vaqtida bemor o'tirishi yoki yotishi mumkin. Uning qo'lini kiyimlardan, ayniqsa, yengi tor kiyimdan bo'shatish lozim. Qo'lni stol yoki karavot chetiga taxminan yurak damiga keltirib, kaft tomonini yuqoriga qilib qo'yiladi, uning mushaklari bo'shashgan holatda bo'lishi kerak.

Apparatni qo'l bilan bir sathda turadigan qilib o'rnatish lozim. Arterial bosim N.S. Korotkov usuli bo'yicha quyidagicha qilib o'chanadi.

Manjeta tirsakdan yuqoriga unchalik mahkam qilmasdan, tagiga barmoq sig'adigan qilib o'raladi. Manjetaning pastki cheti tirsak bo'g'inidan 2,5 sm yuqorida bo'lishi kerak. Tirsak arteriyasidan



17-rasm. Arterial bosimni o'Ichash.

puls ushlab topiladi va shu joyga fonendoskopni qattiq bosmasdan zinch qilib qo'yib eshitiladi. Manjetaga asta-sekin havo beriladi, eshitib ko'rildi va tovushlar yo'qolgandan keyin simob ustuni yana 30—40 mm.ga ko'tariladi. Bu vaqtiga kelib, manjeta arteriyani batamom bosib qo'yadi. Ballondagi vintcha biroz ochiladi va manjetadagi simob sathi unchalik tez pasaymaydigan qilib, havo chiqariladi, ayni vaqtida manjetada bosim kamayib boradi. Diqqat bilan quloq solinadi. Manjetadagi bosim arteriyadagi qon bosimidan salgina pasayishi bilan qon arteriyaning bosilgan joyidan o'tish imkoniga ega bo'ladi va birinchi tovushlar — tonlar paydo bo'ladi.

Ton paydo bo'lgan vaqtidagi bosim sistolik (maksimal) bosim deyiladi. U sistola vaqtida qonning arteriya devorini bosishi natijasida vujudga keladi.

Shkalaga qarab, shu bosim qayd qilinadi. Arteriya birmuncha bosilib turar ekan tovushlar avvaliga tonlar, keyin shovqinlar va yana tonlar eshitilib turadi. Arteriyaga manjetadan tushadigan bosim to'xtashi va uning bo'shlig'i batamom tiklanishi bilan tovushlar yo'qoladi. Tonlarning yo'qolish vaqtidagi bosim diastolik (minimal) bosim deb qayd qilinadi, bu qonning diastola vaqtida arteriya devoriga ko'rsatadigan bosimdir. O'Ichashni 2—3 minut oralatib yana takrorlash va uch marta o'Ichashda hosil bo'lgan eng kichik

raqamlarni olish kerak. O'Ichashlar orasidagi muddat ichida manjeta yechilmaydi, biroq undan havo batamom chiqarib yuboriladi.

Bosim kasr ko'rinishida yozib boriladi. Suratda — sistolik bosim, maxrajda esa diastolik bosim yoziladi. Normal arterial bosim yoshta, tashqi muhit sharoitlariga, nerv va jismoniy ish darajasiga va h.k.larga qarab o'zgarib turadi.

Sog'lom odamda sistolik bosim o'rtaliga hisobda 120 mm simob ustuniga teng bo'lib, 110 dan 130 mm.gacha o'zgarib turadi, diastolik bosim 70 mm bo'lib, simob ustunining 60 dan 80 mm.gacha o'zgarib turadi (ayrim bir adabiyotlarni ko'rsatmasi bo'yicha sharoit o'zgarishi bilan maksimal bosim 160 mm simob ustunida, minimal bosim 90 mm.dan oshmasligi kerak). Turli-tuman kasalliklarda arterial bosim o'zgarib me'yordan oshib ketishi (gipertoniya) yoki pasayib ketishi (gipotoniya) mumkin. Bunda sistolik bosim 200—250 mm simob ustuni va bundan yuqori bo'ladi, diastolik bosim esa 120—160 mm simob ustuniga chiqadi.

Gipotoniya kollaps va shokda, yuqumli kasalliklarda, bronza kasalligida va ba'zi bir boshqa kasalliklarda kuzatiladi.

6.3.2. Fonokardiografiya (FKG)

Yurakda paydo bo'ladigan tovushlarni yozib olish usuli fonokardiografiya deyiladi. Fonokardiografiya yurakni eshitishni almashtirmasdan, balki uni to'ldiradi, yurakdagagi past chastotali tovushlarni aniqlashga yordam beradi.

Fonokardiograf mikrofon, kuchaytirgich, chastotali suzgichlar va yozib oluvchi qurilmalardan iborat. Mikrofon tovush tebranishlarini elektr hodisasiga aylantirib beradi, chastotali suzgichlari esa tovush tebranishlarini past, o'rtaliga va yuqori chastotada alohida yozib olishga imkon beradi. Bir vaqtning o'zida ikkinchi standart ulanishda EKGni yozib olish zarur.

Eshitish usuli bilan yozish nuqtalari oldindan belgilanadi. EKG qilinayotgan xonada mutlaqo jimpitlik bo'lishi zarur. Mikrofon ko'krak qafasidagi eshitish nuqtalariga mustahkamlanadi. Bu nuqtalar yurak uchida, o'ng va chap tomonidagi II qovurg'a oralig'ining to'sh suyagiga yaqin joyida, V qovurg'a oralig'ining to'sh suyagiga yaqin joyida va Botkin nuqtasida deb hisoblanadi. Nafas shovqinlari FKGga tushmasligi uchun u nafas chiqarilgan paytda yozib olinadi.

FKGni tahlil qilganda diqqatni tovushlarning davomliligidagi, ularni kengligiga va EKG tishlari bilan mos kelishiga qaratish kerak. FKG tebranishining kattaligi faqat yurak ishiga bog'liq bo'lmay,

balki tovush o'tkazish sharoitiga ham bog'liq. Ko'krak qafasi qalin bo'lganda, semirishda, o'pka emfizemasida tovushlarning tebranish kengligi pasayadi.

FKGga qarab tovushlarning pasayishi, kuchayishi, bo'linishi hamda shovqinlarni ta'riflash haqida fikr yuritish mumkin. Sistolik davrda yozib olingen shovqin yurak uchida yoki xanjarsimon murtagi asosida bo'lsa, ikki tavaqali yoki uch tavaqali klapan yetishmovchiligidan darak beradi. Yurak asosida yozib olingen qisqarish shovqini aortaning chiqish joyi yoki o'pka arteriyasining torayishidan bo'lishi mumkin.

Diastola davrida yozib olingen shovqinlar diastolik shovqin deyiladi. Aorta yetishmovchiligidan diastolik shovqin yuqori, mitral torayishida esa past chastotali yo'nalish yaxshi yozib olinadi. Organik va funksional shovqinlar ham yozib olinadi.

6.3.3. Sfigmografiya (SMG)

Sfigmografiya — tomir urishi tebranishlarini grafik tarzda yozib olish. Sfigmogrammani hamma arteriyalardan yozib olish mumkin. Ko'pincha sfigmogramma uyqu va o'mrov arteriyalaridan yozib olinadi. Sfigmogrammada yuqoriga ko'tariluvchi katta egri chiziq (cho'qqi tizzasi) — anakrotga va anchagina yassi chiziq (pastga tushuvchi tizza) katakrotga bo'linadi.

Katakrot qismda o'yiqcha va dikrotik ikkilamchi to'lqin yozib olinadi, bu markaziy sfigmogrammada ancha rivojlangan bo'ladi. Bu aorta klapanlarining yopilishi natijasida qon to'qimalarining teskari yo'nalishidan hosil bo'ladi.

Sfigmogrammaga baho berishda tomir urishi to'lqinlarining shakliga, ularning tebranish kattaligiga, ikkilamchi dikrotik to'lqin kattaligiga diqqatni qaratish kerak. Tomir urishi (puls) to'lqinlari tezligini aniqlash uchun uyqu arteriyasida markaziy tomir urishi va qon arteriyasida chetki tomir urishi sfigmografiya qilinadi. Odatda, u 4,5 dan 8 metrgacha bo'ladi. Gipertoniya kasalligida, atersklerozda puls to'lqinlari tezlashadi, aorta yetishmovchiligidan u sekinlashadi.

6.3.4. Ossillografiya

Ossillografiya — arteriyaga tashqi bosimni har xil darajada ta'sir ettirib, tomir urishi to'lqinini grafik usulda yozib olish. Bunda tekshiriluvchi arteriya ossillografning *O* nuqtasi to'g'risida bo'lishi kerak. Ko'pincha tekshirish yelka, boldir, son arteriyalarida ikki tomonlama olib boriladi.

Manjetka qisqichiga tomir urishi yo'qolguncha havo yuboriladi. So'ngra havo asta-sekin chiqariladi. Manjetkadagi bosim arteriya bosimiga teng bo'lganda ossillogrammaning to'g'ri chizig'ida birinchi tomir urish to'lqinlari yozib olinadi — bu sistolik arterial bosim, bosim pasayishi jarayonida tebranish kengligi ortib boradi.

Eng katta tebranish o'rtacha arterial bosimga mos keladi. Dinamik yoki o'rtacha bosim bu doimiy bosim bo'lib, tomirlardagi qonning harakatini tomir urishisiz ham o'sha tezlikda ta'minlashi mumkin. U 80—100 mm simob ustuniga teng. Tebranish asta-sekin kamayib borib, diastolik arterial bosimga teng bo'lib qoladi. Eng yuqori tebranishning ossillografik raqami mm.da aniqlanadi.

6.3.5. Ballistikardiografiya (BKG)

Ballistikardiografiya — yurak faoliyati bilan bog'liq bo'lgan va elektr signaliga aylantiriladigan mexanik tebranishlarini yozib olishga aytildi. Ballistikardiografiyada yurakning har galgi, ya'ni qator to'lqinlari yozib olinadi. Ular lotin harfi bilan belgilanadi.

H, I, U, K — sistolik to'lqinlar, *Z, M, N, O* esa diastolik to'lqinlar hisoblanadi. BXG, EKG bilan baravar sinxron tarzda yoziladi.

BXG to'lqinlarining kengligi nafas olish davriga bog'liq bo'lib, tebranishlarga moyil bo'ladi. To'lqin kengligi nafas olishda ortib, nafas chiqarishda kamayadi. Turli kasallikkarda to'lqinlarning shakli, davomliligi, kengligi va nafas tebranishining to'lqinlari o'zgaradi. Muskullarning qisqarish qobiliyati buzilganda, qon aylanishi yetishmovchiligidagi rivojlanib, bo'shashish to'lqinlari ancha kattalashadi.

6.3.6. Exokardiografiya (EXKG)

Exokardiografiya — yurak-tomir sistemasining ultratovush tebranishlarini yuborish va qaytgan impulslarni qabul qilishiga tushuniladi. Exokardiografiya yordamida aorta teshigi, chap bo'l machaning kengligi, yurak klapanlarining holati, chap qorincha tasviri, sistola va diastola vaqtida chap qorinchadagi qonning hajmi, chap qorincha devorining qalinligi, qorinchalar orasidagi to'siqning holatini aniqlash mumkin.

Exokardiografik skanerlash orqali muskullarning funksional holatini aniqlash mumkin. Qo'shimcha jismoniy zo'riqtirish orqali sog'lom odamlarda, mashq qilmagan sog'lom odamlarda va qon aylanishi yetishmovchiligining boshlang'ich davrini boshdan kechirgan bemorlarda tekshirish o'tkaziladi.

Yurakning rivojlangan shikastlanishi va uning tarqalishi hozirgi kunda yurak kateteri orqali tekshiriladi. Bunda alohida zond yelka, o'mrovosti, nomsiz va yuqori kovak venaga o'ng bo'l macha, o'ng qorincha va o'pka arteriyasi tanasiga yuboriladi. Bu tomirlarning kengligi va yo'nali shini, yurak bo'shlari dagi hamda o'pka arteriya-sidagi bosimni aniqlashga yordam beradi. Bu vaqtida yurak bo'shlig'ida EXKG yozib olish mumkin. Yurak-tomir sistemasining turli qis-midan ma'lum miqdorda qon olib, undagi kislorod va karbonat angidrid gazi miqdorini tekshirish mumkin.

6.3.7. Koronarografiya (KG)

Koronarografiya — kontrast modda yuborish yo'li bilan toj tomirdagi o'zgarishni, to'silib qolishni, kollateral va ulardagi qonning harakatini o'rganishni aniqlashga imkon beradi.

6.3.8. Kapillaroskopiya (KPG)

Kapillaroskopiya — mikroskop yordamida qil tomir (kapillar)larni tekshirish usuli. Tekshirishni terining hamma qismida olib borish mumkin. Ko'pincha nozik terida joylashgan qil tomirlar tekshiriladi. Mikroskop ostidagi maydonning rangiga, muhitiga, tekshiriluvchi barmoqlar kapillarlari soniga, ularni shakliga, arteriya va vena teshigining kengligiga, ularning egri-bugriligiga va qon harakatiga diqqat beriladi.

Odatda, maydon to'q bo'lib, qil tomirlar to'q pushti yoki qizil bo'ladi. Ularda qator joylashadi. Sovuqda qil tomirlar torayadi va qon oqishi sekinlashadi. Issiqda esa kengayadi va qon harakati tezlashadi.

Arteriya bosimi oshganda (gipertoniya kasalligida, nefritda), halqaning egri-bugriliqi, uzunligi ortadi, arteriya qismi torayadi. Shish vaqtida muhit xira bo'lib, qil tomirlar aniq ko'rinxaydi, ularni soni va kengligi kamayadi. Angionevrozda (qon tomirlar nevrozida) qil tomirlar teshigi o'zgaruvchan bo'lib, ko'pincha torayish va kengayish almashinib turadi.

6.3.9. Qon aylanish a'zolarini rentgenologik tekshirish

Bemorni ekranga qo'yib, uning ko'krak qafasi yoritib ko'rlisa, yurakning ba'zi bo'limlari soyasinigina ko'rish mumkin. Yurakning barcha bo'limlarini ko'rish uchun bemorni yonbosh proyek-siyalarda, ya'ni birinchi qiya holatda — bemorning o'ng yelkasini

ekranga qaratib qo'yib va ikkinchi qiya holatda — bemorning chap yelkasini ekranga qaratib qo'yib tekshirish zarur.

Tekshirish boshida bemor ekranga qaratib qo'yiladi — old holat. Bunday holatda sog'lom odamda o'ng tomonda ikki ravoqni ko'rish mumkin, bularning ustkisini yuqori kovak venasi soyasi, pastdagisini yurakning o'ng bo'lmasi soyasi hosil qiladi. Chapdan to'rtta ravoq ko'rindi, ulardan birinchisi (ustkisi) aorta soyasiga, ikkinchisi — o'pka arteriyasi soyasiga, uchinchisi — yurakning chap bo'lmasi qulqchalari soyasiga va eng pastki to'rtinchisi yurakning chap qorinchesi soyasiga to'g'ri keladi. Agar bemor birinchi qiya holatda (o'ng yelkasini ekranga qaratib) tursa, yurakning o'ng konturi yuqori qismi chap yurak bo'lmasi soyasidan hosil bo'ladi. Bu holatda yurak soyasi bilan umurtqa pog'onasi soyasi orasida yorug' yo'l ko'rindi, uni retrokardial bo'shliq deyiladi. Bu bo'shliq yurakning chap bo'lmasi kattalashganda torayishi yoki butunlay bekilib qolishi mumkin.

Ikkinci qiya holatda (chap yelka ekranga qaraganda) yurakning o'ng pastki konturi o'ng qorincha hisohiga hosil bo'ladi. Yurakning hamma bo'limlari kengayadigan yurak kasalliklarida yurakning soyasi hamma tomonda kattalashadi. Bunda yurak bo'lmalarning ham, qorinchalarining ham pulsatsiyasi saqlanib qoladi. Agar perikard bo'shlig'ida suyuqlik to'plansa, unda yurak soyasi keskin kattalashadi, uning konturlaridan iborat ravoqlar tekislanadi va yurak pulsatsiyasi zo'rg'a bilinadi va yoki butunlay bilinmay qoladi.

Aorta anevrizmida pulsatsiya lanayotgan va aorta bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha soyani kuzatish mumkin. Aorta sklerozida uning soyasi kengayadi va ancha intensiv bo'lib qoladi.

6.4. Revmatizm

Revmatizm (yunon. *revmatismos* — shilliq) — biriktiruvchi to'qimaning keng tarqalgan yallig'lanib shikastlanishi bo'lib, ko'pincha yurak-tomir bo'g'inlar va hoshqa organlar sistemasida joylashishi bilan xarakterlanuvchi infeksion-allergik kasallikdir.

1838-yilda rus shifokori G.I. Sokolskiy va fransuz Buyo bo'g'in revmatizmi o'tkir xurujining klinikasi bilan davosini birinchi marta tasvirlab, bu kasallikning yurak shikastlanishiga aloqador bo'lishini aniqlab berishgan. Revmatizm bilan bolalar va o'smirlar hamidan ko'proq kasallanadi. Bunday xastalik bilan ayollar erkaklarga qaraganda 1,5—2 barobar ko'p og'riydlar.

Etiologiyasi. Revmatizm ilgari boshdan kechirilgan streptokokk infeksiyalari, masalan, angina, xronik tonsillit, otit, faringit, yuqori nafas yo'llari katari va boshqa organlarning yallig'lanishidan keyin kelib chiqadi. Revmatizm rivojlanishida tashqi muhit omillari, sovqotish, charchash, immunitetning pasayishi, streptokokka sezuvchanlik, kasb-kor, turar joy, jins, yosh, epidemiologik sharoitlar asosiy omillardan hisoblanadi.

Kasallikni avj olishida streptokokk asosiy rol o'ynaydi. Antigenlar kirishiga javoban organizmda antitelolar hosil bo'lib, bular antigenlar bilan birikadi va ularni neytrallaydi. Me'yordagi mana shu himoya reaksiyasi immunitet deb ataladi. Streptokokk infeksiyasi yuqqan odamlarning taxminan 1—3 % ida bu jarayon, ya'ni antigen kirishi va antitelolar hosil bo'lishi immunitet paydo bo'lishi bilan tugallanmaydi. Sensibilizatsiya tobora kuchayib boradi, ya'ni organizmgaga spetsifik antigenlargina emas, balki nospetsifik antigenlar ham ortiqcha miqdorda kiraveradi.

Shuning natijasida organizmning biriktiruvchi to'qima sistemasida og'ir yallig'lanish reaksiyasi—klinik jihatdan tana harorati ko'tarilishi leykositoz bilan, eritrotsitlar cho'kish reaksiyasingin tezlashuvi va boshqa belgilar bilan harakatlanadigan giperergik reaksiya kelib chiqadi. Revmatizmda antistreptokinaza, antistreptolizin va boshqalarning titri oshib, stereptokokk antigeni bilan qo'yilgan teriichi sinamalari musbat natija beradi.

Streptokokk infeksiyasi faqatgina organizm maxsus individual reaktivlikka ega bo'lganida, unga shamollash, ortiqcha jismoniy ish va asab qo'zg'alishi, ovqatlanish tartibining buzilishi, boshdan kechirilgan kasalliklar kabi noqulay sharoitlar qo'shilganda revmatizmga olib keladi. Immunitet hosil qilishning individual xususiyatlari tufayli, organizmning himoya kuchlari kamayadi va o'choqli streptokokk infeksiyasi mavjud bo'lganda revmatizm kasalligining rivojlanishiga olib keluvchi patologik (allergik) reaktivlik ishlanadi.

Revmatizm turli organ va sistemalarni shikastlovchi butun organizmning kasalligidir. Kasallikning klinik ko'rinishi xarakterlidir.

Klinikasi. Kasallik o'tkir boshlanadi. Angina va boshqa streptokokk infeksiyasi qo'zg'agan kasallikdan keyin 10—14 kun o'tgach, harorat yana ko'tariladi. Og'riq paydo bo'ladi, tirsak, bilak-kaftusti, tizza, boldir-oyoq panjasи bo'g'inlari va boshqa bo'g'inlar qizarib, shishib chiqadi (revmatik poliartrit). Bunda bo'g'inlarning zararlanshi turg'un bo'lmaydi, 10—12 kun o'tgach poliartritning hamma

alomatlari yo'qolib ketadi. Lekin bunday tuzalish vaqtincha, chunki ayni vaqtida yurak (muskul qavati, tashqi va ichki pardalari) ham zararlanadi. Klapanlarning revmatik zararlanishi ularning turg'un deformatsiyasiga va yurak porogi paydo bo'lishiga olib boradi.

Kasallik ikki — asosiy faol va sust bosqichga ajratiladi. Bu kasallik, o'tkir, yarimo'tkir holda, o'tishi cho'ziladigan, tinmay qaytalanib turadigan va yashirin bo'lishi mumkin.

Kasallikning o'tkir turida tana harorati 38—40°C ga ko'tarilishi bilan boshlanadi, shu bilan birga, talay bo'g'inlarning zararlanishi bilan birga davom etib boradi, bo'g'inlarda sal harakat qilganda, hatto biror narsa tegib ketganda ham kuchayuvchi kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bir necha soat ichida bo'g'inlar shishib ketadi, ular sirtida ekssudat paydo bo'ladi. Shikastlangan bo'g'in ustidagi teri qizaradi, harorati ko'tariladi. Yallig'lanishning beshta afomati (yallig'langan joyning qizarishi, shishishi, haroratning ko'tarilishi, og'riq paydo bo'lishi, funksiyasining buzilishi) paydo bo'ladi.

Ko'pincha yirik bo'g'inlar shikastlanadi. Bo'g'inlar kuchli og'rigani uchun bemor o'rniда deyarli qimirlamay yotadi. Tananing yuqori haroratda bo'lishi, intoksikatsiya va og'riqlar, ishtahaning yo'qolishiga, uyqusizlikka va kishining yotib qolishiga olib keladi. Yurak eshitib ko'rilganda tonlar bo'g'iqroq bo'lib qoladi, uning tezlashgani ma'lum bo'ladi.

Shikastlanishning ko'chuvchanligi, ya'ni yallig'lanish jarayonining bir bo'g'indan ikkinchisiga o'tishi, shikastlanishning ko'pligi ularning xarakterli belgilardan biridir.

Revmatizmning yarimo'tkir turida bo'g'inlarda yallig'lanish jarayoni ham ifodalanadi, tana harorati subfebril bo'ladi. Ba'zi bemorlarning bo'g'inlari yallig'lanmaydi. Ularda faqat og'riqning o'zi (artralgiya) kuzatiladi. Yashirin (latent) turida, odatda, streptokokk infeksiyasi tugab, revmatizm xuruji boshlanguncha 2—4 hafta davom etadi. Bu davrda tana sezuvchanligi oshib, birikti-ruvchi to'qimaning toksik-infektion shikastlanishi va streptokokk antigeniga javoban immun siljishlar ro'y berishi natijasida bo'ladi. Bu davr yo klinik belgilarsiz, yoki cho'zilgan angina, surunkali tonsillitdan kechikib tuzalishga xos belgilar. O'zini yomon his qilish, terlash, artralgiyalar, subfebrilitet bilan kechadi.

Qarilarda revmatik poliartrit cho'zilib ketishi mumkin, bunda og'riq, harakatning chegaralanishi, ba'zan uncha ifodalanmagan bo'g'inlar shishi bir necha oy davomida kuzatiladi, lekin keyinchalik butunlay yo'qoladi. Kasallik oqibati bo'g'inlardagi belgilar

intensivligiga emas, balki yurak-tomir sistemasining shikastlanishi darajasiga bog'liq bo'ladi.

Revmatik jarayon ichki a'zolar — o'pka, jigar, buyraklarda, shuningdek, ichki sekretsiya, qalqonsimon bez, buyrakusti bezlari va boshqalarda avj olib borishi mumkin. Revmatizmning teri turi kapillarlar zararlanishining ifodasıdir, bu kasallikda kapillarlar amalda hamisha o'zgargan bo'ladi. Teri va teriosti kletchatkasida aksari mayda-mayda qontalashlar paydo bo'ladi.

Revmatizm bilan og'rigan ba'zi kasallar bilagi yoki boldirining tashqi yuzasi terisida kattaligi olchadek keladigan to'q qizil rangli zichlashmalar paydo bo'ladi, bular teri ustida ko'tarilib turadi. Markaziy asab sistemasining jarohatlanishi bilan o'tadigan revmatizmda miya pardalari va miya moddasi zararlanadi. Revmatizmning bu turi aksari xoreya ko'rinishida namoyon bo'ladi, u asosan, bolalar va o'smirlarda kuzatiladi. Xoreya ko'ndalang-targ'il mushaklarning tortishib-qisqarib turishi bilan ifodalanadi.

Laboratoriya tahlili: qonda leykositoz, eritrotsitlarning cho'kish tezligi kuchayganligi, revmatizmni aniqlash uchun qilingan sinama musbat ekanligi aniqlanadi. Neytrofillar, ayniqsa, tayoqchasimon yadrolar miqdori ortgan bo'ladi.

6.5. Revmokardit

Revmatik kardit (yunon. *kardia* — yurak) — revmatizm oqibatida kelib chiqadigan yurak kasalligidir. Revmokarditda yurakning hamma qavatlari — endokard (endokardit), miokard (miokardit) va perikard (perikardit) u yoki bu darajada shikastlanadi.

O'tishiga qarab birlamchi va qaytalama revmokardit tafovut qilinadi. Qaytalama revmokardit avvalgi yurak porogi yoki miokardioskleroz ustiga paydo bo'ladi.

Revmokardit dastlab xuruj qilganda (revma ataka) yurakda aytarli o'zgarish paydo bo'lmaydi, lekin elektrokardiogramma qilib ko'rildigandagina shu o'zgarishlarning ba'zilari qayd qilinadi. Revmokardit yengil kechganda (bo'g'inlar yallig'lanmay, kasallik belgilari ro'y-rost ko'rinnaganda) kasallik bemorni bezovta qilmay, o'tib ketishi ham mumkin, shunga qaramasdan, yurakda jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Shuning uchun ham revmatizmning dastlabki alomatlari vujudga kelganda darhol shifokorga murojaat qilish zarur. Revmokardit qaytalaganda hemorning ahvoli og'irlashadi, qon aylanishi buziladi, shuningdek, yurak porogi va miokardda chandiqli o'zgarishlar paydo bo'lishi kuzatiladi.

Endokardit (yunon. *endon* — ichki, ichkarida va *kardia* — yurak) — yurak ichki pardasi (endokard)ning yallig'lanishiga endokardit deyiladi. Ko'pincha revmatizm oqibatida kelib chiqadi. Bundan tashqari, sepsis, zaxm, sil, miokard infarkti natijasida ham yuzaga keladi. Endokarditda ko'pincha yurak klapanlariga putur yetadi, natijada uning tuzilishi va funksiyasida qayta tiklanmaydigan o'zgarishlar yuz beradi. Bu esa yurak porogiga olib keladi. Endokardit seziladigan umumiy klinik simptomlarsiz, yashirin holda o'tishi mumkin. Bunda paydo bo'lgan porok tasodifan ma'lum bo'lib qoladi.

Revmatik jarayon o'tkir o'tganida umumiy klinik alomatlar — haroratning ko'tarilishi, kasal rangining oqarganligi, darmonsizlik, eritrotsitlarning cho'kish tezligining ortishi, kamquvvatlik, haddan tashqari tez charchash, yurak sohasida noxushlik sezish, yurak o'ynashi kuzatiladi. Sistolik shovqin paydo bo'ladi. Shunisi xarakterligi, keyinchalik, hemorning ahvoli yaxshilanib qolganiga qaramasdan, bu shovqin birmuncha kuchayadi va uzoqroq davom etadigan bo'lib qoladi.

Ko'pchilik hollarda revmatik endokardit mitral klapanni shikastlantirib, uning yetishmaydigan bo'lib qolishiga olib keladi. Keyinchalik yallig'lanish jarayoni boshqa klapanlarga ham tarqaladi. Revmatik endokarditning qaytalanishi va kombinatsiyalangan yurak poroklari hamda ro'y-rost miokardioskleroz paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Miokardit (yunon. *myos* — muskul va *kardia* — yurak) yurak muskul qavatining yallig'lanishi. Revmatizm oqibatida kelib chiqadi, ba'zi bir qator yuqumli kasalliklar — difteriya, ich terlama, angina, skarlatina (qizilcha), sepsis, gripp oqibatida ham yuzaga kelishi mumkin. Yurak muskullarining revmatizm natijasida yallig'lanishi ko'pincha endokardit bilan birga o'tadi. Miokard mikroblar har xil dori-darmonlar va ularning ishlab chiqargan mahsulotlariga o'ta sezuvchan bo'lganligi sababli, miokardit allergik xarakterda bo'lishi ham mumkin.

Kechishiga ko'ra, miokardit o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir miokarditda ko'pincha nafas qisishi, teri va shilliq pardalarning ko'kimir tusga kirishi (sianoz) bo'yin tomirlarining bo'rtishi, jigarning shishishi, oyoqlarda shish paydo bo'lishi kuzatiladi. Ammo kasallikning bunday turi kamdan kam uchraydi. Ko'pincha kasallik yashirin boshlanib, bemorlar yurak sohasidagi og'riqdan, yurakning tez betartib urishidan, nafas qisishidan, tez charchashdan shikoyat qilishadi. Bu belgililar jismoniy ish bilan shug'ullanganda

zo'rayadi. Bemorning tana harorati o'zgarmasligi yoki biroz ko'tarilishi mumkin. Bunday holatdan oldin angina, gaymorit va boshqa kasalliklar ham kuzatiladi.

Surunkali miokardit sil, zaxm va revmatizm singari kasalliklarda kuzatilishi mumkin. Difteriyali miokardit kasallikning ikkinchi haftasida boshlanib, og'ir kechadi. Ich terlamada miokardit kasallikning 3—4 haftasida yoki bemor tuzala boshlaganda kuzatilib, biroz yengilroq o'tadi. Sepsisda miokardit juda og'ir kechadi.

O'choqli miokardit birmuncha yengil o'tadi va ba'zan kasalga sezilmasdan avj olib boradi. Lekin ko'pincha o'choqli miokarditda yurak o'ynab turadi, aritmiyalar (ekstrasistoliya tipida) paydo bo'ladi, o'tkazuvchanlik buziladi. Ba'zan kasallar yurak sohasining og'rib turishi, umumiy darmonsizlik, tez charchab qolishdan nolishadi.

O'choqli miokarditda yurak kattalashmaydi, yurak uchi tepasida ba'zan funksional xarakterdagi kuchsiz sistolik shovqin eshitiladi. Ritm va o'tkazuvchanlikning buzilganligi elektrokardiogrammada oson aniqlanadi.

Diffuz miokardit birmuncha o'tkir va og'ir, ko'pincha yurak yetishmovchiligidagi xos hodisalar bilan birga o'tadi. Bemorlarning rangi oqargan, juda darmonsiz bo'ladi, andek zo'r berilganida hansirab qolishidan noliydi. Badanga shish kelishi, o'pka, jigarda qon dimlanib qolganiga xos o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Yurak uchining zarbi susaygan, yurak kengayib ketgan, tonlarining jarangi pasaygan bo'ladi. Yurak uchi tepasida sistolik shovqin eshitiladi. Taxikardiya, puls labilligi, arterial bosimning pasayganligi ko'rildi. Yurak porogi bor kasalda miokarditning qaytalanishi qon aylanishining yetishmovchiligidagi olib keladi.

Perikardit — yurak xaltasi, yurakning tashqi qavati yallig'lanishi. Sababi —xilma-xil. O'tkir perikardit ko'pincha revmatizm, shuningdek, o'pkaning krupoz yallig'lanishi, gripp, angina, sepsis kabi yuqumli kasalliklar natijasida ro'y beradi. Miokard infarkti, uremiya, ko'krak qafasi jarohatlanganda ham perikardit paydo bo'lishi mumkin. Surunkali perikarditga sil kasalligi sabab bo'ladi. Yurak xaltasida suyuqlik bor-yo'qligiga qarab, perikarditning quruq va ekssudatli xillari farq qilinadi.

Quruq perikarditda yurak xaltasida qorning g'irchillashiga o'xshash tovush eshitiladi, yurakda og'riq paydo bo'ladi, nafas qisishi mumkin. Ekssudat (suyuqlik)li perikarditda og'riq kam yoki

umuman bo'lmaydi, bemor nafasi qisilib, entikadi, tana harorati ko'tariladi. Bemorlar boshi va gavdasini oldinga engashtirib o'tirishni ma'qul ko'rishadi. Yurak kengayadi, perkussiya qilinganida shaklning xarakterli tarzda o'zgarib, uchburchak shaklga kirib qolganligi aniqlanadi. Yurak tonlari bo'g'iq bo'lib qoladi, shovqinlar yomon eshitiladi. Ekssudat paydo bo'la boshlaganida va uning surilish vaqtiga kelib perikardning ishqalanish shovqini eshitiladi.

Ekssudat surilib ketganidan keyin perikard varaqlarida ko'pincha bitishmalar qoladi, kamdan kam hollarda yurak xaltasi bo'shlig'i to'liq bitib ketadi («kosali yurak»). Lekin perikardda og'ir o'zgarishlar yuzaga kelmasdan turib, ekssudat nom-nishonsiz yo'qolib ketishi mumkin.

Davolash. Bemorlar kasalxonaga yotqizilib, davolashning 6—8 haftasi davomida o'rindan turmay yotishlari kerak. Bemorlarning harakati chegaralangan.

Parhez: ovqat yengil hazm bo'ladigan, vitaminlarga boy, ayniqsa, C vitaminiga boy bo'lishi zarur. Ularga osh tuzi, go'sht va suyuqlikni kamroq berish lozim.

Bemor ko'p terlagani uchun ich kiyimlari tez-tez almashtilib, teri esa spirit, atir yoki sirka kislotasi qo'shilgan iliq suv bilan artib turiladi, o'rnidan turmay yotgan bemorlarning terisini parvarish qilish, yotoq yaralarining oldini olish kerak.

Shifokor-kardiolog ko'rsatmasiga asosan, bemorlarga yallig'lanihnga qarshi nosteroid vositalari (brufen, butadion, voltaren yoki indometatsin) beriladi. Bu dorilarni ovqat yoki sut bilan bir vaqtda ichish kerak. Me'da-ichak yara kasalliklari bor bemorlarda bu dorilar qo'llanilmaydi. Ular o'rniga reopirin, pirabutal eritmalarini mushak orasiga yuboriladi yoki ortofen, xlotazol, mefenaminat kislotasi, perkluzon 1—1,5 oy davomida beriladi. Antibiotiklardan — benzilpenitsillin natriyli tuzi 500 000 TB muskullar orasiga har 6 soatda yuboriladi, ampitsillin 0,25—0,5 dan, oksatsillin natriyli tuzi 0,25 dan muskullar orasiga yuboriladi. Prednizolon 1 hafta davomida bir kunda 5 mg.dan 4 marta, 2 hafta davomida 3 marta, 3 hafta davomida 2 marta, 4 hafta davomida 1 marta beriladi. Boshqa gormonlar ham shu tartibda beriladi. Immunologik tizimni tiklovchi dorilar qo'llanishi mumkin, shu maqsadda aminoxinolin guruhiiga kiruvchi dorilardan plakvenil 0,2 g, delagil 0,25 g kuniga bir marta 6 oygacha beriladi (bu dorilar ko'z kasalliklari mavjud bemorlarga tavsiya etilmaydi).

Bemorlar shifoxonadan chiqqandan keyin yuqorida ko'rsatilgan dorilarni kamroq miqdorda davom ettirishi lozim — asetilsalitsilat kislota bir kunda 1,5—2 g, brufen — 0,6 g, indometatsin va voltarenni 0,02—0,05 g.dan poliklinika shifokori nazorati ostida qabul qilishi kerak.

Ilgari revmatizm bilan og'rigan bemorlarga erta bahor va kech kuzda retsidiyga qarshi davolash buyurilardi, ya'ni 3—4 hafta davomida bemor har 5—6 kunda 600 000 TB da (har kursiga 5—6 inyeksiya) bitsillin inyeksiyasi va har kuni 4 g natriy salitsilat yoki 2—3 g asetilsalitsilat kislota yoki 1 g.dan piramidon, butadion qabul qiladi.

Bemorlar dispanser ro'yxatida har 3 oyda bir marta shifokor tomonidan tekshirilishi lozim. Bunday tekshirish vaqtida bemorning qon tahlili olinadi. Elektrokardiogramma qilinadi.

Revmatizm bilan og'rigan bemorlarga davolash profilaktikasi yordamini tashkil qilishda kardiorevmatologik dispanserlar, kardiorevmatologik markazlar, kasalxonalar va poliklinikalar qoshidagi kabinetlar metodik markaz vazifasini bajaradi.

Profilakrika. Revmatizm profilaktikasida organizmni chiniqtirish, ayniqsa, yoshlik va o'smirlik davrida organizmni chiniqtirish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda toza havoda ko'p vaqt bo'lish, muntazam ravishda sayr qilish, sayohatlarga chiqish, badantarbiya, sport va jismoniy ish bilan shug'ullanish tavsiya qilinadi. Bunday bemorlar ishga to'g'ri qo'yilishlari lozim. Ularning zax joyda ishlashi,sovuqda bo'lishi, shuningdek, og'ir jismoniy mehnat talab qiladigan ishlarni bajarishi mumkin emas. Birlamchi kasalliklarni qo'z-g'alishiga yo'l qo'ymaslik, angina, surunkali tonzillit, sinusit, yuqori nafas yo'llari kasalliklarini o'z vaqtida davolash va ularning oldini olish lozim.

6.6. Yurak poroklari

Yurak poroklari — yurak va undan boshlanadigan tomirlarning tuzilishidagi patologik o'zgarishlar. Bu nuqsonlar, yurak faoliyatning izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Tug'ma va orttirilgan yurak poroklari farq qilinadi.

Tug'ma yurak poroklari bola ona qornida yotganida normal o'smasligi va yurak-qon tomir sistemasining yetarli shakllanmasligi natijasida paydo bo'ladi. Ularning asosiy turlari quyidagilar:

1. Batallo teshigining bitmasligi.
2. Oval teshigining bitmasligi.
3. Qorinchalararo to'siq defekti.
4. O'pka arteriyasi teshigining torayishi.

Orttirilgan yurak poroklari ko'proq revmatizm, sepsis, zaxm, ateroskleroz, shikastlanish natijasida vujudga keladi.

1. Mitral klapan yetishmovchiligi.
2. Chap bo'l macha-qorincha teshigining torayishi—mitral stenozi.
3. Uch tabaqa klapan yetishmovchiligi.
4. O'ng bo'l macha — qorincha teshigining torayishi.
5. Aorta yarimoysimon klapanlari yetishmovchiligi.
6. Aorta teshigining torayishi.

Orttirilgan yurak poroklari turli kasallikkarda yurak klapanlari yoki kameralari to'siqlarining zararlanishi natijasida paydo bo'ladi. Yurak bo'l machalari bilan qorinchalar hamda qorinchalar bilan ularidan boshlanadigan tomirlar poyasi orasidan joy olgan yurak klapanlari yurak faoliyatining muayyan fazalarida yurak bo'laklari orasidagi tegishli teshiklarni yopib qo'yadi. Va shu tariqa qonning kerakli yo'nalishida oqishini ta'minlaydi.

Yurak poroki ko'proq klapanli apparatga putur yetishi — klapan shaklining o'zgarishi, tavaqalarning burishib qolishi bilan xarakterlanadi. Bu klapan funksiyasining izdan chiqishiga olib keladi. Klapan yurak kameralari orasidagi tegishli teshikni to'liq yopolmaydi, natijada, yurak ishlaganida qon qaysi bo'lakdan chiqqan bo'lisa, o'sha bo'lakka qisman qaytib tushadi. Bu yurak muskuliga qo'shimcha yuk bo'lib, uning massasining ko'payishiga va keyinchalik toliqib qolishiga olib keladi.

Klapan funksiyasi izdan chiqib, tavaqalarning o'sib, bir-biriga yaqinlashishi natijasida yurak kameralari orasidan tegishli teshiklar torayib qoladi, bu qonning normal oqishiga to'sqinlik qiladi, natijada, yurakning ishlashi qiyinlashib, muskullari toliqib qoladi. Ko'pincha birorta klapanning yetishmovchiligi tegishli teshikning torayishi bilan birga sodir bo'ladi. Ba'zan bir necha klapan funksiyasi izdan chiqadi.

6.6.1. Mitral klapan yetishmovchiligi

Etiologiyasi. 75 % i revmatizmdan kelib chiqadi. Revmokardit — endokardit, miokardit, perikardit, ateroskleroz, septik endokardit, shikastlanish (travma olish), sepsis, zaxm.

Kasallikni rivojlanish mexanizmi — sog'lom odamlarda bo'lmachada qorincha teshigi zich yopiladi, shuning uchun qonning hammasi chap qorinchadan aortaga chiqadi. Mitral klapan yetishmovchiligidagi esa, masalan, diastola vaqtida chap bo'lmachadan chap qorinchaga 60 ml qon tushgan bo'lsa-yu, chap qorincha sistolasi vaqtida chap bo'lmachaga 10 ml qon qaytib o'tgan bo'lsa, u vaqtida keyingi diastolada chap bo'lmachada qonni, ya'ni 70 ml qonni beradi.

Chap bo'lmachada me'yordagidan ko'proq qon turishi undagi bosimning ko'tarilib ketishiga olib keladi, shuning natijasida uning muskullari gipertrofiyalanib, bo'shlig'i kengayib ketadi. Keyinchalik ko'p zo'r kelaverishi natijasida chap qorincha ham tobora ko'proq qon olib turgani uchun gipertrofiyalanib, bo'shlig'i kengayadi. Shu bilan birga, aorta klapani ham borib-borib shikastlanadi.

Klinikasi. Yurak dekompensatsiyasi yo'q paytlarda bemorlar hech narsadan nolimaydilar. Ularni jismoniy ish vaqtida kuchayadigan nafas qisishi, yurak o'ynashi, ba'zan yurak sohasida yoqimsiz, ko'ngilsiz xislar, sezgilar yoki og'riqlar bezovta qiladi. Bundan tashqari, bemorlar kechga yaqin oyoqlarida shish paydo bo'lishidan shikoyat qilishadi.

Kichik qon aylanishi doirasida qon dimlanishi natijasida, jismoniy ish vaqtida, keyinchalik esa tinch turganda ham hansirash, yurakni tez urishi, nafas qisishi kuchayadi. Bemorning holati quruq yo'tal, ba'zida balg'am ajralishi bilan xarakterlanadi. Balg'ami qonli bo'ladi.

O'ng bo'lmacha-qorincha yetishmovchiligi oqibatida shish paydo bo'ladi, jigar kattalashadi. Bemorlar ko'zdan kechirilganida ko'rini turadigan shilliq pardalarining ko'karib qolgani, oyoqlarining kerkib turgani seziladi. Yurak sohasi ko'zdan kechiriladigan bo'lsa, yurak uchining zarbi ko'rini turishi mumkin, yurak sohasi palpatsiya qilinganida pulsatsiya kuchayib, tarqalish maydoni kengayib qolgani ko'rindi.

Eshitib ko'rilganda yurak uchi sohasida susaygan birinchi ton va chap qo'lтиqosti sohasiga o'tadigan sistolik shovqin eshitiladi. Yurak asosi ustida o'pka arteriyasi tepasida ikkinchi ton aksenti topiladi. Puls to'la, ritmik, odatdagisi tezlikda va taranglikda bo'ladi. Arterial bosim o'zgarmay qoladi.

Yurakni rentgenologik yo'l bilan tekshirish arzimas darajadagi mitral klapan yetishmovchiligidagi ham endi chap bo'lmaching kattalashib qolganini ko'rsatib beradi.

6.6.2. Chap bo'lmacha-qorincha teshigining torayishi (mitral stenoz)

Etiologiyasi. Revmatizm, revmokardit, septik endokardit, tug'ma mitral stenozi, mitral stenozi polipi, travma, yuqumli kasalliklar.

Kasallikni rivojlanish mexanizmi — toraygan chap bo'lmacha-qorincha teshigi orqali qon chap bo'lmadan qiyinlik bilan chap qorinchaga o'tadi, qonning bir qismi chap bo'lmada qolib ketadi va unga o'pka venalaridan qo'shimcha qon kelib qo'shiladi hamda chap bo'lma kengayadi. Tez orada kichik doira sistemasida qon dimlanish kuzatiladi.

Klinikasi. Bemorlarda jismoniy ish vaqtida nafas qisishi, yurak urishi tezlashishi va yurak o'ynashi, ba'zan yurak sohasida og'riqlar bo'lishi hamda yo'tal tutib, ko'pincha qon aralash balg'am tushishi qayd etiladi, tez charchab qolishi, klapan teshigi torayib borgan sari hansirashi zo'rayaveradi. Odam tinch paytida ham hansiray-veradigan bo'lsa (ortopnoe), odatda, o'pkada talaygina patologik o'zgarishlar vujudga kelgan bo'ladi. Qon dimlanishidan paydo bo'ladiqan pnevmoniya, o'pka infarkti, plevra bo'shlig'iga ekssudat to'planishi shular jumlasidandir.

Qon tuflash o'pkada qon dimlanishidan vujudga kelgan bronxit yoki o'pka infakti oqibati hisoblanadi. Aritmiya, titroq aritmiya ko'rinishida paydo bo'ladi. Yurak sohasidagi og'riqlar har xil darajada: sal-pal sanchishdan tortib, og'ir stenokardiya xurujlari gacha bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu og'riqlar chap venoz teshikning juda torayib, qon sistolik hajmining kamayib qolganidan kelib chiqadiki, bu miokardning durust oziqlanmay qolishiga olib keladi.

Bemorlar ko'zdan kechirilganida, bemorlarning jismoniy rivojlanishi sust, bo'yi pastroq, eti qochgan bo'ladi, lunjlar bilan lablari ko'karib turadi (sianoz). Yurak uchi zarbi seziladigan soha tepasida presistolik titrash — «mushuk xirillashi»ni payqash mumkin. Auskultatsiyada yurak uchi ustida I ton kalta tortgan, taqillaydigan o'pka arteriyasi ustida II ton aksentlangan va ikkiga ajralgan bo'ladi. Mitral klapan ustida presistolik shovqin eshitiladi. Puls kichik, ko'pincha aritmik bo'ladi (titroq aritmiya).


Rentgenda o'pka oldingi-orqa proyeksiyada tekshirilganda o'pka arteriyasi va chap bo'lma qulog'inining bo'rtib turganligi ko'rindi. Birinchi qiyshiq holatda, ya'ni bemor 45° burchak ostida o'ng yelkasi bilan oldinga burilib turgan paytda retrokardial bo'shliqda kengaygan chap bo'lma ko'zga tashlanadi. EKGda dekstrogramma, titroq aritmiya topiladi.

Asorati. Qon tuflash, o'pkadan qon oqishi, o'pka infarkti, miokard infarkti, bosh miya trombozi — falajlik, ko'z ko'rmay qolishi, eshitishning buzilishi, o'tkir o'pka shishi, trosik yaralar, gangrena, yurak astmasi xurujlari, «kardial» jigar sirrozi, plevrit, pnevmoniya, emboliyalar, chap bo'lmadan chiqqan tromblar, qon oqimiga tushib, miya taloq yoki buyrakka, yo bo'lmasa o'pkaga tiqilib qolishi mumkin.

6.6.3. Aorta klapanlari yetishmovchiligi

Etiologiyasi. Revmatik endokardit, o'tkir septik endokarditlar, aortaning zaxmdan zararlanishi, gipertoniya bilan o'tayotgan ateroskleroz va jarohatlar, birkittiruvchi to'qimaning sistem kasalliklari — kollagenozlar (sistem volchanka revmatoid artrit, sistem sklerodermiya, dermatomiozit). Aorta klapanlarining yetishmovchiligi organik kasallik ko'rinishida ham, aorta yugori ko'tariluvchi qismi va aorta halqasi ancha kengayib ketgan bo'lsa, nisbiy yetishmovchilik ko'rinishida ham uchraydi.

Kasallikni rivojlanish mexanizmi — diastola paytida chap qorincha bilan aorta orasidagi teshik to'la bekilmaydi, shuning uchun sistola vaqtida qorincha tomonidan aortaga haydalgan qonning bir qismi diastola boshida katta tezlik bilan qaytib, chap qorinchaga tushadi va bu hol diastolik shovqinga sabab bo'ladi. Chap qorincha diastola paytida bo'l machadan odatdagagi miqdorda qon oladi va bu qonga aortadan qaytgan bir qism qon qo'shiladi. Buning oqibatida chap qorincha bo'shlig'i kengayadi. U normal sharoitdagiga qaraganda ko'proq ish bajaradi, bu esa uning devorining sekin-asta gipertrofiyalanishiga olib keladi (18—19-rasmlar).



18-rasm. Aorta yarimoysimon klapanlarining sxematik tasviri—yurak bo'yylama kesilgan (chapda — normal klapanlar, o'ngda — chandiqlanib zararlangan klapanlar):
1—aorta; 2—yarimoysimon klapanlar; 3—yurak chap qorinchasi bo'shlig'i.

Klinikasi. Bemorlar darmonsizlikdan, yurak sohasining og'rib turishidan, dekompensatsiya vaqtida esa nafas qisib qolishidan nolishadi. Yurak sohasidagi og'riqlar shunga bog'liq bo'ladi, porokning bu xilidagi koronar arteriyalar og'ziga qon yetarli miqdorda otilib tushmaydi. Bosim aorta yuqori, qorinchada past bo'lgani uchun qon aortadan chap qorinchaga qarab orqasiga qaytadi. Lekin yo'lida zinch bekilib turgan yarimoysimon klapanlar, ko'rinishidagi to'siqqa duch kelib to'xtaydi va shu vaqtida koronar arteriyalar qon bilan to'ladi.


Aorta klapanlari yetishmovchiligida esa qon aorta og'zida to'xtalib qolmaydi, balki chap qorinchaga qaytib tushadi va koronar arteriyalar qon bilan yetarlicha to'lishmaydi, miokard kislrorodga yolchimay qolib (koronar yetishmovchilik) to'sh orqasida og'riq paydo bo'ladi (stenokardiya). Bu xildagi porok bilan og'rigan kasallarda nafas qisishi chap qorinchcha muskullari juda zaiflashib qolganida kelib chiqadi. Bu holda chap qorinchcha zaiflashib qolib, qonning hammasini aortaga chiqara olmaydi, shuning natijasida chap bo'lma va kichik qon aylanishi doirasida birdan qon dimlanib

qoladi—kardial astma (nafas siqishi) paydo bo'ladi.

Bemor ko'zdan kechirilganida terining ancha oqarib turganligi ma'lum bo'ladi. Yurak uchining zarbi yaxshi ko'rinishib, palpatsiyada qo'lga unnaydi.

Rentgenologik tekshirishda chap qorinchcha ancha kengaygan bo'lib chiqadi. Yurakning aorta konfiguratsiyasi ko'riliishi jihatdan etik yoki qo'nib turgan o'r-dakka o'xshab ketadigan o'ziga xos shakl bilan ta'riflanadi.

Auskultatsiyada yurak uchi ustida I tonning susayib qolganligi, aorta ustida esa II tonning ham susayganligi yoki batamom yo'qolib ketganligi seziladi. Aorta ustida beshinchi nuqta — Botkin-Erb nuqtasiga o'tadigan diastolik shovqin eshitiladi. Arteriya



19-rasm. Aorta klapanlari yetishmovchiligida yurakning sxematik tasviri (aorta yarimoysimon klapanlari va o'pka stvoli tomiridagi ko'ndalang kesma, yuqoridan ko'rinishi):
1—o'pka stvolining zararlanmagan klapanlari yopiq turibdi; 2—chan-diqlanib zararlangan klapanlari yopiq turibdi (klapanlar cheti to'liq yopilmaydi, natijada tirqish qoladi); 3—bo'lmacha-qorinchcha to'sig'i.

tomirlarida sezilarli patologik pulsatsiya ko'riladi, uyqu arteriyalarining urib turishi qayd qilinadi. Puls to'la va tarang, ritmik bo'ladi. Qon bosimi o'zgaradi — sistolik bosim ko'tariladi, diastolik bosim keskin pasayadi.

6.6.4. Aorta og'zining stenozi

Etiologiyasi. Aortal stenoz rivojlanishida ateroskleroz, revmatik, surunkali va septik endokarditlar, tug'ma anomaliyalar muhim hisoblanadi.

Kasallikning rivojlanish mexanizmi — sistola paytida qonning chap bo'lmachadan aortaga o'tishida qiyinchalik tug'iladi, shuning uchun diastola boshlanadigan paytda chap qorinchada biroz qon qoladi. Bundan tashqari, diastola davomida chap qorincha chap bo'lmachadan odatdagagi miqdorda qon oladi. Demak, navbatdagi qisqarish paytida u aortaga odatdagidan ko'ra ko'proq qon haydab chiqarishi kerak.

Chap qorinchaga bo'lган haddan tashqari bunday zo'riqish shu qorincha mushagining gipertrofiyanishiga olib keladi. Qon kuchli chap qorincha bosimi ta'sirida toraygan teshikdan qiyinchilik bilan o'tar ekan, aorta boshlanadigan yerda dag'al sistolik shovqin va sistolik titirash hosil qiladi.

Klinikasi. Aortasida stenoz bor kasallar jismoniy nagruzka vaqtida hushdan ketib turishi va to'shi orqasida og'riq sezishidan noliyi. Bosh miyaning qon bilan yetarli miqdorda ta'minlanmasligi tufayli adam hushidan ketib tursa, koronar tomirlarning qon bilan yaxshi to'lishmasligi natijasida yurak sohasida og'riqlar paydo bo'ladi. Bemorning nafasi qisadi, yurak o'ynashi kuzatiladi, bosh aylanishi, bosh og'rig'i, kechga borib nafas qisishi takrorlanishi, gandiraklash, holsizlik, lohaslik, ish faoliyatining pasayishi kabi klinik belgilardan noliydi.

Ularni ko'zdan kechirganda periferik tomirlarga yetarli qon o'tmasligi tufayli badanning terisi oqorganligi ko'zga tashlanadi. Porokning bu xildagi turida sekin oshuvchi va pasayuvchi puls seziladi, hatto dekompensatsiyada ham uning soni minutiga 60 tadan oshmaydi.

Arterial bosim sistolik (maksimal) bosim past bo'lib, 90/70 mm simob ustuniga tengdir. Yurak tepkisi kuchaygan, tarqalgan, chapga va pastga siljigan bo'ladi. Auskultatsiyada o'ng tomonda to'sh suyagining ikkinchi qovurg'alar orasidagi cheti yonida dag'al sistolik shovqin eshitiladi, u qon oqimi bo'ylab uyqu arteriyalariga o'tib

boradi. Stenokardiya va qon aylanishi yetishmovchiligi paydo bo‘lishi taxminini yomonlashtiradi. Qon aylanishi yetishmovchiligi yurak astmasi bilan namoyon bo‘ladi.

6.6.5. Uch tavaqali klapan yetishmovchiligi

Etiologiyasi. Revmatizm, surunkali septik endokardit, tug‘ma poroklar, klapanlarning travmatik shikastlanishi kabilar keltirib chiqaradi. Yurak kasalliklarida uch tavaqali klapanning nisbiy yetishmovchiligi mitral stenozda, aterosklerotik kardiosklerozda, miokardit o‘ng qorincha infarkti va boshqalarda kuzatiladi.

Kasallikning rivojlanish mexanizmi — uch tavaqali klapan yetishmovchiligidagi ikki tavaqali klapan yetishmovchiligidagidek o‘ng qorincha sistolasi paytida klapanlar yaxshi bekilmaydi, buning oqibatida qon qorinchadan o‘ng bo‘lmachaga sistolik shovqin hosil qilib qaytadi. O‘ng bo‘lmachaning uzoq vaqt qon bilan to‘lib turishi uning kengayishiga olib keladi. Oqibatda qon katta qon aylanish doirasi venalarida turib qoladi. O‘ng qorinchaning har bir sistolasida qon ma‘lum miqdorda o‘ng bo‘lmachaga qaytadi, u yerdan kovak venalariga o‘tadi. Shuning uchun u har bir o‘ng qorincha sistolasida maxsus qonuniyat bo‘yicha o‘ng bo‘lmachaga yaqin joylashgan jigar venalariga keladi. Jigarning sistolik pulsatsiyasi yoki musbat jigar pulsi deb ataluvchi hol ro‘y beradi. Bu uch tavaqali klapan yetishmovchilagini ro‘y-rost isbotlovchi alomatdir.

Klinikasi. Kasallar hansirash, oyoqlar shishishi, qorinning kattalashgani, o‘ng qovurg‘alar ostida og‘riq sezilishidan noliydlar. Bundan tashqari, bemorlar darmonsizlikdan, lohaslikdan tez char-chash, mehnat qilish qobiliyatining pasayishidan shikoyat qilishadi.

Ko‘zdan kechirilganda teri qoplamlarining boshqa poroklar-dagiga qaraganda ko‘proq seziladigan darajada ko‘karib turganligi (sianoz), ba’zan teri sarg‘ish tusga kirib qolganligi ko‘rinadi (jigarda qon dimlanganda). Bo‘yindagi venalar shishib chiqib, kengayib ketadi, jigarda ham pulsatsiya zo‘rayadi.

Perkussiyada yurak o‘ng chegarasining to‘s sh suyagining o‘ng chetidan o‘ng tomonga ancha surilib qolganligi aniqlanadi.

Auskultatsiyada yurak uchi ustida birinchi tonning susayib qolganligi va to‘s sh suyagi xanjarsimon o‘simganligi asosi sohasida dag‘al sistolik shovqin borligi ma‘lum bo‘ladi. Porokning dastlabki davrida puls o‘zgarmasdan qolaveradi, keyingi davrida kichrayib qoladi, titroq artimiya paydo bo‘ladi. Arterial bosim va puls bosimi me‘yordan pasayadi.

Yurakning o'ng yarmining boshqa poroklari, masalan, o'ng bo'l macha-qorincha teshigining torayishi o'pka arteriyasi klapanlarining yetishmovchiligi va o'pka arteriyasi teshigining torayishi kam uchraydi. Ular ona qornida homilada rivojlangan endokardit oqibatida paydo bo'ladi.

Ko'pincha bunday poroklar yurak rivojlanishining boshqa yetishmovchiliklari bilan birga kechadi. Ular juda yoshlik davrda aniqlanadi. Bunday bolalar rivojlanishdan orqada qolib, o'pka arteriyasi teshigi torayganda, ularda nafas qisishi va ko'karish erta paydo bo'ladi. Bunday porokli bemorlar yoshlikda qon aylanishi yetishmovchiligidan halok bo'lishadi.

6.7. Yurakning murakkab poroklari

Yurakdagi bir necha klapanlarning organik kasalliklar bilan aralashishiga shikastlanishi o'sha klapanlarning alohida kasalliklaridan ko'ra kamroq uchraydi. Ko'pincha mitral klapan yetishmovchiligi chap bo'l macha-qorincha teshigining torayishi bilan kechadi. Bunday hollarda klinik ko'rinishda u yoki bu porokning alomatlari yig'iladi, biroq mazkur kombinatsiyada qaysi porok keng avj olgan bo'lsa, shuning alomatlari ustun turadi. Ko'pincha ikki va hatto uch tavaqali klapanning porogi qo'shilib ketadi. Masalan, ko'pincha mitral klapan va aortal klapanlarning shikastlanish hollari birga uchraydi, ancha kamroq hollarda mitral, aorta va uch tavaqali klapanlarning bir vaqtida organik o'zgarishi kuzatiladi.

Yuqorida tilga olib o'tilgan yurak poroklari orasida klapanning nisbiy shikastlanishi tashxisi ko'proq qo'yiladi. Poroklarning shu turidan yurakning organik mitral porogi borligi, ichida ich tavaqali klapanning nisbiy yetishmovchiligi hammdan ko'ra ko'proq uchraydi. Aorta poroklarida va atero-miokardiosklerozda mitral klapanning nisbiy yetishmovchiligi ham birmuncha ko'p aniqlanadi.

Aorta aterosklerozi va uning boshqa kasalliklarida aorta klapanlarining nisbiy yetishmay qolishi kamroq uchraydi. Yurak klapanlarining poroklari anchadan beri davom etib kelayotgan bo'lsa yoki atero-miokardiosklerozning miokardi zaiflashtirib qo'yadigan davri cho'zilib ketgan bo'lsa, yurak hamma bo'limlarining faoliyati susayib, uning bo'shliqlari kengayib ketadi. Bunday bemorlarda miokardning umuman zaiflashib qolganiga xarakterli belgilari paydo bo'ladi: sianoz, ortopnoe, butun badanga shish kelishi shular jumlasidandir.

Yurakning barcha chegaralari kengayib ketadi, yurak konfiguratsiyasi ho'kiz yurak degan o'zgarish belgilariga ega bo'lib qoladi. Yurak tonlari bo'g'iq bo'lib, yurak uchi va aorta ustida sistolik shovqin eshitiladi. Artimiya (titroq artimiya, ekstrasistologiya va blokadalarining turli xillari), kichik puls ko'pincha puls bosimining pasayib, vena bosimining ko'tarilib ketgani ko'rildi. Biroq yurakning murakkab poroklarini yakka holdagilariga qaraganda taxmin jihatdan yomon deb hisoblash kerak emas. O'z-o'zidan ma'lumki, chap bo'lmacha-qorincha teshigining torayishi darajasi kasallik taxminiga ta'sir ko'rsatadi. Yurakning alohida poroklarida, murakkab poroklarida yurak mushaklarining zaiflanishiga olib keluvchi omillar, masalan, infeksiyalar tez-tez bo'ladigan retsidiylar, haddan tashqari jismoniy zo'riqish va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, alohida porokda erta dekompensatsiya alomatlarni va aksincha, murakkab porokda uzoq vaqt davom etadigan kompensatsiyani kuzatish mumkin.

6.7.1. Yurak poroklarining kechishi. Qon aylanishi yetishmovchiligi

Yurak poroklarining kechishi, ya'ni yurak porogi bilan og'rigan bemor ko'p yillar davomida kasalligini sezmay, o'zini yaxshi his qilib, odatdagagi ishini bajarib yuraverishi mumkin. Bunga sabab, yurakning katta imkoniyatlarga ega ekanligidir, shuning uchun mavjud porok yurak tegishli kameralarining zo'r berib ishlashi hisobiga sezilmaydi.

Lekin bu hollarda ham shifokor yurakning hajmi va urishining o'zgarganligiga va yurakda shovqin mavjudligiga qarab, yurak porogining belgilari borligini aniqlab beradi. Kasallikning zo'rayishi yurakning imkoniyatlari tugab, faoliyatining kuchsizlanishiga va yurak yetishmovchiligi deb ataladigan belgilarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Kasallikning ilk davrida yurakning biroz bo'limi tez ishlashi tutayli, qon aylanishidagi porok keltirib chiqangan buzilish bartaraf bo'ladi va yurak o'z funksiyasini qoniqarli bajara boshlaydi, bunday holatga kompensatsiya deyiladi.

Yurak porogi kompensatsiya bo'lgan shaxslar mehnatga layoqatli bo'lib, davolanishga muhtoj bo'lishmaydi. Biroq, ularni soppasog' deb ham hisoblash mumkin emas. Chunki kompensatsiya bo'lgan porok, ba'zan 10—15 yil, hatto 20 yilgacha qoladi, amma

nihoyat yurak muskuli bo'shashadi va yurak dekompensatsiyasi ro'y beradi. Bu nafas qisishi, sianoz, venada qon dimlanishi, shish va bo'shliqlarda suyuqlik yig'ilishi bilan namoyon bo'ladi. Bunday bemorlar uchun revmatik endomiokarditning takrorlanishi, ayniqsa xavfli, chunki buning oqibatida ertami-kechmi dekompensatsiya sodir bo'ladi.

Binobarin, yuragida kompensatsiyali porogi bor bemorlarni maxsus davo qilishning ehtiyoji bo'limasa-da, lekin ular mehnat qilish, dam olish va ovqatlanishda ma'lum rejimga qat'iy rioya qilishlari kerak. Klapanlar deformatsiyasining kuchayishi va yurak muskullarining zararlanishiga olib keluvchi revmatizmning zo'ra-yishi, jismoniy zo'riqishlar, turli yuqumli va boshqa kasalliklar, homiladorlik va tug'uruq dekompensatsiyaning rivojlanishiga yordam beradi. Ko'p hollarda kompensatsiyaning buzilishi qaytadigan xarakterda bo'ladi. Davolash o'z vaqtida va muntazam o'tkazib turilganda, kompensatsiya holatini uzoq vaqt tiklab va quvvatlab turish mumkin.

6.7.2. Yurak poroklari, qon aylanishi yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarni davolash, parvarish qilish

Kasallikning davolash choralari, eng avvalo, yurak poroklarini keltirib chiqaruvchi revmatik endokardit, miokardit, perikardit, ateroskleroz, gipertoniya kasalligi, revmatizm, zaxm, sepsis, tug'ma yurak poroklari, polip, jarohat, yuqumli kasalliklarning oldini olishga va davolashga qaratilgan bo'lishi shart.

Qon aylanishi yetishmovchiligin davolashda asosiy maqsad yurak funksional holatini yaxshilashga, qon tomirlar tonusini tiklashga, a'zolar va to'qimalarda mikrosirkulatsiyani normallash-tirish ularning faoliyatini tiklashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Davolash choralari qon aylanishi yetishmovchiligining bos-qichiga, asosiy kasallikka, bemor ahvolining og'ir-yengilligiga qarab belgilanadi. Kasalxonada yotib-turish yoki yotish rejimiga rioya qilgan holda jismoniy va ruhiy osoyishta sharoit yaratib beriladi.

Diyetoterapiya — 10,10a-parhez, M.I. Pevzner bo'yicha to'yimlilik miqdori 2000 kkal atrofida bo'lgan, osh tuzi va suyuqlik miqdori chegaralangan, kaliy tuzlariga boy bo'lgan oziq-ovqatlar, yengillashtiruvchi kunlar buyuriladi. Bunda bemorga faqat olma yeish, suzma, qatiq ichish buyuriladi.

Shifokor ko'rsatmasiga asosan, bemorga yurak glikozidlari: strofantin 0,05 %—1,0; korglikon 0,06 %—1,0; digoksin

0,025 %—1,0 g.li eritmalari yuboriladi. Kaliy preparatlaridan — panangin, asparkam kaliy orotati yurak glikozidlari bilan birqalikda buyuriladi. Yurak ishini quvvatlash maqsadida kokarboksilaza, ATF, riboksin kabi dorilar beriladi. Anabolik gormonlardan retabolil, nerabolil buyuriladi. Siyidik haydovchi dorilardan furosemid, uregit, klolamid, siklometiazid beriladi. Kaliy saqlovchi diuretiklardan amilorid, veroshpiron, triamteren beriladi.

6.8. Ateroskleroz

Ateroskleroz (yunon. *athera*—butka va *scleros*—qattiq) — arterial qon tomirlar devorining ichki intima qavatida alohida-alohida pilakchalar paydo bo‘ladi, natijada, pilakchalar qon tomirlar devorining qattqlashuviga, yo‘llarining torayishiga olib kelib, qon oqimi yurishini sekinlashtiradi.

Yaxshilab ishlab turgan organni qon bilan ta’minlab kelayotgan arteriyada ateroskleroz paydo bo‘lishi sababli qon oqimi yetishmay qoladi, bu organning funksional imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi.

Bu uzoq davom etadigan kasallik hisoblanib, asta-sekin boshlanadi. Bemor o‘zida bu kasallik borligini, keyinroq kasallik zo‘rayishi va asoratlari paydo bo‘lishidan ancha kech payqashi mumkin.

Ko‘pincha erkaklar, asosan, 45—55 yoshda bunday kasallik bilan xastalanadi, biroq, aterosklerozning yoshlarda ham avj olish hollari uchraydi. Erkaklarda ateroskleroz ayollardagiga qaraganda, klinik jihatdan og‘ir o‘tadi, bundan tashqari, erkaklarda kasallik nisbatan erta boshlanadi.

Ateroskleroz arteriya tomirlarining keng tarqalgan surunkali kasalligidir.

Etiologiyasi. Aterosklerozni keltirib chiqaradigan sabablar orasida hozirgi vaqtida yog‘ almashinuvining buzilishi, qonda ularning ko‘payib ketishi, fosfolipidlar miqdori esa kamayishi, ovqatda xolesteringa va to‘yingan yog‘ kislotalariga boy bo‘lgan hayvonlar yog‘ini iste‘mol qilish, semirib ketish, tamaki chekish, surunkali spirtli ichimliklar ichish, odam energiyasi sarflari ovqat mahsulotlaridan olinadigan yuksak energetik qiymatiga mos kelmasligi, texnikaning jadal sur’atlar bilan rivojlanishi tufayli jismoniy faoliyning kamayganligi, asab faoliyatining buzilishi, ruhan zo‘riqish, giper-toniya kasalligi birinchi o‘rinda turadi.

Shuningdek, kasallikning avj olishida xolesterin almashinuvining buzilishi katta ahamiyatga ega, buning natijasida qonda xolesterin yig‘ilib, bu modda arteriyaning ichki devorlarida to‘plana boradi.

Bundan tashqari, ko‘pincha yog‘ bosish, podagra, o‘t-tosh kasalligi, qonda xolesterin miqdorining yuqori darajada bo‘lishi, oqsil almashtinuvni buzilishi, tomirlar ichki qavati butunligining buzilishiga kasallikka moyillik tug‘diruvchi sabab deb qaraladi. Tomirlar ichki qavatining lipo-protein substansiyalardan infiltratsiyalanishi natijasida bu pardaning g‘ovaklanishi va degeneratsiyasi ro‘y beradi. Pilakchalar paydo bo‘ladi. Aterosklerotik pilakchalar tomir bo‘shlig‘iga bo‘rtib chiqadi va uni toraytiradi.

Aterosklerotik pilakcha asta-sekin kattalashib tomir bo‘shlig‘ini, mayda tomir bo‘shlig‘ini batamom berkitib qo‘yishi mumkin. Pilakchalar atrosfida tomir devorida biriktiruvchi to‘qima o‘sib qalinchashadi, aterosklerotik qismlarda ohak tuzlari yig‘iladi, natijada, zararlangan tomirlar ancha qattiqlashib qoladi. Bularning hammasi tomirlarda qon oqishining sekinlashishiga olib keladi, natijada, organ va to‘qimalarga oziq moddalarning yetkazib berilishi izdan chiqadi.

Klinikasi. Klinik kechishiga ko‘ra, to‘rt asosiy shakli tafovut qilinadi:

1. Bosh miya shakli (bosh miya tomirlar aterosklerozi).
2. Yurak shakli (yurak tomirlar aterosklerozi).
3. Buyrak shakli (buyrak tomirlar aterosklerozi).
4. Periferik qon tomirlar aterosklerozi.

Mianing qon bilan ta‘minlanishi o‘zgarib qolgan bo‘lsa, bemorlar bosh aylanishi, xotiraning susayib qolishi, quloglarining shang‘illashidan falaj bo‘lib, gapira olmay qoladi. Bosh miya aterosklerozi 60 yoshdan oshgan kishilarda ko‘proq uchraydi. Eslash qobiliyati pasayadi, ayniqsa, kecha, o‘tgan kun bo‘lgan voqealarni eslolmaydi, fikrlash qobiliyati pasayadi. Bemorlar tez charchaydi, uyqusizlik, bosh og‘rig‘i bosh aylanishi bilan birga kechadi. Bosh miya tomirlarining aterosklerozi zo‘riqqan kishida es-hushining pasaygani, aqlsizlik aniqlanadi. Keyinchalik miya tomirida qon aylanishi buziladi. Bemor tromboembolik asoratlar natijasida insult bo‘lishi mumkin.

Yurak tomirlari aterosklerozi — stenokardiya va miokard infarktingning hammadan ko‘ra ko‘proq uchraydigan sababidir. Yurakning toj tomirlarida ateroskleroz ko‘pdan beri davom etib, yurakning qon bilan ta‘minlanishi buzilgan bo‘lsa, bu — yurakdag‘i muskul tolalaridan bir qismining o‘rniga biriktiruvchi to‘qima elementlari hosil bo‘lishiga olib keladi, bu aterosklerotik kardioskleroz deb aytildi. Bunda yurak muskulining qisqaruvchanlik xususiyati kamayib qoladi, aksari qon aylanishida yetishmovchilik paydo bo‘ladi.

Aorta aterosklerozi — ateroskleroz aorta bosh tomiri hamda uning tarmoqlarida eng ko‘p joylashadi. Ko‘krak aortasining boshlanishi qismida, ravog‘ida joylashgan ateroskleroz uning devorini qalilnashтиrib, elastikligini pasaytiradi. Ko‘krak aortasi devorida joylashgan depressor donalar faoliyatи buziladi. Natijada sistolik gipertoniya bo‘ladi, diastolik bosim me’yordan pastroq bo‘ladi. Aorta ravog‘idan chiqqan nomsiz, chap uyqu arteriya tarmoqlarining boshlanishi ateroskleroz bo‘lsa, bosh miya, qo’llarning qon bilan ta’minlanishi buziladi. Natijada aorta ravog‘i asorati rivojlanadi.

Bemorlar bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, quloqlardagi shovqindan shikoyat qilishadi. Bemor birdan o‘rnidan turib ketsa, boshi aylanib hushidan ketishi mumkin. Yurak-tomirlar aterosklerozida stenokardiya, miokard infarktida klinik belgilari namoyon bo‘ladi. Puls shikastlangan tomonda pasayadi. Shu qo‘lida arterial qon bosim sog‘ qo‘liga nisbatan past bo‘ladi. Aorta ravog‘ining aterosklerozida ba’zan puls ikki qo‘lda har xil bo‘ladi. Yurakni eshitib ko‘rilganda aorta nuqtasida II ton qattiq jaranglab hamda sistolik shovqin eshitiladi. Aorta og‘zi stenozi yoki mitral porogi rivojlanishi mumkin.

Ko‘krak aortasining aterosklerizi, yurak chap qorinchasining yetishmovchiligi kelib chiqishi mumkin. Aorta aterosklerozining asoratiga aorta devorida paydo bo‘ladigan anevrizma kiradi. Og‘riq asta-sekin boshlanib uzoqqa cho‘ziladi. Ichak mezenterial arteriyalari aterosklerizi, qorinning yuqori qismida bir necha daqiqadan I soat-gacha bo‘ladigan og‘riq bilan xarakterlanadi. Qorin dam bo‘ladi, qabziyat, kekirish bo‘ladi. Og‘riq nitroglitserin tabletkasi ichilgandan so‘ng qoladi. Paypaslab ko‘rilganda qorin tarang, devoridagi mushaklar taranglashgan, yuqori qismida og‘riq kuzatiladi.

Ichak mezenterial arteriyasi aterosklerozining asoratlardan biri tromb bo‘lib, ichak devorida infarkt bo‘lishiga, bu esa qorinda, ayniqsa, kindik atrofida qattiq og‘riqqa olib keladi. Bemor qusadi, ko‘ngli ayniydi, ichi kelmaydi, qorni dam bo‘ladi, qusgan narsalarida, axlatida qon bo‘ladi. Qorindagi og‘riqqa narkotik dordarmonlar bas kelmaydi. Keyinchalik peritonit bo‘lib, bemor o‘ladi.

Buyrak arteriyalari aterosklerozida nevrogen yo‘l bilan kelib chiqadigan gipertoniya kasalligidan farq qilib, simptomatik gipertoniya deb ataladigan kasallik paydo bo‘ladi. Buyrak arteriyalari devori ateroskleroz bilan zararlangan hollarda buyrak faoliyatining asta-sekin buzilishi ro‘y beradi, natijada organizmdan chiqarib tashlanishi zarur bo‘lgan turli xil azotli va boshqa zaharli moddalar tutilib qoladi.

Aterosklerozning hamma shakkllari uchun bir qancha biokimyoiy o'zgarishlar — qondagi xolesterin miqdorining ko'payib ketishi, alfa va beta-lipoproteyinlar normal nisbatining buzilishi bilan xarakterlanadi.

Davolash. Aterosklerozni davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan organizmda xolesterin sintezini kamaytiradigan (klofibrat, lipantil), ichaklarda xolesterin surilishini kamaytiradigan (xolestiramin), gipoxolesterinemik dorilar (probukol, lovastatsin, zokor, fluvastatin), angioprotektorlar (prodektin, anginin, parmidin), nootrop dori vositalari (serebrolizin, nootropil, piratsetam) dori guruhlaridan foydalaniladi.

Profilaktikasi. Aterosklerozga qarshi kurash ko'pgina yo'llar bilan olib borilishi lozim, tarbiya, sport bilan shug'ullanish, mehnat rejimi va miriqib uqlash katta ahamiyatga ega.

To'g'ri ovqatlanish aterosklerozning profilaktikasida katta o'rinni egallaydi. Hammadan avval tarkibida xolesterin ko'p bo'ladi dan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklab qo'yish kerak. O'simlik kletchatkasiga boy bo'lgan sabzavot va mevalarni ko'p miqdorda ratsionga qo'shish o'rinnlidir, chunki o'simlik kletchatkasi ichakda xolesterinning so'riliшини qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, bu mahsulotlar C va B guruh vitaminlariga boy bo'ladi.

6.9. Arterial gipertoniya

Arterial gipertoniya (yunon. *hyper*—ortiqcha, *tonos*—taranglik, bosim) yoki essensial gipertenziya — arterial qon bosimining oshishi bilan kechadigan surunkali kasallikdir, bunda ham maksimal (sistolik), ham minimal (diastolik) arterial qon bosimi ko'tariladi. Gipertenziyaning boshqa shakkllaridan farqli ravishda, gipertoniya kasalligida arterial bosimning yuqori bo'lishi buyrak yoki endokrin bezlari kasalliklari oqibatida bo'lmay, balki qon bosimi idora etilishining buzilishiga bog'liq bo'ladi. Arterial gipertoniyaning asosiy belgilariidan biri birlamchi a'zolar patologiyasi bilan bog'liq bo'limgan arterial qon bosimining ortishi. Bu kasallik yurak-qon tomir tizimi tomonidan asoratlar yuzaga kelishi bilan xarakterlanadi.

Etiologiyasi. Arterial gipertoniyaning kelib chiqish sababi 95 % hodisalarda noma'lum (essensial gipertoniya). Markaziy nerv faoliyatida tez-tez takrorlanadigan salbiy kechinmalar, moddalar almashinuvining izdan chiqishi, irtsiy moyillik, ba'zi bir tashqi omillar, gipodinamiya (kam harakatlanish), o'tkir ruhiy-emotsional

jarohatlar va markaziy asab faoliyatining klimaks munosabati bilan izdan chiqishi, nikotin kabilari ta'sirida arterial gipertoniyaning kelib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Alkogol (10 %) va semizlik (ortiqcha vaznga ega bo'lish) arterial qon bosimini ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, quyidagi kasalliklar va holatlar ham sabab bo'lishi mumkin: buyrak kasalliklari, endokrin kasalliklar (Kushing sindromi, fetoxromositoma, akromegaliya, giperparatiroidizm, qandli diabet), homiladorlik, aorta koarktatsiyasi.

Tashqi muhitdan bosh miyaning oliy bo'limlariga asablarni toliqtiradigan ta'sirotlar kelib turishi natijasida bosh miyaning kechishi qismlari doim qo'zg'algan holda turadigan bo'lib qoladi. Miyadagi mana shu qo'zg'alish o'choqlari qon tomirlariga ta'sir ko'rsatib, ular tonusining to'g'ri idora etilishini buzadi, natijada arzimagan sababdan ham tomirlar tonusi o'zgarib, qon bosimi ko'tarilib turadigan bo'lib qoladi. Bu hodisa bora-bora kuchayib, doimiy tus ola boshlaydi va oxiri qon bosimi mudom yuqori darajada turadigan bo'ladi. Vaqt o'tgan sayin turli organ va to'qimalardan chiqadigan gormonlar hamda boshqa faol moddalar vositasi bilan organizmga ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlar qon bosimining yuqori turishini quvvatlab boradigan bo'lib qoladi.

Klinikasi. Hozirgi vaqtida arterial gipertoniyaning quyidagi tasnifidan foydalaniлади (1999-yilda JSST tomonidan joriy etilgan):

Toifasi	Sistolik arterial bosim (mm simob ustunida)	Diastolik arterial bosim (mm simob ustunida)
Optimal	120 dan kam	80 dan kam
Normal (me'yoriy)	120–129	80–84
Me'yor chegarasida ko'tarilgan	130–139	85–89
Gipertoniya		
I daraja	140–159	90–99
Chegaraviy	140–149	90–95
II daraja	160–179	100–109
III daraja	180	110 va undan yuqori
Alohiда sistolik arterial gipertoniya	140	90 dan kam
Chegaraviy	140–149	90 dan kam

Klinik kechishiga qarab, uch davrga bo'linadi:

1. Birinchi davr — xastalikning boshlang'ich davri bo'lib, bunda qon bosimi, asosan, ruhiy-hayajon ta'sirida vaqtincha ko'tarilib turadi, bu davrda kasallik qaytalanadi.

2. Ikkinci davr — arterial bosimning mudom ko'tarilib turilishi bilan xarakterlanadi, maxsus davo qilinmasa, bosim pasaymaydi. Gipertoniya krizlariga moyillik paydo bo'ladi.

3. Uchinchi davr — sklerotik davr deb atalib, bunda buyrak va boshqa a'zolar tomirlarida, aorta toj tomirlari bilan miya tomirlarida qaytmas o'zgarishlar paydo bo'ladi.

Bundan tashqari:

1. Xastalikning sekin kechadigan turi.

2. Zo'rayib boradigan (xavfli) turlari.

3. Uzoq muddat davom etadigan turlari mavjud.

Kasallikning boshlanishida gipertoniya alomatlarsiz kechadi. Bemorning asablari bo'shashgan, mehnat qobiliyati pasaygan, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, boshning lo'qillashi, yurak urishining tezlashuvi tez-tez kuzatiladi. Ammo ko'p hollarda kasallik biror alomatsiz kechib, arterial bosim o'lchangan holdagina aniqlanadi. Keyinchalik nafas qisishi, yurak sohasida og'riq paydo bo'ladi. Kasallik rivojlanishining miya turida miyada qon aylanishi buzilib, insult yuz berishi ehtimoli mavjud. Arterial gipertoniyaga uchragan bemorlar quloqda shovqin eshitilishi, badanda chumoli yurgandek hisning paydo bo'lishi, ko'z oldining jimirlashi, ko'rishning buzilishi, yurak sohasida yoqimsiz his sezgisining paydo bo'lishi, injiqlik, uyqusizlik, umumiy behollik, mehnat qobiliyati va xotiraning susayishidan shikoyat qiladilar.

Obyektiv tekshirish. Pulsning tarangligi, yurak cho'qqisidagi zarbning kuchayganligi va chap qorincha gipertrofiyasi natijasida yurakning chap chegarasi ozroq chapga surilganligi hamda aortada ikkinchi tovush aksenti aniqlanadi. Keyinchalik bemor nafas qisishi va yurak sohasida og'riq paydo bo'lganidan shikoyat qiladi, bu hol qon aylanish ishidagi yetishmovchilikning dastlabki alomatlardan va koronar qon aylanishining buzilganligidan dalolat beradi. Bu vaqtda obyektiv tekshirishda yurakning chap qorincha hisobiga ancha kengayganligini, mitral yetishmovchilikning avj olganligidan dalolat beruvchi unchalik aniq eshitilmaydigan sistolik shovqin, taxikardiya va ahyon-ahyonda, yakka-yakka holdagi ekstrasistolalarini aniqlash mumkin.

Arterial gipertoniyaning kechikkan davrlarida titroq aritmiya va yurak astmasi kabi og'ir yurak hodisalari paydo bo'ladi. Miokard infarkti — arterial gipertoniyaning yurakda qoldiradigan eng og'ir va birmuncha ko'p uchraydigan asoratidir. Miokard infarkti tegishli koronar aritmiyaning uzoq vaqtgacha spazm va troboz holatida bo'lishi oqibatida kelib chiqadi.

Arterial gipertoniyada buyrak tomirlarining shikastlanishi, buyraklar arteriosklerozi boshlanishiga olib keladi. Asta-sekin buyrak yetishmovchiligiga xos alomatlar avj olib boradi. Siydkning solish-tirma og'irligi past — 1010 dan kam bo'lib qoladi, poliuriya, albu-minuriya va gematuriya kuzatiladi. Kasallikning keyingi davrlarida qonda qoldiq azot miqdori ko'payib ($0,4\text{ g/l}$ ortiq bo'ladi), uremiya sindromi avj oladi.

Arterial gipertoniyaning xavfli turida ko'z tubidagi o'zgarish-lar — gipertonik retinopatiya (ko'rvuv nervi so'rg'ichi atrofiga qon quyilib, natijada, tamomila ko'r bo'lib qolishiga olib boradigan buzilish) dastlabki alomatlardan sanaladi. Arterial bosim baland va barqaror bo'ladi. Xavfli gipertoniya paydo bo'lganligiga shub-halanilganda bemor zudlik bilan shoshilinch yordam markazlariga yuboriladi.

Arterial gipertoniysi bor shaxslarda ba'zan kasallikning qisqa muddatli kuchayishi — gipertonik xurujlar paydo bo'ladi. Miya tomonidan bo'ladigan hodisalar bosh og'rig'i, qayt qilish, giper-tonik xurujning o'ziga xos alomatlaridir. Bunday hollarda shoshilinch davo choralarini ko'rilmasa, gipertonik kriz insult yoki subaraxnoidal qon quyilishi bilan tugallanishi mumkin.

Davolash va profilaktikasi. Arterial gipertoniyaning oldini olish uchun bemor yashash tarzini o'zgartirishi lozim. Chekish, spirtli ichimliklar, kam harakatlanish, sho'r, achchiq, yog'li, qovurilgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish kabi odatlardan voz kechish lozim. Hamma narsa asabiy va ruhiy zo'riqishlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi, ya'ni asab tizimini ehtiyyotlash choralar bilan mustah-kamlangan bo'lishi kerak. Turmush sharoitini to'g'ri tashkil etmoq zarur. Zo'r berib aqliy va jismoniy mehnat bilan shug'ullanish yaramaydi, uyda va ishxonada behudaga achchiqlanmaslik, odamlar bilan xushmuomalada bo'lish, yaxshi munosabat o'rnatish lozim.

Gipertoniyalı bemorlar qo'shimcha mashg'ulotlardan ozod qilinadi. Dam olish kunlari bemor yaxshi hordiq chiqarishi kerak, uyquni ta'minlaydigan to'g'ri rejimni tashkillashtirish lozim. Ovqatni uqlashdan 3 soat oldin yejish kerak.

Diyetoterapiya — 10-, 10a parhez. Xolesteringa boy mahsulotlarni, yog'li go'sht, yog' va boshqalarni chegaralash, achchiq, tuzlangan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik, suyuqliklarni chegaralash lozim. Siyidik haydovchi ovqat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish lozim. Ovqat vitaminlarga (*A, B, C, P*) boy bo'lishi kerak.

Hozirgi vaqtida arterial gipertoniyanı davolashda quyidagi gipotenziv dori guruqlaridan kombinatsiyalangan holatda qo'llanildi: tiazid diuretiklar (gipotiazid, furosemid, uregit, verosh-piron), β -adrenoblokatorlar guruhi (propranolol, atenolol), alfa-adrenoblokatorlar, kalsiy antagonistlari (nifedipin, adalat, verapamil, amlodipin), APF ingibitorlari (kaptopril, enalapril, sandopril). Medikamentoz terapiya buyurishda dori vositalarini qo'llash uchun ko'rsatma va moneliklarni inobatga olish va nojo'ya ta'sirlarning oldini olish maqsadida dorilarni minimal dozadan boshlash lozim. Medikamentoz terapiya davomiyligi 6 oydan kam bo'lmasligi kerak.

6.10. Gipertonič kriz

Arterial gipertoniya kechishida ko'pincha gipertonič kriz nomini olgan holat — kasallikning yangi alomatlari paydo bo'lishi yoki mavjudlarining kuchayishi bilan xarakterlanadigan holat kuzatiladi. Turli noqulay tashqi ta'sirotlar (o'ta toliqish, qattiq hayajonlanish, issiqlab ketish, ko'p ichkilik ichish, chekish) yoki arterial gipertoniya rivojlanishidagi muayyan qonuniyatlar sababli birdaniga bosh aylanishi paydo bo'ladi, bosh og'rig'i kuchayadi, arterial bosim anchagini ko'tariladi. Ba'zan ko'ngil ayniydi, bemor qayt qiladi, birdaniga holsizlanib qoladi, hushidan ketadi. Miyada qon aylanishi buzilishi natijasida harakatlar, nutq buzilishi mumkin. Og'ir hollarda miyaga qon quyiladi (insult). Gipertoniya krizi «yurak turi» bo'yicha rivojlanishi mumkin, bunda yurak toj tomirlari spazmi bilan birga miokard infarkti yuz berishi ehtimol tutilganda yurak sohasidagi qisadigan og'riq asosiy alomat hisoblanadi.

Gipertonič krizda shoshilinch yordam. Gipertonič kriz vaqtida, eng avvalo, bemorga jismoniy va ruhiy osoyishtalikni ta'minlash kerak (o'rinda yotish rejimi, sokinlik). Bemor yotgan xonadagi chiroq yorug' bo'lmasligi lozim. Uning oyoqlariga grelka yoki xantallar, boshiga esa muz yoki sovuq suvgaga ho'llangan, vaqt-vaqtida almashtirib turiladigan sochiq qo'yiladi. Gipertoniya krizida ko'pincha chakka suyaklarining o'siqlariga zuluklar solinadi. Bitta zuluk

10 ml qon so'radi, zuluk ko'chib tushgandan so'ng taxminan 30 ml qon oqadi (u qon o'zanidan qonni chiqaribgina qolmay, balki qonga maxsus modda — qon ivish jarayonini pasaytiradigan girudin ajratadi). 5—6 ta zuluk solish maqsadga muvofiq. Zuluklar og'riqni kamaytiradigan, chalg'ituvchi ta'sirga ega bo'lib, bosh og'riganda yaxshi yordam beradi.

Zuluklarning yaxshi xususiyati yana shundan iboratki, ular qonni qon olishdagiga qaraganda sekinrok chiqaradi. Zuluklar dixonalarda suvli bankada saqlanadi. Zuluk solishdan oldin u qo'yiladigan joyni iliq suv bilansovunlab yuviladi (spirit bilan artish tavsiya qilinmaydi). Og'iz tomoni bilan teriga qo'yilgan zuluk qonni so'ra boshlaydi va so'rib bo'lgandan keyin o'zi ko'chib tushib, o'rnida qonab turadigan kichik jarohat qoladi. Zuluk ko'chib tushgandan so'ng jarohatga steril bog'lam qo'yish zarur. Jarohatdan uzoq vaqt qon oqib turadigan bo'lsa, uni bint bilan bog'lab qo'yiladi.

Yuqoridagi muolajalar ta'sir qilmaganda shifokor ko'rsatmasiga asosan, quyidagi dori guruhlari qo'llaniladi: tiazid diuretiklar (gipotiazid, furosemid, uregit, veroshpiron), β -adrenoblokatorlar guruhi (propranolol, atenolol), alfa-adrenoblokatorlar, kalsiy antagonistlari (nifedipin, adalat, verapamil, amlodipin), APF ingibitorlari (kaptopril, enalapril, sandopril).

6.11. Yurakning ishemiya kasalliklari. Stenokardiya (ko'krak qisishi)

Yurakning ishemiya kasalligi yurak toj tomirlarining ateroskle-rozga uchrashi va miokardga qon yetkazilishining kamayishi yoki to'xtab qolishiga bog'liq bo'lgan yurak mushagining o'tkir yoki surunkali zararlanishidir. Xastalik rivojlanishiga tashqi va ichki muhitning turli-tuman omillari, arterial gipotensiya, chekish, giperxolesterinemiya, kam harakatlik, yog' bosishi sabab bo'ladi.

2000-yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston kardiologlarining IV syezdida klinik amaliyotda yurak ishemiya kasalligining tasnifini to'ldirgan holda yangi modeli taklif etildi.

1. Toj tomirlar kasalligi sababli to'satdan o'lim (yurakning birlamchi to'xtashi).

2. Stenokardiya.

2.1. Zo'riqish stenokardiyasi, barqaror.

2.2. Beqaror stenokardiya:

- ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya;
- zo'riqishdagi stenokardiyani rivojlanishi;
- angiospastik stenokardiya;
- ilk infarktdan keyingi stenokardiya;
- ilk jarrohlikdan keyingi stenokardiya.

3. Miokard ishemiyasining og'riqsiz turi.

4. Miokard infarkti.

- tishchali Q-QMI;
- tishchasisz Q-NOMI.

5. Infarktdan keyingi kardioskleroz.

6. Yurak ritmining buzilishi (shaklini ko'rsatgan holda).

7. Yurak yetishmovchiligi (shakli va bosqichini ko'rsatgan holda).

Stenokardiya (yunon. *stenos*—tor, qisqa va *kardia*—yurak), yurak qisishi — yurak ishemik kasalligining keng tarqalgan shakli, ko'krak sohasida to'satdan paydo bo'ladigan g'ijimlovchi og'riq bilan o'tadigan kasallikdir.

Etiologiyasi. Stenokardiyada koronar qon aylanishining izdan chiqishi natijasida og'riq sezgilar paydo bo'ladi. Stenokardiya miokardda o'tkir kislородга yolchimaslik (ishemiya) paydo bo'lib kelayotganini, ya'ni oqib kelayotgan qonning miokard funksional ehtiyojiga yetmay qolayotganini ko'rsatadigan klinik belgidir. Kislород kamchil bo'lsa, yurak muskuli skelet muskuli singari ishlay olmay qoladi.

Miokardda yetishmay turgan kislородning o'rni yurakning bo'shashish fazasi — diastolada to'ladi. Shu munosabat bilan koronar sistemaga qon oqishini cheklab qo'yadigan yoki yurakning zo'r berib ishlashini talab etadigan hamma sabablar stenokardiya paydo bo'lishini osonlashtiradi.

Stenokardiya bilan og'igan kasallarning to'qson foizida uchraydigan koronar arteriyalar aterosklerozi ahamiyati hamda ko'krak qisishiga ko'proq sabab bo'lish jihatidan birinchi o'rinda turadi. Zaxm, gipertoniya kasalligi, revmatizm, anemiya singari kasalliklar ham stenokardiya paydo bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yurakning aortal poroklari ba'zan stenokardiya sababi bo'lib qoladi. Ateroskleroz sal-pal avj olgan bo'lsa, stenokardiya tomirlar spazmi (karonarspazm) tufayli kelib chiqishi mumkin.

Klinikasi. Bemorlar, asosan, yurak sohasida va to'sh orqasida siqadigan, bosadigan qattiq og'riq xurujlari hamda bu og'riqning chap yelkacha, ko'kraklararo bo'shliqqa, chap qo'lga, kamroq o'ng yelkaga, o'ng ko'krakka, ensaga berilishidan shikoyat qilishadi.

Og'riq xurujlari, asosan, sutkasiga bir necha marotaba, har kuni yoki kamdan kam bo'lishi, ko'pincha tunda, tinch turganda, bemor ishga otlanayotgan paytda bir necha sekundlardan bir necha daqiqagacha davom etishi bilan namoyon bo'ladi.

Bemorlar xuruj paydo bo'lishini hayajonlanish, ruhiy asab, zo'riqish, xavotirlanish, ko'p ovqat yeyish, qorinning dam bo'lishi bilan bog'laydilar. Xuruj paytida iztirob chekish, o'lim vahimasi bo'lishi, harakatsiz bo'lish, terining oqarib ketganligi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, nitroglitserin yoki validol qabul qilgandan keyin og'riq xurujlarining o'tib ketishi xastalikning asosiy klinik belgilardan hisoblanadi.

Stenokardiyaning klinik shakllari:

1. Zo'riqish stenokardiyasi.
2. Tinch davrdagi stenokardiya.
3. Stenokardiyaning alohida turi.
4. Kechishi bo'yicha:

- a) barqaror stenokardiya;
- b) beqaror stenokardiya;
- d) avj olib boradigan stenokardiya;
- e) xavf soladigan miokard infarkti holati.

5. Stenokardiyaning atipik turi.

Zo'riqish stenokardiyasi jismoniy zo'riqish sababli, miokardning kislородга ehtiyoji oshishi natijasida toj tomirlar spazmi yoki ularning organik torayishidan hosil bo'ladi. Yurak sohasida yoki to'sh orqasida qattiq og'riq paydo bo'lib, u kishiga xavotirlik, qo'rquv holatini beradi. Bemorni rangi oqaradi, badanidan sovuq ter chiqib, siyish ko'payadi. Ba'zan og'riq bilan birga, ko'krak qisishi, hansirash, havo yetishmasligi kabi holatni sezishi mumkin.

Puls sekinlashadi, ba'zan tartibsiz urishi qayd qilinadi. Qon bosimi qisman ko'tarilishi mumkin. Yuragida tipik bo'limgan tovush eshitiladi. Stenokardiya kasalligi 2—3 yil davom etadi, ba'zan 10—20 yilga cho'ziladi.

Tinch davrdagi stenokardiya—zo'riqish stenokardiyasi keyinchalik kasallik zo'rayishi natijasida og'riq xurujlari organizmning tinch holatida ham paydo bo'ladi. Tinch holatdagi stenokardiya kechasi, odam uxlab yotganda yuz berishi mumkin. Stenokardiya xuruji 1—2 minut davom etib, nitroglitserin shimilganda o'tib ketadi. Ayrim hollarda stenokardiyaning og'ir xuruji yarim soatdan ko'proq davom etib, nitroglitserin foyda bermasligi va miokard infarkti yuz berishi mumkin.

Stenokardiyaning alohida turi — bu xil stenokardiyada og'riq xurujlari 5—15 minutdan 30 minutgacha davom etadi. Ko'pincha kechasi yoki saharda bo'ladi. Og'riqning og'ir-yengilligi, uning joylashishi, tarqalishi jihatidan zo'riqish stenokardiyasidan farq qilmaydi. Bemor sovuq qotganda, nitroglitserin dorisini birdan to'xtatib qo'yganda og'riq xuruji tutib qolishi mumkin.

Barqaror stenokardiya — xurujlari paydo bo'lganiga kamida I oy va ko'proq bo'lgan stenokardiya. Bu bemorlar ahvoliga baho berish uchun ularning jismoniy harakatlarni bajarish qobiliyatiga ko'ra, to'rt faol sinfga ajratiladi:

- I sinf — yashirin stenokardiya;
- II sinf — stenokardiyaning yengil darajasi;
- III sinf — o'rta og'irlikdagi stenokardiya;
- IV sinf — og'ir stenokardiya.

Beqaror stenokardiya — birinchi marta paydo bo'lgan stenokardiya kasallikning ilk marta paydo bo'lishi avval nisbiy xarakterda bo'lib, faqat jismoniy mashg'ulot paytida (yurak muskullarining oziq moddalar va kislorodga ehtiyoji oshganda) namoyon bo'ladi.

Davolash va profilaktikasi. Stenokardiya xurujining oldini olish maqsadida jismoniy harakat qilmaslik, masalan, tez yurmaslik, balandlikka ko'tarilmaslik, hayajonlantiruvchi manzaralarga qaramaslik, asabni toliqtirmaslik lozim, butunlay yotib olmaslik ham kerak. Oz-ozdan mehnat qilish, og'riq bo'lmasa, ko'proq shug'ullanish lozim.

Parhezga rioya qilish, yog' bosishining oldini olish, ruhiy zo'riqishlarni bartaraf etish, chekishni tashlash bemor bilan shifokorning bir-birini tushunishi, oila va jamoada normal psixologik sharoit yaratilishidan iborat.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, nitroglitserin 0,0005 g.li tabletkada (0,5 mg) 1 %—10 ml flakonlarda: 1/2—1 tabletkadan til tagiga tashlanadi yoki 0,5—1 % li eritmasi 1—2 tomchidan beriladi. Validol 0,06 g tabletkalarda, 5 ml flakonlarda, 0,05 g kapsulalarda; 0,06 g va 0,05 g.li tabletkalari til tagiga tashlanadi yoki bir chaqmoq qandga 4—5 tomchi eritmasi tomizib ichiladi. Trinitrolong (plastinkasi) tish ildiziga qo'yiladi. Sustak 1 tabletkadan 2—3 marta ichiladi, nitrong 1 tabletkadan ovqatdan oldin ichiladi; erinit 0,01—0,02 g (10 va 20 mg) ovqatdan bir soat oldin 1 tabletkadan ichiladi; nitrosorbit 0,005 va 0,01 g (5 va 10 mg) kuniga 3—4 marta 1 tabletkadan buyuriladi. Amilnitrit 0,5 ml kattalarga 2—3 tomchi paxtaga yoki dokaga tomizib hidlatiladi. Natriy nitrat 0,1—0,2 g (0,5 % li erit-

masi) bir martalik dozasi 0,3 g, bir kecha-kunduzlik dozasi 1 g.dan buyuriladi. Anaprilin (obzidan, inderal) 0,01—0,04 g (10—40 mg) ovqatdan 15—30 minut oldin 0,01 g.dan kuniga 4 marta ichiladi. Oksprenolol (trazikor, koretal) 0,02 g (20 mg) kuniga 3 marta 20 mg.dan ichiladi. Benzodiksin 0,025 g ovqatdan 15—30 minut oldin, dastavval 0,025 g, kuniga 3 marta, keyin 0,05—0,1 g.dan kuniga 3—4 marta beriladi. Talinolol (kordanum) 0,05 g (50 mg) kuniga 1 drajedan 3 marta beriladi. Uxlatadigan vositalardan — natriy brom, kaliy brom, bromkomfora, valokormid, volosedan beriladi. ATF, fosfaden, riboksin, nialamid preparatlari shifokor ko'rsatmasi asosida buyuriladi.

Ateroskleroz, arterial gipertoniya hamda stenokardiya paydo bo'lishiga imkon beradigan omillarni bartaraf etish va o'z vaqtida davolash, iqtisodiy sog'lomlashtiruvchi tadbirlar o'tkazish, ko'p ovqat iste'mol qilishga qarshi kurash, ishxona va oilada ham normal ruhiy sharoit yaratish va boshqalardan iborat.

6.12. Miokard infarkti

Miokard infarkti — bu yurak toj arteriyalarining tromb bilan berkilib qolishi yoki ularning siqilishi oqibatida, yurakni muskul qavatini qon bilan ta'minlanishini buzilishi natijasida yurak muskul qavatini nekrozga (mahalliy o'lim) uchrashi. Bu kasallik bilan 45—60 yoshdagi kishilar kasallanadi. Erkaklar ayollarga nisbatan miokard infarktiga ko'p chalinadilar, 40—50 yoshdagi erkaklar besh barobar ko'p kasal bo'lishadi.

Etiologiyasi. Ateroskleroz, arterial gipertoniya, stenokardiya, qandli diabet, semizlik, asabiylashish, shikastlanish, ko'p chekish, qon ivishining buzilishi, tromb, kuchli jismoniy va ruhiy toliqishlar, revmatizm, revmokardit, qonda xolesterinning ko'payib ketishi miokard infarktiga olib kelishi mumkin.

Toj arteriyaning qaysi tarmog'i tromb bilan berkilib qolganiga ko'ra, chap qorinchaoldi devori infarkti — old infarkt yoki chap qorincha ortki devori infarkti — ortki infarkti farq qilinadi.

Infarkt chap qorinchaning faqat old va ortki devorinigina egallab qolmay, balki qorinchaning yon devoriga ham tarqalib, anchagina kattalikda bo'lishi mumkin. Bunday infarktlar old — yon devor yoki ortki — yon devor infarktlari nomini olgan. O'ng qorincha va bo'lmachalar infarkti g'oyat kam uchraydi.

Yurak muskulidan infarkt o'rnidida hosil bo'lgan nekrotik massa surilib ketadi va uning o'miga biriktiruvchi to'qima o'sib qalinlashib, asta-sekin chandiqqa aylanadi.

Klinikasi. Infarktining uch asosiy varianti farqlanadi.

1. Stenokardiyadagi og'riqni eslatadigan qattiq og'riq bilan o'tadigan og'riqli — *status anginosus* turi.

2. Me'da sohasida paydo bo'ladigan abdominal turi — *status gastralgicus*.


3. Og'riq mutlaqo bo'lmaydigan, biroq to'satdan yurak astmasi xuruji paytida paydo bo'ladigan asmatik turi — *status asthmaticus*.

Hozirgi vaqtida miokard infarktining serebral varianti ham tafovut qilinmoqda, bu variant miya qon aylanishining buzilishi alomatlari bilan o'tadi.

Miokard infarktining asosiy alomati ko'krak qafasida qattiq, ba'zan siqadigan, bosadigan, achishtiradigan o'ta kuchli og'riq paydo bo'lishidir.

Og'riq ko'pincha to'sh orqasida bo'ladi, lekin yurak uchi sohasida, ko'krak qafasining chap yoki o'ng yarmida hammadan zo'r bo'lishi mumkin. Og'riq chap yelka, o'mrov va qo'lga, ba'zan o'ng qo'l, bo'yin, pastki jag'ga, ahyon-ahyonda orqaga, ba'zi kasallarda qoringa, oyoqlarga tarqaladi (20-rasm). Og'riq bir necha soat yoki 2—3 kun tutib turadi va nitroglitserin ishlataligan bilan qolmaydi. Atipik hollarda og'riq qisqa muddatli bo'lishi, hatto butunlay bo'lmasligi mumkin.

Yurak-tomirlar sistemasi tomonidan o'zgarishlar, chunonchi o't-kir qon tomirlar yetishmovchiligi, ya'ni shok yoki kollaps ancha ko'p uchrab turadi. Avvaliga pulsning sekinlashishi va arterial bosimning bir qadar ko'tarilishi qayd qilinadi, keyin bosim pasayadi, puls tezlashti, yuz oqarib ketadi, oyoq va qo'llar muzlay boshlaydi, bemor terlaydi, ko'zi kirtayib qoladi, bosh aylanishi, hatto hushidan ketishi mumkin. Yurak chegaralari, odatda, surilmagan, tovushlari tiniq, jarangli, keyinchalik yurak tovushlari sustashadi, ba'zan galop ritmi (ot tuyog'i



20-rasm. Miokard infarktida og'riqlar tarqalishi.

tovushi) paydo bo'lishi ehtimol. Miokard nekrotik o'chog'i yurak ritmi buzilishining manbayi bo'lishi mumkin (ekstrasistoliya, paroksizmal, taxikardiya, titroq aritmiya).

Harorat reaksiyasi miokard infarktining doimiy alomati hisoblanadi. Tana haroratining ko'tarilishi (38°C atrofida), odatda, 3—7 kun shu holda saqlanadi. Tezlashgan EChT 3—6 kun aniqlanadi va u 30—40 kungacha shundayligicha qoladi.

Nekrotik o'choqning surilishi leykositozga olib keladi va tez orada eritrotsitlarning cho'kish reaksiyasi tezlashadi. Leykositoz — qonda leykotsitlar 1 mm^3 -da $10000—15000$ ($10 \cdot 10^9—15 \cdot 10^9 / \text{l}$) bo'ladi, infarkt paydo bo'lgandan so'ng 1 sutkada, ba'zan bundan ham ko'p bo'lib, shu holda bir necha kungacha saqlanib qoladi. Leykositoz, odatda, neytrofillidir (neytrofiller 75—80 % ga yetadi).

Keyingi yillarda miokard infarkti borligini tasdiqlaydigan bir qancha yangi tekshirish usullari taklif etilgan. Faqat nekrotik o'choqda hosil bo'ladigan va qonga o'tadigan C-reakтив oqsilni aniqlash shunday usullar jumlasidandir. Sog'lom kishilarda C-reakтив oqsilga manfiy reaksiya beradi. Miokard infarkti bor bo'lganda oqsilning bu turi infarkt paydo bo'lgandan keyin dastlabki 29 soatda qonda topiladi. Qonning oqsil spektri tekshirilganda L_1 -globulinlar va fibrinogen miqdori ko'payganligi aniqlanadi. Qonda qoldiq azot va qand miqdorining ko'payishi organizmda miokard infarktida ko'rildigani unchalik doimiy bo'lмаган о'згаришлардир.

Elektrokordiografiya ma'lumotlari miokard infarkti diagnostikasida juda muhim ahamiyatga ega, chunki EKG tekshirish infarkt o'rnini aniq belgilashga, dinamikada bajarilgan tasvirlar esa, kasallikning kechishi haqida tasavvur hosil qilishga imkon beradi. Yangi ro'y bergen miokard infarktida chap qorinchaning old devori sohasida EKGda I ulanishda $S-T$ oralig'i koronar tishga T ga o'tadigan izochiziq ustida yuqoriga surilgan, III ulanishda $S-T$ oralig'inining faqat pastga surilishi ko'rildi. Chap qorincha devori III ulanishda Q tishga kattalashishi va koronar tishga T ga o'tadigan $S-T$ oraligning yuqoriga surilgan, I ulanishda $S-T$ oralig'i pastga suriladi.

Miokard infarktining gastralik xili — qorin bo'shlig'i a'zolari faoliyatining o'zgarishi kasalligiga xos bo'lgan belgilar — qorinning yuqori qismida og'riq, ko'ngil aynishi, quşish, kekirish, hiqichoq tutishi, qorinning dam bo'lishi, ich ketish bilan kechadi. Qorin

sohasida paydo bo'lgan og'riq ko'krakka, ko'kraklar oralig'iga, to'sholdi qismiga tarqaladi, bemorning umumiy ahvoli yomonlashadi. Qorin paypaslab ko'rildi ganda, oldingi devorining yuqori qismi qattiqlashib og'riydi.

Miokard infarktining astmatik xili nafas yetishmasligi, hansirash bilan boshlanadi. Chap qorinchaning o'tkir yetishmovchiligi bu holga olib keladi. Yurak astmasi, o'pka shishi rivojlanadi. Kasallikning astmatik xili nihoyatda og'ir kechib, yurak-tomirlar tizimining surunkali yetishmovchiligiga olib keladi.

Miokard infarktining aritmik xili — yurakning maromsiz urishi bilan ifodalanadi. Titroq artimiya qorincha ekstrasistoliyasi, turli darajadagi blokadalar, paroksizmal taxikardiya, ko'proq qorincha xili rivojlanishi mumkin. Miokard infarkti boshlanishi bilan xavfli aritmiyalar bo'lib, bemorning ahvolini tang qilib qo'yadi va ko'pincha o'limga olib keladi. Yurakning notekis urishini bemor tez sezadi. U yurak urishi, hansirash, holsizlikdan shikoyat qiladi. Kardiogen shok rivojlanadi. Ba'zan bemorlar hushdan ketishadi.

Miokard infarktining serebral turi — miokard infarktining miyada qon aylanishining buzilishi bilan kechadigan xilda — bemorning psixikasi o'zgaradi, boshi aylanadi, hushidan ketishi mumkin. Miyada qon aylanishining buzilishiga miokard infarkti tufayli yurak qonni hayot uchun zarur a'zolarga yetkazib berolmasligi sabab bo'ladi.

Miokard infarktining asoratlari:

1. Shok kuzatiladi.
2. Yurak urishi maromining buzilishi.
3. Yurak astmasi yuz berishi.
4. Yurak devoridagi anevrizma paydo bo'lishi.
5. Yurakdagi qorinchalararo devorining teshilishi.
6. Tromboembolik asorat bo'lishi.
7. Me'da-ichakning shishi ketishi, me'daosti bezining yallig'-lanishi.

6.12.1. Miokard infarktida bemorlarni bavolash, parvarish qilish.

Miokard infarktining profilaktikasi

Miokard infarktida shoshilinch davo choralarini kasallik boshlangan joyning o'zida, uyda, ko'chada ko'rildi va zudlik bilan tez tibbiy yordam mashinasini chaqirib, bemor eng yaqin shifoxonaga

yuboriladi. Miokard infarktida uchragan bemorga o'rinda qimirlamay yotish rejimi, ruhiy va jismoniy osoyishtalik yaratish, parhezga amal qilish, ularni tegishlicha parvarish qilish buyuriladi.

Agar xuruj uyda tutgan bo'lsa, bemorga birinchi yordam ko'r-satilgach, uni tezlikda kasalxonaga yotqizish kerak. Xuruj uyda tutib qolganda og'riq alomati to'xtaganidan so'ng — o'tkir yurak va qon tomir yetishmovchiligi yoki ritmnning o'tkir avj olgan buzilishi bartaraf qilinadi. Miokard infarktida shoshilinch yordam:

- jismoniy va ruhiy osoyishtalik;
- oksigenoterapiya;
- nitroglitserin 0,5 mg til ostiga 3 marta har 5 minutdan so'ng;
- analgetiklardan tramadol yoki metamizol natriy, morfin gidroxlorid;
- neyroleptanalgeziya: fentanil — promedol — natriy xlорид eritmasi;
- asetilsalitsilat kislotasi 300 mg chaynash uchun;
- kasalxonaga yotqizish.

Miokard infarktiga duchor bo'lgan bemorlarni davolashda, ayniqsa, rejimga e'tibor berish kerak. Bunday bemorlar jismoniy va ruhiy osoyishtalikni butunlay ta'minlaydigan o'rinda yotish rejimiga uzoq vaqtgacha qa'tiy rioya qilishlari lozim.

Uzoq vaqtgacha qimirlamay yotish rejimidan maqsad shuki, bunda yurak muskulining jonsizlangan sohasida chandiq vujudga kelishi kerak, aks holda, anevrizma paydo bo'lishi va yurak muskulining uzilishi ro'y berishi ehtimol.

Bemor parvarishining boshqa choralarini ko'rish — uni yuvintirish, badanini artish, tuvak tutishda ham nihoyatda ehtiyyotkorlik talab etiladi. 2-haftadan boshlab, tizzalarni bukishga va boldir-tovon bo'g'inda aylantirishga, shuningdek, ularni asta-sekin qimirlatishga ruxsat etiladi. Keyinchalik qanday rejimga amal qilish kasallikning og'ir-yengilligiga, yoshiga va qo'shilib kelgan kasalliklariga bog'liq. Agar kasallik normal o'tayotgan bo'lsa, bu holda 4-haftadan boshlab, bemorlarga oz-ozdan (5—10 minutdan) yonboshlab yotishga ruxsat etiladi. Bemorni unga qarab turadigan xodimlar yonboshlatib yotqizishadi.

Bemorning bir vaziyatdan ikkinchisiga o'tkazishning bayon etilgan usuli huqna qilishda va shifokor bemorga mustaqil ravishda yonboshlashga ruxsat bergandan keyingi dastlabki vaqlarda

qo'llanishi lozim. Gavda vaziyatini shu tariqa o'zgartirish bemorning orqasini va dumg'azasini ho'llangan sochiq bilan artish yengil uqalash imkonini beradi. 4 haftadan keyingina mustaqil yonboshlashga ruxsat etiladi.

Monelik qiladigan sabablar bo'limgan taqdirda 3-haftadan boshlab, davo badantarbiyasi tayinlanadi. Infarkt bo'lgan bemorlar uchun shunday maxsus badantarbiya komplekslari ishlab chiqilgan.

Kasallikning dastlabki kunlarida bunday bemorlarning ovqati subkaloriyalı (sutkasiga 800—1000—1200 kaloriya) bo'lishi kerak. Qorinning dam bo'lishiga yo'l qo'yilmay, oson singiydigan ovqatlar beriladi. Bemorlarda meteorizm paydo bo'lishiga sabab bo'lmasa, unga meva suvları, sut, kefir, ilitilgan tuxum, moyda qovurib olingan oq non, bo'tqalar, ezilgan tvorog, qaynatilib maydalangan sabzavotlar berish tavsiya etiladi. Tuz miqdorini chegaralash kerak, bemorga ovqatni oz-ozdan, kuniga 4—5 mahal berish lozim. Suyuqlikni bemorning ahvoliga ko'ra, bir sutkada 1200—1500 ml ichishga ruxsat etiladi. Bemorning ahvoli yaxshilana borgan sari, parhez ovqatlar soni ko'paytirilib boriladi.

Miokard infarktini boshdan kechirgan bemorlar kasal kunitdan hisoblanganda 3—4 oydan keyin bajaradigan vazifalari og'ir jismoniy yoki ruhiy zo'riqishga aloqador bo'lmasa, ishga tushib ketishlari mumkin. Miokard infarkti bo'lib o'tgan bemorlarning hammasi dispanser kuzatuvida bo'lishlari kerak.

6.12.2. Kardiogen shokda yordam ko'rsatish

Kardiogen shok — miokard infarktining eng og'ir asoratlaridan biri bo'lib, yurak sohasida kuchli og'riq paydo bo'lganda kuzatiladi. Kardiogen shokda bemor haddan tashqari darmonsizlanib, rangi oqarib, labi ko'karadi, qo'l-oyog'i muzlaydi, yopishqoq sovuq ter chiqadi va ko'pincha hushidan ketadi.

Kasallikning doimiy belgilariidan yana oligo- yoki anuriya aniqlanadi. Kardiogen shokda shifokor ko'rsatmasiga binoan, strofantin 0,25 mg, kordiamin tomchilatib yuborib turiladi. Tomirlar tonusini yaxshilash uchun 0,5—1 ml 1 % li mezaton mushak orasiga yuboriladi. Og'riq shokida pressor aminlar bilan birga kortikosteroidlar qo'llaniladi. Sezilarli asidoz mahalida tomchi usulida natriy laktat gidrokarbonat tayinlanadi.

6.13. Yurak astmasi

Yurak astmasi o'pka shishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Chap qorincha yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadi. Yurak astmasi — yurak chap qorinchasining qonni aortaga haydash qobiliyati susayishi tufayli sodir bo'ladi. Yurak poroklari (aortal porok), yurakning ishemik kasalligi (miokard infarkti), gipertoniya kasalligi, ateroskleroz, stenokardiya sabab bo'ladi. Bu o'pkada qon dimlanib qolishiga va gaz almashinuvining buzilishiga olib keladi. Qonda buning natijasida karbonat angidridning ortib ketishi miyadagi nafas markazlarini ta'sirlab, keskin hansirash yuzaga keltiradi. Jismoniy zo'riqish, ruhiy hayajonlanish ham yurak astmasiga sabab bo'lishi mumkin.

Yurak astmasi ko'pincha tunda xuruj qiladi, bemor to'satdan havo yetishmasligidan uyg'onib ketadi va o'rnidan turib o'tirib oladi. Kuchli halloslaydi, yo'talib, ko'pikli balg'am tashlaydi. Juda bo'shashadi, bezovta bo'ladi, muzdek yopishqoq ter bosadi, ko'karadi. Bemorning teri qoplamlari oqarib va ko'karib ketadi, nam, sovuq bo'ladi. Bemor xuruj paytida majburiy hollarda bo'ladi, oyoqlarini pastga tushirib, qo'llariga tayangan holda o'tirib qolishadi (majburiy holat). Bemorda xunuj vaqtida o'lim vahimasi paydo bo'ladi. Qon bosimi sal ko'tarilib, yurak urishi tezlashadi. Eshitib ko'rulganda yurak tonlari bo'g'iq bo'lib, o'pka arteriyasi sohasida II ton kuchaygan bo'ladi.

O'pka eshitib ko'rulganda, uning pastki qismlarida nam va quruq xirillashlar paydo bo'ladi. Rentgenda o'pka tasviri kuchaygan bo'ladi. EKGda chap qorinchaning zo'riqqanlik belgilari ko'rildi. Kichik qon aylanishi doirasida qon dimlanishining kuchayishi natijasida yurak astmasi o'pka shishiga o'tib ketishi mumkin.

O'pka shishida bemor bo'g'ilishining yanada kuchayishi, o'pkada nam xirillashlar sonining juda ko'payib ketishi, bemor ko'p miqdorda suyuq, ko'piksimon, pushtirangli balg'am ajratishi kuzatiladi. Eshitib ko'rulganda o'pka ustida har xil pufakli nam xirillashlar ko'p miqdorda eshitiladi. Qon bosimi pasayadi. Tomir urishi tezlashib, ipsimon bo'lib qoladi. O'pka shishi juda og'ir holat bo'lib, bemorga o'z vaqtida yetarlicha yordam ko'rsatilmasa, uni qutqarib qolish mumkin bo'lmay qoladi.

6.14. O'tkir tomir yetishmovchiligi

O'tkir tomir yetishmovchiligi og'ir jismoniy shikastlanish, ruhiy iztirob, zaharlanish, organizmga yuqori harorat ta'siri (qattiq qizib ketish), qon va suyuqlikni ko'p yo'qotish (masalan, ko'p ich ketish va tinimsiz quşish) sabab bo'ladi.

Rivojlanish mexanizmiga ko'ra, o'tkir tomir yetishmovchiligi yurak yetishmovchiligidan farq qiladi. Tomir yetishmovchiligidida tomirlar, asosan, vena tomirlari funksiyasi keskin buziladi.

Venalarning asosiy roli yurakka qonni muayyan bosim ostida olib kelishdan iborat, venalar funksiyasi buzilganda, ularning tonusi pasayadi, venoz o'zani kengayadi, undagi bosim pasayadi. Shunga ko'ra, yurakka va arterial tarmoqqa venoz qon kam tushadi, yurak o'z qisqarishi bilan arterial o'zanga qonni yetarlicha «itara olmaydi», natijada, miya va yurakning o'zida qonsizlanish alomatlari paydo bo'ladi. O'tkir tomirlar yetishmovchiligi hushdan ketish, kollaps, shok bilan yuzaga chiqadi.

6.14.1. Hushdan ketish

Hushdan ketish deganda, miyaning o'tkir qonsizlanishi natijasida qisqa vaqtga hushni yo'qotish tushuniladi. Hushdan ketish – o'tkir tomir yetishmovchiligining eng yengil turi bo'lib, nerv sistemasi kuchsiz shaxslarda shamollatilmagan xonada, jaziramada uzoq vaqt bo'lish, emotsiyal va ruhiy zo'riqish kabi tashqi yoqimsiz ta'sirlar natijasida sodir bo'ladi.

Alomatlari. Bemor hushidan ketadi, rangi oqaradi, terisini sovuq ter bosadi, qorachiqlari torayadi, ko'ngli aynishi mumkin, puls kuchsiz, tezlashmagan, nafasi siyrak bo'ladi.

Davolash va parvarish qilish. Bemor oyoqlarini boshidan balandroq vaziyatda qilib yotqiziladi, bu miyaning qon bilan ta'minlanishini yaxshilashga imkon beradi. Bemor sof havodan bahramand bo'lishi kerak. Uni siqib turgan kiyimlari yechib qo'yiladi. Hushdan ketganda badanga sovuq suv purkash, so'ngra ishqalash va isitish, 1—2 marta novshadil spirti bug'larini hidlatish shoshilinch tibbiy yordam choralaridan hisoblanadi. Bu choralar qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatadi. Agar bu choralar natija bermasa, bemor terisi ostiga 1 ml kordiamin yuboriladi.

6.14.2. Kollaps

O'tkir tomirlar yetishmovchiligining bu turi MNSning idora qilish funksiyasi buzilganda, intoksikatsiya ta'siri ostida tomirlar tonusining boshqarilishi izdan chiqishi natijasida paydo bo'ladi. Kollaps og'ir infekzion kasallikda, ko'p qon ketganda va organizm ko'p suyuqlik yo'qotganda (ko'p ich ketishi, quşish) yuz berishi mumkin.

Alomatlari. Es-hush yo'qotilmagani holda tinka-mador quriydi. Bemor qattiq tashnalikdan shikoyat qiladi, nafasi yuzaki, tezlashgan, terisi keskin oqarib ketadi, sovuq ter bosadi, tana harorati pasayib ketgan, og'iz quriydi, arterial bosim keskin pasaygan, puls tezlashgan, ipsimon bo'ladi.

Davolash va parvarish qilish. Avvalo, kollapsni keltirib chiqaridan sabablar imkonli boricha bartaraf qilinadi (qon oqishini to'xtatish, intoksikatsiyaga qarshi choralar ko'rish). Bemorga jismoniy va ruhiy jihatdan to'la osoyishtalik yaratiladi. Venaga 0,5 ml kordiamin va 0,3—0,5 ml 1 % li mezaton eritmasi, 20 ml 40 % li glukoza eritmasidan yuboriladi. Teri ostiga 1 ml 20 % li kofein yoki kamfora yuboriladi, kislorodni hidlashga beriladi.

Keyinchalik shifokor ko'rsatmasiga binoan, venaga tomchilab (minutiga 20—40 tomchi) taxminan 5 ml 1 % li mezaton eritmasi yoki 5 ml 1 % li noradrenalin eritmasi 500 ml izotonik natriy xlorid eritmasida yoki shuncha miqdor 5 % li glukoza eritmasida kiritiladi. Agar eritmani quyish boshlangandan 5 minut o'tgach, arterial bosim ko'tarilmasa, dori yuborish tezligini minutiga 50—70 tomchiga oshirish zarur.

Arterial bosim normal raqamlargacha oshganda va kollapsning klinik belgilari yo'qolganda, ko'rsatib o'tilgan preparatlarni yuborish tezligi asta-sekin kamaytiriladi, so'ngra dori quyish to'xtatiladi. Noradrenalinning pressor samarasini kuchaytirish uchun 1 ml 0,1 % li atropin sulfat eritmasini yuborish maqsadga muvofiq. Kollaps yuz berganda venaga yuboriladigan mezatonli yoki noradrenalinli suyuqlik aralashmasiga prednizolon yoki kortizon qo'shiladi.

Ayrim hollarda arteriyaga 250 ml qon yuboriladi, so'ngra venaga tomchilab 150—500 ml qon yoki qon o'mini bosadigan suyuqliklar (poliglukin va boshq.) quyiladi. Qon quyishda mos kelish-kelmaslikka individual sinama, shuningdek, biologik sinama (3 marta) o'tkazish tavsiya etiladi. Bemor yaxshi shamollatiladigan xonada bo'lishi kerak, tashqi ta'sirotlar (yorug'lik, chiroq, shovqin) bartaraf qilinadi.

6.15. Qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi

Qon aylanishi surunkali yetishmovchiligining uch darajasi farq qilinadi.

1-darajasida surunkali qon aylanishi yetishmovchiligi rivojlana-digan asosiy kasallik belgilariga umumiy behollik, tez charchash, ta'sirchanlik, yaxshi u xlabel olmaslik qo'shiladi. Yurak urishi tezlashadi, nafas urishi kuchayadi.

2-darajasi xuddi shu alomatlar bilan xarakterlanadi. Biroq, ular oz-moz harakatda yoki osoyishtalikda paydo bo'ladi, oyoqlarga shish kelishi, jigar kattalashuvi bilan o'tadi, siyidik miqdori kamayadi, unda oqsil yuklari topiladi, diurez tungi soatlarga suriladi (nikturiya), oz-moz jismoniy harakat qilganda nafas qisa boshlaydi.

3-darajasida shishlar tarqaladi va doimiya aylanadi, suyuqlik bo'shliqlarda yig'iladi (assit, gidrotoraks. va h.k.). O'pkada qon dimlanishi hodisalari qayd qilinadi, jigar kattalashib, qattiqlashadi (sirroz), nafas doimo qisadigan bo'lib qoladi. Qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi chap qorincha, o'ng qorincha va aralash turda bo'ladi, bunda sianoz kuchayadi, hansirash tinch turganda ham bezovta qiladi. Bemor faqt yarimo'tirgan holatda u xlabeldi.

Davolash va parvarish qilish. Qon aylanishining surunkali yetishmovchiligin davolash uning bosqichiga bog'liq bo'lib, kompleks olib boriladi. Yetishmovchilikning 1-darjasida bilan kasallangan bemorlar mehnatga layoqatli bo'lishadi, biroq, ular dispanser kuzatuvida bo'lib, vaqt-vaqtida shifokor ko'rsatmasiga binoan, tegishli dori-darmonlar ichib turadilar.

Yetishmovchilikning 2-darajasi bo'lgan bemorlarni vaqt-vaqtida kasalxonaga yotqizib turish va yurak glikozidlari (strofantin, korglikon, digitoksin, digoksin) bilan davolash zarur. Qon aylanishning 3-darajasida o'rinda yotish rejimi, parhez (10-stol), siyidik haydaydigan vositalar, yurak glikozidlari bilan davolash tayinlanadi. Bo'shliqlarga suyuqlik yig'ilganda abdominal va plevral punksiya qilinadi.

Qon aylanishning surunkali yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarni parvarish qilish, avvalo, ularni tinmay kuzatib turish-dan iborat. Navbatchi o'rta tibbiyot xodimi shifokorga bemorning qanday u xlabeli (osoyshtami yoki bezovtami, ko'p uyg'onib turadimi, to'lg'anadimi, alahlaydimi), u xlabel va bedorlik vaqtida qanday nafas oladi (ravon yoki ravonmas), minutiga necha marta nafas

oladi, yo'taladimi, balg'am ajraladimi, tez-tezmi, qancha miqdorda hamda balg'amning turi to'g'risida xabar beradi. Bo'g'ilish xuriji, yurak sohasida og'riq paydo bo'lish vaqtি va boshqalarni qayd qilish lozim.

Palatada havoni muayyan haroratda, taxminan 18—20°C atrofida saqlab turiladi. Yozda, tashqarida jazirama issiq bo'lganda palatada konditsioner yordamida muayyan haroratni saqlash lozim.

Ovqat yeyilgandan keyin bemor tishlarini yuvishi, og'zini va tomog'ini kaly permanganat eritmasi bilan chayib turishi kerak. Agar bemor darmonsiz bo'lsa, parvarish qilayotgan xodim bemornining milklarini va tilini kaly permanganat eritmasida ho'llangan doka bilan artadi.

Bemorning ko'rpa-yostiq jildlari, choyshablari, ro'molchalarini tez-tez almashtirib turish zarur. Choyshabda hech qanday burmalar va non ushoqlari bo'lmasligi kerak. Bunday holat bemorda yotoq yaralar hosil bo'lishiga olib keladi.

Agar bemor o'rnidan tura olmaydigan bo'lsa, tagiga maxsus tuvak qo'yiladi, ichi kelgandan keyin bemor tagini uy haroratidagi iliq suv bilan yuvish lozim. Tunga qo'yiladigan tuvakni ishlatishdan oldin ularga ozroq suv yoki dezinfeksiya qiladigan eritma quyiladi. Tuvakdan foydalanib bo'lgandan keyin palata havosini buzmaslik uchun zudlik bilan uni xonadan olib chiqish kerak. Bemor terisini parvarish qilishda har kuni 2—3 marta butun badanni nam sochiq bilan artish zarur.

7-bob. OVQAT HAZM QILISH A'ZOLARI KASALLIKLARI


7.1. Kasallik haqida umumiy tushuncha

Hazm a'zolari og'iz bo'shlig'idan boshlanib, to'g'ri ichak bilan tugaydi, ularning uzunligi o'rtacha hisobda 11—12 metrga to'g'ri keladi. Quyidagi qismlardan iborat (21-rasm):

1. Og'iz.
2. Halqum (12—15 sm).
3. Qizilo'ngach (25 sm).
4. Me'da (16—24 sm).
5. Ingichka ichak (5—6 metr):
 - a) o'n ikki barmoqli ichak (26—30 sm).
 - b) och ichak (ingichka ichakning taxminan 2/5 qismini tashkil qiladi);
 - d) yonbosh ichak (ingichka ichakning 3/5 qismini tashkil qiladi).
6. Yo'g'on ichak (1—1,5 metr):

**21-rasm. Ovqat hazm qilish sistemasi
(sxematik tasvir):**

1—jag'osti so'lak bezi; 2—tilosti so'lak bezi; 3—og'iz bo'shlig'i; 4—til;
5—quloqoldi so'lak bezi;
6—halqum bo'shlig'i; 7—qizilo'ngach
(yuqori bo'lagi ochib ko'tilgan);
8—me'da; 9—me'daosti bezi; 10—o'n
ikki barmoqli ichak; 11 va 12—ingichka
ichak (11—och ichak, 12—yonbosh
ichak); 13—chuvalchangsimon
o'simta; 14—19—yo'g'on ichak
(14—ko'richak; 15—ko'tariluvchi
chambar ichak; 16—ko'ndalang
chambar ichak; 17—tushuvchi
chambar ichak; 18—sigmasimon ichak;
19—to'g'ri ichak); 20—o't pufagi;
21—jigar; 22—umumiy o't yo'lli.



- a) ko'richak (5—7 sm);
- b) ko'tariluvchi chambar ichak (18—20 sm);
- d) ko'ndalang chambar ichak (30—40 sm);
- e) tushuvchi chambar ichak (10—15 sm);
- f) S-simon ichak;
- g) to'g'ri ichak (15—20 sm).

Og'iz bo'shlig'i a'zolari sistemaning boshlang'ich qismi bo'lib, ovqat shu joyda mexanik qayta ishlanadi va qizilo'ngach orqali me'daga o'tkaziladi. Chaynash jarayonida ovqat so'lak bilan ho'llanadi, maydalanadi, so'lak fermentlar ta'sirida ovqat tarkibidagi uglevodlar, shu yerni o'zidan singishi boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida quloqoldi bezi, jag'osti bezi, tilosti bezi bo'lib, o'zлari ajratib chiqarayotgan suyuqligi bilan ovqat hazm qilish jarayonida qatnashadi.

Halqum og'iz bo'shlig'ining bevosita davomi bo'lib, uning shakli voronkaga o'xshaydi. Halqumning uzunasiga ketgan va kattalarda 12—15 sm keladigan bo'shlig'ining ustki yarmida tomoqdan halqum orqali ovqat luqmaga va suyuqlik qizilo'ngachga o'tadi.

Qizilo'ngach halqumning bevosita davomi bo'lib, u me'daga davom etadi. Qizilo'ngachning asosiy vazifasi luqma va suyuqlikni me'daga o'tkazishdir. Qizilo'ngach uch bo'limdan iborat: yuqori bo'yin sohasi, o'rta eng uzun soha va pastki eng qisqa soha. Uch fiziologik toraygan qismi — boshlanish qismida, o'rta qismida va me'daga o'tadigan joyida joylashgan.

Qizilo'ngach muskullarining yuqori qismidagi muskul tolalari funksional jihatdan halqum muskullariga o'xshab odamning xohishiga muvofiq qisqaradi, pastki silliq muskullar xohishiga itoat qilmaydi. Tashqi qavatini hosil qiluvchi muskullarning qisqarishi qizilo'ngachni kengaytirsa, ichki qavat muskullarining qisqarishi uni toraytiradi va luqmaning yoki suyuqlikning pastga yo'nalishini osonlashtiradi.

Qizilo'ngach o'ng va chap *n.vagus* (sayyor nerv) hamda ko'krak aortasining chigali vositasida innervatsiya qilinadi.

Me'da — hazm kanalining eng kengaygan joyi bo'lib, qorin bo'shlig'ining yuqori qismida joylashgan. Me'danining uzunligi 16—24 sm, kengligi 12 sm bo'ladi. O'rta hisobda 3—3,5 litr hajmga ega (22-rasm).

Me'da shakli nokka, kimyoviy laboratoriyalardagi retortaga yoki bir tomoni ingichka loviyaga o'xshaydi.

Me'da besh bo'limdan iborat:

1. Qizilo'ngachning me'daga o'tish joyiga to'g'ri keladigan kardial qismi.
2. Gumbaz yoki me'danining tubi.
3. Me'da tanasi.
4. Sinus — me'danining eng pastki qismi.
5. Me'danining pilorus bilan tugallanadigan chiqish qismini tashkil etadigan pilorik kanal.


Me'da devori uch qavatdan tashkil topgan. Qorin pardasining bir qismini tashkil etuvchi tashqi seroz qavat, buning qatlamlari katta va kichik charvilardan va boshqa qo'shni organlardan me'daga o'tadi: o'rta — muskul qavat va ichki-shilliq qavatdan iborat. Me'da tubidagi bez hujayralaridan pepsin va xlond kislota ajraladi. Bundan tashqari, me'dada ferment ajratadigan hujayra elementlari ham bo'lib, ular qon yaralishida alohida o'rindutadi.

Me'dada ovqat qisman hazm bo'ladi, so'ngra ichaklarga so'riladi. Me'danining ajratish va so'rish funksiyalari ham mavjud. Ingichka ichak me'danining oxirgi, chiqish qismidan boshlanib, to yo'g'on ichakning boshlang'ich qismiga qadar davom etadi va hazm kanalining eng uzun qismi hisoblanadi. Ingichka ichakning uzunligi 5–6 metr.

Ingichka ichakning boshlanish qismi, o'n ikki barmoqli ichak bo'lib, me'dani pilorus qismidan boshlanadi, u uch qismdan iborat, yuqori gorizontal qism, pastki gorizontal qismga o'tadigan tik qism. Tik qismning ichki tomonida Fater so'rg'ichi bor, ana shu joyda o'n ikki barmoqli ichakka umumiy o't yo'lli va medaosti bezining chiqaruv yo'llari ochiladi.

Ingichka ichak yuzasi juda ko'p so'rg'ichlardan iborat bo'lib, ularning soni odamlarda o'rta hisobda 4 million hisobida bo'ladi, bo'yi 0,5 mm.dan 1,5 mm.gacha yetadi.

Har qaysi so'rg'ichlarning ichida limfa tomirlar, qon tomirlar va nervlar bo'ladi, ovqat bo'tqasidan yog'lar limfa tomirlariga, oqsillar, uglevodlar esa vena tomirlariga o'tadi, undan filtrlanish



22-rasm Me'danining sxematik tasviri
(tik kesmasi):

- 1—me'da tubining seroz pardasi;
2—muskul pardasi; 3—shilliq pardasi; 4—katta egriligi; 5—chiqish qismi; 6—o'n ikki barmoqli ichak;
7—pilorus; 8—kichik egriligi;
9—kardial qismi; 10—qizilo'ngach.

(tozalanish) uchun darvoza venasi orqali jigarga boradi. So'rg'ichlar och ichakda uzunroq va ko'proq bo'ladi. Ingichka ichak devorida limfa tugunlar ham bo'ladi. Limfa tugunlari yakka yoki bir qanchasi to'planib, g'uj-g'uj bo'lib turadi.

Yo'g'on ichak hazm kanalining ingichka ichakdan keyin davom etuvchi qismi bo'lib, orqa chiqarish teshigi bilan tugaydi. Ingichka ichak yo'g'on ichak chambarining ichida yotadi. Yo'g'on ichakning uzunligi 1—1,5 metr, yo'g'on ichak ovqatni hazm qilish, hazm jarayonida hosil bo'lgan moddalarini so'rish, uning qoldiqlarini shaklga solish va ajratishga xizmat qiladi.

Demak, me'daga tushgan ovqat o'sha onda me'da shirasi yordamida hazm bo'la boshlaydi, qisman oqsillar ham hazm bo'ladi. Hazm qilish o'n ikki barmoqli ichakda birmuncha jadal boradi. Bu yerda me'daosti bezi shirasi va o't ta'sirida oqsil yog' va uglevodlar parchalanishi boshlanadi. Hazm jarayonida hosil bo'lgan moddalar ingichka ichakda so'riliadi, uning shilliq qavati shunga juda ham moslashgan.


Yo'g'on ichak devorida, asosan, suyuqlik so'riliadi. Bu esa ovqat qoldiqlarini axlat massasiga shakllantirish imkonini beradi. Oqsil, qand va ayrim yog' moddalar ichakda so'rilgach, darvoza vena orqali jigarga tushadi, jigarda tegishlicha o'zgorganidan so'ng organizm to'qimalariga o'tadi. Yog'larning asosiy qismi limfa yo'liga tushadi va jigarni chetlab o'tib, umumiy qon oqimiga tushadi.

Ichakda, shuningdek, suv, vitaminlar, tuzlar va boshqa mineral mahsulotlar so'riliadi.

7.2. Jigar va o't yo'llari a'zolarining qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlari

Jigar qorin bo'shlig'inng yuqori qavatida joylashgan bo'lib, diafragmaga tegib turadi. Jigar organizmdagi bezlarning eng kattasi bo'lib, og'irligi taxminan 1500 g. Jigarning uzunligi 20—22 sm, eni 10—12 sm, qalinligi 7—8 sm. Jigar qizg'ish-kulrang tusda bo'lib, ushlab ko'rilganda qo'lga juda yumshoq unnaydi. Jigar uch bo'lakdan: kichik (chap), katta (o'ng) va pastdan o't pufagi tutashadigan kichik kvadrat bo'laklaridan iborat (23-rasm).

Jigarda o't yo'llari, darvoza vena tarmoqlari, arteriyalar, jigar venalari, limfa tomirlar mavjud. Yirik tomirlar kiradigan va undan o't yo'llari chiqadigan joy jigar darvozasi deyiladi.



23-rasm. Jigarning sxematik tasviri (chapda—pastdan ko'rinishi, o'ngda—yuqoridan ko'rinishi):

1—pastki kovak venasi; 2—qopqa vena; 3—umumiyo o't yo'li; 4—jigarning o'ng bo'lagi; 5—o't pufagi yo'li; 6—o't pufagi; 7—o't pufagining jigardagi yo'li; 8—jigarning chap bo'lagi; 9—jigar boylamasi.

Jigar glisson kapsula deb nomlangan fibroz qatlam bilan o'rالgan. Fibroz parda jigar darvozasi sohasida birmuncha qalinchashib, qon tomirlari bilan birgalikda jigar ichiga kiradi va yupqa biriktiruvchi to'qima qavatiga aylanib, jigarni juda ko'p bo'laklarga bo'lib yuboradi. Jigar ichidagi 1—2 mm keladigan bo'lakchalar xuddi to'rtburchak asosli pirizmaga o'xshaydi.

Jigarga kiruvchi qon tomirlar yonida nervlar va limfa tomirlari ham bo'ladi. Bo'lakchalar o'rtasidagi arteriyalar va venalar ham maydalashib, jigar bo'lakchalarining muddasi ichiga kiradi va kapillar turini hosil qiladi. Natijada arteriya va vena kapillarlariga kelgan qonlar aralashib, vena qoniga aylanib ketadi. Bu aralashgan qon markaziy venalarga, undan yig'uvchi venalarga o'tadi. Yig'uvchi venalar ham o'zaro qo'shilib, borgan sari yiriklasha boradi va pirovardida, jigar venasi hosil bo'ladi. Jigar venasi bevosita pastki kovak venaga quyiladi.

Jigar hujayralari orasida joylashgan mayda o't naychalari, o'tni bo'lakchalararo naychaga quyadi. Bu so'nggi naychalar bir-biri bilan qo'shilib, jigarning o'ng va chap bo'lakchalaridan chiquvchi yo'llarini hosil qiladi. Bu ikki jigar darvozasidan chiqqan zamon bir-biri bilan qo'shilib, umumiyo o't yo'lini hosil qiladi.

Yuqorida bayon etilganidek, o't pufagining naychasi bilan qo'shilib, umumiyo o't yo'lini hosil qiladi. Jigar adashgan nervlar va jigar (simpatik) chigali vositasida innervatsiya qilinadi.

Fiziologiyasi. Jigar orqali 1 soatda 100 litr qon oqib o'tadi.

Jigar oqsillar almashinuvida ishtirok etadi. Jigar oqsillarning 7 kun ichida yangilanish fakti aniqlangan (boshqa organlarda oqsillar 17 sutkadan ko'proq vaqtida yangilanadi). Plazmaning ko'p oqsillari 100 % albuminlar, 80 % globulinlar jigarda sintezlanadi. Organizmida aminokislotalarning almashinuvida jigar asosiy rol o'yaydi. Jigarda mochevina hosil bo'ladi, glutamin va kreatinlar ishlanadi. Organizm och qolganda, jigar oqsilni boshqa to'qimalarga nisbatan qonga ko'proq chiqaradi.

Jigar yog'lar almashinuvida ishtirok etadi. Yog' almashunuvida jigar o't ishlab chiqarish funksiyasi tufayli ishtirok etadi. Yog'larning normal hazm bo'lishi va so'riliishi uchun o't suyuqligi bo'lishi kerak.

Uglevodlar almashinuvida jigar yetakchi rolni o'yaydi. Jigarda glikogen sintezlanadi va parchalanadi, glukoza oksidlanadi, glukoneogenez bo'ladi, glukuron kislota hosil bo'ladi. Jigarning baryer funksiyasi jigar tashqi va ichki zaharli moddalarni zararsizlantiradigan markaziy organlardan biridir. Jigarda ammiakda mochevina hosil qilish yo'li bilan u zararsizlanadi. Jigarda gormon va fiziologik aktiv moddalar oksidlanadi.

O't pufagi jigarning o'ng bo'lagining ostki yuzasida o't pufagi chuqurchasida joylashgan. U keng tubi jigarning old chekkasidan biroz chiqibroq turadigan nok shaklidagi a'zodir. O't pufagining tubi, tanasi, bo'yni tafovut qilinadi.

O't pufagi jigarda ishlanib chiqqan o'tning ortiqcha miqdori saqlanadigan joy bo'lib, sig'imi 40—60 sm³ keladi, lekin o'zi o't ishlab chiqarmaydi. O't pufagi to'rt qavatdan iborat: 1) seroz parda; 2) seroz osti qavati; 3) muskul qavati; 4) shilliq parda.

O't pufagi xususiy arteriyasidan chiquvchi qon bilan ta'minlanadi. Vena qoni shu nomdag'i vena orqali darvoza venasiga qo'yiladi. Adashgan nerv tolalari, simpatik nervlari jigara chigali vositasida innervatsiya qilinadi. Odamning jigari bir sutkada 700—800 gramm-gacha o't ishlab chiqaradi.

Me'daosti bezi qorin bo'shlig'inining orqa tomonida I—II bel umurtqalari qarshisida, me'danining orqasida ko'ndalang holatda yotadi. Bu bez kattalikda jigardan keyin ikkinchi o'ringa turadi.

Bezning uzunligi 16—22 sm, kengligi 3—8 sm, qalinligi 2—3 sm, og'irligi 70—90 g. U yumshoq pushti-kulrang bo'lib, juda ko'p bo'laklardan iborat.

Bez boshi, tana, dum qismlaridan iborat. Me'daosti bezining boshi boshqa qismlarga qaraganda katta bo'lib, o'n ikki barmoqli ichakning tushuvchi qismiga o'zining yo'li bilan qo'shiladi. U hazm

a'zolari sistemasiga quyadigan shiradan tashqari, insulin gormonini ham ishlab chiqaradi va uni to'g'ridan to'g'ri qonga qo'shib turadi.

Insulin gormoni qondagi qand miqdorini bir me'yorda tutib turadi. Me'daosti bezi, arteriya va vena qon tomirlari bilan ta'milangan holda uni adashgan nerv tolalari, simptomi nerv tolalari orqali innervatsiya qilinadi.

7.3. Hazm a'zolari tizimi kasalliklarining umumiy alomatlari va tekshirish usullari

Hazm a'zolari tizimi kasalliklarida bemorlarning shikoyatları xilma-xildir. Bular: 1) og'riq; 2) ishtahaning pasayishi; 3) ko'ngil aynishi; 4) ta'm bilish sezgisining yo'qolishi; 5) so'lak oqishi; 6) kekirim; 7) zarda qaynashi; 8) qusish; 9) hiqichoq tutishi; 10) ich ketishi; 11) ich qotishi; 12) qon ketishi; 13) qoringa suyuqlik yig'ilishi; 14) disfagiya; 15) badanning qichishishi; 16) tosh bosgandek hisning paydo bo'lishi; 17) o'xchish; 18) og'izdan badbo'y hid kelishi; 19) ozish; 20) chanqash; 21) ochlik hissining paydo bo'lishi; 22) go'shtli taomlardan yuz o'girish (me'da raki); 23) darmonsizlik; 24) lohaslik; 25) tenezm; 26) badan sarg'ayishi.

Og'riq hazm a'zolari kasalliklarida ko'p uchraydigan belgi bo'lib, uning xarakterli xususiyati xilma-xildir. Turli xil kasalliklarda og'riq turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Og'riq to'shosti sohasida, to'sh suyagi xanjarsimon o'simtasi tagida, o'ng, chap qovurg'alar tagida, kindik atrofida, qorin sohasida, bel sohasida, kurak tagida, yelkada va boshqa sohalarda uchraydi. Og'riq bir nuqtadan bir qancha kenglikda tarqaladi, gohida og'riq ko'chib yuruvchi xarakterga ega bo'ladi. Og'riq qisqa, hatto soatlab davom etadi. Og'riq tutgan paytda bemorlar ko'pincha gavda vaziyatini o'zlaricha o'zgartiradilar.

Qorin tarangligini kamaytirish uchun bemorlar oyoqlarini bukkan holda chap yoki o'ng yonboshni yoki qorinni bosib, ba'zan esa tizza bilan tirsaklariga tayanib yotadilar. Og'riq turlicha: goh lo'qillagan, goh achitadigan, goh kuchli xurujsimon bo'ladi. Gastrit va saratonda uchraydigan doimiy og'riqlar, ovqatdan 2—3 soat va, hatto bundan ko'ra ko'proq vaqt o'tgandan keyin, tunda tutib qoladigan kechki og'riqlar tafovut qilinadi. Tunda tutadigan kechki og'riqlar o'n ikki barmoqli ichakda boshlanganini ko'rsatadi. Qorin

ochligida nahorga tutadigan og‘riqlar o‘n ikki barmoqli ichak yarasi va sekretsiyaning kuchayishi uchun xarakterlidir.

Hazm a‘zolari kasalligida ishtaha pasayishi (surunkali gastrit, me‘da chiqish joyining torayishi), ishtaha kuchayishi yoki susayishi mumkin. Ishtahaning butunlay yo‘qolishi — anoreksiya o‘tkir gastritda va oshqozon o‘smasida kuzatiladi. Me‘da-ichak yara kasalliklarida ishtaha saqlanadi, lekin bemor og‘riqdan qo‘rqib ovqat yemaydi. Ishtaha buzilganda ovqatni tanlab yeyish xohishi kuzatiladi, o‘tkir gastrit va oshqozon o‘smasida bemor yog‘li ovqatlar, go‘shtni ko‘rgisi kelmaydi. Aksincha, ularda yeb bo‘lmaydigan moddalarni yeyish ishtiyogi tug‘iladi (ohak, gilvata).

Kekirish kardial qism ochiq bo‘lganda oshqozonning qisqarishi natijasida vujudga keladi. Hidsiz, havo bilan kekirish (aerofagiya) havo yutganda kuzatiladi. U uzoqdan ham eshitilib turadi. Gazli kekirish oshqozondagi ovqatning achishidan kelib chiqadi. Hidsiz gaz bilan kekirish karbonat angidrid ajralib chiqqanda kuzatiladi. Palag‘da tuxum hidiga o‘xhash kekirish uzoq turib qolgan oqsillar parchalinishi natijasida sodir bo‘ladi. Kislotali kekirish oshqozon shirasi ishlab chiqarilish kuchayganda, o‘t suyuqligining oshqozonga tushishi natijasida yoki kislotalilik oshganda kuzatiladi.

Qizigan yog‘ hidiga o‘xhash kekirish kislotalilik kamayganda yoki erkin xlorid kislota kamayganda, oshqozon uzoq vaqt bo‘shamay turganda va unda har xil organik kislotalar hosil bo‘lganda kuzatiladi.

Zarda bo‘lish (jig‘ildon qaynashi) ko‘pincha kislotalilik oshib ketganda kuzatiladi, ammo u kislotalilik pasayib ketganda ham, hatto oshqozon shirasida erkin xlorid kislota bo‘limganda ham paydo bo‘lishi mumkin. Ko‘pincha zarda qilish qizilo‘ngachning pastki qismida va achishish sezgisi bilan kechadi. Kardiya sohasida joylashgan sfinkterning yetishmovchiligi va shu tufayli me‘dadagi suyuqlikning yetishmovchiligi tufayli me‘dadagi suyuqlikning qizilo‘ngachga qaytiq chiqishi zarda bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Qusish — me‘dadagi hazm bo‘limgan ovqat moddalarini beixtiyor ravishda orqaga qaytiq chiqishi. Ertalab nahorga birtalay shilimshiq aralash qayt qilish surunkali gastritlar uchun xarakterlidir. Yara kasalligida odam odatda ovqatdan 2—5 soat keyin, pilorus stenozida esa kechasi qayt qiladi. Qusish kelib chiqishi jihatidan markaziy va periferik bo‘lishi mumkin.

Markaziy nerv sistemasiga ta’sir qilishi natijasida shartli refleks tarzida, miyaga oid, zaharlanish natijasida va ba’zi bir dori

moddalarning quşish markaziga ta'siri natijasida kelib chiqadi. Markaziy nerv sistemasiga ta'sir qilish natijasida kelib chiqadigan qayt qilishda ko'ngil aynimasligi, quşishdan so'ng yengillik bo'lmasligi kuzatiladi. Periferik ta'sir natijasida quşish — me'da shilliq pardasining kimyoviy moddalardan ta'sirlanishi. Me'da chiqish qismining funksional torayishidan kelib chiqqan quşish ro'y beradi. Me'da shilliq pardasining kimyoviy moddalardan ta'sirlanishi tufayli kelib chiqqan quşishda — qusuq miqdori kam bo'ladi, chunki quşish refleksi oshqozonni to'lishiga imkon bermaydi, gastritlarda va oshqozon o'smasi rivojlanishing boshlang'ich davrida kuzatiladi. Quşish ovqatlanishdan so'ng tezda ro'y beradi.

Me'da chiqish qismining funksional torayishidagi quşishda esa qusuq miqdori hadeb nordon ovqatlangach, 2—4 saat keyin boshlanadi. Yara kasalligida shira ko'p ishlab chiqariladigan gastritlarda kuzatiladi. Oshqozon chiqish qismining funksional organik torayishidan quşish, oshqozon haddan tashqari to'lib ketganda kechqurun yoki tunda ro'y beradi. U bir necha kun ilgari yeyilgan ovqat mahsuloti bo'lishi mumkin, bunda bemor ancha yengil tortadi. Yaradan so'ng chandiq natijasida, oshqozon chiqish qismi torayganda o'smada kuzatiladi.

Alkogol gastritda quşish ertalab, nahorga kuzatiladi, bunda kechki oshqozonda shilliq, so'lak, shira to'planib qolganda ro'y beradi. Oshqozon kardial qismining o'smasida, gastritlarda ovqatlangandan 5—10 saat keyin quşish oshqozon shilliq pardasi sezgirligi ortib ketganda, ovqatlangandan 4—6 saat keyin quşish oshqozon yarasi uning chiqish qismida yoki o'n ikki barmoqli ichakda joylashganda, oshqozon tonusi yo'qolganda kuzatiladi. Ovqatdan 12—14 saat o'tgach, quşish oshqozon chiqish joyining torayishida, oshqozon keskin kengayib ketganda, tarangligi yo'qolganda kuzatiladi.

Ich ketish organizmning himoya vositasi bo'lib, bunda organizmdan zaharli moddalar, kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar, achish va bijg'ish natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar va dorilar chiqarib tashlanadi. Ich ketish — me'da-ichak yo'lining yuqori qismida ovqat hazm qilishning buzilishi, me'da shirasining kamayib ketishi (axiliya), me'daosti bezi sekreti va jigar hujayralari sekreti (o't)ning yetishmasligi, ingichka ichakda so'rilib jarayonining buzilishi sabab bo'ladi. Ba'zan kishi qattiq hayajonlanganda, qo'rqqanida, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari yoqmaganida ich ketishi mumkin. Qon aralash ich ketishi ham kuzatiladi.

Qon ketish, qon quşish. Hazm a'zolari kasalliklarida ham belgi sifatida hamda asorati sifatida qon ketishi mumkin. Qonli quşuq — gemotomezis, qon aralash ich ketish — qatronsimon najas — melena yoki axlatni laboratoriya usulida tekshirishda aniqlanadigan oz miqdorda yashirin qon ketishi me'da yarasida bo'ladiyan alomatidir. Qon me'dadan yoki o'pkada ketayotganini hamma vaqt aniqlab bo'lmaydi, lekin bemorga darhol yordam ko'rsatish uchun bu masalani zudlik bilan hal qilish zarur. O'pkada qon bemor yo'talganda ketadi. U alvon rangli, ko'piksimon, ishqoriy muhitga ega.

Me'dadan qon ketganda u quşish paytida paydo bo'ladi. Qon ovqat bilan aralashgan, agar unga me'da shirasi qo'shilgan bo'lsa, to'q qizil rangga nordon muhitga ega, ivigan bo'ladi. Me'da yarasidan qon tez ketadigan bo'lgani uchun odam qon aralash ko'p quşadi, lekin quşiqdan qon o'pkadan qon ketganidek tiniq bo'lmaydi va ko'piklanmaydi. Me'da rakida qon sekin ketib, gemoglobin xlorid kislota ta'sirida o'zgarishi natijasida quşuqqa qahva quyqasiga o'xshab qolgan ozroq qon aralashib tushadi.

Dam bo'lish. Ichakda ko'p yel to'planishi natijasida qorin taranglashadi, ichakda normal mikrob florası o'zgarishi natijasida chirish va bijg'ish kuchayganda ko'p gaz hosil bo'ladi. Bemor qornida og'irlilik, tirsillash, quldirash va og'riq sezadi, yel chiqqandan keyin bu alomatlar yo'qoladi. Ichi dam bo'lgan odamni ba'zan hiqichoq tutadi, kekiradi, boshi og'riydi.

Qabziyat — surunkasiga 48 soat va bundan ham ortiq vaqt davomida ich kelmasligi. Ba'zan qabziyat mustaqil kasallik hisoblanadi.

Har kuni bir xil, ayniqsa, tarkibida oqsilli ko'p ovqatlar yeish, ovqat tarkibida suv, ho'l meva va sabzavotlar kam bo'lishi yo'g'on ichakning normal funksiyasi buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada, qabziyat ro'y beradi. Ichaklar me'yorida ishlab turganda, ozish maqsadida haddan ziyod surgi dorilar qabul qilish qabziyatning juda og'ir turini keltirib chiqaradi. Yo'g'on ichakning tug'ma uzunlashuvi, surunkali kolit, qorin bo'shlig'idagi bitishma singari qator kasalliklarda ichak torayib qoladi, me'da, o't pufagi, buyrak, ayollar jinsiy organlari kasalliklarida yo'g'on ichak funksiyasi buziladi, oqibatida qabziyat vujudga keladi.

Qabziyat yo'g'on ichak devori muskullari tonusining ortib yoki kamayib ketishi, ba'zan bavul qilish (defekatsiya)ning tabbiy ravishda buzilishi oqibatida vujudga keladi. Har safar hojatga borganda,

zo'riqib kuchanish natijasida orqa chiqaruv yo'li churrasi, bavosir, shilliq qavatning tirmalishi singari qator kasalliklar vujudga kelib, bular jarrohlik yo'li bilan davolashni taqozo etadi.

So'lak oqishi. So'lak ajralishining buzilishi ovqat hazm qilishga va butun hazm qilish sistemasiga ta'sir qiladi. So'lak bezlari nervlarining ta'sirlanishi natijasida ko'p so'lak chiqib, uning oqib turishi bemorlarga salbiy ta'sir etadi. O'tkir enterit, kolit va gijja kasalliklarida kuzatiladi.

Ko'zdan kechirish. Hazm a'zolari kasalliklari bilan og'igan bemorni ko'zdan kechirganda, uning umumiy ko'rinishiga, oriq-to'laligiga, qorin qoplamalarining ahvoli, teriosti venalarining nechog'liq rivojlanganligi, kindigiga, qorinning shakli va tomirlar urib turishining ko'rinish-ko'rinasligiga ahamiyat beriladi.

Ba'zi kasalliklarda qorin hajmining sezilarli darajada kattalashib ketishi, haddan tashqari semizlik, me'da va ichaklarning dam bo'lib turganiga (meteorizm), qorin bo'shlig'ida suyuqlik (assit) to'planib qolganiga, jigar va taloqning ancha kattalashib ketgani, qorin bo'shlig'iga yoki kichik chanoq organlarida katta o'smalar borligiga bog'liqdir. Umumiy meteorizmda qorin ko'proq oldinga chiqib turadi, assitda pastga, kishi yotganida esa biror tomonga do'mpayib chiqib turadi, ko'pincha qorin ichidagi bosim ortib ketganligi tufayli kindik turtib chiqqan bo'ladi, xususan, ichak tutilishi, pilorus stenozi tufayli uzoq och qolganida, tez-tez ichi ketaverGANIDA qorin ichiga tortib ketadi.

Teriosti venalari, xususan, pastki qorin va ustki qorin sohalaridagi venalarning kengayib ketganligi, qorinning o'rta qismidagi venalarning kengayib, meduza boshi shaklida kindikdan radikal yo'nalihsda tarqab borganligi, darvoza venasi stvolining yoki jigardagi tarmoqlarining tashqaridan bosilib turishi tufayli teshigi bekilib qolganligini ko'rsatadi.

Perkussiya. Qorin perkussiya qilinganda timpanik tovush chiqadi, me'da va yo'g'on ichak ustida bu tovush birmuncha past va kattaroq bo'lib, qorin o'rtasi, ingichka ichak ustida birmuncha yuqori bo'ladi.

Jigar va taloq kattalashib ketishi, o'sma bo'lishi yoki talaygina suyuqlik to'planib qolsa, perkutor tovush bo'g'iq bo'lib qoladi. Me'da qismi perkussiyada muayyan balandlikka ega bo'lgan timpanik tovush beradi.

Auskultatsiya. Me'dani palpatsiya qilayotgan vaqtida biryo'la auskultatsiya qilish ahamiyatga ega. Me'daga stetoskop qo'yiladi va

eshitib turgan vaqtning o'zida barmoqni qorin devori bo'ylab, stetoskopdan hamma tomonga qarab yurgizib boriladi. Palpatsiya qilib borayotgan barmoq me'da ustida bo'lar ekan, stetoskopda shildirovchi tovushlar eshitiladi. Jigar va taloq seroz pardalari yallig'langanida fibroz qatlamlar to'planib qolgan joyda ishqalanish shovqinini eshitish mumkin.

Palpatsiya qilish jarayonida bemor butun muskulaturasini bo'-shashtirib, oyoqlarini tizza bo'g'inidan bukkan holda va qo'llarini ko'kragiga qo'ygan holda qulay yotishi lozim. Tekshiruvchi kishi karavotning o'ng tomonida bemorga yuzni qaratib, bemorning o'mi bilan bir sathda turishi lozim. Yuza va chuqur palpatsiya tafovut qilinadi. Yuza palpatsiyada tekshiruvchi o'ng qo'lini bemorning qorincha kafti bilan qo'yib, juda ichkariga kirishga harakat qilmasdan, asta-sekin qorinning butun sohasini palpator yo'l bilan ohista tekshira boshlaydi. Bunda qorinning tarangligi, do'mpayib chiq-qan-chiqmaganligi, qarshiligi, sezgirligi, og'riq, shish bor-yo'qligi aniqlanadi.

Me'da va ichakni chuqur palpatsiya qilish quyidagilardan iborat: barmoq uchlari bilan ohista, go'yo paypaslab ko'rayotgandek, asta-sekin chuqur tushib boriladi va buning uchun har safar nafas chiqarilganida qorin devorining bo'shashuvidan foydalanib, qorin bo'shlig'inng orqa devori yoki chuqurda yotgan organgacha yetib borishga harakat qilinadi.

Qorin sohasini chuqur palpatsiya qilish qaysi joyning va qancha og'rishini, qorin devori muskullarining nechog'liq tarangligi, organlarning katta-kichikligi, o'smalar bor-yo'qligini aniqlashga imkon beradi. Hazm organ kasalliklarida qo'shimcha tekshirish usullari: rentgenografiya, rentgenoskopiya, xolesistografiya, gastro-skopiya, fibroskopiya (biopsiya, gistologik tekshirish), laparoskopiya (peritoneskopiya), me'da shirasini tekshirish, duodenal zondlash, qusuq massalarini tekshirish, axlat, qon (biokimiyoviy analiz) va siyidik tahlillari, UTT (ultratovushli to'lqin) yordamida tekshirish haqida maxsus bo'limlarda so'z yuritiladi.

7.4. Me'da kasalliklari

7.4.1. Gastrit

Me'da shilliq qavatining yallig'lanishiga gastrit deyiladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali gastritlar farq qilinadi.

7.4.2. O'tkir gastrit

Etiologiyasi. Sifatsiz ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, qiyin hazm bo'ladigan, yog'li, achchiq, dag'al ovqatlar, issiq va sovuq ovqatlar, kuchli spiritli ichimliklar ichish, kislota va ishqorlardan zaharlanish, ovqatlanish tartibining buzilishi, tibbiy dorilarni noto'g'ri qabul qilish, yovvoyi qo'zigorin, poliz mahsulotlaridan zaharlanish, bakteriya toksinlarining ta'siri, kasalliklar oqibatida: o'tkir angioxolit, o'tkir pankreatit, bezgak, gripp, salmonelloz, botulizm, qizilcha (skarlatina), pnevmoniya, sil, yurak yetishmovchiligi (dimlanish) oqibatida buyrak yetishmovchiligi (uremik gastrit).

Klinikasi. O'tkir gastrit to'satdan boshlanib, og'iz bemaza bo'ladi, so'lak oqadi, ko'ngil ayniydi, ishtaha yo'qoladi. Yeyilgan ovqat aralash bemor qayt qiladi, qusuq badbo'y hidli, unda shilliq o't bo'ladi, qusuqda yaxshi hazm bo'limgan ovqat bo'laklari ko'rindi. Ko'p suyuqlik yo'qotish oqibatida bemor chanqaydi, tana harorati ko'tariladi ($38-39^{\circ}\text{C}$). Qorinning yuqori epigastral sohasida og'riq seziladi. Og'riq goh lo'qillagan, goh achitadigan, gohida kuchli xurujsimon bo'ladi. Me'daosti sohasida to'liqlik va og'irlik seziladi.

Qorin dam bo'ladi, gohida ichi qotadi (qabziyat), gohida esa ketma-ket ich ketadi. Darmonsizlik, lohaslik, tez charchash seziladi. Bosh og'rishi, bosh aylanishi kuzatiladi. O'tkir gastritni og'ir shaklida tomir yetishmovchiligi (kollaps)ga xos belgilar namoyon bo'ladi.

Ko'zdan kechirilganda, teri rangi oqargan, badandan yopishqoq sovuq ter chiqadi, lablar ko'karadi, uchuq toshadi. Puls tez-tez, minutiga 100—120 marta (taxikardiya) urib, yaxshi to'lishmaydigan bo'lib qoladi. Qon bosimi pasayib ketadi, yurak tomir bo'g'iq bo'lib qoladi, nafas qisadi.

Til quruq, tilda gungurt-jigarrang dag'al karash bilan qoplangan bo'ladi. Palpatsiyada epigastral sohada og'riq kuzatiladi, ichakda quldirash, ko'richak sohasida chayqalish, shovqin seziladi.

Laboratoriya tahlili: qonda neytrofil leykositoz, EChT tezlashgan; siydikda oqsil va giperbiliarubinemiya topiladi.

Me'da suyuqligining kislotaliligi avvaliga oshgan, keyinchalik uning kislotaliligi pasayib ketadi. Axlat badbo'y bo'lib, undan ovqat va shilimshiq aralashmalar topiladi. Qusuqdagi kislotalar tekshirilib

ko'rilganda yo yuqori, yo past raqamlarni topish yoki erkin xlorig kislota mutlaqo yo'qligini aniqlash mumkin.

Davolash va profilaktikasi. Dastlab tashqaridan tushgan toksinli moddalarni organizmdan chiqarish zarur, shu maqsadda me'da yuviladi. Mahalliy sharoitda qaynatilgan, iltilgan suv, ayron ichkizib qustirish mumkin.

Ichakni zaharli, toksinli moddalardan tozalash. Tuz surgi – magneziy sulfat, natriy sulfat yarim stakan suvga 25 g qo'shib ichkiziladi. Tozalovchi huqnalar ham qilinadi.

Organizmni suvsizlanishiga qarshi va qonni toksindan tozalash, og'riqni qoldirish uchun shifokor ko'rsatmasiga binoan, turli vositalar va yurak glikozidlari buyuriladi.

Kasallikning profilaktikasi oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlash ustidan sanitariya nazorati olib borishdan iborat, ovqat tayyorlanadigan idish-tovoqlarning toza bo'lismiga alohida ahamiyat berish zarur. Oshxona xodimlarini vaqt-vaqt bilan tibbiy tekshiruvdan o'tkazib turish kerak.

Kasallikni parvarish qilishda – og'iz bo'shlig'ini muntazam tozalab turish, quisish vaqtida qoringa issiq qilish (issiq grelka, kompress, priparka quyish) tozalovchi yoki sifonli huqna qilish lozim.

Giyohlardan ich ketganda 20 g yong'oq va 40 g rovoch yig'masidan bir osh qoshiq solib, 200 ml qaynab turgan suvda 10 minut ohista qaynatiladi. Uni dokadan o'tkazib, kun davomida 2 mahal ovqatlanishdan 40 minut oldin 200 ml.dan ichish lozim.

7.4.3. Surunkali gastritlar

Surunkali gastrit – me'da shilliq pardasini surunkali yallig'lanishi bo'lib, me'da muayyan morfologik o'zgarishlar hamda shu organning sekretor, motor va boshqa funksiyalari buzilishi bilan xarakterlanadigan, keng tarqalgan kasallikdir.

Surunkali gastritlarning tasnifi

I. Gastrit – asosiy kasallik bo'yicha

A. Etiologiyasiga qarab.

1. Ekvogen gastrit:

a) alimentar;

b) surunkali intoksikatsiya – alkogol, nikotin;

d) kasbga aloqador — metall, ko'mir, silikat changi, ishqor va kis-lota ta'siri.

2. Endogen gastrit:

- a) yuqumli kasalliklar;
- b) moddalar almashinuvining buzilishi;
- c) ichki sekretsiya bezlari kasalliklari;
- d) qon aylanish yetishmovchiligi;
- e) allergik kasalliklar.

B. Funksional belgilari bo'yicha:

1. Kislotaning normaga nishatan oshishi — giperasidli gastrit.

2. Kislotaning normaga nisbatan kamayishi — gipoasidli gastrit.

3. Kislotaning normada bo'lishi — normasidli gastrit.

4. Kislotaning bo'lmasligi — anasidli gastrit.

II. Gastrit boshqa kasalliklar bilan birgalikda bo'lishligi.

1. Me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi.

2. Surunkali kolit.

3. Surunkali enterit.

4. Surunkali hepatit.

5. Surunkali xolesistit.

6. Surunkali pankreatit.

Etiologiyasi. Ovqatlanish me'yorining buzilishi — o'ta to'yib ovqatlanish, to'liq chaynamasdan yutish, qattiq, achchiq, issiq ovqatlar iste'mol qiliш, chaynov apparatidagi nuqsonlar, ovqatning kam kaloriyaliligi, unda vitaminlar va oqsillarning yetishmasligi.

Muntazam ravishda spirtli ichimliklar ichib turish, tamaki chekish, tibbiy dorilarni uzoq vaqt iste'mol qiliш, kasbga aloqador ba'zi zararli omillar, asabiy zo'riqish, stomatit, laringit, faringit, nafas olish organlarining yallig'lanish kasalliklari (bronxit, pnevmoniya, o'pkani yiringli kasalliklari, o'pka sili), surunkali hepatit, xolesistit, pankreatit, enterokolit, o'tkir gastrit, me'da yarasi, endokrin bezlari kasalliklari (qandli diabet, Addison kasalligi, Isenko-Kushing kasalligi, buqoq, gipotireoz, modda almashinuvining buzilishi), kamqonlik — temir moddasining yetishmovchiligi.



24-rasm. Ovqat hazm qilishda ishtirok etadigan qorin bo'shilig'i organlari (me'da-ichak yo'li, me'daosti bezi va jigar) chizmasi. Gastrida zararlanadigan organ (me'da) strelka bilan ko'rsatilgan.

Klinikasi. Og'riq paydo bo'lishiga epigastral sohada me'da muskulaturasining cho'zilib ketganligi yoki tortishib qisqarishi sabab bo'ladi. Yallig'langan shilliq parda har qanday mexanik ta'sirotlarda og'riq manbayi bo'lib qoladi. Og'riqdan kelib chiqadigan me'da shirasi kislotaliligining oshganligi ham sabab bo'lishi mumkin. Surunkali gastrit uchun, odatda, unga kuchli bo'limgan simillab, vizillab turadigan, ahyon-ahyonda zo'rroq tutadigan doimiy og'riq xarakterlidir. Og'riq ko'pincha achchiq ovqat yeyish, ichkilik ichishiga aloqador bo'ladi. Ular me'da nerv chigallarining ta'sirlanishi tufayli kelib chiqadi.

Dispeptik hodisalar – sekretsiya yetarli bo'limgan gastritda bemor quruq kekiradi, og'zidan palag'da tuxum hidi keladi, ko'ngli ayniydi, kasal zo'raygan paytida bemor qayd qiladi, ich ketishi, qorinning dam bo'lishi kuzatiladi. Sekretsiyasi oshgan gastritda esa dispeptik hodisalar yaqqol namoyon bo'ladi, bemorlarda achchiq kekirish, zarda qilish, ko'krakosti sohasidagi achishish, qorin dam bo'lishi, qayt qilish kuzatiladi. Ich qotish (qabziyat) bilan kechadi.

Ishtahaning pasayishi, darmonsizlik, gohida lohaslik kuzatiladi. Obyektiv tekshirishda: tili ko'pincha gungurt sariq karash bilan qoplangan bo'ladi, bemor ozadi. Palpatsiya qilinganda to'shosti sohasida (epigastral sohada) xanjarsimon o'simta bilan kindik orasidagi o'rta chiziqda bosib ko'rilmaga bezillab turadigan og'riq sezildi.

Me'da shirasini tekshirib ko'rish va uning miqdori hamda kimyoviy tarkibini aniqlash tashxis uchun katta ahamiyatga ega. Sekretsiyasi yetarli bo'limgan gastritda sinov nonushtasidan so'ng me'da suyuqligi tekshirilganda, talaygina miqdordagi shilliq va yetarlicha chaynalmay yeyilgan non topiladi. Ozod xlorid kislota miqdori birmuncha kamaygan, ba'zida esa u bo'lmaydi. Sekretsiyasi oshgan va saqlanib qolgan gastritda sinov nonushtasidan keyin me'da suyuqligida sekretsiya va kislotalilikning oshganligi, ovqatga aralashib ketgan shilimshiq borligi, ko'p miqdorda leykotsitlar mavjudligi aniqlanadi.

Rentgenologik tekshirish: sekretsiyasi yetarli bo'limgan gastritda shilliq qavati burmalari silliqlashgan yoki mutlaqo bo'lmaydi. Sekretsiyasi oshgan gastritda shilliq qavat burmalari qalinlashgan bo'ladi. Gastroskopik tekshirish – me'da shilliq qavatini geperplaziyasi va atrofiyasi aniqlanadi; yallig'lanish uchastkalari ko'rildi.

Eroziyalı, petexiyali, qontalashlar aniqlanadi. Qonda – leykotsitlar miqdori ko'paygan, gemoglabin miqdori kamaygan bo'ladi.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya: surunkali gastrit qo'zigan davrda 1-parhez, keyin 2-parhez buyuriladi. Bemorlar achchiq, dag'al, juda issiq yoki sovuq ovqatlardan o'zlarini tiyishlari kerak. Ovqatni oz-ozdan, vaqt-vaqt bilan yeyish tavsiya etiladi. Jismoniy va ruhiy zo'riqishlardan saqlanishi zarur.

Mineral suvlari: gastritning sub va anasid turlarida tarkibida osh tuzi bor suvlari «Yessentuki» №17, «Ijevsk» suvi, giperasad turlarida ishqorli mineral suvlari – «Smernovsk», «Borjomi» va boshqa ma'danli suvlari tavsiya etiladi. Mahalliy sharoitda tabiiy ma'danli suvlari ichiladi.

Surunkali giperasad gastritni davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan, quyidagi dori vositalaridan foydalilanildi: antasid preparatlar (almagel, maloks, gastal, renni), xolinolitik preparatlar (atropin, platifillin, benzogeksoniy), dispepsik holatlarni yo'qotish uchun vositalar (serukal, motilium, metoklopramid), xelikobakteriyalarga qarshi preparatlar (trixopol, amoksitsillin, tetrasiklin, sefalotin), N_2 -gistamin retseptor blokatorlari (simetidin, ranitidin, famotidin), vismut preparatlari (de-nol, vikalgin), spazmolitiklar (no-shpa, papaverin). Surunkali gipoasad gastritni davolashda 2-parhez tayinlanadi. Kislotaning o'rnini bosuvchi dori vositalari (asidin pepsin, pankreatin, xolenzim, panzinorm, digestal, festal), ishtahani ochish uchun plantaglutsid buyuriladi.

Giyohlardan aloy suvi ovqatdan 30 minut ilgari 1 choy qoshiqdan kuniga 2–3 mahal ichiladi. Dengiz karami ich qotganda yengil surgi vositasi tariqasida $1/2$ – 1 choy qoshiqdan kechasi ichib yotish uchun buyuriladi (suv bilan). Yel haydaydigan yig'ma, qorin dam bo'lganda damlama ko'tinishida $1/4$ – $1/2$ stakandan ertalab va kechqurun ichiladi. Ukrup suvi 1 osh qoshiqdan kuniga 3–6 mahal ichiladi. Rovoch ildizi mudom ich qotib yuradigan mahalda 0,5 g.dan kechasi ichib yotiladi. Zubturum suvi 1 osh qoshiqdan kuniga 3–4 mahal (anasidli gastritda) ichiladi.

Kasallikning oldini olishda uni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etish lozim. O'tkir gastritning oldini olish, chekish, spiritli ichimliklarni iste'mol qilish, birlamchi kasalliklarni hamda yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi omillardan bartaraf bo'lishi lozim. Og'iz bo'shilg'ini toza tutish, ovqatlarni yaxshilab chaynab yeyish, chaynov apparatidagi nuqsonlarni davolash, organizmdagi infeksiya o'choqlarini yo'qotish kerak.

7.5. Me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi

Me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi o'ziga xos ko'rinishi va mahalliy anatomik o'zgarishlar bilan kechadigan organizmning umumiy surunkali kasalligidir.

Etiologiyasi. Markaziy nerv sistemasi faoliyatining buzilishi, uni o'ta ta'sirlanishi yoki qo'zg'alishi va tormozlanish jarayonlarning to'qnashuvi oqibatida yuz berishi, kuchli ruhiy kechinmalar, ovqatlanish tartibining buzilishi, chaynov apparatidagi nuqsonlar, to'liq chaynamasdan yutish, me'da shirasining kislotaliligi va peptik faoliyatining ortib ketishi, me'da shilliq qavatining qon aylanishini pasayishi, ruhiy hayajonlanish, aqliy va jismoniy charchash, doimo xavotirda bo'lism, surunkali gastritning giperasidlik turi, chekish, spirtli ichimliklarni ichish, mexanik ta'sirotlar, kislota va ishqorlardan zaharlanish, tibbiy dorilarni noto'g'ri qabul qilish.

Klinikasi. Og'riq — yara kasalligida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Og'riq turlicha, goh lo'qqilagan, goh achitadigan, gohida esa kuchli xurujsimon bo'ladi. Og'riq 1—2 soatdan keyin paydo bo'lsa, yara me'daning kardial qismida joylashish hollari juda ko'p marta ko'rilgan, og'riq tez paydo bo'lsa, yara me'dani pilorik qismida joylashganligi ma'lum. Kechikkan va qorin ochligidan og'riq, asosan, o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligida bo'ladi.

Kekirish — oshqozon shirasi ko'p ajralganda vujudga keladi, bunda achchiq, nordon ta'm seziladi, bu hodisa oshqozonda yara borligidan dalolat beradi. Oshqozonda ko'p gaz hosil bo'lganda, oshqozonning kardial qismi reflektor ravishda ochilib, chiqish qismi esa yopiladi, bu kekirishga olib keladi.

Ko'ngil aynishi — ko'ngilsiz hislarni paydo bo'lishi, me'da yarasida ovqat mahsulotlarining to'liq hazm bo'imasligi, quish markazini reflektor ta'sirlanishi oqibatida vujudga keladi. Zarda qilish (jig'ildon qaynashi) qizilo'ngachning pastki qismida o'ziga xos qizish va achishish sezgisini vujudga kelishi, ko'pincha u kislotalilik oshib ketganda kuzatiladi.

Qayt qilish — yara kasalligining juda ko'p uchrab turadigan muhim alomati hisoblanadi. Og'riq juda qattiq tutib turgan paytda, ba'zida bemor og'riqni yengillashtirish maqsadida sun'iy yo'l bilan qayt qilishga harakat qilib ko'radi.

Qusuq massalariga qon aralashgan bo'lishi yoki qusganda «qahva quyqasini» tashlash, me'dadan qon ketayotganligini ko'rsatadi. Qon quish bitan bir qatorda, ko'pincha axlatga ham qon aralashib, u suyuq qoramoysimon xarakterli ko'rinishda bo'lib tushadi (melena).

Qon ketish ham yara kasalligining muhim alomati hisoblanadi. Qonli qusuq — gematomezis qon aralash ich ketish — qatronsimon najas — melena yoki axlatni laboratoriya usulida tekshirishda aniqlanadigan oz miqdorda yashirin qon ketishi yarada bo'ladigan alomatdir. Qon me'dadan yoki o'pkadan ketayotganini hamma vaqt ham aniqlab bo'lmaydi, lekin bemorga darhol yordam ko'rsatish uchun bu masalani zudlik bilan hal qilish zarur. O'pkada qon bemor yo'talganda ketadi, u alvon rangli, ko'pixsimon ishqoriy muhitga ega. Me'dadan qon ketganda u qusish paytida paydo bo'ladi. Qon ovqat bilan aralashgan, agar unga me'da shirasi qo'shilgan bo'lsa, to'q qizil rangga, nordon muhitga ega, ivigan bo'ladi.

Me'da yarasidan qon tez ketadigan bo'lgani uchun odam qon aralash ko'p qusadi. Lekin qusiqdagi qon o'pkadan qon ketganidek tiniq bo'lmaydi va ko'piklanmaydi. Bemorni ko'zdan kechirganda, tili ko'pincha oq karash bilan qoplangan bo'ladi. Bemor ozib ketganda, me'daning perestaltik harakatlari sezilib turadi. Og'riq tutib turganda, bemorlar majburiy holatga tushib qolishadi.

Palpatsiyada og'riq epigastral sohada, ba'zan esa qorin o'ng to'g'ri muskulining uchdan bir yugori qismida joylashadi, bu soha pilorusning qorin devori reaksiyasiga mos keladi. Ehtiyyotlik bilan bosib ko'rulganda, bu sohalarda og'riq paydo bo'ladi — Mendel simptom qorinni yuza palpatsiya qilishda o'ng to'g'ri muskulning qattiqligi (rigidligi) qayd qilinadi (muskul himoyasi).

Me'da shirasi laboratoriyada tekshirib ko'rilsa, ko'pincha sekretsiya bilan kislotalarning ko'payib ketganligi ma'lum bo'ladi. Axlatda yashirin qon borligi ko'rildi.

Bemorni rentgenologik tekshirishda kontrast modda bariy sulfati ichkizilganda me'da ko'lankasidan go'yo turtib chiqib turadigan tokchani (simptom «nisha»ni) ko'rish mumkin. U me'da devoridagi chuqurchaning bariydan to'lishidan hosil bo'ladi.

Asoratlari:

1. Perforatsiya — yaraning teshilishi, yara barcha qavatlardan o'tib, me'da devorini teshishi mumkin, bu teshib o'tgan yara nomini olib, qorin pardasini yallig'lanishiga olib keladi.

Klinikasi o'tkir bosylanadi, to'shosti sohasida «xanjarsimon» og'riqning vujudga kelishi, qorinning oldingi devori muskuli taranglashishi (doskasimon), Shyotkin-Blyumberg simptomı musbat, terining oqarishi, bradikardiya kuzatiladi. Bemorning umumi ahvoli og'irlashadi, kollaps, qisqa puls, tana haroratining ko'tarilishi, ichak tutilish, neytrofill leykositoz kuzatiladi.

2. Penetratsiya. Yara ba'zida qo'shni a'zolarga — jigar, me'daosti bezi, o'n ikki barmoqli ichak va boshqa organlarga teshib o'tadi. Bunday hollarda mazkur a'zoning yuzasi va qorin pardasi yaraning tubi bo'lib qoladi — bunday yara penetratsiyalovchi yara nomini oladi. Klinikasi — og'riq muntazam ravishda bo'ladi, ko'pincha ovqat yeyish bilan bog'liq bo'ladi, ko'ngil aynishi, quşish, tana harorati subfebril bo'lib qoladi, eritrotsitlarni cho'kish tezligi — tezlashishi kuzatiladi.

3. Stenoz va deformatsiya. Chuqur yaralarning chandiqlanishi vaqtida me'da shakli o'zgaradi. Bunday hollarda u qum soat (qo'shaloq bo'shliqli me'da) yoki chig'anoq shaklini olishi mumkin. Agar pilorus sohasida joylashgan yara chandiq hosil qilsa, bu holda chandiq me'dadan o'n ikki barmoqli ichakka chiqish qismini toraytirib qo'yishi mumkin va bunda pilorus stenozi paydo bo'ladi. Klinikasi uch bosqichga bo'linadi:

- kompensatsiyalangan bosqich — og'riq tez, jadal, to'shosti sohasida to'liqlik, bosim sezgisi, kekirish, quşish kuzatiladi;
- subkompensatsiyalangan bosqich — og'riq, me'daning peristaltik harakatlari sezilib turadi, kekirish, quşish kuzatiladi;
- dekompensatsiyalangan bosqich — doimiy og'irlilik, to'liqlik, quşish, bemorning umumi ahvoli og'irlashadi. Tez charchash, holdan toyish, suvsizlanish, talvasaga tushish va azotemiya kuzatiladi.

4. Qon ketish — qon ketayotganligi, qon aralash quşish yoki suyuq qatronsimon ich ketishida aniqlanadi.

5. Yaraning rakka (malignizatsiya) va diafragma osti absessiga aylanib ketishi ko'rildi.

Davolash. Me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligini davolashni ikki turi farqlanadi: konservativ va jarrohlik yo'li bilan davolash. Konservativ davolash asoratlanmagan me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligida qo'llaniladi. Kasallikning asoratlarida jarrohlik yo'li bilan davolash qo'llaniladi.

Konservativ davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi: jismoniy faoliytni cheklash, kasallikni o'tkir davrida o'rinda yotish rejimi, diyetoterapiya, medikamentoz davo. Kasallikni 1-haftasida — 1-a-parhez, 2-hafta davomida — 16-parhez, 3-haftadan boshlab davolash kursining oxirigacha — 1-parhez. Ovqatlanish sutkasiga 5—6 martani tashkil qilishi kerak. Parhez tarkibiga sut mahsulotlari, bulyonlar, eziltirib pishirilgan sho'rvalar, bo'tqalar, kisel, meva suvlari, sariyog'lar, ilitilgan tuxum, qand bir kunda 50 g, oq

suxari, go'sht va baliqli ovqatlar, yormalar, bug'da pishgan ovqatlar buyuriladi. Ovqatlar ko'pincha kungabooqar yoki zaytun moylarida tayyorlanishi kerak.

Kasallikni dorilar bilan davolash shifokor ko'rsatmasiga asosan, me'da shirasini kamaytirishga va me'da-ichak yo'li motor funksiyasini tiklashga qaratilgan bo'lishi kerak. Shu maqsadda quyidagi dorilar tavsiya qilinadi:

- **gastroprotektorlar:** *N₂* gistogram retseptor blokatorlarining 3—4 avlod turlari (ranisan, zantak, famotidin, nizatidin). Bu dorilar me'da sekretsiyasini kamaytirib, yara epitelizatsiyasini tezlashtiradi;
- **proton nasosi blokatorlari** (omeprazol, lansoprazol, ramiprazol);
- **antixelikobakterial dorilar** (amoksiklav, flemoksin, klatsid, rovamitsin, doksisiklin, minotsiklin);
- **vismut preparatlari** (de-nol, sukralfat).

Fizioterapevtik davo tadbirlaridan parafin applikatsiyalari, diatermiya, gidroterapiya qo'llaniladi.

Ayrim hollarda endoskopik davo qo'llanilishi mumkin. Bunda, agar 1 oy davomida yuqoridaq davo choralar natijasida yaraning bitishi kuzatilmasa, endoskop orqali solkoseril, heparin, ximotripsin yuborish yo'li bilan davolanadi.

Me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligining qon ketish asoratida bemorga osoyishtalik yaratish va me'da sohasiga muzli xalta qo'yish tavsiya qilinadi. Qon to'xtatuvchi dori vositalarni (vikasol, aminokapron kislotasi), qon o'rnni bosuvchi dorilarni tayyorlab qo'yish zarur.

Kasallikning barcha asoratlarida bemor jarroh ko'rigidan o'tishi kerak.

Giyohlardan moychechak gullari damlamasi 1—5 osh qoshiqdan kuniga 2—3 mahal ichiladi. Shuningdek, qoncho'p o't ildizpoyasi va ildizlari, zira mevasi, zirk daraxt bujurlari damlamasi 1 osh qoshiqdan 5—6 marta ichiladi. Air ildizpoyasi ishtahani ochish maqsadida ovqatdan 30 minut oldin, kuniga 3 mahal $\frac{1}{4}$ stakandan damlama ko'rinishida ichiladi, achchiq ermon o'ti ishtaha ochish, ovqat hazmini yaxshilash maqsadida ovqatdan 30 minut ilgari damlamasi 1 osh qoshiqdan yoki teng turasi 15—20 tomchidan kuniga 3 mahal ichiladi. Ukrop suvi 1 osh qoshiqdan kuniga 3—6 mahal ichiladi.

7.6. Me'da saratoni

Erkaklar ayollarga qaraganda ikki barobar ko'p kasallanadi. Me'da saratoni bilan og'rigan bemorlarni asosiy qismini 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan odamlar tashkil etadi. Me'da saratoni o'lim jihatidan boshqa hamma xavfli kasalliklardan ajralib turadi.

Etiologiyasi aniqlanmagan, lekin bir qancha ta'sirlar kasalliklarni rivojlanishiga omil sifatida qatnashadi, sekretsiyasi yetishmovchiligi bo'lgan surunkali gastrit, me'da polipozi, me'da yarasi (kallez yara), irsiy moyillik, autoimmun jarayonlar, konserogen moddalarni ta'siri, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, dag'al va ta'sirlantiradigan taomlarni ko'p iste'mol qilish, issiq va sovuq ovqatlarning ta'siri, pernisinoz anemiya.

Klinikasi. Kasallikning boshlanishida bemorlar boshqa me'da kasalliklari singari shikoyat qilishadi. Avvaliga alomatlarsiz kechadi. Bemorlar shifokorga kech murojaat qilishadi. Bemorning darmoni qurib, mehnat qobiliyatni pasayadi, go'shtli taomlardan yuz o'giradi, ishtahasi pasayadi. Kekirish, ko'ngil aynishi, qorin dam bo'lishi, ich qotishi, to'shostining og'ir bo'lib, og'ib turishi, keyinchalik anemiya rivojlanib, borgan sari darmoni qurib, bemorlar ozib ketadi. Saraton o'smasi pilorik qismida joylashganda me'daning chiqish qismi o'sma bilan bekilib qolganligi sababli turib qolgan ovqatni bemorlar qusib tashlaydilar, qusuq massa qahva quyqasini eslatadi, ba'zida qon quisiladi.

Ko'zdan kechirilganda, teri quruq, mayinligi (turgorligi) pasaygan, ko'rinish turadigan shilliq pardalar rangsiz. Paypaslab ko'rulganda epigastral sohada qattiq va ushlab ko'rulganda og'riydigan o'smani aniqlash mumkin. Keyinchalik saraton o'smasi boshqa organlarga metastaz beradi.

Laboratoriya tahlili. Qonda EChT tezlashadi, gipertrombositoz, gemoglobin miqdorini pasayishi. Axlatda qon topiladi.

Rentgenda kontrast modda ichib tekshirilganda, to'lish nuqsoni topiladi.

Davolash va profilaktikasi. Saratonoldi kasalliklari bor bemorlarni dispanser hisobiga olish, kasallik keltirib chiqaruvchi sabab-larning oldini olish lozim.

Me'da saratoni metastaz bermagan bosqichlarda jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Kasallik boshqa a'zolarga metastaz bergen bosqichlarda saratonga qarshi dorilar va nur bilan davolanadi. Qattiq

og'riq holatlarida narkotik va nonarkotik og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalaniladi.

Davolash onkolog ko'rsatmasiga binoan, nur va kimyoviy vositalar bilan ilgari qilingan davodan bir oy keyin o'tkaziladi. Sarkolizin 0,01 g tabletka 0,02 g kukunlarda chiqariladi. Katta yoshli odamlar uchun (50 kg.dan og'ir vazn) bir martalik dozasi 0,03 g.dan 0,05 g.gacha. Tana vazni 50 kg.dan kam bo'lsa 0,5—0,7 mg/kg hisobida beriladi. Davo kursi 4—7 hafta.

Giyohlar bilan davolashda qayin zamburug'i qo'llanilishi mumkin. Qayin zamburug'i (chaga) 20—100 damlama ko'rinishida, maydalaniib ustiga 48 soatcha qaynagan ($50-60^{\circ}\text{C}$ haroratli) suv quyib qo'yiladi. So'ngra suyuqlikni quyib olinadi-da, turpini bir necha qavat dokaga solib eziladi. Shifokor buyurganiga qarab, I stakandan kuniga 1—3 mahal ichiladi. Uni ichilayotganda, asosan, sut-o'simliklardan iborat ovqatlar bilan ovqatlanish tavsiya etiladi. Ishtaha ochadigan yig'ma tarkibida ermon o'ti 8 qism, bo'yimodaron o'ti 2 qism ovqatdan 30 minut ilgari I osh qoshiq-dan kuniga 3—4 mahal ichiladi. Uch yaproq bargi ishtahani ochish maqsadida kuniga 2—3 mahal $\frac{1}{4}$ stakandan ovqatdan 30 minut oldin ichiladi.

7.7. Ichak kasalliklari

7.7.1. Enterit

Ingichka ichaklarning shilliq pardasining yallig'lanishiga enterit deyiladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali enterit farq qilinadi.

7.7.2. O'tkir enterit

Etiologiyasi. Sifatsiz ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish (ovqatning sifati va miqdoriga aloqador kamchiliklar), hazm kanalining zaharlardan shikastlanishi (dorilardan zaharlanish, yovvoyi qo'ziqorinlarni iste'mol qilish), ichakdagи mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar, gjijalar), kislota, ishqor, spirt, metall changlaridan zaharlanish, ichki sekretsiya bezlari kasalliklari, me'da va me'daosti bezi kasalliklari, surunkali nefrit-uremiya, virusli gripp, sil, tif, qizamiq, sepsis, dizenteriya kasalliklaridan keyin, zaharli moddalar — mishyak, simob, yod, salitsilatlar, adonis, ayrim sanoat zaharlari ta'sirlaridan kasallik vujudga keladi.

Klinikasi. Kasallik to'satdan boshlanadi. Bemorning ko'ngli aynib, tez-tez, sutkasiga 10—15 marta sassiq hidli ichi ketadi. Qorinda, kindik atrofida sanchiqsimon og'riq tutadi, bemor qayt qiladi, ishtahasi yo'qoladi. Zarda qaynash, kekirish, ko'pincha bemor lanj bo'lib, darmoni qurib borayotganidan, boshi og'rib, aylanayotganidan noliydi.

Tili quruq va karash bilan qoplangan, og'zidan badbo'y hid keladi. Puls tez, og'ir hollarda arterial qon bosimi birdaniga pasayib ketadi, kollaps ro'y beradi.

Organizmning suvsizlanishi oqibatida oyoq-qo'llar tortishib turadi, muskullarda og'riq bo'ladi, oyoq-qo'llar muzlaydi. Gohida tana harorati ko'tariladi.

O'tkir toksik enteritda, avvaliga bemorning darmoni qurib, ko'ngli ayniydi, so'lagi oqadi, qusib, ichi ketadi, qorni og'rib turadi. Og'ir shaklida (yengil, o'rtacha og'ir, og'ir shakli) bemor hech to'xtamasdan, varaq-varaq qusadi, ichi ketadi, shuning natijasida organizm suvsizlanib, talvasaga tushib qoladi, yurak-qon tomirlar faoliyati susayib qoladi.

Laboratoriya rahlili. Siydkning sutkalik miqdori kam, siydk quyuqlashgan, oqsil va silindrlar topiladi. Axlatda ko'p miqdorda shilimshiq va hazm bo'lмаган ovqat qoldiglari (muskul tolalari, kraxmal donachalari va yog' tomchilari) topiladi. Qonda—leykositoz, EChT—tezlashgan.

Davolash. Dastavval, organizmdan kasallikka sababchi bo'lgan zaharli oziq-ovqat moddalari va mikroblarni chiqarib tashlash zarur. Buning uchun me'da 2 % li soda eritmasi yordamida yuviladi. Surgi tayinlanadi. 20—25 g magneziy sulfat yarim stakan suv bilan ichiladi, kanakunjut moyidan 1—2 osh qoshiqdan ichiladi va tozalovchi huqna qilinadi. Shifokor ko'rsatmasiga binoan, antibiotiklardan levomitsetin, tetrasklin, neomitsin sulfat, monomitsin, kanamitsin, sulfanilamid preparatlaridan sulgin, ftalazol, ftazin, enteroseptol beriladi. Og'riq qoldiruvchi vositalar — no-shpa, platinillin beriladi. Yurak ishini yaxshilash maqsadida: kofein-natriy benzoat 10 % li — 1 ml teri ostiga, kamfora 20 % li — 2 ml teri ostiga, kordiamin 25 % li — 2 ml teri ostiga, mezaton 1 % li — 1 g teri ostiga qilinadi. Vitaminlardan: askorbin kislotasi kuniga 100 mg.dan, nikotin kislotasi 50 mg.dan kuniga 3 mahal, riboflavin 5 mg.dan kuniga 3 mahal, A vitamini 2 mg.dan kuniga 3 mahal beriladi.

Organizmni suvsizlantirishga qarshi natriy xlorid 0,9 % li — 400 ml tomir ichiga, huqnalar holida yuboriladi.

Giyohlar bilan davolash. Qoncho'p o't ildizpoyasi va ildizlari I osh qoshiqdan kuniga 5—6 mahal ichiladi. Moychechak gullari I osh qoshiqda kuniga 5—6 marta ichiladi. G'ozpanja ildizpoyasi I osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichiladi. Zira mevasi kuniga 3—4 mahal 1—2 osh qoshiqdan yel haydovchi vosita sifatida ichiladi. Zirk daraxt burjlari I osh qoshiqdan kuniga 3—4 mahal ichiladi.

Profilaktikasi. Kasallikning oldini olish: ovqatlanish gigiyenasiga rioxva qilishdan iborat. Ovqatdan oldin hamisha qo'llarni yuvish, idish-tovoqlarni toza tutish, ovqatni yangi mahsulotlardan tayyorlash, meva va poliz mahsulotlarini yuvib yeyish lozim. Ovqat tarkibi oqsil, uglevod va vitaminlarga boy bo'lishi bilan birga, kasallik keltirib chiqaruvchi sabablarga qarshi kurashish lozim.

7.7.3. Surunkali enterit

Ingichka ichaklarning surunkali yallig'lanishi bo'lib, atrofik, distrofik va degenerativ zararlanishi bilan kechadigan kasallikka aytildi.

Etiologiyasi. O'tkir enterit, alimentar – o'zgarishlar o'z vaqtida ovqat yemaslik, dag'al va achchiq ovqatlarni muntazam iste'mol qilish, ovqatlarni chaynamasdan shoshilib yeyish, chaynov apparatida nuqsonlar bo'lishi, tarkibida yetarli bo'limgan oqsil, uglevod, vitaminlar bo'limgan ovqatlarni iste'mol qilish. Neyrogumoral omillar issiq — iqlim ta'siri, endokrin faoliyatining buzilishi; gjija, amyobiaz, lyambliozi, mikrob, floralarni ta'siri; me'da shirasining kamayishi, me'daosti bezi funksiyasining buzilishi, surunkali gastrit, me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi, duodenit, surunkali gepatit va xolesistit, jigar sirrozi, surunkali pankreatit, nospetsifik yarali kolit, disbakterioz, kandidamikoz, allergiya va boshqa kasalliklardan keyin kelib chiqadi. Sanoat zaharli moddalar — mishyak, simob, qo'rg'oshin, tibbiyotda ishlatilayotgan ayrim dorilarni noto'g'ri qabul qilish — kodein, papaverin goritsvet, ba'zi bir surgi dorilar ta'sir etadi.

Klinikasi. Bemorlar qorni shishib, quldirab turishidan, kindik sohasida simillagan og'riq bo'lib, vaqt-vaqt bilan sanchiqqa o'xshab tutib turishidan nolishadi. Bir sutkada 10—12 marta badbo'y hidli suyuq ich ketadi. Ich ketishni xarakterli xususiyatlaridan biri ertalab azonda va ovqatdan keyin ketadi. Qorinda ko'ngilsiz his paydo bo'ladi. Uchlik alomat (triada) — qorinni quldirashi, og'irlilik hissi, og'riq

vujudga keladi. Bemor darmonsiz va lohas bo'lib qoladi, ishtahasi pasayadi. Bosh og'rig'i, bosh aylanishi kuzatiladi. Qon bosimi pasayadi, bradikardiya —puls pasayib ketadi.

Ko'zdan kechirishda hemorning ozib ketganligi ko'rindi. Qorin dam (meteorizm) bo'ladi. Paypaslab ko'rilganda kindik atrofida og'riq va ko'richak sohasida chayqalish shovqini aniqlanadi. Rentgenologik tekshirishda kontrast modda bariy sulfat ichkizib ko'rilganda, kontrast modda avval tez o'tishi, keyinchalik turib qolishi kuzatiladi. Ingichka ichakni uzoq vaqt yallig'lanib turishi oqsil, yog', uglevod, vitaminlar almashinuvining buzilishiga olib keladi. Teri zahal tortib, gungurt rangga kiradi, til yallig'lanadi (atropik glossit), og'iz burchaklari yorilib ketadi, muskullar og'rib turadi. Vitaminlar yetishmasligi natijasida kamqonlik rivojlanadi.

Laboratoriya tahlili. Qonda kalsiy va fosfor kamayadi, leykositoz, neytrofiloz, EChT oshadi, kamqonlik rivojlanadi.

Axlat o'zgarishi ham katta ahamiyatga ega, axlat rangi oqish-sariq yoki ko'kimdir bo'ladi, axlatda muskul tolalari, kraxmal, neytral yog'lar, yog' kislotalari topiladi.

Davolash. Ovqat baquvvat, oqsillar bilan vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Qo'shimcha C, PP, K vitaminlari va B guruh vitaminlari buyuriladi. To'rtinchi parhez stoli bo'yicha ovqatlanish tavsiya qilinadi. Shifokor ko'rsatmasiga binoan, antibiotiklar va sulfanilamidlar, enteroseptol tipidagi o'rab oluvchi va burishtiruvchi vositalar bilan qisqa davolash kurslari o'tkaziladi. Kolibakterin, bifidumbakterin, bifikol 10 kun davomida 5 g.dan 3 mahal beriladi.

Giyohlar bilan davolash. Zira mevalari, moychechak, ukrop suvi, fenxel moyi, valerian ildizi damlama tariqasida kuniga ertalab va kechqurun ichiladi. 1 qism tabiiy zig'ir urug'i, 30 qism qaynoq suvdan tayyorlanadi.

Profilaktika. Xastalikka chalinmaslik uchun birlamchi va yuqumli kasalliklarning oldini olish hamda ularni davolash lozim. Ovqatlanish tartibiga, sifatiga e'tibor berish kerak. Vitamin, uglevod, oqsil va yog' mahsulotlariga boy ovqatlar iste'mol qilish, tez-tez, vaqt-vaqt bilan ovqatlanib turish lozim.

7.8. Kolitlar

Yo'g'on ichak shilliq pardasining yallig'lanishiga kolit deyiladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali kolit farq qilinadi.

7.8.1. O'tkir kolit

Etiologiyasi. Ichak infeksiyalari, gjijalar, sil tayoqchalar, sifilis, qo'r-g'oshin, mishyak, simoblardan zaharlanish, sifatsiz ovqat mahsulotlaridan hamda qo'zigorin va poliz mahsulotlaridan zaharlanish, ovqatlanish rejimining buzilishi, dag'al, tez hazm bo'l-maydigan ovqat mahsulotlarini istemol qilish, chaynov apparatidagi nuqsonlar, nerv sistemasi, ichki sekretsiya bezlari kasalliklari, jigar va o't yo'llari kasalliklari, siydik-tanosil tizimi kasalliklari, yurak-tomir sistemasi kasalliklari o'tkir kolitning rivojlanishiga omil sifatida qatnashadi (25-rasm).

Klinikasi. Kasallik o'tkir boshlanadi, tana harorati ko'tariladi. Intoksikatsiya holatlari vujudga keladi. Bemor qayt qiladi, ketma-ket ichi ketadi (soxta hojatga borish istagi — tenezmalar bilan ich ketishidir). Qon aralash ich ketadi. Bunday bemorlarda, odatda, tez-tez, bir sutkada 20 va bundan ham ko'p marta ich ketadi. Qorin sohasida kuchli xurujsimon og'riq bo'ladi. Qorin kattalashgan, uni paypaslab ko'rildganda yo'g'on ichak yo'li bo'ylab og'riq borligi aniqlanadi. Til quruq, karash boylagan, ishtaha yomonlashgan. Bemor darmonsiz va lohas.

Laboratoriya tahlili. Axlat ko'p shilliqli va ayrim hollarda qon aralashgan bo'ladi. Ammiak va fenol miqdori katta miqdorda topiladi. Qonda leykositoz, neytrofiloz, EChT tezlashgan.

Asoratlari. Sigmamonich ichak yo'lining torayib qolishi, ichakning yiringli yoki gangerenoz yallig'lanib, teshilib ketishi bilan birga davom etishi mumkin.

Davolash. Diyetoterapiya — birinchi kun 5 stakan shirin choy, keyin 2—5 kunlari 4-parhez beriladi, klinik belgilari aniqlanguncha 4b-parhez beriladi, keyinchalik 4v-parhez beriladi.

Organizmning suvsizlanishini bartaraf etish uchun fiziologik eritma 0,9 % li—400 ml va undan ko'p miqdorda teri ostiga,



25-rasm. Ovqat hazm qilishda ishtiroy etadigan qorin bo'shlig'i organlari (me'da-ichak yo'li, me'daostsi bezi va jigar sxemasi. Koltida zararlanadigan organ (yo'g'on ichak) strelnka bilan ko'rsatilgan).

tomir ichiga tomchi usulda beriladi. Tuzli eritmalar — sanasol, trisol, xlosol, disol, asesol, laktassollar 400—500 ml.dan tomir ichiga, shifokor ko'rsatmasi bilan tomchi usulida beriladi.

Kasallikni davolashda og'riq qoldiruvchi vositalar, vitaminlar, antigistamin, antibiotiklar, sulfanilamid preparatlaridan foydalanildi.

Giyoqlar bilan davolash. Sariq choy o'ti 10:200 nisbatdagi qaynatma ko'rinishida ovqatdan 30 minut ilgari 1/3 stakandan ichiladi. Moychechak gullari 1—5 osh qoshiqdan kuniga 2—3 mahal ichiladi. Zirk daraxti bujurlari 1 osh qoshiqdan kuniga 3—4 mahal ichiladi. Ishtahani yaxshilash uchun tillabosh o't ovqatdan 30 minut ilgari 1 osh qoshiqdan kuniga 3—4 mahal ichiladi.

Profilaktikasi. Kasallikning oldini olish maqsadida shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish, ovqatga ishlataladigan masalliqlarni sanitariya tozaligidan o'tkazish, yuqumli kasalliklar hamda sanoat zaharli moddalaridan ehtiyoj bo'lish chora-tadbirlarni qo'llash zarur.

7.8.2. Surunkali kolit

Yo'g'on ichak shilliq qavatining distrofik, degenerativ va atrofik o'zgarishlari bilan kechadigan kasallikkha aytildi.

Joylashish joyiga qarab, pankolit — yo'g'on ichak hamma qismalarining bir vaqtida yallig'lanishi, tiflit — ko'richakning yallig'lanishi, transverzit — ko'ndalang-chambar ichakning yallig'lanishi, proktosigmoidit — to'g'ri va S-simon ichakning yallig'lanishi (yoki alohida sigmoidit, proktit).

Etiologiyasi. Ekvogen zaharlanishlar (qo'rg'oshin, mishyak, simob, alkogol, surgi dorilar, ishqorlar, kislotalar, fenol, tibbiy dorilar), zamburug'lardan zaharlanish, endogen zaharlanishlar, surunkali nefrit, uremiya, tireotoksikoz, Adisson kasalligi, limfogranulematoz, jigar sirrozi, pankreatit, surunkali enterit, surunkali hepatit, parazitar invaziyalar (gijjalar, trixomonada, lyambliozi, balantidiaz, amyobiaz, askaridoz), alimentar omillar (sifatsiz ovqat mahsulotlari, dag'al ovqatlar iste'mol qilish, pishmagan meva va sabzavotlar yeyish), avitaminoz (C vititamini), alimentar distrofiya, spru, pellagra, vegetativ nerv faoliyatining buzilishi, asabruhiy shikastlanishlar (neyrogen-diskinetik kolit).

Klinikasi. Surunkali kolitning asosiy belgisi, ich kelishining buzilishi, tez-tez suyuq ich ketadi, ich kelishiga soxta istak — tenezm paydo bo'lishi hisoblanadi. Bir kunda 8—10 martagacha yetadi.

Ba'zan ich ketishi bilan qotishi almashinib turadi. Kasallik og'ir o'tayotgan hollarda isitma chiqib, a'zoiyi badan qaltiraydi, bosh og'rib, bemor ozib ketadi, kuch-quvvatdan qoladi, rasmona dispeptik hodisalar boshlanib, mehnat qobiliyatini yo'qotib qo'yadi.

Og'riq ichakning shikastlangan joyida bo'ladi (teflit, transverzit, sigmoidit, proktit, gohida pankolit). Ko'pincha ishtahaning pasayib ketishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, og'izning taxir bo'lib turi-shidan shikoyat qilishadi. Bundan tashqari, jizzaki bo'lib, uyqusini yo'qotib qo'yadi. Kayfiyati tushib ketadi.

Bemorlar ko'zdan kechirilganda ozib, terisining quruq bo'lib, oqarib turganini aniqlash mumkin. Til karash bilan qoplangan bo'ladi. Palpatsiya qilib ko'rilmaga yo'g'on ichak bo'ylab qorinning bezillab turgani va quldirashi, dam bo'lib ketgani ma'lum bo'ladi.

Rentgenologik tekshirish. Kontrast modda ichkizib tekshirilganda evakuatsiyasining tezlashishi yoki sekinlashishi kuzatiladi, shilliq pardanering noto'g'ri relyefi unda yallig'lanish jarayoni borligidan dalolat beradi. Rektoromanoskolpiyada to'g'ri va sigmasimon ichaklar shilliq pardasida turli xil patologik o'zgarishlar ko'rish mumkin.

Laboratoriya tahlili. Najas mikroskopik usulda tekshirilganda, unda ko'p miqdorda leykotsitlar, eritrotsitlar, kletchatkalar, shilliq, kraxmal bakteriyalarni topish mumkin.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya — birinchi kun 5 stan-kan shirin choy, keyin 2—5-kunlari 4-parhez beriladi, klinik belgilari aniqlanguncha 4b-parhez beriladi, keyinchalik 4v-parhez beriladi.

Organizmning suvsizlanishini bartaraf etish uchun fiziologik eritma 0,9 % li—400 ml va undan ko'p miqdorda teri ostiga, tomir ichiga tomchi usulida beriladi. Tuzli eritmalar — sanasol, trisol, xlosol, dissol, asesol, laktasollar 400—500 ml.dan tomir ichiga, shifokor ko'rsatmasi bilan tomchi usulda beriladi.

Kasallikni davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan, og'riq qoldiruvchi vositalar, vitaminlar, antigistamin, antibiotiklar, sulfanilamid preparatlardan foydalaniлади.

Fizioterapeutik davo. Isituvchi kompress, qoringa issiq qilish, issiq grelka, issiq vanna, novokainli elektroforez, diatermiya, balchiq bilan davolash, parafin.

Giyohlar bilan davolash. Axlat tuta bilmasa, mikrokлизма — 30—50 ml qaynatma evkalipt, moychechak, kraxmal, furatsilin, rivanol bilan. Qorin dam bo'lganda — o'simlik moyi, baliq moyi,

na'matak, chakanda va Shostakovsk balzamiga o'simlik moyi qo'shib qilinadi. I qism tabiiy zig'ir urug'i 30 qism qaynoq suvgaga solib ishlataladi. Sariq o't choy 10:200 nisbatda qaynatma ko'rinishida ovqatdan 30 minut ilgari 1/3 stakan ichiladi.


7.9. Jigar kasalliklari

7.9.1. Surunkali hepatit

Surunkali hepatit bu jigar parenximasini diffuzli – distrofik yallig'lanishidan kelib chiqadigan shikastlanishdir. Jigarda morfologik o'zgarishlar avj oladi. Kupfer hujayralar giperplaziysi rivojlanib, portal traklarda o'tracha ifodalangan fibroz, gistiolimsoplazmotsitlar ko'payishi bilan xarakterlanadi (26-rasm).

Etiologiyasi. Surunkali hepatit o'tkir virusli hepatit (Botkin kasalligi), B va C turdag'i o'tkir hepatitdan keyin rivojlanadi. Bezgak, zaxm, brutselloz, sil, me'da-ichak yo'llari kasalliklari, o't pufagi kasalliklari, ich terlama, semirib ketish, qandli diabet kasalliklari-ning asorati sifatida yuzaga chiqishi mumkin.

Sifatsiz ovqatlanish, kuchli spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, dorilardan zaharlanishi – sulfanilamidlar, antibiotiklar, silga qarshi dorilar, yallig'lanishga qarshi dorilar, atofan, aminazin, metildofa kabilalar uzoq vaqt katta miqdorda qo'llanilganda kasallik rivojlanishi mumkin. Surunkali hepatit sanoatda, qishloq xo'jaligidagi, uy-ro'zg'or ishlarida ishlataladigan har xil metall va metalloidlar (qo'rg'oshin, simob, margumish birikmalari), kimyoiy bo'yoqlar, benzol va uning hosilalari, xlororganik, fosfororganik pestitsidlarning zaharli ta'sirlari, bundan tashqari, cho'zilgan septik endokardit, biriktiruvchi to'qimaning tizimli yallig'lanish kasalliklari, ba'zi bir yuqumli kasalliklar bilan kasallanganlarda uchraydi.



26-rasm. O't yo'llarining tuzilishi:

- 1—mc'daosti bezi (kesilgan holda ko'rinishi); 2—jigarning chap bo'lagi; 3—jigarning o'ng bo'lagi; 4 va 5—jigardagi o't yo'llari;
- 6—umumiyoj jigarda o't yo'li; 7—o't pufagi; 8—o't pufagi yo'li;
- 9—umumiyoj o't yo'li;
- 10—o'n ikki barmoqli ichak (kesilgan holda ko'rinishi).

Klinikasi. Surunkali gepatitning asosiy belgilaridan biri, o'ng qovurg'a ostida og'riq, ko'ngil aynishi, kekirish, ishtahaning pasayib ketishi, ovqatlangandan so'ng qorinning yuqori qismida bosilib turgandek sezgining paydo bo'lishidan noliydarlar. Kasallik zo'riqdan davrda badan terisi qichishib, bemor ozib ketadi. Muskullari va bo'g'inlarida og'riq paydo bo'ladi. Tana harorati ko'tarilib, ich buzilishi, qorinning dam bo'lishi, ich qotishi, og'izning taxir bo'lib turishi, badanning sarg'ayishi kuzatiladi.

Bundan tashqari, mehnat qobiliyatining pasayishidan, serzarda bo'lib qolganidan, yurak g'ashligidan shikoyat qiladi. Bemorlar obyektiv tekshirilganida teri, shilliq pardalarning sarg'ayganligi, kaft terisi rangining qizarganligi — palmar eritema, erkaklarda ginekomastiya kuzatiladi. Qorin sohasini palpatsiya qilinganda, og'riq hamda jigar va taloqning kattalashganligi aniqlanadi.

Laboratoriya tahlili. Qon tahlilida EChT tezlashganligi, gemoglobin, leykotsit va trombotsitlarni kamayganligi kuzatiladi.

Qonni biokimyoaviy usul bilan tekshirilganda albuminlar miqdori kamayganligi, gammaglobunlar miqdorining ko'payishi, qondagi oqsil cho'kishi sinamalari (timol, sulema) musbatligi aniqlanadi. Qonda bilirubin, siydikda urobillin miqdori oshadi. Kasallik xolesistitlar bilan og'irlashadigan bo'lsa, uning manzarasida o't pufagining yallig'lanishiga xos alomatlar ustun turadi (27-rasm).

Asoratlari. Jigar yetishmovchiligi, burundan, qizilo'ngachdan, me'da va ichak varikoz venalaridan qon ketishi, tromboz, gripp, pnevmoniya, sepsis, sil va boshqa yuqumli kasalliklar qo'shib kelishi, oriqlab ketishi, jigar sirrozi, jigar saratoni.

Davolash. Diyetoterapiya — 5-parhez. Sutkalik ovqat tarkibiga 100—120 g oqsil, 80 g yog', 450—500 g uglevod, jami 3000—3500 kkal kerak. Kasallik qaytalansa, me'da-ichak yo'llari kasalliklari bilan qo'shib kelsa, Sa-parhez beriladi.



27-rasm. Ovqat hazm qilishda ishtirok etadigan qorin bo'shilg'i organlari (me'da-ichak yo'li, me'daosti bezi va jigar) sxemasi. Gepatitda zararlanadigan a'zo (jigar) strelna bilan ko'rsatilgan.

Surunkali gepatitni davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan quyidagi dori vositalari qo'llaniladi:

- gepatoprotektorlar – jigar hujayralaridagi moddalar almashinuvini yaxshilab, gepatotsitlarning regeneratsiyasini stimullaydi (legalon, liv-52, silibor, gepatofalk, laktofalk, dyufalk, portalak, karsil, essensial, gepral);
- virusga qarshi dorilar (adenin-arabinozid, asiklovir, gamma-interferon);
- glukokortikoidlar (prednizolon, deksametazon);
- immunodepressantlar (delagil, azatioprin);
- o't haydovchi dorilar (alloxol, xolenzim, xolosas, xolagol);
- vitaminlar (B_1 , B_6 , C, E, PP).

Giyohlar bilan davolashda itshumurt po'stlog'i, ich qabziyat bo'lganda qaynatma ko'rinishda $1/2$ stakandan, suyuq ekstakrt ko'rinishida 0,2–0,4 g.dan ichiladi. Ukrop suvi 1 osh qoshiqdan kuniga 3–6 mahal ichiladi, oddiy tog'jambili, otquloq, tirnoqgul, turp, maymunjiyda (chakanda), yalpiz barglari davolash maqsadida ishlatalidi. Sanatoriyy-kurortlarda reabilitatsiya qilish tavsiya etiladi («Yessentuki», «Jeleznovodskiy», «Pyatigorsk», «Borjomi», «Jermuk», «Truskoves», «Morshin», «Mirgorod», «Java», «Arzni», «Ankavan», «Istu-Su»).

Profilaktikasi kasb-kor yoki turmushga aloqador etiologik omillarni bartaraf etish, virusli gepatit kasalligiga o'z vaqtida tashxis qo'yish va uni davolashdan iborat.

7.9.2. Jigar sirrozi

Jigar sirrozi deb jigar parenximasida, biriktiruvchi to'qimani o'sib, qalinlashishi oqibatida, jigarda distrofik, degenerativ va atrofik o'zgarishlar bilan kechadigan va butun organizmda bo'ladigan kuchli patologik o'zgarishlar bilan o'tadigan surunkali kasallikka aytildi.

«Sirroz» so'zini birinchi marta Laennek 1819-yilda ishlatgan. «Sirroz» yunoncha «mall» degani, 1875-yilda Ganu «Gipertrofik sirroz bilan sariqliknii» tasvirlab berdi. Keyinchalik jigar sirrozini har xil turlari borligi bir qancha olimlar tomonidan aniqlandi.

Turlari:

1. Portal jigar sirrozi:
 - a) laennek jigar sirrozi;
 - b) atrofik jigar sirrozi;

d) alkogol jigar sirrozi;

e) yog'li jigar sirrozi;

f) septal jigar sirrozi.

2. Postnekrotik jigar sirrozi:

a) postgepatit;

b) toksik jigar sirrozi;

d) ko'p tarmoqli jigar sirrozi.

3. Biliar jigar sirrozi:

a) birlamchi jigar sirrozi;


b) ikkilamchi jigar sirrozi.

4. Kardial jigar sirrozi – muskat jigar sirrozi – yurak kasalligidan kelib chiqqan jigar sirrozi.

5. Aralash turi.

Etiologiyasi. O'tkir hepatitning og'ir shakli, surunkali hepatit, Veyl-Vasilev, laktospirozi, bezgak, brutselloz, exinokokk, fassiolez, opistorxoz, sifilis, leyshmanioz, sil, qandli diabet, tireotoksikoz, yurak poroklaridan keyin; alimentar — ovqatlanish rejimining buzilishi, vaqtida ovqatlanmaslik, och yurish, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, ovqat ratsionida oqsil va vitaminlar yetishmov-chiligi (ayniqsa, B₁, B₂, vitamini, folat kislota) hamda ularni qonga so'riliشining buzilishi; o't yo'llari infeksiyasi, surunkali xolesistit, xolangit, o't-tosh kasalligiga turli xil toksinli omillar, kimyoviy omillar (xloroform, fosfor va xlor organik birikmalar, tibbiyotda ishlatilayotgan dorilar), yog' almashuvining buzilishi, jigarning yog' distrofiyasi, moddalar almashinuvining buzilishi, semirish (28-rasm).

Klinikasi. Kasallik asta-sekinlik bilan kechadi, hemorlar uzoq vaqtgacha hech narsadan nolimasliklari mumkin, keyinchalik biror



28-rasm. Alkogol ta'sirida paydo bo'lgan jigar sirrozi:

o'ngda — alkogoldan zararlangan jigar hujayralari o'mini egallaydigan biriktiruvchi to'qima o'sib ketishi oqibatida jigar yuzasi g'adir-budur bo'lib qolgan; chapda — sog'lom odam jigari (solishtirish uchun).

ishda zo'r berilganidan keyin darmon qurib, tez charchab qolishi mumkin. To'shosti sohasida, qovurg'alar tagida, qorinda simillab turadigan og'riq seziladi. Ishtahasi pasayib, ko'ngli ayniydi, bemor kekiradi, ichi qotadi, gohida ichi ketadi, qorni dam bo'ladi. Badan sarg'ayadi, qichishib turadi. Xiliga qarab, jigarning hajmi o'zgaradi. Gipertrofik jigar sirrozida, jigar kattalashib ketadi. Atrofik jigar sirrozida jigar mayda do'mboqli g'adir-budur bo'lib, qo'lga unnaydi. Taloq kattalashib, jigarning kichrayib qolishi va biriktiruvchi to'qimaning chandiqlanishiga olib horadigan jarayon bois kollateral tarmoqlar vujudga keladi.

Qorin va kindik atrofining terisida venoz turi yaqqol bilinib turadi. Bu «meduza boshi» simptomidir (29-rasm). Gemorroidal venalarda ham kollaterallar paydo bo'ladi. Keyinchalik asta-sekin assit paydo bo'ladi (qoringa suyuqlik yig'ilishi). Sirrozning oxirgi bosqichida anemiya paydo bo'ladi, odam ozib ketadi. Muskullar atrofiyalashadi.

Laboratoriya tahlili: leykotsit va trombotsitlarning kamayishi kuzatiladi, bilirubinning oshishi, oqsil modda almashinuvida albuminlarning kamayishi, globulin va fibrinogenlarning oshishi, xolesterin va protrombinning kamayishi kuzatiladi. EChT tezlashadi.

Jigar komasi. Bemor qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi. Uyqusizlik, bosh og'rishi, quşish, tana haroratining ko'tarilishi, darmonsizlik, lohaslik, ishtahananing pasayishi, taxikardiya, badan sarg'ayishi, og'izdan jigar hidining kelishi, bo'g'in reflekslarining pasayishi, siyidik tuta olmaslik. Kasallik avj olganda qon bosimi pasayadi, ko'z qorachig'i yorug'da o'zgarmaydi. Puls notekis, bemorlar qattiq uyquga — behushlik holatiga tushadilar. Behushlik paytida bemorning nafas olishi tezlashadi, nafasi Kussmaul yoki Cheyn-Stoks holida, yurak tovushlari bo'g'iq bo'ladi. Paylarda aniqlanadigan reflekslar yo'qoladi, markaziy asab sistemasi zaharlanganda yuzaga keladigan o'zgargan reflekslar paydo bo'ladi.



29-rasm. «Meduza boshi» simptomi.

Davolash. Diyetoterapiya 5-parhez ovqat tarkibi oqsil, vitaminlarga boy bo'lishi lozim. Tuzli ovqatlarni chegaralash, sut mahsulotlari, kefir, two-

rog, sabzavot-mevalar, kisel, yog'siz go'sht, daryo balig'i taomlarini ko'paytirishi kerak.

Jigar komasi belgilari paydo bo'lganida bemor zond orqali ovqatlantiriladi, ovqat uglevodlardan, qisman yog'lardan iborat bo'ladi. Venaga 10 % li glukoza eritmasi yuborish, surgilar berish, ichakdag'i bakterial florani zaiflashtirish uchun antibiotiklar ishlatalish o'rinnlidir. Bundan tashqari dorillardan albumin, kaly xlorid, yurak ishini quvvatlaydigan dorilar beriladi. Insulin 12 TBda glukoza bilan qo'shib tomir ichiga tomchi usulda yuboriladi. Gormonlardan prednizolon 60 mg tomir ichiga, glutamin kislota 1 % li—30 ml tomir ichiga, askarbinat kislota 5 % li—5 ml muskul ichiga, xolin xlorid 20 % li—20 ml, glukoza 5 % li—200 ml qo'shib tomir ichiga tomchi usulda, kokarbaksilaza 300—500 mg, 100 mg.ga 200 ml—5 % li glukoza qo'shib sutkasiga 4 marta tomir ichiga yuboriladi. ATF 2 ml—1 % muskul orasiga sutkasiga 2 marta yuboriladi, vikasol 1 % li—1—2 ml muskul orasiga, gemodez 400 ml tomir ichiga asta-sekin, seduksen 0,5 % li—2 ml muskul orasiga, tiamin bromid 3—4 ml 1 % li yoki 6 % li—1—2 ml muskul orasiga, siankobalamed 500 mg muskulga, piridoksin gidroxlorid 2 ml—5 % li tomir ichiga yuboriladi.

Giyohlardan na'matak, turp, kadi, makkajo'xori popugi, ukrop, chakamig', yalpiz, bo'znoch (o'lmas o't), bo'yimodaron, darstarbosh, dafna daraxti, yovvoysi sabzi suvlari, urug'lari, ildizlari damlama holida ishlataladi.

Profilaktik choralar virusli kasalliklarni oldini olish va ular qo'zg'agan kasalliklarni davolash (o'tkir gepatit), alkogolizmga qarshi kurashish, ovqatlanish rejimiga e'tibor berish, kasb-korga tegishli bo'lib, jigarga zaharli ta'sir ko'rsatadigan sabablarni bartaraf etishdan, shuningdek, tibbiyotda ishlataladigan dorilarni to'g'ri qabul qilish, yurak-qon tomirlar tizimi kasalliklari, ichki sekretsiya bezlari kasalliklari, modda almashinuv kasalliklarini bartaraf etish, o't pufagi, o't yo'llari yallig'lanishi, o't-tosh kasalliklarining oldini olish, gijjalarga qarshi kurashish kabilidan iborat.

7.10. O't pufagi kasalliklari

7.10.1. Xolesistit

O't pufagi shilliq pardasining yallig'lanishiga xolesistit deyiladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali xolesistit farq qilinadi.

7.10.2. O'tkir xolesistit

Etiologiyasi. Ichak tayoqchasi, kokk florasi, viruslar, lyambliozi, o'tkir va surunkali gepatit, gastrit, kolit, enterit, ich terlama, gripp, bezgak, angina, stomatit, otit, gaymorit. Homiladorlik davrida ko'pincha o'tning dimlanib qolishi ham infeksiya yuqishiga yo'l ochadi. O't ajratish sistemasi qisqarish funksiyasining buzilishi, o't pufagining qon bilan ta'minlanishdagi kamchiliklari ham kasallikning avj olishini tezlashtiradi.

Kasallikda infeksiya ko'pincha uch yo'l bilan yuqadi: 1) enterojen yuqori ko'tarilib boradigan infeksiya — bunda o'n ikki barmoqli ichakdagi Oddi sfikteri harakat funksiyasi buzilganida, ichakdan o't yo'llari va o't pufagiga o'tadi; 2) gemitogen — infeksiyani birlamchi o'choqdan qon orqali kelishi; 3) limfogen yo'l, bunda infeksiya limfa yo'llaridan o't pufagiga keladi.

Klinikasi. O'ng qovurg'a ostida to'satdan og'riq paydo bo'ladi, o'tkir xolesititning asosiy alomatlaridan biridir. Og'riq o'ng qovurg'a ostidan tashqari, qorinning yuqori qismiga, kindik atrofiga, yuqoriga va o'ngga tarqaladi. Bundan tashqari, og'riqlar o'ng kurak tagiga, o'ng yelkaga, o'mrov tagiga, belga beradi.

Ko'ngil aynishi, quşish, qorinning dam bo'lishi, ich qotishi, badanning sarg'ayishi, terining qichishi kuzatiladi. Tana harorati ko'tariladi. Og'ir hollarda harorat juda yuqori bo'ladi va qaltirash bilan o'tadi.

Bemorni ko'zdan kechirganda ko'z skleralari sarg'aygan, tili quruq, oq karash bilan qoplangan, nafas olishi tezlashgan, o'ng qovurg'a ostini paypaslab ko'rilmaga shu qadar og'riq paydo bo'ladiki, bemorlar qo'l tekkizilishidan bezillab turadilar. Kasallikka xos bir qancha belgilarni aniqlash mumkin. Merfi-Georgiyevskiy belgisi yoki Frenikus belgisi — ko'krak o'mrov muskulining o'ng o'mrov suyagiga birikkan joyini bosganda og'riq bo'ladi. Ortner belgisi — kaft cheti bilan o'ng qovurg'a yoyiga tebratilsa og'riydi. Vasilenko belgisi — nafas olish cho'qqisida o't pufagi joylashgan qismini tebratganda og'riq ro'y beradi. Zaxarin belgisi — o't pufagi sohasini bosganda og'riq kuzatiladi.

Laboratoriya tahlili: qonda neytrofill leykositoz 1 mm^3 qonda $14000 - 20000 (14 \cdot 10^9 - 20 \cdot 10^9)$ EChT tezlashgan; qand miqdori oshgan. Duodenal zondlashda barcha porsiyalarda leykotsitlar, shilliq va epitelial hujayralar ko'p. O'tning B porsiyasida biliribin kam yoki mutlaqo olib bo'lmaydi.

7.10.3. Surunkali xolesistit

Etiologiyasi: o'tkir xolesistit; o't-tosh kasalligi; surunkali gepatit; sekretor yetishmovchiligi bilan o'tadigan gastrit; surunkali pankreatit; semirish kasalligi; ovqatlanish rejimining buzilishi – yog'li ovqatlarni ko'p miqdorda iste'mol qilish.

Klinikasi. Surunkali xolesistitda o'ng qovurg'alar tagida vaqtiga vaqt bilan og'riq qo'zib turadi. Og'riq ko'pincha jismoniy harakat qilganda, sovgotganda, ruhiy emotsiyal buzilish jarayonida issiq va yog'li ovqatlarni iste'mol qilayotgan vaqtida, achchiq taomlar, pivo, sharbat, gazli suv ichganda kuchayadi. Kekirish, ko'ngil aynishi, ishtahaning pasayishidan noliydi. Qorin damlanishi, ich qotishi, ba'zida ich ketishi bezovta qiladi. Me'da-ichak ishi buzilishi kuzatiladi. Og'iz bemaza bo'lib turadi. Yog'li ovqatlarni hazm qila olmaydi. Bemorning uyqusini buziladi, ozib ketadi.

Og'riq o'ng kurak tagiga, o'mrovga, yelka bo'g'inlariga, gohida chap qovurg'alar tagida tarqaladi. Og'riq o'tkir, qisqa vaqt xurujsimon burab oluvchi holda kechadi.

Ko'zdan kechirilganda, sariqlik kam, til quruq oq karash bilan qoplangan. Paypaslab ko'rilganda o'ng qovurg'a ostida og'riq seziladi. Zaxarin-Ged, Kerr, Lepen, Myussi-Georgiyev, Grekov-Ortner, Obrasov-Merfi, Vasilenko belgilari musbat bo'ladi.

Laboratoriya tahlili: qonda leykositoz, gipoxrom kamqonlikka moyillik kuzatiladi, EChT-tezlashgan. Duodenal zondlashda B porsiyasida o'zgarishlar ketadi. Xolesistografiyada o't pufagi qisqarish xususiyatini buzilishiga moyillik, ya'ni diskineziya belgilari aniqlanishi mumkin.

Asoratlari. O't-tosh kasalligi, o't pufagi saratoni, xolesistoangioxlit, reaktiv gepatit, jigarning biliar sirrozi, pankreatit, o'tkir peritonit kabi asoratlari berishi mumkin.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya: 5—5a-parhez. Pevzner bo'yicha ovqatlar tarkibida yog', qovurilgan mahsulotlar, tuzlar, balqliqlar, spirtli ichimliklar, sovuq taomlar chegaralanadi. Ovqat ratsionida sut mahsulotlari, meva va poliz mahsulotlari bo'lishi kerak.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, antibiotikoterapiya (tetrasiklin, amoksitsillin), o't haydovchi vositalar (allaxol, xologol, xolosas, xolenzim, makkajo'xori popugi 25 ml ekstrakti kuniga 2—3 mahal 30—40 tomchi qaynatma ko'rinishida) beriladi.

Dubaj qilish tavsiya etiladi. Buning uchun bemorga nahorga soda eritmasi (yarim stakan suvg'a 1—2 choy qoshiq) ichishni tavsiya etiladi, bundan keyin o'ng biqinga yotib va o'ng qovurg'a ostiga

sochiqqa o'ralgan grelka (isitgich) qo'yib qo'yish kerak. Bu holatda 45 minut yotish, keyin bir stakan magniy sulfat eritmasi (bir stakan qaynatilgan iliq suvgaga 1 choy qoshiq magniy sulfat qo'shib tayyorlanadi) ichib, o'ng biqinga grelka qo'yib, yana 30 minut yotish kerak. Bundan keyin asta-sekin $\frac{1}{2}$ -1 stakan 40—50°C gacha ilitilgan ma'danli suv ichish va shu holatda yana 45 minut yotish tavsiya etiladi.

Fizioterapevrik davo: issiq grelka qo'yish, issiq priparka, parafin, applikatsiya — balchiq bilan davolash, diatermiya, induktotermiya, UVCh, 2—10 % novokainli elektroforez, 10 % magniy sulfat, papaverin eritmasi bilan diatermoelektroforez, og'riq vaqtida diadinamik terapiya — Bernar toki yoki amplipuls o'tkaziladi. Ba'zida mikroto'lqinli terapiya qilinadi.

Giyohlar bilan davolash. Qoqio't (momaqaymoq) ildizi, o't haydash, ishtahani ochish maqsadida ovqatdan 30 minut ilgari 1—4 stakandan kuniga 3—4 mahal ichiladi. Makkajo'xori popugi, qaynatma ko'rinishida ovqatdan oldin. Har 3—4 soatda 1—3 qoshiqdan, ekstrakti kuniga 2—3 mahal 30—40 tomchidan ichiladi.

Dastarbosh gullari suvgaga qaynatilib 1 choy qoshiqdan kuniga 3 marta ichiladi. Mavruk, maymunjon, na'matak, otqulog, oqqaldirmoq, sariq bosho't, tog rayhon, turp, shotara, ermon, yalpiz, yantoq, qora andiz, qora zirk, qora zira urug'lari, ildizlari, gullari, damlamasi, qaynatilgan hollarda ishlataladi.

7.11. O't-tosh kasalligi (xolelitiaz)

XVI asrda birinchi marta Vezaliy bilan Fernol o't-tosh kasalligi haqida yozib o'tishgan. Fransuz terapevti Shoffar va nemis patolog-anatomii Ashof, rus jarrohi S.P. Fedorov o't-tosh kasalligi bo'yicha bir qancha ahamiyatli ishlar qilishgan.

O't-tosh kasalligi hamma yoshdagi kishilarda uchraydi, ko'pincha yoshi o'tgan kishilarda ko'proq uchraydi. Xotinlar erkak-larga nishbatan ko'proq kasallananadilar. Homiladorlik bunga sabab bo'la oladi (30-rasm).

Etiologiyasi. Modda almashinuvining buzilishi — semirish, qandli diabet, podagra, ateroskleroz; irlsiy moyillik; o'tning o't pufagida dimlanib qolishi; o't pufagida yallig'lanish jarayonining avj olishi; harakatsiz kishilarga; homiladorlik; qorinning dam bo'lishi, ich qotishi; o't pufagida infeksiya bo'lishi; o'tkir gepatit (Botkin kasalligi); gemolizni kuchayishidan; qonda xolesterin miqdorining oshishi;

biluribin almashinuvining buzilishi; qorin terlamasi, ichburug[‘], enterokolit, ko‘richak, gjijalar, boshqa yuqumli kasalliklar. Toshlar tarkibiga ko‘ra, sof xolesterinli toshlar, xolesterin, bilirubin va kalsiyidan tashkil topgan aralash toshlardan iborat.

Klinikasi: o‘ng qovurg[‘] a ostida xunj-simon og‘riqning paydo bo‘lishi, xuruj to‘satdan tutib qoladi, jismoniy mehnatdan zo‘riqish, og‘ir ruhiy kechinmalar, ovqatlanish rejimi buzilganda og‘riq kuchayadi. Og‘riq qorin sohasiga, kindik atrofiga, belga, o‘ng kurak tagiga, yelkaga beradi. Og‘riq bilan birga ko‘ngil aynishi, et uvushishi, darmon qurishidan shikoyat qilinadi. Ba’zan bemor ketma-ket qusadi. Bemorning ichi qotib, qorni dam bo‘lib, siyidik ajralishi qiyinlashadi, xuruj vaqtida tana harorati ko‘tarilib, sariqlik paydo bo‘ladi.

Laboratoriya tahlili. Jigar sanchigⁱ tutib turgan paytda qonda yuksak leykositoz ko‘riladi. EChT tezlashadi.

Siyidik qon tusiga kiradi. Axlat rangsizlanadi. Qonda bilirubin miqdori ko‘payadi. Og‘riq xuruji to‘xtagandan keyin barcha alomatlar yo‘qoladi. O‘t pufagini, ayniqsa, unga kontrast modda kiritib, rentgenografiya (xolesistografiya) qilish yordamida toshlarni ko‘rish mumkin. Bu toshlar o‘t pufagi sohasidagi yorug[‘] sohalardan iborat bo‘lib ko‘rinadi.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya: 5-parhez. Ovqatni bo‘lib-bo‘lib, tez-tez, kuniga 5—6 mahal yeb turish tavsija etiladi. Spiritli ichimliklar, achchiq taomlar, qovurilgan va yog[‘]li ovqatlar berilmaydi. Xolesteringa boy ovqatlar (sariyog[‘], mol yog[‘]) ozroq miqdorda iste’mol qilish mumkin. Zaytun, o’simlik moylari o‘t haydash maqsadida beriladi. «Yessentuki», «Borjomi», «Jeleznovodsk» ma’danli suvlari iste’mol qilinadi.

Shifokor ko‘rsatmasiga hinoan, spazmolitiklar (atropin, platinfillin, papaverin), o‘t haydovchi dorilar, antibiotiklar (penitsillin, streptomitsin, oleandomitsin, monomitsin) beriladi.



30-rasm. O‘t pufagi va o‘t yo‘lida tosh joylashishi mumkin bo‘lgan joylar (sxema) strelka bilan ko‘rsatilgan: o‘n ikki hamroqli ichakka (3) quyladigan o‘t pufagi (1) va umumiy o‘t yo‘li (2) oechib ko‘rsatilgan, unda toshlar ko‘rinib turibdi

Fizioterapeutik davo tadbirleridan issiq grelka, priparka, parafin, applikatsiya, diatermiya, UVCh, elektroforez qilinadi, dubaj o'tkaziladi.

Giyohlar bilan davolash. Ajgon (zirai Karmoni) bir qoshiq miqdoridagi maydalangan ajgon ustiga qaynab turgan 200 ml suv qo'shib, 1 soat damlab qo'yiladi, suzib olinib, ovqatdan 30 minut oldin 1/4 stakandan ichiladi. Zaytun, zira, zig'ir, kovrak, kapalak-gul, na'matak, oddiy silibum, turp, qora zirk, qora andiz, qora zira, anjabar (yerqo'noq) ildizlari, qaynatma va damlamalari holida ishlataladi.

7.11.1. O't sanchig'i xuruji

O't sanchig'i xuruji — o't-tosh kasalligining alomati bo'lib, uning paydo bo'lishiga quyidagilar sabab bo'ladi: jismoniy, ruhiy va asabiy zo'riqishlar, parhezning buzilishi.

Klinik belgilari: o'ng qovurg'alar ostida to'satdan paydo bo'ladigan og'riq. Og'riq o'ng qo'lga, o'ng yelkaga va o'ng kurakka tarqaladi. Og'riq xarakteriga ko'ra, qattiq, kesuvchan, sanchiqli bo'ladi. Og'riq vaqtida bemor quisishi mumkin. Xuruj vaqtida tana harorati ko'tarilishi mumkin. Og'riq xuruji bir necha minutdan bir necha soatgacha davom etadi.

Birinchi yordam: bemorni tinchlantirish va uni yonboshlatib yotqizish. Shifokor ko'rsatmasiga binoan, xuruj vaqtida og'riqni qoldirish uchun — analgin 50 % li 2 ml, baralgin 5 ml, og'riq xuruj yo'qolmaganda promedol 2 ml qilinadi. Xurujdan keyin bemorni kasalxonaga yotqizish lozim.

7.12. Me'daosti bezi kasalliklari

7.12.1. Pankreatit

Me'daosti bezi parenximasining yallig'lanishiga pankreatit deyiladi. Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali pankreatit farq qilinadi.

7.12.2. O'tkir pankreatitlar

Etiologiyasi: yuqumli epidemik virusli parotit; virusli gripp; qorintisi; dizenteriya; ovqatdan zaharlanish; me'daosti bezi yo'lining tiqilishi; o't-tosh kasalligi; oddiy sfinkterning yallig'lanishi; jarotiqilishi.

hatlar; gjijalar; moddaalar almashinuvining buzilishi; homiladorlik; diabet ketozi; ateroskleroz; tugunchali arterii; sistemali qizil volchonka; toksinlarning ta'siri — metil spirti bilan zaharlanish, dorilardan zaharlanish — tiouratsil, xlortiazid, spirtli ichimliklardan zaharlanish; allergik kasalliklar.

Klinikasi. Kasallik og'riq bilan boshlanadi, qorinning yuqori qismida, ko'pincha gir aylanasi bo'ylab seziladi. Og'riq chap kurak ostidan, chap qovurg'a ostidan orqa tomonga tarqaladi. O'tkir pankreatit, o'tkir peritonit ichak buralishiga o'xshab ketadigan klinik belgilarni beradi, bemorning ko'ngli ayniydi, qayt qiladi, tana harorati ko'tariladi (31-rasm).

Ko'zdan kechirilganda qorinning yuz, yon tomonlariga, teriosti yog' qavatlariga qon quyilishlar (Greya-Ternera simptomi) yoki kindik atrofining «ko'-karish» belgisini paydo bo'lishi (Qo'llena simptomi), yong'oq kattaligida teriosti qavatining nekrozi, ko'krak va qorin sohalarida mayda-mayda dog'lar borligi ko'rindi (qizil tomchi simptomi).

Laboratoriya tahlili. Qondagi fermentlar (amilaza, tripsin) miqdorining ortib borishi, siyidikda diastaza miqdorining keskin ko'payib ketishi, qonda leykositoz topiladi. Rentgenda — ichak parezi ko'riladi.

7.12.3. Surunkali pankreatit

Etiologiyasi: o'tkir pankreatit; qo'shni organlarni surunkali kasalliklari; surunkali xolesistit; me'da va o'n ikki barmoqli ichak yallig'lanishi; hepatit, kolit, enterit; modda almashinuvining buzilishi; spirtli ichimliklarni iste'mol qilish.

Klinikasi. Surunkali pankreatit takror-takror tutib turadigan og'riq xurujlari ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Bu og'riq kindikdan chapga va sal yuqoriroqda, aksari chap qovurg'alar tagida seziladi va yog'li ovqat yeyilgandan keyin zo'rayadi. Dispeptik



31-rasm. Ovqat hazm qilishda ishtiroy etadigan qorin bo'shilg'i organlari (sxematik tasvir). Pankreatitda zararlanadigan me'daosti bezi strelka bilan ko'rsatilgan.

hodisalar — ishtahaning yo‘qolishi, ich ketishi, ko‘ngil aynishi, ich qotishi, qorinning dam bo‘lishi kuzatiladi. Bir talay gaz to‘planishi natijasida qorinning shishib ketishi, to‘shesti sohasining og‘ir bo‘lishi sezilib turadi.

Ba’zi hollarda me’daosti bezi ichki sekretsiyasining yetishmov-chiligi tufayli ikkilamchi diabet avj oladi. Ko‘zdan kechirilganda til karash bilan qoplangan, bemor ozgan, paypaslab ko‘rilganda chap qovurg‘a tagida og‘riq, qorin taranglashganligi aniqlanadi.

Laboratoriya tahlili. Qonni biokimyoviy tekshirishda pankreatik fermentlar miqdorining oshganligi yoki pasayganligi ko‘riladi. Axlat va siydkda patologik o‘zgarishlar topiladi.

Asoratlari: me’daosti bezining yallig‘lanishi, peritonit, me’da va ichaklardan qon ketishi.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya 5-parhez, sharbatli mahsulotlar, meva va poliz mahsulotlari, tez hazm bo‘ladigan uglevodlar. Bir kunda 4—6 marta ovqatlanish lozim. Ovqat muloyim bo‘lishi kerak, shira chiqaradigan masalliqlar istisno qilinadi. Bemorlarga o‘rindan turmay yotish, qoringa sovuq narsa bosish buyuriladi. Shifokor ko‘rsatmasiga binoan, og‘riqni qoldiradigan vositalar, elektrolitli suyuqliklar, antibiotiklar, me’daosti bezi fermentlari ishlaniб chiqishini susaytiradigan moddalar — ingibitorlar (trasilol, kontrikal, pantiprin) ishlataladi. Kasallik og‘ir o‘tayotganida (abscess, nekroz bo‘lganida) jarrohlik yo‘li bilan davolanadi.

Giyohlar bilan davolash. Qora andiz, qora zira, mayda to‘g‘ralgan qora andiz ildizlaridan 2 choy qoshiq miqdorida olib, ustiga 2 stakan qaynoq suv qo‘yladi-da, 8 soat davomida qaynatib qo‘yladi, keyin suzib olib, ovqatdan 20 minut oldin $\frac{1}{4}$ stakandan kuniga 3—4 mahal ichiladi. Qora zira urug‘laridan 3 choy qoshiq miqdorida olib, ustiga 1 stakan qaynoq suv quyiladi-da, 15 minut qaynatiladi, keyin 10 minut damlab qo‘yib, suzib olnadi va $\frac{1}{4}$ stakandan 3 mahal ichish uchun buyuriladi.

8-boʻb. BUYRAK VA SIYDIK AJRATISH YO’LLARI KASALLIKLARI

8.1. Qisqacha anatomik-fiziologik maʼlumot

Buyraklar loviya shaklidagi juft organlar boʼlib, XI—XII koʼkrak va I—II bel umurtqalari roʼparasida, qorin boʼshligʼining orqa devoriga yopishib joylashadi. Buyrak yuzasida fibroz kapsula bor, bu kapsula sirtida yogʼ kapsula bor. Yogʼ kapsula buyrak fassiyasi bilan oʼralgan. Bu kapsula va fassiyalar buyraklar bel muskullariga birikishida ishtirok etadi. Buyrakning umurtqa pogʼonasiga qaragan ichki (medial) tomonida buyrak darvozasi bor. Darvoza orqali buyrakka buyrak arteriyasi va nervlari kiradi, buyrak venasi, siyidik yoʼli va limfa tomirlari chiqadi. Buyrak darvozasi buyrak kovagi deb ataladigan chuqurchaga olib kiradi. Buyrak kovagida buyrak kosalari, buyrak jomi, jomda esa nervlar, qon tomirlari va yogʼ toʼqimasi bor. Buyrak ikki qavat moddadon: tashqi poʼstloq va ichki magʼiz moddasidan tuzilganligini koʼramiz.


Buyraklarning poʼstloq moddasida juda koʼp buyrak tanachalari bor, har qaysi tanacha qon tomirlaridan hosil boʼlgan. Malpigi jomchasi va uni oʼrab olgan Shumlyanskiy kapsulasidan iborat. Kapsulaning qoʼshqavat devori bir qavatli epiteliy hujayralaridan tuzilgan. Devorlar orasidagi kapsula boʼshligʼidan buyrak kanalchalari boshlanadi. Ular buyrakning poʼstloq moddasida koʼp marta buralib, birinchi tartib burama kanalchalar hosil qiladi.

Burama kanalchalar magʼiz moddasida toʼgʼrilanadi va poʼstloq moddası tomonga qayrilib, Genle qovuzlogʼini hosil qiladi. Poʼstloq moddasida kanal-



32-rasm. Buyrak (toʼqimasi qisman olib tashlangan):

- 1—poʼstloq moddasi;
- 2—buyrak piramidası;
- 3—buyrakning katta kosachalari;
- 4—buyrak jomi;
- 5—siyidik yoʼli;
- 6—buyrak tomirlari (arteriya va vena).



33-rasm. Siyidik ajratish sistemasining sxematik tasviri (chap buyrak ochib ko'r-satilgan). Buyrakning nefritda kasallanadigan to'qimasi strelka bilan ko'rsatilgan.

qalin qilib o'rab turadi. Kapillarlar burama kanalchalardan o'tgandan keyin o'zaro qo'shilib, mayda venalarni hosil qiladi. Bu venalar buyrak venasiga quyiladi.

Buyrak tanachalari bilan burama va to'g'ri kanalchalar nefronlar deb ataladi. Ular buyrakning siyidik hosil qiladigan qismidir. Ikkala buyrakda 2—4 mln nefron bor. Buyrak kanalchalarining umumiy uzunligi 100—120 km.ga yetadi (33-rasm).

Buyrakning uzunligi katta odamlarda 10—12 sm, eni 5—6 sm, qalinligi 4 sm.ga teng. Og'irligi esa 120 g.dan 200 g.gacha. O'ng buyrak chap buyrakka nisbatan 1—1,5 sm pastroqda joylashgan, po'stloq qismining qalinligi 4—5 mm. Buyraklar bir kecha-kunduzda o'rta hisobda 1,5 litr siyidik ajratadi. Siyidik yo'li uzunligi 30 sm, diametri 3—9 mm.ga yetadi. Siyidik yo'li yassi nay shaklidagi organ. Siyidik yo'li buyrak jomidan boshlanadi va qorinning orqa devoriga yopishgan holatda pastga yo'nalib, kichik chanoqqa kiradi va shu joyda qovuqqa ochiladi. Siyidik yo'li devori uch qavatdan: *tashqi qavat* — biriktiruvchi to'qima qavati, uning ostida muskul qavati va *ichki qavat* — shilliq pardadan iborat.

Qovuq yoki siyidik pufagi siyidik yo'lidan keladigan siyidik to'planadigan organ bo'lib, kichik chanoq bo'shlig'ida, qov

chalar yana bir necha buraladi. Bu kanalchalar ikkinchi tartib burama kanalchalar deyiladi. Ular chiqarish yo'llariga, chiqarish yo'llari esa, o'z navbatida, buyrak so'rg'ichlari orqali buyrakning kichik kosalariga ochiladi. Buyrakda 8—12 dona kichik kosa bo'ladi. Kichik kosalar qo'shilib, katta kosalarni (2—3 dona), ular esa buyrak jomini hosil qiladi. Buyrak jomidan siyidik yo'li boshlanadi.

Buyrak tanachasiga keladigan tomir (olib keluvchi arteriya) kapillarlarga bo'linib, Malpigi jomchasini hosil qiladi. Jomchadagi kapillarlar o'zaro qo'shilib, boshqa organlardagidek venani emas, balki yana arteriyani hosil qiladi. Bu arteriya (olib ketuvchi arteriya) burama kanalchalar atrofida yana kapillarlarga bo'linadi va ularni

birikmasining orqasida joylashgan. Uning orqasida erkaklarda to'g'ri ichak, ayollarda esa bachadon joylashadi. Qovuqning tanasi, uchi, tubi va bo'yni bor. Devori, asosan, uch qavatdan: tashqi — biriktiruvchi to'qima qavati, o'rta — muskul qavati va ichki shilliq pardadan iborat. Qovuqning siyidik chiqarish kanaliga o'tish joyida halqasimon silliq muskul tolalari qalinlashadi va ichki sfinkter hosil qiladi. Ichki sfinkterdan pastroqda, tashqi sfinkter yoki siyidik chiqarish kanalining sfinkteri bor. Bu sfinkter ko'ndalang-targ'il muskul tolalaridan tuzilgan.

Ichki va tashqi sfinkter qovuq to'lmasdan turib, siyidikni tashqariga chiqarmaydi. O'rta sig'imi 500—700 m.ga ega. Siyidik chiqarish kanali erkaklarda va ayollarda har xil tuzilgan. Qovuqdagi siyidik shu kanal orqali tashqariga chiqariladi. Ayollarning siyidik chiqarish kanali (uzunligi 3—3,5 sm) qin dahliziga ochiladi. Erkaklarning olati (uzunligi 16—18 sm) ichida joylashgan.

8.2. Siyidik hosil bo'lishi

Normal hujayra almashinuvi, oqsillar, nuklein kislotalarning tinmay tuzilib, yemirilib turish jarayonari davomida mochevina (siyidikchil) hosil bo'ladi. Hayot faoliyati natijasida paydo bo'ladigan ana shu «chiqindilar» foydasiz bo'lishi bilan birga, zaharli hamdir. Ularning qon va to'qimalarda to'planib qolishi o'limga olib keladi. Organizmni almashinuv mahsulotlaridan xalos qilish vazifasini buyrak kamroq darajada bajarib, asosan, teri va hazm yo'li ado etib boradi.

Siyidik hosil bo'lishi — bu jarayonda qon tomirlari bilan Shumlyanskiy kapsulasida suyuqlikning har xil bosimda bo'lishi katta rol o'ynaydi. Malpigi jomchasidagi qon bosimi organizmning boshqa kapillarlaridagi bosimga nisbatan baland, Shumlyanskiy kapsulasi bo'shilig'idagi bosim past. Shuning uchun qondagi suvning bir qismi, suvda erigan tuzlar, moddalar almashinuvi mahsulotlari, ba'zi aminokislotalar va qand kapillarlari hamda kapsula devoridan filtrlanib, kapsula bo'shilig'i o'tadi va kapsulada suyuqlik hosil bo'ladi (birlamchi siyidik).


Bunday siyidik tarkibida siyidik bilan chiqariladigan tuzlar va zararli moddalardan tashqari, organizm uchun kerakli qand va ba'zi aminokislotalar ham bo'ladi. Birlamchi siyidik burama kanal-chalardan o'tar ekan, tarkibidagi suvning ko'p qismi, qand, amino-kislotalar va ba'zi tuzlar qaytadan qonga so'riladi. Kanalchalarda

qolgan siyidik ikkilamchi yoki oxirgi siyidik deyiladi va tashqariga chiqariladi.

Buyraklarda siyidik hosil bo'lishi nerv sistemasi tomonidan va qon bilan buyrakka kelgan moddalar ta'sirida boshqariladi. Siyidik ishlab chiqarishni boshqaradigan markazlar bosh miyaning ko'rish va kulrang do'mboqchalarida, to'rtinchi qorincha tubida va miyachada joylashgan bosh miya po'stlog'i ham buyraklar faoliyatiga ta'sir etadi.


Buyraklarga simpatik nerv sistemidan va adashgan nervdan tolalar keladi. Qon tomirlari torayganda buyrakka keladigan qon miqdori kamayib, siyidik kam ishlanadi. Tomirlar kengayganda siyidik miqdori ko'payadi. Buyraklar ishiga qon bilan keladigan har xil gormonlar, mochevina, kofein, ba'zi tuzlar va boshqa moddalar ham ta'sir etadi.

Gipofizning orqa qismida ishlanadigan vazopressin bilan antiidiuretik gormon ishlab chiqariladi. Vazopression buyrak qon tomirlarini toraytirib siyidik hosil bo'lislini kamaytiradi yoki



34-rasm. Buyrakning ko'ndalang kesmasi:

- 1—biriktiruvchi to'qimali kapsula;
- 2—miyasimon qatlam;
- 3—po'stloq qatlami;
- 4—miyasimon nur;
- 5—yog' to'qimali qatlami;
- 6—buyrak so'rg'ichilar;
- 7—arteriya, yoy shaklidagi arteriya;
- 8—buyrak arteriyasining shoxobchasi;
- 9—buyrak kosachalar;
- 10—buyrak jomi;
- 11—siyidik yo'li.



35-rasm. Boumen-Shumlyanskiy kapsulasining tuzilishi:

- 1, 2, 3, 4—Boumen-Shumlyanskiy kapsulasini ikki varag'i va uning bo'shlig'i;
- 5, 6—siyidik kanalining boshlanish qismi;
- 7—8—arteriya shoxobchasi;
- 9—qonni koptokchaga o'tish qismi.

butunlay to'xtatadi. Qonda antidiuretik gormon kamayib ketsa, siyidik miqdori ko'payadi. Qalqonsimon bez gormoni trioksin siyidik hosil bo'lshini kuchaytirsa, buyrakusti bezi gormoni adrenalinni susaytiradi.

Siydikning tarkibi: siyidik kuchsiz kislotali reaksiyaga ega bo'lgan och sariq suyuqlik. Siydikning solishtirma og'irligi o'rtacha 1015—1020 ga teng. Siyidik tarkibida suv, oqsillar parchalanadi. Hosil bo'ladigan azotli mahsulotlar — mochevina, kreatinin, ammiak, siyidik kislota, osh tuzi, sulfit va fosfat kislota tuzlari bor. Bir sutkada siyidik bilan taxminan 60 g tuz tashqariga chiqariladi. Siydikda unga och sariq tus beradigan urobilin va urxrom pigmentlari ham bor. Siydikning tarkibi, miqdori va xossalari ovqat tarkibidagi, ichiladigan suv miqdoriga, tashqi muhit haroratiga, odamning mehnat faoliyatiga, ko'p yoki oz terlashiga qarab o'zgarib turadi. Bir sutkada o'rtacha: erkaklarda 1000—1500 sm³, ayollarda 900—1200 sm³ siyidik ishlanib chiqadi.

8.3. Buyrak va siyidik ajratish yo'llari kasalliklarining asosiy alomatlari hamda tekshirish usullari

Buyrak kasalliklarida asosiy belgilardan shish, bel sohasida og'riq, qon bosimining ko'tarilishi, siyidik tarkibida bo'ladigan o'zgarishlar buyrakning yallig'lanishi oqibatida kelib chiqadi. Shishlar buyrak kasalliklarining eng ko'p uchraydigan alomatlardan hisoblanadi. Bemorni tashqi ko'rinishini ko'zdan kechirishdayoq, shishlarning sababi xususida taxmin qilish mumkin. Buyrak kasalliklarida shishlar butun tana bo'ylab tarqaladi, lekin asosan, yuz, ayniqsa, yumshoq teriosti yog' kletchatkasi ko'p bo'ladigan qovoqlar shishadi.

Yurak kasalliklarida shishlar tananing quyida o'rnashgan qismlarida joylashadi. Shishlarda terining rangi ko'kimtir tusga kiradi, buyrak kasalliklarida teri bo'zargan bo'ladi. Yurak yetishmovchiligi zaminida paydo bo'lgan shishlarda hemorlarning nafasi qisadi va ular o'rinda qaddilarini baland qo'yib, majburiy holatni egallab yotadilar. Buyrakka aloqador shishlari bo'lgan hemorlar boshni past qo'yib yotadilar.

Buyrak shishlari buyrak teriosti-yog' kletchatkasidagina emas, balki ichki organlarda va tana bo'shliqlarida ham joylashadi.

Qon bosimining oshishi — buyrakning yallig'lanishi, buyrak qon tomirlarining shikastlanishi, arterial gipertenziyaning topilishi, buyrak kasalliklarining birdan bir dastlabki alomati bo'lib,

ikkilamchi gipertoniyaga xos belgilar namoyon bo'ladi. Arterial gipertoniya buyrak koptokchalarining yallig'lanishi (o'tkir nefrit) yoki skleroz tufayli zararlanishi oqibatida, arterial bosim regulatsiyasining buzilishi, buyraklarda qon oqishining yetishmovchiligi munosabati bilan ularda ishlab chiqariladigan maxsus moddaning ta'sir qilishi sabab bo'ladi. Arterial gipertoniyaning o'tishi uchun organizmning turli xil sohalaridagi tomirlarning spazimga uchrab, shu sohaga qon kelishining vaqtincha kamayib qolishi va funksional o'zgarishlar kelib chiqishi xarakterlidir.

Og'riq – buyrak kasalliklarida og'riqlar bel sohasida seziladi. Ba'zan ular doimiy bo'ladi, boshqa hollarda bel sohasida faqat og'irlik seziladi. Ko'pgina hollarda vaqt-bevaqt buyraklar sohasida birdan boshlanadigan, aksari chidab bo'lmaydigan og'riq kuzatiladi (buyrak sanchiqlari).

Siydik tarkibining o'zgarishi. Siydik laboratoriyyada tekshirilganda, unda o'ziga xos bir qancha o'zgarishlar topish mumkin: albu-minuriya (proteinuriya) – siydik bilan oqsil ajralishi, gematuriya – siydikda qon (eritrotsitlar) bo'lishi, silindrlar, epitelial hujayralar, leykotsitlar, bakteriyalarni topish mumkin.

Siydikning rangi va tiniqligi ko'z bilan ko'rib aniqlanadi. Bunda siydikni silindrغا solib, oq narsa ustida qaraladi. Normal siydik och sariqdan qora-ko'ng'irranggacha bo'ladi. Agar siydakka o't pigmentlari aralashsa, u pivo rangini oladi (sariq-yashil rangdan to'q jigar ranggacha), agarda qon pigmentlari (gematuriya, gemboglobinuriya) aralashsa, bu holda u go'sht yuvindisi rangiga kiradi.

Siydikda bakteriya ko'p miqdorda bo'lsa, u loyqa bo'lib qoladi. Siydikka leykotsitlar, eritrotsitlar, epiteliya, silindrlar ham ko'p miqdorda bo'lsa ham, siydik loyqalanadi.

Ko'zdan kechirish – buyrak kasalliklarida teri rangi sianotik tusda yoki bo'zargan bo'ladi. Teristi kletchatkasining shishganligi aniqlanadi. Ularning yuzi va qovog'i kerkib, gohida esa rangi oqarib ketadi. Buyrak-tosh kasalligida yuzi bo'rtib, qizaradi, terlash kuzatiladi. Nefrozda rangi oqarib, shishgan qismlari yuzasi yaltiroq va quruq bo'ladi. Surunkali nefrit bilan og'rigan bemorning rangi za'faron, terisi quruq bo'ladi.

Buyrak kasalliklarida Pasternatskiy alomati ma'lum rol o'ynaydi: chap qo'lning kafti bir buyrak sohasiga qo'yilib, o'ng qo'lning mushti bilan chap qo'l panjasining orqasiga ohista urib ko'riladi, keyin ikkincha tomonda ham xuddi shu takrorlanadi. U yoki bu

tomonning bezillab turishi yoki birmuncha ko'proq sezgir bo'lib chiqishi Pasternatskiyning musbat yoki kuchsiz musbat alomati deb hisoblanadi. Sog'lom odamda buyraklar qo'lga unnamaydi, lekin ular kattalashganda yoki o'midan surilib qolgan bo'lsa, paypaslab ko'rilganida ko'pincha qo'lga unnashi mumkin.

Bemorni turli vaziyatlarda: tik turg'izib qo'yib, chalqanchasiga yoki yonboshi bilan yotqizib qo'yib buyraklarni palpatsiya qilish mumkin. Eng yaxshi natija olish uchun bemor chuqur-chuqur nafas olib turishi va qorin muskullarini batamom bo'shashtirishi zarur.

Bemor oyoqlarini uzatib chalqancha yotgan holida palpatsiya qilinadigan bo'lsa, tekshiruvchi kishi qo'l kaftini, orqa tomondan bel sohasiga, ikkinchi qo'l kaftini qovurg'alar chetidan pastroqqa, qoringa qo'yadi va bemorning nafas harakatlaridan foydalanib, qo'lini qorin bo'shlig'iga imkonli boricha chuqurroq botirishga harakat qiladi. Shu bilan bir vaqtida, orqa tomonga turgan qo'li bilan palpatsiya qilayotgan qo'li tomoniga qarab, kalta-kalta zarb beradi va shu tariqa buyrakni oldinga surishga urinib ko'radi. Qov suyaklari ustini palpatsiya qilib ko'rish ba'zan qovuqning kattalashib ketganini topishga imkon beradi.

8.3.1. Siyidik ajratish a'zolari kasalliklarida tekshirish usullari

Ekskretor urografiya — siydik chiqarish yo'llarini rentgenologik yo'l bilan tekshirish bo'lib, bunda rentgenokontrast moddalardan foydalaniлади (kardiotrast, diodon, verografin, urografen). Rentgenokontrast moddalar 35—50 % li eritmalar ko'rinishida bo'ladi. Tekshirishning sifati ichakning gazlar va axlatdan nechog'liq tozalanganligiga, buyraklarning funksional holatiga, kasallik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Yodli rentgenokontrast moddalar venadan yuborilganida bo'ladi gan allergik reaksiyani istisno qilish uchun bemorning ushbu preparatni ko'tara olishi sinab ko'rildi. Buning uchun venaga 1 ml preparat yuborib, sinab ko'rildi. Allergik reaksiya yuzaga kelganda, tekshirish o'tkazilmaydi.

Ichakning nechog'liq yaxshi tozalanganini sinab ko'rish uchun bevosita urografiya oldidan buyrak va qovuq sohalari atroficha rentgenografiyadan o'tkaziladi. Ichakni tozalash uchun kechqurun va tekshirishdan 2 soat ilgari tozalovchi huqna qilinadi. Tekshirish oldidan bemor qovug'ini bo'shatib oladi.

Preparat tana haroratigacha iltilgan holda tirsak venasiga 3—5 minut davomida yuboriladi. Eritmaning dastlabki 2—3 ml ni bemorning o'zini tutishi va reaksiyasiga qarab asta-sekinlik bilan yuboriladi. Allergik reaksiyalar (aksirish, burun bitishi, eshakemi toshishi) paydo bo'lganida preparat yuborishni darhol to'xtatish kerak. Rentgenokontrast modda venadan yuborilganida tez orada buyraklar orqali chiqa boshlaydi. Buyrak jomlari, siyidik yo'llari, qovuq konturlari suratlarda ko'rinish turadi.

Retrograd piyelografiya. Kontrast moddalarni siyidik chiqarish yo'llari orqali bevosita buyrak jomiga yuborsa ham bo'ladi. Bu usul retrograd (yuqori ko'tariladigan) piyelografiya deb ataladi. Bunday tekshirish paytida kontrast moddani maxsus ureter kateterlari yordamida sistoskop orqali buyrak jomlariga yuboriladi. Maxsus belgilar kateterning qayerda turganini ko'rsatadigan muhim mo'ljal bo'lib xizmat qiladi: buyrak jomiga kateter solish uchun kateterni og'zidan 24—28 sm o'tkazish kerak bo'ladi. So'ngra 5—7 ml 20—30 % li sergozin, diodon yoki kardiotrast yuboriladi. Eritmani iltilgan holda asta-sekin yuboriladi.

Sistoskopiya — qovuq bo'shlig'ini sistoskop yordamida ko'zdan kechirishdir. Sistoskop solishdan avval siyidik chiqarish kanali tashqi teshigi diametrini aniqlash va shunga qarab tegishli kalibrdag'i sistoskop tanlab olish zarur. Sistoskopga steril glitserin surtiladi va uretraning tashqi teshigiga bir necha tomchi glitserin yuboriladi. Sistoskopning tumshug'ini uretradan sirg'antririb turib, uni qovuq-qacha oldinga surib yuboriladi.

Punksion buyrak biopsiyasi — tekshirish uchun maxsus asbob yordamida buyrak to'qimasidan kesib olish. Kesib olingan to'qima — bioptat mikroskop ostida tekshirib ko'rilibadi. Bu tekshirish usuli surunkali glomerulonefritning shakllarini aniqlashda qimmatli ahamiyatga ega.

8.4. O'tkir diffuz glomerulonefrit (o'tkir nefrit)

Buyrak jomchalari, qon tomirlarining yallig'lanishiga o'tkir diffuz glomerulonefrit deyiladi, u infeksion — allergik kasalliklar turkumiga kiradi.

Etiologiyasi: streptokokk infeksiyasi; yuqori nafas yo'llari kasalliklari; faringit, laringit, traxeit, angina; revmatizm, skarlatina (qizilcha), pnevmoniya, septik endokardit; yuqumli kasalliklar — gripp, qizamiq, terlama, difteriya, sepsis; kuchli sovqotish; allergiya; yuqoriga ko'tariluvchi infeksiya.

Klinikasi. Kasallik to'satdan boshlanadi, umumiy lohaslik, nafas qisishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, tana haroratining ko'tarilishi, ko'ngil aynishi, quşish, hansirash, shish, bel sohasida og'riq, siyidik ajratish kamayishidan shikoyat qiladilar.

Bemor ko'zdan kechirilganda, terisining rangi sianotik tusda uchganligi, teriosti kletchatkasining shishganligi aniqlanadi. Shish yuzda, belda, qorinning old devorida va oyoq-qo'llarda bo'ladi. Shish juda tez, ba'zan bir necha soat ichida paydo bo'lib, juda katta hajmgacha yetadi.

Arterial bosim ko'tariladi, yurak urishi tezlashadi, yurak sohasida og'riq bo'ladi, chap qorincha gipertrofiyalashadi. Tomir urishi tarang, sekin. Uch asosiy belgi, ya'ni shish, qon bosimining ko'tarilishi, siyidikda oqsilning paydo bo'lishi asosiy xarakterli xususiyatlardan biri hisoblanadi.

O'tkir nefrit ayrim hollarda og'ir o'tadi. Buyrak eklampsiyasi avj oladi. Eklampsiya xuruji qon bosimining birdaniga ko'tarilishi bo'lgan bemorlarda paydo bo'ladi. Bemorning badani shishgan bo'ladi. Muskullar tonik va klonik qisqaradi, badan taranglashadi, muskullar uchib turadi, ko'zlar g'ilaylashadi, yorug'likni sezmaydi, ko'z qorachiqlari kengaygan bo'ladi, og'zidan ko'pik ajraladi, bemor uzoq vaqt dovdiragan holatda bo'ladi, atrofdagilarga loqayd qaraydi, atrof-sharoitni yaxshi sezalmaydi, harakatlari sust bo'ladi.

Laboratoriya tahlili. Siyidik miqdori kamayadi — 700—400 ml. Albuminuriya — siyidikdan oqsil ajralishi, gematuriya — siyidikdan qon ajralishi kuzatiladi.

Siyidik rangi: qo'ng'ir, qizg'imir, go'sht yuvindisiga o'xshash. Siyidikning solishtirma og'irligi yuqori. Bundan tashqari, siyidikdan silindrler, epiteliy hujayralari, leykotsitlar topiladi. Qonda leykositoz, EChT tezlashadi.

Davolash. Diyetoterapiya — 7-, 7a-, 7b-parhez. Ovqatlanish tartibi 1 kunda 5 mahal. Osh tuzi, suyuqlik, go'sht cheklanadi, 2—3 kun sutkasiga 100—150 gr qand kunlari tayinlanadi. Ovqat, asosan, baliq, tvorog, sut, tuxum oqi, sabzavot, mevalardan iborat bo'ladi.

Bemorlarni kasalxonaga yotqizish, yotish rejimini uzaytirish, issiq palata hamda issiq o'rnlarda yotqizish zarur, qattiq nafas qisganda yostiqlar yordamida bemor gavdasining yuqori qismini balandroq qilib qo'yish kerak.

Bemorlarni davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan quyidagi dori vositalari ishlataladi: antibiotiklar (benzilpenitsillin natriy,

gentamitsin sulfat), yurak glikozidlari (strofantin K, korglikon), glukokortikoid dori vositalari (prednizolon, gidrokortizon), diuretik dori vositalari (furosemid, gipotiazid), gipotenziv dori vositalari (dibazol, enam, klofellin).

Buyrak eklampsiyasi xurujida (koma) yordam ko'rsatishda shifokor ko'rsatmasiga binoan, qon chiqariladi, shunday qilinganda tomirlarning qonga to'liqligi kamayadi. Bundan tashqari, muskul orasiga magniy sulfat 5—10 ml 25 % li eritmasi yuboriladi, bu arterial bosimning pasayishiga va suyuqliknинг miya to'qimasidan oqib ketishiga imkon beradi. Xuruj takrorlanganda lyumbal punksiya qilinadi. Eufillin 2,4 %—10 ml tomir ichiga 40 % — 10 ml glukoza eritmasi bilan, laziks 40—60 mg tomir ichiga, dibazol 6—8 ml 0,5 % tomir ichiga, rezerpin 1 ml — 0,1 % muskul orasiga, no-shpa 2 % 2—3 ml muskul orasiga, papaverin 2 % — 2 ml muskul orasiga yuboriladi. Oksigenoterapiya, xloralgidratli huqnalar qilinadi (150 ml suvg'a 0,5—1,5 g).

Fizioterapeutik davo choralaridan — diatermiya, parafin, applikatsiyalar qilinadi.

Giyohlar bilan davolash. Buyrak choy barglari ovqatdan oldin iliq damlama 3,5:200,0 ko'rinishida yarim stakandan kuniga 1—2 mahal ichiladi. Ajgon (tmin) 30 tomchidan kuniga 2 mahal ichiladi (siyidik haydash maqsadida), anjabor (yerqo'noq) har ikki soatda bir qoshiqdan ichib turiladi. Anjir damlamasi $\frac{1}{2}$, stakandan kuniga 2—3 mahal ichiladi. Limono't ovqatdan oldin $\frac{1}{2}$, stakandan 3 mahal ichiladi.

Profilaktikasi. O'tkir nefritni oldini olish maqsadida o'choqli infeksiya (angina, laringit, faringit, gingivit), surunkali va yuqumli, yallig'lanishga olib keladigan kasalliklarning oldini olish, barvaqt aniqlash va davolash lozim.

8.5. Surunkali diffuz glomerulonefrit (surunkali nefrit)

Surunkali diffuz glomerulonefrit deb, buyrak jomchalarining uzoq davom etadigan surunkali yallig'lanishiga aytildi.

Etiologiyasi: o'tkir diffuz glomerulonefrit, sil, zaxm, bakterial endokardit, gemorragik vaskulit, tugunli periarteriit kasalliklari asosatli sifatida, streptokokk infeksiyasining xronik o'chog'i bor joylardan qon orqali, limfa orqali kelishi (gemotogen, limfogen) va ba'zi bir tibbiy dorilarning ta'siri natijasida.

Klinikasi. Badanda shish paydo bo'lishi, qon bosimining ko'tarilishi, buyrak sohasida og'riq, siyidikda o'zgarishlar kuzatiladi.

Bundan tashqari, nafas qisishi, bosh og'riши, darmonsizlik, ishtahaning pasayishidan shikoyat qilishadi. Surunkali nefrit bilan og'riqan bemorning rangi, odatda, za'faron, terisi quruq bo'ladi, terining oqarib turishi shu kasallikda ko'pincha avj oladigan kamqonlikka, shuningdek, tomirlar spazmiga bog'liqdir.

Bemorning yuzi kerkib, ajinlari bilinmay qoladi, ko'z yorig'i torayib, ko'z yumilib qoladi. Organizmda suyuqlik ushlanib qolishi natijasida hansirash, yurakning tez urishi, yurak sohasida og'riq seziladi. Arterial bosim ko'tarilib, katta raqamlariga yetishi mumkin. Tomir urishi tarang, sekin, yurakni chap qorinchasi gipertrofiyalashgan. Markaziy nerv sistemasi buzilishi kuzatiladi (uyquchanlik, talvasa xurujlari).

Laboratoriya tahlili. Siydkda qon bo'lishi uning rangi o'zgarishiga olib keladi: (gematuriya) qo'ng'ir, qizg'imtir, go'sht yuvindisiga o'xshab. Siydkdan oqsil ajraladi (albuminuriya, proteinuriya). Siydkning solishtirma og'irligi yuqori. Bundan tashqari, siydkdan donador silindirlar, leykotsitlar, bakteriyalarni ko'p miqdorda topish mumkin. Qon plazmasida oqsil miqdorining kamayib ketishi (gipoproteinemiya) xolesterin miqdorini ko'payib ketishi (giperxolesterinemija) xarakterlidir, qonda qoldiq azotning oshganligi – azotemiya, shuningdek, asidoz, giperkaliyemiya, giponatriyemiya qayd qilinadi. Leykositoz, EChT tezlashadi.

8.6. Buyrak yetishmovchiligi. Uremiya

Etiologiyasi: surunkali diffuz glomerulonefrit, surunkali piyelonefrit, buyrak-tosh kasalligi; siydk ajratish sistemalarining o'smalari, gidronefroz, amiloidoz, qandli diabet, podagra, polikistoz, kalsiy almashinuvining buzilishi, buyrak gipoplaziyasи.

Klinikasi. Buyrak yetishmovchilida klinik manzarasi sistemasiga qarab o'zgarib boradi: nerv sistemasi, hazm organlari sistemasi, yurak-qon tomirlar sistemasi, nafas olish sistemasi hamda qon tarkibida kuchli o'zgarishlar ketadi. Nerv sistemasida uyquchanlik, tez charchash, holsizlik, befarqlik belgilari ko'rildi. Hazm organlar sistemasida esa ko'ngil aynishi, ishtahaning pasayishi, ozib ketish, ich ketishi, oshqozon-ichakdan qon ketishi kuzatiladi.

Qon aylanish sistemasida – qon bosimining ko'tarilishi, yurak tez urishi, og'riq, yurak chegarasining chagga siljiganligi, ko'ruv qobiliyatining pasayishi kabi (qon bosimining oshganligi natijasida) belgilari namoyon bo'ladi. Nafas sistemasida – plevrit va

pnevmoniya rivojlanadi. Og'izdan siydk hid'i kelib turadi. Til quruq, mallarang karash bilan qoplangan bo'ladi. Qorin paypaslab ko'rilingda, epigastral sohada og'riq kuzatish mumkin.

Laboratoriya tahlili. Zimnitskiy sinamasida o'zgarishlar ketadi, nikturiya kuzatiladi, siydikning solishtirma og'irligi pasayadi — 1005—1008. Siydk rangsiz va tiniq bo'lib qoladi. Bu buyrakning siydk pigmenti ajratish xususiyatini yo'qotganligiga bog'liq. Qonda qoldiq azot, mochevina va indikan miqdori o'rtacha ko'paygan.

Uremiya asta-sekin rivojlanadi. Bemorlar darmonsizlik, lohaslik, tez charchash, ishtaha yo'qligidan shikoyat qilishadi, keyinchalik, ko'ngil aynishi, qayt qilish, ich ketishi, nafas qisishi kuzatiladi. Til quruq, qattiq chanqash kuzatiladi. Og'izdan yoqimsiz urinoz hid keladi. Teri quruq bo'lib, bemor ozib ketadi.

Bunday hollarda bemorning umumiy ahvoli yomonlashadi. Mushaklar tortishib, uchib turadi, es-hush xiralashadi, kamqonlik yuz beradi. Ba'zan qonli ich ketishga sabab bo'ladigan yarali kolit qo'shiladi. Nafas qisishi ham uremiya alomatidir. Nafas tez-tez, chuqur bo'ladi. Uremik astma rivojlanadi.

Asorati. Kasallikning so'nggi kunlarda quruq perikardit, plevrit, gemorragik pnevmoniya asorati bo'lib qoladi. Uremiya goh pasayib, goh zo'rayib, bir necha haftaga cho'zilishi mumkin. Biroq, oqibat natijasi o'limga olib boradi.

Laboratoriya tahlili: qon tekshirilganda qoldiq azotning oshganligi — azotemiya, shuningdek, asidoz, giperkaliyemiya va giponatriyemiya qayd qilinadi. Siydk ajralmaydi.

8.7. Surunkali diffuz glomerulonefrit, buyrak yetishmovchiligi, uremiyalarni davolash va profilaktikasi

Diyetoterapiya — 7-, 7a-, 7b-, 7v-parhez. Osh tuzi va suyuqlik miqdori chegaralanadi. Sutli, mevali sho'rvalar. Qaynatilgan, qiyma qilingan va maydalangan, qaynatilgandan so'ng pishirilgan bo'lak-bo'lak go'sht va parrandaning yog'siz xillari. Pishirilgan sabzavotlar beriladi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, siydk haydovchi (gipotiazid, furosemid, uregit), gipotenziv vositalar (magniy sulfat, gemiton, rezerpin), antibiotiklar (benzilpenitsillin, oksatsillin, metatsiklin gidroxlorid, eritromitsin), prednizolon, delagil, platifillin, atropin, no-shpa, vitaminlar (B_{12} , B_1 , B_6), og'riq bartaraf etish maqsadida promedol yuboriladi. Asidozni bartaraf qilish uchun kuniga

3—9 g natriy gidrokarbonat yoki 3—5 % 300—500 li eritmasini tomir ichiga yuborish tavsiya qilinadi.

Uremiyada qonda ko'payib ketadigan moddalarni yarim-o'tkazgich membranada ushlab qolishga asoslangan gemodializ muolajalari 5 soatdan haftasiga 3 marta o'tkaziladi. Surgi dorilar buyurish, me'dani takror yuvish, haftasiga 2 marta sifonli huqnalar qilish zaharlanishni bartaraf etish imkonini beradi. So'nggi yillarda surunkali nefrit va uremiyani davolashning yangi usullari ishlab chiqarilmogda: peritoneal dializ, sun'iy buyrak, buyrakni ko'chirib o'tkazish usullari shular jumlasidandir.

Fizioterapevtik davo tadbirlaridan UVCh, diatermiya, Gauffeni to'rt kamerali vannasi, parafinli applikatsiya, «Sollyuk» lampasi qo'llanishi mumkin.

Giyohlar bilan davolash. Bo'tako'z (savatchaguli), petrushka (urug'i), qayin (kurtagi), qora andiz (ildizi), toloknyanka (bargi), suv uchbargi (bargi): 2 choy qoshiq yig'mani 1 stakan qaynayotgan suvga solib, 10 minut qaynatiladi, dokadan o'tkazib, kun davomida 3 mahal 1/2 stakandan ovqatlanishdan 20 minut oldin ichish zarur. Archa (mevasi), qayin (bargi), qoqi (ildizi) 1 osh qoshiq yig'mani 1 stakan qaynagan suvga solib, 30 minut damlanadi, dokadan o'tkazib, kun davomida 3—4 mahal 1 osh qoshiqdan ovqatlanishdan 15 minut oldin ichiladi (siydk haydash maqsadida). Anjir, anjabar (yerqo'noq), anor, meva suvlari va mevalari iste'mol qilinadi.

8.8. Piyelonefrit. Piyelit

Piyelonefrit buyrak jomlari shilliq pardasi va buyrakning yallig'lanishiga piyelonefrit deyiladi. Piyelit — buyrak jomlari shilliq pardasini yallig'lanishidir.

Klinik kechishiga ko'ra, o'tkir va surunkali piyelonefrit hamda piyelit farq qilinadi.

Etiologiyasi: ichak tayoqchasi, enterokokklar; streptokokk, stafilokokk, vulgar protey; endogen va ekzogen zaharlar; ayrim bir dori moddalarning ta'siri; buyrak toshi, siydk yo'lining toshi, torayishi, qiyshayishi, o'smalar; qandli diabet, podagra, kolit, prostatit.

Infeksiyalar — gemitogen, limfogen va yuqoriga ko'tariladigan enterogen yo'llar orqali buyrak va buyrak jomlariga o'tadi.

Klinikasi. Kasallikda et uvushish, tana haroratining ko'tarilishi, belda va ko'pincha qovuq ustida simillagan og'riq bo'ladi, bosh og'rishi, yurakning tez-tez urishi, hansirash, ko'ngil aynishi, quşish, qorin dam bo'ladi, lohaslik, ko'p terlash, ishtahaning yo'qolishi, ozish kuzatiladi. Surunkali piyelonefritda tana harorati subfebril bo'ladi, qon bosimi ko'tariladi, kasallik gohida yashirin o'tadi.

Tekshirganda til quruq karash bog'lagan. Pasternatskiy alomati ijobjiy. O'tkir piyelit to'satdan boshlanadi va haroratning 40°C va bundan ko'ra yuqori ko'tarilib, a'zoyi badanining titrab-qaqshashi birinchi alomati hisoblanadi, tomiri tez-tez urib, ko'ngli ayniydi, boshi va belida og'riq kuchayadi, nafas tezlashadi, tili quruq va karash bilan qoplangan, ichagi shishib ketgan, ichi qotgan bo'ladi.

Laboratoriya tahlili. O'tkir piyelonefritda siydikning tashqi ko'rinishi diqqatni tortadi. U loyqalanib qoladi, yiringli, ipir-ipir cho'kmalar hosil bo'ladi. Siydikning solishtiirma og'irligi past, mikroskop ostida ko'p miqdorda leykotsitlar va bakteriyalar ko'rindi. Qonda chapga siljish bilan neytrofilli leykotsit kuzatiladi. EChT tezlashadi.

Surunkali piyelonefritda: siydikda oqsil va leykotsitlar topiladi, gipostenuriya, poliuriya rivojanadi. Bunda ham qonda leykositoz EChT tezlashadi. O'tkir piyelitda siydik loyqa bo'ladi, tinitib qo'yilganida yiringli cho'kma beradi. Unda oqsillar kam miqdorda bo'lgani holda talaygina leykotsitlar, bakteriyalar, qonda esa leykotsitlar ko'payadi. EChT tezlashgan.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya — 7-parhez. Mo'l suyuqlik ichish tayinlanadi. Bir necha stakandan ma'danli yoki qaynatilgan, ilitilgan oddiy suv, kompot, sut, meva sharbatlari har kuni kundalik narmal ichimlik ratsionida ortiq miqdorda ichiladi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, antibiotiklar (benzilpenitsillin, streptomitsin sulfat), sulfanilamid preparatlari (biseptol—480 kuniga 1—2 tabletkadan 2 marta beriladi), furodonin sinonimlari (furatsilin, infurantin, furadonin), vitaminlar (B_1 , B_6 , B_{12} , C, A), 5-NOK (nitroksolin) buyuriladi.

Giyohlardan shirinmiya (ildizi), archa (mevasi), toloknyanka (barg) yoki archani o'rniga bo'tako'z (savatchaguli) I osh qoshiq yig'mani I stakan qaynayotgan suvgaga solib, 30 minut damlanadi. Dokadan o'tkazib, kun davomida 3—4 mahal I osh qoshiqdan ovqatdan 15 minut oldin siyidik haydash maqsadida ishlataladi.

Fizioterapevtik davo. Kunora 30 minut buyrak sohasiga diatermiya qilinadi; 10—15 minut kunora buyrak sohasiga UVCh, 30—40 minut kunora buyrak sohasiga induktotermiya; 10—15 minut 37—38°C li umumiy vanna qilinadi. 20—30 minut 46—48°C li balchiqli applikatsiya buyuriladi. 20—30 minut 50—55°C li parafinli applikatsiya kunora olinadi.

8.9. Sistit

Qovuq shilliq pardasining yallig'lanishiga sistit deyiladi.

Etiologiyasi: ichak tayoqchasi, streptokokk, stafilokokk, gonokokk, sil mikobakteriyasi; qovuqda toshlar bo'lganda; prostata bezi gipertrofiyalangan bemorlarda siyidik dimlanib qolganida; infektion kasalliklarda gematogen yo'l bilan buyraklardan o'tishi natijasida; endogen va ekzogen zaharlar; infeksiyani yuqoriga ko'tarilishi — enterogen yo'l bilan kasallik vujudga keladi.

Klinikasi. Sistitda tana harorati ko'tariladi, bemor og'riq bilan tez-tez siyadigan bo'lib qoladi (dizuriya). Qorinning pastki qismida simillab turadigan og'riqlar paydo bo'ladi. Buyrak sohasini urib ko'rganda Pasternatskiy alomati kasal tomonida musbat, qattiq og'riq seziladi.

Laboratoriya tahlili. Siyidik loyqalashgan, ba'zan yiring aralashgan bo'ladi. Siyidikda oqsil kam miqdorda topiladi. Mikroskop ostida tekshirilganda ko'pgina leykotsitlar, dumli jom hujayralar topiladi. Silindrler, eritrotsitlar kam uchraydi. Qonda leykositoz, EChT tezlashgan.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya — 7-parhez. Dorivorlar, achchiq, sho'r ovqatlar, spirtli ichimliklar ichish man etiladi. Sut-sabzavotli ovqatlar beriladi. Suyuqlik ko'p miqdorda beriladi. Qaynagan suv, suyuq damlangan choy, kompot, sut, mineral suvlari («Yessentuki» № 20, «Borjomi», «Smirnovsk» suvi) ichish tavsiya qilinadi.

Dorilardan shifokor ko'rsatmasiga binoan, salol (fenilsalitsilat) kuniga 3—4 mahal 0,25—0,85 g.dan ichiladi, urotropin (gexsametilentetramin) 0,5 g.dan kuniga 3 marta ichiriladi. Urotropinni glukoza bilan tomir ichiga yuborish mumkin.

Antibiotiklardan benzilpenitsillin natriy va kaliyli tuzi 500 000 TB har 4 soatda muskul orasiga, levomitsitin ovqatdan 20—30 minut oldin 0,25—0,75 g.dan kuniga 3—4 mahal ichiladi, davo kursi 7—10 kun.

Iliq vannaga tushishi, buyrak sohasiga issiq grelka qo'yish tavsiya etiladi.

Giyohlardan ayiqquloq damlamasi buyuriladi. 10 %—200 bir osh qoshiqdan kuniga 5—8 mahal. Sabur, daraxtsimon aloy, 150 g sabur barglarini maydalab, ustiga qaynatilgan asal va 350 ml vino qo'shiladi. 5—7 kundan keyin 1—2 choy qoshiqdan kuniga 2 mahal ichiladi. Qirqbo'g'in, anjir mevalari iste'mol qilinadi.

8.10. Buyrak-tosh kasalligi

Buyrak-tosh kasalligi 26—40 yoshlardagi kishilarda uchraydi. Erkak kishilar, ayollarga nisbatan ikki marta ko'p kasallanadi. Issiq va tabiatи quruq joylarda, suv tarkibi kalsiy tuzlariga boy bo'lgan maskanlarda uchraydi.

Etiologiyasi: modda almashinuvi buziladi, kislota va ishqor muvozanatining buzilishi, buyrakni shikastlanishi va yallig'lanishi, A vitaminini yetishmovchiligi, mineral almashinuvi buzilishi, siyidik dimlanishi; siyidik yo'llaridagi infeksiya, siyidkning quyuqlashuvi.

Quyidagi turdagи toshlar farq qilinadi:

- 1) urat toshlar;
- 2) oksalat toshlar;
- 3) fosfat toshlar;
- 4) karbonat.

Urat toshlar zich, sariq-jigarrang, yuzasi silliq bo'ladi. Oksalat toshlar juda qattiq, yuzi tikanlar bilan qoplangan, ular to'q qo'ng'ir, deyarli qora rangda bo'ladi va tuzilishi jihatidan malinaga o'xshab ketadi. Fosfatlar bilan karbonatlar yumshoq, mo'rt yuzasi silliq yoki gadir-budur, oq rangli bo'ladi.

Toshlar no'xatdan tortib tovuq tuxumidek keladi. Ular buyrak parenximasida ham, jomida ham bo'lishi mumkin.

Klinikasi. Buyrak sanchiqlari tutib turishi bu kasallikning asosiy alomati hisoblanadi. Bemorning beli to'satdan qattiq og'rib qoladi, og'riq chov, son va tashqi jinsiy organlarga o'tadi. Odatda, bemorning tez-tez siygisi qistaydi, ammo siyidik kelmaydi yoki juda kam ajraladi. Siyidkda qon aralashgan bo'ladi. Og'riqning zo'ridan bemor qusishi, hatto hushini yo'qotishi mumkin. Tana harorati ko'tariladi.

Bel sohasiga urib ko'rilganda, har ikki tomonda og'riq aniqlanadi. Pasternatskiy alomati musbat bo'ladi. Rentgen yordamida toshlarni aniq ko'rish va joylashgan o'rnini bilish mumkin.

Toshlarning ko'pchiligi rentgen nurlarini o'tkazmasligi sababli, tasvirda toshlarning soyasi hosil bo'ladi. Oksalat toshlar soyasi eng yaxshi ko'rindi. Urat toshlari esa juda yomon ko'rindi, fosfat toshlar tasvirda ko'rindiydi.

Siydik laborator tekshirilganda, unda oqsil va qon aniqlanadi.

Davolash. Buyrak sanchig'ida bemorni o'rniga yotqizib qo'yib, belini issiq tutish, issiq vannaga tushirish yoki issiq grelka qo'yiladi. Oyoq-qo'l muzlasa, grelka qo'yiladi. Siydik yo'llarini yuvib turish maqsadida bemor ko'p suyuqlik ichishi kerak. Ma'danli suvlari yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bemorga butunlay orom berish kerak. Diyetoterapiya — 7-parhez, nordon sut mahsulotlari, limon tayinlanadi, ozroq miqdorda go'sht berish mumkin. Ovqat tarkibi oqsillar, yog'lar, vitaminlar, uglevodlarga boy bo'lishi kerak.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, og'riq qoldiruvchi va spazmolitik vositalar (platifillin 0,2 %—1 ml teri ostiga; morfin 1 %—1—2 ml teri ostiga; promedol 1 %—1 ml teri ostiga; no-shpa 2 %—2—3 mg muskul orasiga, papaverin 2 %—2 ml muskul orasiga, spazmolitin 0,05—0,1 g.dan kuniga 2—4 mahaldan ichiladi. 1 % li eritmasi 5—10 ml.dan muskul orasiga; atropin 0,1 %—2 ml teri ostiga), siydik toshlari chiqib ketishiga yordam beradigan vositalar (sistenal ovqatdan 30 minut oldin 3—4 tomchisini qandga tomizib ichiladi, etamid 10—12 kun davomida 0,7 g.dan kuniga 4 mahal ichiladi, urolesan, bir chaqmoq qandga 8—10 tomchi tomizib, ovqatdan oldin kuniga 3 mahal til ostiga qo'yiladi, urodan 1 choy qoshig'ini $\frac{1}{2}$ stakan suvga solib, ovqatdan oldin kuniga 3—4 mahal ichiladi va h.k.).

Tibbiyot hamshirasi buyrak sanchig'i xuruji vaqtida bemor hushidan ketishi (vannada bo'lgan paytda) mumkinligini yodda tutishi va kerak bo'ladi dorilarni (kofein, kordiamin) taxt qilib qo'yishi lozim. Bemorni vannada yolg'iz qoldirish mumkin emas.

Giyohlar bilan davolashda yovvoyi sabzi, yong'oq, ko'k bo'ta-ko'z, qirqbo'g'in, ajgan mevalari ishlataladi. Urug'lari, ildizlari damlama va qaynatma holida ishlataladi.

9-boʻb. QON VA QON ISHLAB CHIQARISH A’ZOLARI KASALLIKLARI

9.1. Qisqacha anatomik-fiziologik maʼlumotlar

Qon – organizmda xilma-xil vazifalarni bajaradi: u hujayralarga kislorod yetkazib berib, karbonat angidrid gazini olib ketadi; ovqat hazm qilish organlaridan oziq moddalarni butun organizmgaga tarqatadi; moddalar almashinuvi mahsulotini chiqarish organlariga olib boradi.

Qon organlarning gumoral aloqasini yuzaga chiqaradi, u gaz almashinuvi, nafas, suv-tuz almashinuvi, kislota-ishqor muvozanatida ishtirok etadi. Qon organizmni zararli moddalar va yot jismlardan himoya qiladi. U tana haroratini doim bir meʼyorda saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Erkaklarda oʼrtacha $5 \frac{1}{2}$, litr, ayollarda esa $4 \frac{1}{2}$, litrgacha qon boʼladi. Qon suyuq qismi plazma – 55 % va shaklli elementlar – 45 % dan iborat.

Qon plazmasi vitaminlar, fermentlar, tuzlar va moddalar almashinuvining oxirgi mahsulotlaridan iborat. Plazmada erigan oqsillar, jigar hujayralari va retikuloendotelial sistema hosil qiladi. Plazma oqsillari transport vazifasini bajaradi, kislota-ishqor muvozanatini regulatsiyalashda ishtirok etadi.

Qonning shaklli elementlari qon yaratish organlarida ishlanadi: qon va qon yaratish organlari – qon yaratish sistemasini tashkil etadi. Qon tarkibidagi uglevodlarga glukoza va uning almashinuv mahsulotlari kiradi. Qonda 80—100 mg % gacha glukoza, shuningdek, glikogen, fruktoza va oz miqdorda glukozamin boʼladi. Uglevodlar va oqsillarning almashinuv mahsulotlari (glukoza, monosaxaridlar, kislotalar, tuzlar va suv) ichak kapillarlaridan oqayotgan qonga soʼriladi.

Glukozaning bir qismi organ va toʼqimalarga tarqaladi, boshqa qismi esa jigarda glikogenga aylanadi. Qonda lipidlar aralashmasi neytral yogʼlar, erkin yogʼ kislotalari va ularning parchalanish mahsulotlaridan, erkin va bogʼlangan xolestirindan, shuningdek, steroid gormonlaridan iborat. Neytral yogʼlar, glitserin, yogʼ kislotalari

ichak shilliq qavatidan qonga qisman so'riladi. Qon yog' emulsiyasini yog' to'qimalariga yetkazadi va u yerda zaxira holda saqlanadi. Qon tarkibida mineral moddalar (asosan, natriy va xlor) ham bor.

Qon yaratish organlari. Bu organlarda qonning shaklli elementlari shakllanadi. Qizil ko'mik, taloq va limfa tugunlari qon yaratish organlari hisoblanadi. Qizil ko'mik asosiy qon yaratuvchi organ. Qizil ko'mikning hamma to'qimasi qonning yetilgan hujayra elementlari bilan to'la bo'ladi.

Qizil ko'mikdan farq qilib, sariq ko'mikda yog' ham bo'ladi. Ko'mikda eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlar shakllanadi.

Limfa tugunlari qon yaratilishi va organizmning himoya reaksiyalarida qatnashadi, ularda, asosan, limfotsitlar rivojlanadi. Qon yaratish organlarning asosiy vazifasi qon hujayralarining yemirilishiga qaramay, ularni doimiy nisbatda saqlab turishidan iborat.

Qonning shaklli elementlari, asosan, eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlardan iborat.

Eritrotsitlar (*yunon.* qizil hujayra ma'nosini bildiradi) — qizil qon tanachalari: qonning shakli elementlari; tarkibidagi gemoglabin qonga qizil tus beradi. Eritrotsit, asosan, organizm bilan atrof-muhit o'tasidagi gazlar almashinuvini, ya'ni nafas olishni ta'minlaydi. Kislorodni o'pkadan organizmning barcha to'qimalariga yetkazib beradi. Eritrotsit boshqa funksiyalarida ham ishtirok etadi.

Odam eritrotsitining diametri 7—8 mk, qalinligi 2—2,5 mk, ikki tomon botiq, yumaloq, yadrosiz hujayralardir. Ko'mikning miyelod to'qimalarida eritrotsitlar ishlanadi. Sog'lom odamning 1 mlk qonida $4-5 \text{ mln}$ ($4 \cdot 10^{12}-5 \cdot 10^{12}/\text{l}$) eritrotsitlar bor. Erkaklar qonining 1 mlk.da $4,5-5 \text{ mln}$ ($4,5 \cdot 10^{12}-5 \cdot 10^{12}/\text{l}$), ayollar qonining 1 mlk.da $4-4,5 \text{ mln}$ ($4 \cdot 10^{12}-4,5 \cdot 10^{12}/\text{l}$) eritrotsitlar bo'ladi. Eritrotsitlar miqdori hamisha bir xil turmaydi, ba'zi fizilogik sharoitlarda, jismoniy ish vaqtida, baland joylarga chiqilganda hamda ba'zi bir kasalliklarda ular miqdori o'zgaradi. Eritrotsitlar miqdorining ortib ketishi — polisitemiya, kamayib ketishi esa eritropeniya deb ataladi.

Leykotsitlar: oq qon tanachalari — qonning yadroli va protoplazmali rangsiz hujayralari. Yadrosining shakli har xil, shunga ko'ra, tayoqcha yadroli, segment yadroli va monotsitlarga ajratiladi. Limfotsitlar ko'mik, limfa tugunlari va taloqda hosil bo'ladi. Donali leykotsitlar (granulotsitlar) va donasiz leykotsitlar (agronulotsitlar) farq qilinadi.

Leykotsitlar me'yorda 1 mlk qonda erkaklarda $4300 - 11300$ ($4,3 \cdot 10^9 - 11,3 \cdot 10^9/l$), ayollarda $3200 - 10200$ ($3,2 \cdot 10^9 - 10,2 \cdot 10^9/l$) bo'ladi.

Leykotsitlarning bo'yalish xususiyatiga qarab, ularni eozinofillar (ezoin bilan bo'yaladi) normada $0,02 - 0,3 \cdot 10^9/l$; 1 mlk qonda $20 - 30$; foiz hisobida $0,5 - 5$ bo'ladi. Bazofillar (metilen ko'ki bilan bo'yaladi) normada $0 - 0,65 \cdot 10^9/l$; 1 mlk qonda $0 - 65$, foiz hisobida $0 - 1$; neytrofillar (neytral bo'yoqlar bilan bo'yaladi) me'yorda tayoqcha yadrolisi $0,040 - 0,3 \cdot 10^9/l$ 1 mlk qonda $40 - 300$, foiz hisobida $1 - 6$.

Segment yadroli $2,0 - 5,5 \cdot 10^9/l$, 1 mlk qonda $2000 - 5500$, foiz hisobida $47 - 72$.

Limfotsitlar $1,2 - 3,0 \cdot 10^9/l$, 1 mlk qonda $1200 - 3000$, foiz hisobida $19 - 37$; monotsitlar $0,09 - 0,6 \cdot 10^9/l$ 1 mlk $90 - 600$, foiz hisobida $3 - 11$. Miyelotsitlar — 0, metamiyelotsitlar — 0.

Leykotsitlar organizmning yot jismlar kirgan joyiga yetib kelib, mikroorganizmga yaqinlashgach, soxta oyoqlar chiqarib, uni hamma tomonidan o'rabb oladi va yutib yuboradi. Yutilgan mikroorganizm yemirilib, leykotsit protoplazmasida hazm bo'lib ketadi. Ko'pincha bu jarayonda leykotsitlarning o'zi ham nobud bo'ladi. Leykotsitlar sonining ortib ketishiga leykositoz, kamayib ketishiga leykopeniya deb ataladi.

Trombotsitlar me'yorda 1 mlk qonda $180000 - 320000$ ($180 \cdot 10^9 - 320 \cdot 10^9/l$) yunonchadan «laxta hujayra» ma'nosini bildiradi. Qondagi shaklli elementlardan bo'lib, diametri $2 - 5$ mkm keladigan tanachalardir, ular qon plastinkalari deb ataladi. Ular ko'mikda ishlaniib chiqadi. Qon plastinkalari osonlik bilan yemiriladi va qonning ivishida ishtirok etadi. Qon tomir bilan qoplanganda trombotsitlar xuddi shu joyga to'planadi va o'zaro birikib, qonning xuddi shu joyiga to'planadi va o'zaro birikib, qonni quyultiradigan maxsus modda ajratadi, natijada laxta qon (tromb) hosil bo'lib, qon oqishi to'xtaydi. Qon ketganda, operatsiyadan keyin organizmning himoya reaksiyasi sifatida qonda trombotsitlar soni ortadi. Ba'zan trombotsitlarning ortishi yurak bo'shliqlarida va qon tomirlarida tromb hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin; bunday holat ko'proq venalarning varikoz kengayishi yoki ularning yallig'-lanishida kuzatiladi. Trombotsitlar soni kamayishi ham mumkin. Masalan, ayrim dorilarga nisbatan sezuvchanlik yuqori bo'lganda, ba'zi kimyoviy moddalardan zaharlanganda trombotsitlarning ko'plab yemirilishi kuzatiladi, bunda salga qon oqaveradi.

9.2. Qon tizimi kasalliklarining asosiy alomatlari va tekshirish usullari

Qon tizimi kasalliklari bilan xastalangan bemorlar darmonsizlik, lohaslik, lanjlik yoki bo'shashish, tez charchash, holsizlanish, bosh aylanishi, bosh og'rishi, qulqo shovqin eshitilishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, badanda chumoli yurgandek sezgining paydo bo'lishi, qulqo shang'illashi, ishtaha pasayishi, badan qichishi, badanning salga ko'karib ketishi, ko'p terlash, suyak va bo'g'lnlarda og'riq, yurak sohasida og'riq, ko'ngilsiz hislarning paydo bo'lishi, qayt qilish, nafas qisishi, hansirash, sarg'ayish, tilni achishib turishi, qo'l va oyoqlarning uvushib qolishi, taloq va jigarning kattalashishi hamda ularning og'rib turishi, badanda gemorragik toshmalar toshishi kuzatiladi. Bu yuqorida ko'rsatilgan alomatlar (shikoyatlar, belgililar) qon sistema kasalliklari uchun xarakterli bo'lgan turli xil ko'rinishda namoyon bo'ladi.

Qon kasalliklarining alomatlari juda xiitma-xil bo'lib, kasalliklarni tasvirlash vaqtida batafsil bilib olinadi. Qon kasalligi bilan og'rigan deb guman qilingan bemorning anamnezini aniqlab olish maqsadida o'tkir yoki surunkali qon ketish hollari bo'lgan-bo'lmaganligi hemordan surishtirib ko'riladi. Shikastlangan paytida ko'p qon ketganligi, o'pkasidan qon kelganligi, qon qusganligi, qon aralash ichi ketganligi – melena bo'lgan-bo'lmaganligi, bachedondan ko'p qon ketgan-ketmaganligi so'raladi. Oz-ozdan, takror-takror qon yo'qotish ham (bavosirda) anemiyaga olib kelishi mumkin.

Goho kasallik ba'zi bir dori moddalarni; piramidon, butadion va boshqalarni ichish, aksari uzoq muddat davomida ichib yurish natijasida paydo bo'ladi. Bemorni qanday bo'lmasin biror xildagi me'da-ichak kasalligi bilan og'rigan-og'rimaganligini, me'dasi operatsiya qilingan-qilinmaganligini ham aniqlab olish kerak, chunki bir qancha qon kasalliklari hazm sistemasi funksiyalarining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Bemorda qon kasalligi borligi ilgari aniqlangan bo'lsa, uning qanday davo olganligini surishtirib ko'rish kerak.

Ko'pgina qon kasalliklari tabiatan suyak suradigan, ya'ni irlsiy bo'ladi. Shu munosabat bilan bemorning qarindoshlarida shunga o'xshash kasalliklar bor-yo'qligini bilib olish mumkin.

Bemorni obyektiv tekshirish, odatda, unda qon kasalligi bor deb guman qilishga imkon beradigan bir qancha belgilarni ko'rsatib beradi.

Rangparlik ko'pgina qon kasalliklarida (anemiya, leykozlarda) uchraydi. Bir qancha hollarda teri mum tusiga kiradi yoki zaxil tortib turadi (xloritik bo'ladi). Eritrotsitlarning tomirlar ichida yemirilishi (gemolizga uchrashi) bilan o'tadigan kasalliklar uchun badan sarg'ayishi xarakterlidir. Odamni qon ketib turishiga moyil qilib qo'yadigan bir qancha qon kasalliklari (gemorragik diatezlar) terida har xil toshmalar toshishi – petexiyalar paydo bo'lishi (teri ichiga nuqta-nuqta bo'lib qon quyilishi) teriosi gemorra-giyalari bilan namoyon bo'ladi.

Ba'zan hemor hilagining kaft tomonidagi teri burmasiga barmoq bilan ohista bosib ko'riganidan keyingina petexiyalar paydo bo'ladi (chimchitash alomati). Teri ichiga qon quyilishiga moyillik boryo'qligini topish uchun jgut simptomni ham tekshirilib ko'rildi. Buning uchun hemorning yelkasiga tonometr manjetkasi o'ralib, simob ustini hisobi bilan aytganda minimal arteriya bosimidan 10 mm yuqori darajagacha unga dam beriladi. 10 minutdan keyin havo chiqarib yuboriladi va bilakning kaft tomoni hamda tirsak hukilishidagi petexiyalar soni sanab ko'rildi. Ko'zdan kechirilganda, til shilliq pardasining yallig'lanishi – glossit – pernitsioz anemiya (xavfli kamqonlik) bilan og'rigan hemorlarda uchraydi.

Palpatsiyada ko'pincha teri ostidagi limfa bezlari, jigar va taloqning har xil darajada kattalashib ketgani ma'lum bo'ladi. Qon kasalliklarida to'sh suyagiga barmoq bilan ohista urib ko'rish bir qancha hollarda og'riqqa sabab bo'ladi. Har xil sabablardan kelib chiqadigan anemiylar bilan og'rigan hemorlar uchun yurak urishining tezlashuvi, yurak uchining tepasida paqillaydigan I ton va sistolik shovqin, shuningdek, bo'yin tomirlarida o'ziga xos «pildiroq shovqini» bo'lishi xarakterlidir. Laboratoriya tahlilida qonning tarkibiy qismlarida patalogik o'zgarishlar bilan kechadi. Har bir kasalliklar bilan tanishganda, bu o'zgarishlarni bilib olishingiz mumkin.

9.3. Anemiya (kamqonlik)

Anemiylar uch asosiy guruhga bo'linadi.

I. Qon yo'qotishdan yuzaga keladigan anemiylar:

1. O'tkir postgemorragik anemiya.

2. Surunkali postgemorragik anemiya.

II. Qonning ortiqcha yemirilishidan vujudga keladigan anemiylar (gemolitik):

1. Eritrositopatiyalar.
 2. Fermentopatiyalar.
 3. Gemoglobinopatiyalar.
 4. Antitelolar, bevosita gemolizin va boshqa shikastlantiruvchi omillar bilan bog'liq kamqonliklar.
- III. Qon hosil bo'lishi buzilishidan paydo bo'ladigan anemiylar:
1. Temir tanqisligi anemiyasi.
 2. Temirga to'yinish anemiyasi (sideroaxrestik).
 3. B_{12} vitamini va folat kislota tanqisligidan kelib chiqadigan anemiylar.

9.4. O'tkir postgemorragik anemiya

Etiologiyasi: turli xil jarohatlar; me'da va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, me'da saratoni, o'pka sili, gemorragik diatezlar, ichaklar saratoni; bachadon saratoni yoki fibromiomasi, hayz ko'rish siklining buzilishi, bachadondan tashqaridagi homiladorlikda fallopiy nayining yorilishi, abort yoki tug'ish vaqtidagi jarohatlar, jigar sirrozi, qizilo'ngach venalari varikoz kengayganda, bavosir, buyrakdan qon ketishi.

Klinikasi. O'tkir qon ketish ko'p qon yo'qotilgan taqdirdagina kamqonlikka olib keladi. Ko'p qon yo'qotilganda bemorning umumiy ahvoli ancha og'ir bo'ladi, darmoni quriydi, nafasi qisadi, yuragi tez uradi, pulsi tezlashadi, to'liqligi kuchsiz, ba'zan aritmiya bo'ladi, arterial bosim pasayadi, bemor oqarib ketadi, ko'z skleralari och havorang tusga kiradi, lablari va boshqa shilliq pardalari qonsiz bo'lib ko'rindi, boshi aylanadi, boshi og'riydi, qulog'i shang'ilaydi, tana harorati pasayib ketadi, muzday ter chiqadi, qayt qiladi, badani och havorang tusga kiradi. O'tkir tomir yetishmovchiligi ro'y beradi, bemor hushdan ketadi (36-rasm).

Laboratoriya tahlili. Qonning umumiy kamayishi bilan birga, barcha shaklli elementlari miqdori kamayadi. Qon ketishidan so'ng dastlabki soatlarda paydo bo'lgan leykopeniya tez orada leykositoz bilan alma-



36-rasm. Shilliq pardalarning qonsiz bo'lib ko'rinishi.


shinadi. Eritrotsitlar soni kamaygan, gemoglobin miqdori anchagina pasaygan, rang ko'rsatkichi pasayib, 0,6—0,5 gacha tushadi. Qizil qon tanachalarining rangi oqish bo'lib qoladi. Ko'p qon yo'qotilganda, anizositoz va mikrositoz paydo bo'ladi.

9.5. Surunkali postgemorragik anemiya

Etiologiyasi. Sununkali postgemorragik anemiya ko'pincha mudom takror-takror qon ketib turishi natijasi (me'da va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, me'da, ichak saratonlari, bavosir, bachadondan qon ketish, o'pka sili, bronxoektaz, jigar saratoni, jigar sirrozi, turli joylarda venalarni varikoz kengayishi, polipoz, ankilostomidoz, bachadon saratoni yoki fibromiomasi)da paydo bo'ladi.

Klinikasi. Organlardan takror-takror qon ketishi natijasida, qon birdaniga kamayib ketadi, postgemorragik anemiya alomatlari ko'rindi, bemor tez charchaydi, umumiy darmonsizlik kuzatiladi, boshi aylanadi, qulingga shovqin eshitiladi, nafasi qisiladi, yuragi tez uradi.

Bemor ko'zdan kechirilganda, terisining rangi oqargan, shilliq pardalar qonsiz, pay reflekslari oshgan, qon bosimi pasaygan, yurak uchida hamda o'pka arteriyasida sistolik shovqin eshitiladi (37-rasm).



37-rasm. Bemor terisi rangining oqarganligi.

Laboratoriya tahlili: eritrotsitlar va gemoglobin miqdori pasaygan, rang ko'rsatkichi 0,5—0,6. Eritrotsitlarni degenerativ shakllari paydo bo'ladi. Mikrositoz, poykilositoz, gipoxromiya, retikulotsitlar miqdori oshgan—10—20 %. Trombotsitlar miqdori kamaygan—trombositopeniya. Oq qon tomonidan avvaliga leykositoz ko'rilib, bu keyinchalik leykopeniyaga o'tadi.

Davolash va profilaktikasi. Avvalo, qon oqishini to'xtatish choralarini ko'rish zarur, buning uchun to'g'ri tashxis qo'yib, jarrohlik usulida yordam ko'rsatiladi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, qon to'xtatuvchi vositalar (vikasol

1 % li—1 ml muskul orasiga yoki 0,015 kuniga 1 tabletkadan 2 marta ichiladi, kalsiy xlor 10 % li—10 ml tomir ichiga, adrokson 0,025 % li—1 ml muskul orasiga, aminokapronat kislota 5 % li—100 ml tomir ichiga tomchilab quyiladi), jelatinol (300 ml tomir ichiga, tomchilab), poliglukin (500 ml tomir ichiga), protein (250—300 ml tomir ichiga), reopoliglukin (400 ml tomir ichiga tomchilab) yuborilishi mumkin.

Shokka qarshi quyidagilar qilinadi: kofein — benzoat natriy 10 % li—1 ml kuniga 1 ml.dan 2 marta teri ostiga, dofamin 25 yoki 200 mg preparat, 125 yoki 400 ml 5 % li glukoza bilan qo'shib tomir ichiga tomchi usulda yuboriladi, kortizon 2,5 % li—10 ml kuniga 1—2 ml bir marta muskul orasiga yuboriladi. Takror-takror qon quyiladi, glukoza eritmasi 5 % li—400 ml tomir ichiga tomchi usulda, gemostimulin 0,06 g kuniga 3 marta ichiladi, temir karbonat, saxarat, temir askorbinat 1—2 oygacha kuniga 3—4 mahal 1—2 g.dan kukun yoki pilula holida buyuriladi.

9.6. Temir yetishmasligidan paydo bo'ladigan anemiya (temir tanqisligi anemiyasi)

Temir organizmning hayot faoliyatida muhim rol o'ynaydi: u eritrotsitlar tarkibidagi gemoglobinning tuzilishi uchun zarur, chunki gemoglobin o'pkadan to'qimalarga kislorod yetkazib beradi. Temir yetishmaganda hazm bezlari, nerv sistemasi, muskul apparating ham funksiyasi buziladi.

Etiologiyasi. Bu kasallikni kelib chiqishiga qon yo'qotish sabab bo'ladi. Oz-ozdan uzoq vaqt qon ketib turganda: havosir, me'da va o'n ikki harmoqli ichak yarasi kasalligida; hayz qoni uzoq muddat va ko'p ketadigan ayollarda; anemiya paydo bo'lishida bot-bot homilador bo'lish, uzoq vaqt bola emizish katta rol o'ynaydi. Chunki homiladorlik va emizikli davrida ona organizmidagi temir zaxirasining bir qismi bolaga o'tib ketadi; vaqtida ovqatlanmaslik, noto'g'ri ovqatlanish, o'zida temir tutadigan ovqatlarni kam iste'mol qilish; me'da shirasida kislotalarning kamayib qolganligi munosabati bilan temirni o'zlashtirish buziladi. Chunki me'da shirasida kislotalarning kamayishi me'da-ichak yo'lida so'rilib funksiyasining buzilishiga olib keladi.

Klinikasi. Katta yoshdagи odam uchun massasining har bir kilogramiga 0,001—0,002 g temir talab etiladi.

Temir tanqisligidagi anemiylar jumlasiga:

- 1) yuvenil xloroz (o'smirlar xlorizi);
- 2) kechki xloroz;
- 3) axlorgidrik (gastrogen) anemiya kiradi.

Yuvenil yoki ilk xloroz (rangparlik kasalligi) – umumiy darmonsizlik, nafasning qiyinlashib va tezlashib qolishi, ishtaha yo'qligi, bemorlar bo'r, ohak yeydigan bo'lib qolishadi. Yuz terisi zaxil tortib, teri tiniq tortib qoladi. Qonda gemoglobin pasayib ketadi.

Kechki xloroz, 35—45 yoshlardagi ayollarda uchraydi, ba'zan klimaks boshlanishi oldidan ko'rildi. Ta'm va hid bilish buzilishi, disfagiya, sochlarning to'kilib ketishi, tirnoqlarning mo'tt bo'lib qolishi ko'rildi.

Qonda rang ko'rsatkichining keskin pasayib ketishi gipoxrom anemiya, eritrotsitlarda degenerativ o'zgarishlar borligi bilan ta'riflanadi.

Axlorgidrik (gastrogen) anemiada, darmonsizlik, oyoq-qo'llarning uvushishi, chumoli yurgandek bo'lib sezilishi bezovta qiladi. Ishtaha pastligi, ko'ngil aynishi, kekirish, ba'zan qayt qilishdan noliydarlar. Ko'pincha til achishgandek bo'lib tuyuladi. Bosi og'riydi, yurak o'ynashi kuzatiladi.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya: oqsil, uglevod, yog', vitaminlarga boy ovqatlar beriladi. Ovqat tarkibida jigar, go'sht, tuxum va tarkibida temir moddasi ko'p bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilish lozim.

Tarkibida temir bor preparatlar: feramid, ferrokal, serbitol, ferropleks, ferroseron, fitoferrolaktol, ferrumlek beriladi. B_{11} , B_{12} , B , va C vitaminlari tavsiya qilinadi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, kunora qon, qon o'rnnini bosuvchi eritmalar quyiladi. Glukozani 5 % li eritmasidan 400 ml, 40 % li eritmasidan 20 ml tomir ichiga yuboriladi.

9.7. B_{12} vitamini (folat kislota) yetishmaslididan kelib chiqadigan anemiya (Addison-Birmer kasalligi)

Odatda, bu kasallik bilan 35—40 yoshdag, kamdan kam hol-larda 22—27 yoshdag odamlar xastalanadi. Xastalik birinchi marta 1855-yilda Addison va 1888-yilda Birmer tomonidan tasvirlangan.

B_{12} vitamini yoki folat kislota yetishmasligi oqibatida kelib chiqadi. Addison-Birmer kasalligi surunkali kasallik bo'lib, tobora

zo'rayib boradigan kamqonlik, me'da axiliyasi va nerv sistemasining shikastlanishi bilan xarakterlanadi.

Etiologiyasi. Me'da tubining maxsus bezlaridan gastromukoprotein ishlaniб chiqishi to'xtab qolganda, me'da shilliq pardasi atrofiyaga uchraganda, me'dada polipoz, o'sma paydo bo'lganida. Me'da jarrohlik usuli bilan qisman olib tashlanganda. Ichakda B_{12} vitaminining so'tilishi buzilganda. Homiladorlikda organizmda vitamin sarfi kuchayganida kasallik paydo bo'ladi.

Me'da tubining maxsus bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan gastromukoprotein hamda tashqaridan tushgan B_{12} vitamini bilan beqaror birikma hosil qiladi. B_1 , vitamini ichak devori orqali qonga o'tib plazma oqsili bilan birikadi. U B_{12} — protein kompleksi ko'rnishida jigarga yig'iladi, u yerda bir qancha vaqtgacha tutilib qoladi. B_{12} vitamini jigaдан qonga o'tib, ko'mikka qon yaratilishini tartibga soluvchi sifatida ta'sir etadi.

Klinikasi. Kasallik zimdan boshlanadi. Bemorlar darmonsizlik, tez charchash, bosh aylanishi, nafas qisishi, yurak urishi, yurak sohasida og'riq, tana haroratining ko'tarilishi, ovqat yeyish vaqtida tilning achishib og'rishi, ba'zan oyoqlarda shish, barmoq uchlarning uvushib qolishi va ularda chumoli yurayotgandek sezgi paydo bo'lishi, qo'l panjası, oyoq panjasining sanchib turishidan shikoyat qilishadi.

Ba'zida kekirish, ko'ngil aynishi, ich ketishi kuzatiladi. Nerv sistemasiga taalluqli o'zgarishlar — paresteziyalar (bemorlar yurganda gandiraklaydilar) sodir bo'ladi. Nerv yo'llari bo'ylab og'riq bo'ladi, chanoq organlari funksiyasining buzilishi ko'riladi.

Yurak-qon tomirlar sistemasida puls tezlashishi, yurak tovushlarining sustlashishi, uchida yurak asosida va uch tavaqali klapan sohasida sistolik shovqin eshitiladi. Til to'q qizil rangli, sugonlari bo'rtgan, kechki bosqichlarida u silliqlashgan, burmalari, sugonlari yo'qolib, go'yo yaltirab turadi (*Gunter glossiti*) (38-rasm).

Laboratoriya tahlili. Eritrotsitlar miqdori gemoglobinidan ko'ra ko'proq kamaygan, rang ko'rsatkichi birdan ortiq—1,8 ga yetadi. Qonda makro va megalo-



38-rasm. Gunter glossiti.

tsitlar, megaloblastlar va eritroblastlar bo‘lishi kasallikning muhim alomatidir. Leykopeniya – leykotsitlar miqdori kamaygan 1 mm³-da 3000–7000 gacha, neytopeniya, limfositoz kuzatiladi: eozinofillar va monotsitlar soni kamaygan. Qonda bilirubin miqdori ko‘paygan, natijada sterkobilin ko‘p bo‘ladi.

Davolash va profilaktikasi. Diyetoterapiya qo‘llanishi maqsadga muvofiqdir. Bemorga har kuni 200 g dan jigar beriladi (jigar dimlamasi), kuniga 120–140 g qaynatilgan mol yoki qo‘y go‘shti buyuriladi. Bundan tashqari, yangi mevalar, sabzavotlar iste’mol qilish tavsiya etiladi.

Shifokor ko‘rsatmasiga binoan, C, B₁₂ vitaminlari, folat kislota, kapolon, gepalon, ferramid buyuriladi. Bemorlarga kunora 200 ml qon quyiladi, qon o‘rnini bosuvchi preparatlardan tavsiya etiladi. Glukozani 5 % li eritmasidan 400 ml, 40 % li eritmasidan 20 ml tomir ichiga yuboriladi.

9.8. Gemolitik anemiya

Gemolitik anemiya eritrotsitlarning ortiqcha yemirilib turishi bilan xarakterlanadi. Fiziologik sharoitlarda eritrotsitlarning yashash davri 100–120 kunni tashkil qiladi, anemiyada 14–16 kunga qisqaradi. Organizmda autoantitelolar paydo bo‘lishi natijasida yoki xastalikdan eritrotsitlar tug‘ma nuqsoni borligi tufayli parchalanadi.

Etiologiya: turli xil yuqumli kasallikklardan keyin (sepsis, malyariya); turli xil dorilarni organizmga salbiy ta’siri (sulfanilamid preparatlari, Bertolle tuzi); yovvoyi qo‘ziqorindan zaharlanish; ilon va kuchli zaharli gazandalar chaqishi; tug‘ma kasalliklar.

Kasallik asosida kamqonlik va sariqlik yotadi. Sariqlik eritrotsitlarning yemirilishi natijasida paydo bo‘ladi (gemolitik sariqlik).

Bilirubin qondan jigar hujayralari tomonidan ushlanadi va o‘t qopchasiga, so‘ng o‘t chiqaruvchi yo‘llarga boradi. Bilirubini ko‘p bo‘lgan o‘t ichaklarga tushadi, bu yerda ichak bakteriyalari ta’sirida bilirubindan urobilinogen hosil bo‘ladi: bu esa najas va siyidki to‘q jigartingga bo‘yaydigan sterkobilinga aylanadi. Urobilinogenning talay qismi ichakdan qonga so‘riladi va darvoza venasi orqali yana jigarga keladi; qisman kupfer hujayralari tomonidan ushlab olinib, bilirubinga aylanadi, boshqa qismi esa yana umumiyl qon oqimiga tushadi va buyraklar tomonidan siyidik bilan urobilin ko‘rinishida ajratiladi.

Yemirilgan eritrotsitlar gemoglobinidan hosil bo'ladigan bilirubin qisman qonda yig'iladi, lekin u oqsil fraksiyasi bilan bog'liqligidan (bevosita bilirubin) buyraklar tomonidan ajratilmaydi. Qonda yig'ilgan bilirubin teri shilliq pardalarni sariq rangga bo'yaydi.

Eritrotsitlar, asosan, taloqda yemiriładi, taloq funksiyasi oshib ketganligidan u kattalashib ketadi.

Klinikasi. Kasallik bolalikdayoq ancha ravshan namoyon bo'ladi. Bemor darmonsizlik, mehnat qobiliyatining pasayib ketishi, o'ng va chap qovurg'alar ostida og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish, qorinda og'riq, qaltirash, tana haroratining ko'tarilishidan (39—40°C) aziyat chekadi. Taloq va jigar kattalashadi. Goh ko'payib, goh kamayib turadigan sariqlik (to'lqinsimon o'tadigan) bu kasallikka xos alomatdir. Sariqlikning ko'payishi gemolitik krizlarga bog'liq. Terida ko'rinish turadigan shilliq pardalarning sariqligini payqash mumkin.

Laboratoriya tahlili: eritrotsitlar kamayib ketadi: 1 mm³ qonda 3000000—2000000—1000000 ($3 \cdot 10^{12}$ — $2 \cdot 10^{12}$ — $1 \cdot 10^{12}$ /l), gemoglobin 30—20 % kamayadi. Rangli ko'rsatkich goh yuqori, goh past. Retikulotsitlar miqdori keskin ko'payib, 40—50 % gacha yetadi. Gemolitik anemianing xarakterli alomati mikrositozdir. Qon zardobida bilirubin miqdori ko'payadi.

Leykotsitlar soni normal yoki biroz oshgan. Sterkobilin miqdori ko'pligidan najas qora rangli, siydikda urobilin ko'p topiladi.

Davolash va profilaktikasi. Kasallikni davolashda asosiy o'rinni kortikosteroidlar egallaydi (prednizalon, gidrokortizon, deksametazon). Kortikosteroidlar berib borish bilan bir vaqtda qon yoki eritrotsitar massa quyiladi. Ayrim hollarda taloq olib tashlanadi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, og'riq qoldiruvchi, tinchlan-tiruvchi, umumiy quvvatni oshiruvchi vositalar hamda vitaminlar beriladi.

Kasallikning oldini olishda turli xil yuqumli kasallikklardan himoyalanish, qon yaratilishiga zararli ta'sir etadigan moddalardan xoli bo'lish lozim.

9.9. Gipoplastik anemiya (aplastik)

Bu anemiya ko'mik funksiyasining susayishi natijasida qon tarkibidagi eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlar sonining kamayib ketishi bilan xarakterlanadi.

Etiologiya: turli xil yuqumli kasallikkardan keyin —sepsis, angina, tuberkuloz, gripp, ba'zi bir dorilarni haddan tashqari ko'p qabul qilish (amidopirin, metiltiouratsil, miyelosan, TioTEF, levomitsetin, streptomitsin, sulfanilamidlar, novarsenol, benzol), nur radiatsiyasi, rentgen nurlari.

Klinikasi. Darmonsizlik, kamquvvat, tana haroratining ko'tarilishi, pnevmoniaga xos klinik belgilari namoyon bo'ladi, bemorlar milk va burun qonab turishidan shikoyat qilishadi. Surunkali turlarida bemor rangining keskin oqarib ketganligi, teri va shilliq pardalarda mayda nuqtasimon qon quylishlar borligi qayd etiladi. Limfa tugunlar kattalashadi.

Laboratoriya tahlili: periferik qonda normoxrom anemiya kuzatiladi, gemoglobin miqdori 20—30 g/l.gacha tushadi, leykotsitlar, retikulotsitlar miqdori keskin pasayadi. Eritrotsitlar cho'kish tezligi 30—50 mm/soatgacha oshgan bo'ladi. Trombositlar miqdori nolga tushib ketadi. Siyidik, axlat va qusuq massalariga qon aralashgan bo'ladi.

Davolash. Bemor hematologiya bo'limiga yotqizib davolanadi. Shifokor ko'rsatmasiga binoan, unga har 2—3 kunda 200—300 ml qon quyish, leykotsitar va trombotsitlar massalarini quyish amalga oshiriladi. Umumiy quvvatni oshiruvchi vositalar hamda vitaminlari beriladi. Prednizolon 15—20 kun davomida 40—60 mg.dan, neyrobolit, metandrostenolon 1—2 mg.dan 1 kg tana og'irligida berib turiladi.

Profilaktikasi. Kasallikning oldini olishda turli yuqumli kasallikkardan himoyalanish, qon yaratilishiga zararli ta'sir etadigan moddalardan xoli bo'lish, nur radiatsiyalaridan saqlanish, sitostatik moddalarni to'g'ri qabul qilish lozim.

9.10. Leykozlar

Oq qon tomonidan bo'ladigan o'zgarishlar bilan kechadigan kasallikka leykozlar deyiladi (yunoncha oq ma'nosini bildiradi). Leykoz — qon sistemasining yomon sifatlari kasalligi hisoblanadi (qon saratoni).

Turlari:

1. Miyeloz — periferik qonda ko'mik elementlarining ko'payishi.
2. Limfadenoz — periferik qonda limfoid elementlarining bo'lishligi.
3. Retikuloz — retikulo-endoteliy hujayralarining ko'p bo'lishligi.

Leykotsitlarni periferik qonda o'zgarishiga ko'ra:

1. Leykemik leykoz — 1 mm³ qonda leykotsitlar 100000—200000 gacha ko'tariladi.

2. Subleykemik leykoz — 1 mm³ qonda leykotsitlar 20000 gacha ko'tariladi.

3. Aleykemik leykoz — leykotsitlar miqdori me'yorda va kamaygan bo'lgani holda oq qon tomonidan jiddiy sifat o'zgarishlari yuz beradi.

Klinik kechishiga ko'ra:

1. *O'tkir leykoz*

- a) o'tkir miyeloz;
- b) o'tkir limfadenoz;
- d) o'tkir retikuloz.

2. *Surunkali leykoz*

- a) surunkali miyeloz;
- b) surunkali limfadenoz;
- d) surunkali retikuloz.

Etiologiyasi. Kelib chiqish sabablari aniqlanmagan, lekin har qanday kasallikning kelib chiqishida turli xil ta'sirotlar rol o'ynaydi. Shuningdek, yuqumli kasalliklar, turli xil o'smalar, turli nurlar (rentgen, radiy, uran nurlari); zaharlanish, surunkali kamqonlik, irlsiy kasalliklar, alimentar ta'sirlar, endogen omillar, tibbiy dori-darmonlar.

9.11. O'tkir leykoz

O'tkir leykozning quyidagi turlari tafovut qilinadi:


1. O'tkir miyeloz.

2. O'tkir limfadenoz.

3. O'tkir retikuloz.

Klinikasi. Kasallik to'satdan boshlanib, darmonsizlik, lohaslik, bo'shashish, kamquvvatlik, badanning qaqshab og'rishi, tana haro-ratining ko'tarilishi, organlardan qon ketishi (burun, bachadon, me'da, ichaklardan), badanga gemorragik toshmalar toshishi, og'izdan badbo'y hid kelishi kabi belgilar kuzatiladi. Taloq va jigar kattalashadi, despeptik hodisalar kuzatiladi, ba'zan qon aralash ich ketadi.

Suyaklar barmoq uchi bilan urib ko'rildi, og'riq paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bosh og'rishi, bosh aylanishi hamda ko'ruv va



39-rasm. O'tkir leykozda periferik qonning ko'rinishi.

eshituvning yomonlashishi kuza tiladi. Yurak-qon tomir sistemasi o'zgarishlar: puls sust, tez-tez uradi, yurak chegaralari o'zgargan, sistolik shovqin eshitiladi. Limfa tugunlari kattalashgan — limfoadenopatiya, ular zich kon sistensiyali hamda og'riqsiz bo' ladi.

Laboratoriya tahlili. Siydkda oqsil, silindrlar va ko'p miqdorda urat kislota topiladi. Qonda leykotsitlar miqdori ko'tarilgan, leykemik turi rivojlanadi. O'tkir miye lozda—meyloblastlar va neytrofil

larning yetilgan shakllari topiladi. O'rtacha o'tkir kechganda, oraliq shakllar ham uncha katta bo'limgan promiyelotsitlar, meylotsitlar, bazofil va eozinofil leykotsitlar paydo bo'ladi.

O'tkir limfadenozda katta limfotsitlar, limfoblastlar, kichik limfotsitlar topiladi. Retikulozda monotsitlar va retikulo-endotelial hujayralar ko'pligi ko'rindi. Qonda eritrotsitlarning degenerativ shakllari (anizositoz, poykilositoz) topiladi. Trombotsitlar miqdori keskin kamaygan yoki mutlaqo bo'lmaydi (39-rasm).

9.12. Surunkali leykoz

Surunkali leykozning quyidagi turlari tafovut qilinadi:

1. Surunkali miyeloz.
2. Surunkali limfadenoz.
3. Surunkali retikuloz.

Klinikasi. Bu kasallik leykozlar ichida ko'proq uchrab turadi. 25—40 yoshdagi har ikkala jinsga mansub bo'lganlar bir xil og'rishadi. Kasallik asta-sekin rivojlanadi. Bemorlarda salga charchab qolish, darmonsizlik, lohaslik va chap qovurg'alar ostida og'irlik sezgisi paydo bo'ladi. Ba'zan, go'yo soppa-sog' yurgan, hech qanday shikoyat qilmagan odamda tasodifan taloqning kattaligi ma'lum bo'ladi, keyinchalik jigar ham kattalashadi, og'riq paydo bo'ladi.

Tana harorati ko'tarilib, badan terisida papulyoz toshmalar ko'rinishida leykemik infiltratlar paydo bo'ladi, bemor ozadi.

Periferik limfa tugunlari kattalashadi. Aniq yuzaga kelgan anemiyada taxikardiya, yurak uchida va asosida sistolik shovqin eshitiladi. Ba'zan gemorragik ekssudatli plevrit, pnevmoniya, bronxit qayd qilinadi. Kasallik to'lqinsimon, vaqt-vaqtida qo'zib turishi va remissiya bilan kechadi. Ayollarda hayz qoni juda oz, ba'zan butunlay hayz ko'rishmaydi. Nerv sistemasi tomonidan aksari ruhiy qo'zg'alish, ba'zan esa aksincha, depressiya kuzatiladi. To'sh suyagi va boshqa suyaklar urib ko'rilganda og'riq seziladi.

Bir xil vaqtda kasallik asta-sekin kechadi, og'irlashish davrlari tuzalish davrlari bilan almashinadi. Boshqa hollarda bemorning umumiy ahvoli tobora yomonlashadi, leykotsitlar miqdori to'xtovsiz osha boradi, gemoglobin va eritrotsitlar miqdori kamayadi. Qon aylanish yetishmovchiligi yuz beradi. Darmonni qurituvchi ich ketadi, taloq infarktlari bo'ladi. Qon oqishining tez-tez takrorlanishi bemorni zaiflashtiradi, turli asoratlar qo'shiladi.

Laboratoriya tahlili. Surunkali miyeloz — kasallikning boshlanishida qizil qon tomonidan hech qanday o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin, keyinchalik gipoxrom anemiya rivojlanadi. Oq qonda uning leykemik, aleykemik tarkibi topiladi. Miyeloblastlar promiyelotsitlar, miyelotsitlar uchraydi. Limfotsitlar juda kam, 1—2 % trombotsitlar, eritrotsitlar, gemoglobin miqdori pasayadi. Trombotsitlarni kamaytirish tufayli gemorragik diatezlar — qon oqishi rivojlanadi. Surunkali limfadenoz, qonda donador leykotsitlar miqdori kamayadi, natijada organizmning infeksiyalarga qarshiligi pasayadi.

Surunkali retikulozda periferik qonda ko'mik punktatidagi kabi retikulo-endotelial elementlar ko'p bo'ladi. Siyidikda faqat uratlar miqdorining ko'payganligi topiladi.

Davolash va profilaktikasi. Leykoz kasalligining hamma turlarini davolashda o'rta tibbiyot xodimining roli katta. O'rta tibbiyot xodimi bemorlar bilan muloyim, shirinso'z bo'lishi kerak. Iloji boricha, bemor tashxisini oshkor etmasligi lozim. Bemor o'z tashxisini bilgan holatda ham uning sog'ayishiga bo'lgan ishonchini orttirish kerak.

Bemorni parvarish qilishda badan terisiga, og'iz bo'shlig'i holatiga alohida e'tibor berish lozim. Og'iz bo'shlig'ini nam tampon bilan artish, tez-tez chayishini tekshirib turish kerak. Yotoq yaralar paydo bo'lishining oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish kerak. Bemorning ovqatlanishi yuqori kaloriyalı bo'lishi darkor.

Bemor yotgan palatani doim ozoda saqlash, sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilish, bemor kiyim-boshlari va o'rin-ko'rpalari niqoblarini o'z vaqtida almashtirib turish lozim. Palataga begona shaxslarni qo'ymaslik, tibbiyot xodimlari palataga maxsus xalat va niqoblarda kirishi lozim.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, gormonal va sitostatik terapiya (prednizolon, antimetabolitlar, vinkristin, vinblastin, siklofosfan, saratonga qarshi antibiotiklar, rubomitsin, karminomitsin) qo'llaniladi. Shuningdek, dezintoksikatsion terapiya, immunoterapiya (interferon, reaferon), kindik qoni bilan davolash, ayrim hollarda suyak ko'migini transplantatsiya qilish amalga oshiriladi.

9.13. Gemorragik diatezlar

Qon oqishi bilan kechadigan kasallikkarga gemorragik diatezlar deyiladi. Gemorragik diatezlar patogenetik belgisiga qarab uch guruhga bo'linadi. Bular:

1. Qon ivituvchi xossalarga buzilishi bilan o'tadigan gemorragik diatezlar – gemofiliya, K-avitaminoz.
2. Tomirlar funksiyasi buzilishidan kelib chiqadigan gemorragik diatezlar.
3. Trombositopoez buzilishidan kelib chiqadigan gemorragik diatezlar – Verlgof kasalligi (trombopenik purpura).

9.14. Gemofiliya

Gemofiliya nasldan nasnga o'tadigan gemorragik diatez hisoblanadi. Xastalikda qon oqish asosida plazma omillarining yetishmasligi natijasida qon ivishi xususiyatining buzilishi yotadi.

Gemofiliya bilan faqat erkaklar kasallananadilar. Gemofiliya belgilari yoshlikdanoq paydo bo'lib, bola ulg'aygan sari kamayib boradi.

Gemofiliya alomatlari tug'ilishidan boshlab, yuzaga chiqadi. Qon bemor tishini oldirganida, lat yeganda, kindik kesilganda, biror joyi kesilganda, igna sanchilganda, bola sunnat qilinganda oqishi mumkin. Aksari bunday qon oqishini to'xtatish qiyin, ba'zan o'lim bilan tugaydi. Yirik bo'g'inlar – tizza, boldir-panja bo'g'inlariga qon quyilib, ularda kuchli o'zgarishlar sodir bo'lishi ancha xarakterlidir.

Laboratoriya tahlili. Qonning hujayra tarkibi normal. Qonda yuz beradigan birdan bir alomati ivish xususiyatining keskin pasayishidir (normada 6—9 minut o'tniga bir necha soat), bu hol shunday bemorlar plazmasida antigemofilik globulin (faktor VIII nomini olgan) yetarli emasligiga bog'liq, shu tufayli tromboplastin hosil bo'lishi buziladi, bu esa trombning juda sekin hosil bo'lishiga olib keladi.

Davolash va profilaktikasi. Gemofiliya bilan og'rigan bemor bolalarni tasodifan jarohatlanishidan ehtiyoj qilish choralar ko'riladi. Tishlari, hattoki sut tishlarini olib tashlashdan saqlash kerak. Gematolog shifokor ko'rsatmasiga binoan, sog'lom odam qon plazmasidan tayyorlangan konsentrat moddalarni qo'llash natijasida qon ketishini oldi olinmoqda. Fibrinogen, aminokapronat kislota, antigemofil globulin beriladi. Yangi plazma va qon 250—500 ml miqdorda quyiladi. Zarurat bo'lganda, har 6—8 soatda qon ketish to'xtagunicha quyiladi.

Qonayotgan yuza yoki jarohatni issiq steril suyuqlik — tuz eritmasi, novokain, suv bilan yuviladi va mahkamlab tamponlanadi (gemostatik yoki fibrinli gubka bo'lgan ma'qul). Bo'g'lnlarga qon quyilganda immobilizatsiya qilish, sovuq qilish va bosib turadigan bog'lam bog'lash kerak.

9.15. Gemorragik vaskulit

(*Shenley-Genox sindromi, gemorragik kapillarotoksikoz*)

Bu kasallik gemorragik diatezlar guruhiga kirib, tomir devori o'tkazuvchanligining oshishi bilan xarakterlanadi.

Etiologiyasida gripp, angina, qizilcha (skarlatina), yuqori nafas yo'llari katari, sil, tuberkuloz, revmatizm kabi kasalliklar katta o'ren egallaydi. Shuningdek, sovuq qotish, intoksikatsiyalar, invaziyalar, ovqatlardan zaharlanishlar, dori-darmonlardan xinin, barbituratlar, sulfanilamid preparatlar, streptomitsin va boshqa larning dozasi oshib ketishi yoki noto'g'ri iste'mol qilish ham sabab bo'lishi mumkin.

Klinikasi. Gemorragik vaskulitning to'rt klinik turi farq qilinadi:

- 1) oddiy turi;
- 2) bo'g'inli turi;
- 3) abdominal (qorin) turi;
- 4) to'lqinsimon turi.



40-rasm. Gemorragik vaskulit.

Oddiy turi. Gemorragik toshmalar teri, oyoqlar va shilliq qavatlarda paydo bo'ladi. Toshmalar turli ko'rinishga ega va katta-kichikligi bilan farq qiladi. U og'riqli bo'lib, qichishib turadi. Kvinke tipdagi shishlar bo'ladi. Bemorning tana harorati ko'tarilib, kuchli darmonsizlikdan shikoyat qiladi.

Bo'g'inli turi. Bo'g'inlarda og'riq va toshmalar toshadi, bo'g'inlarda shish kuzatiladi, harakati cheklanadi. Katta bo'g'inlarda shikastlanish bir bo'g'indan ikkinchi bo'g'lnarga klinik belgilari o'tib turadi.

Abdominal turi. Yosh va o'smirlarda uchrab turadi, qorinda og'riq paydo bo'ladi, og'riq ichak sanchig'iga o'xshab ketadi. Qonli quisish kuzatiladi, suyuq ich ketadi. Kasallikning klinik belgilari me'da yarasi hamda dizenteriyaga o'xshab ketadi.

Me'da va ichaklarning shilliq qavatlarda gemorragik toshmalar toshadi, yallig'lanadi. Bemoring umumiyligi ahvoli og'ir, teri qavatida oqimtigemorragik toshmalarni ko'rish mumkin. Til quruq karash bilan qoplangan, qorin taranglashgan, og'riqli, tana harorati 38—40°C.

To'lqinsimon turi. Qizilchaning og'ir shakli (skarlatina) angina, pnevmoniya kasalliklaridan keyin avj oladi. Juda ham og'ir shakli hisoblanadi. Hamma klinik belgilari, shu shakliga to'g'ri keladi. Toshmalarning o'rta qismida nekroz uchastkalari ko'rinadi. Chuqur yaralar paydo bo'ladi, atrofida shish bo'ladi. Bo'g'inlar shikastla-

nadi. Me'da-ichak faoliyatida kuchli o'zgarishlar ketadi. Gemorragik nefrit rivojlanadi. Surunkali nefrit, buyrak yetishmovchiligidan bemorlar nobud bo'ladi.

Laboratoriya tahlili. Qonda gipoxrom anemiya belgilari kuzatiladi. Leykositoz, leykotsitlar formulasi chapga siljigan, EChT tezlashgan. Trombotsitlar miqdori o'zgarmagan, qonning ivuvchanligi va vaqt o'zgarmagan. Jgut alomati manfiy.

Davolash. Shifokor ko'sratmasiga binoan, nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar (indometatsin, voltaren), kortikosteroidlar (prednizolon va kortizon), natriy salitsilat buyuriladi.

Buyrak shikastlanganda geparin bilan davolashga immuno-depressantlar qo'shish, ko'pgina hollarda plazmaferez usuli bilan davolashni buyurish tavsiya qilinadi.

9.16. Trombotsitopenik purpura (Verlgof kasalligi)

Bu kasallik gemorragik diatezlar guruhiga kirib, qonda trombotsitlar yetishmasligi bilan xarakterlanadi. Kasallik birinchi marta 1735-yilda Verlgof tomonidan tasvirlangan. Bu xastalik bilan erkaklarga nisbatan ayollar ko'p kasallanishadi.

Etiologiyasi noma'lum.

Klinikasi. Kasallikning asosiy belgilari teriga qon quylishi va shilliq pardalarning qonab turishidir. Bunday o'zgarishlar o'z-o'zidan yoki arang seziladigan juda arzimas shikastlar ta'sirida paydo bo'laveradi. Ko'pincha burun yoki bachadondan qon ketishi hamda ayollarda hayz ko'rishdan boshlanadi. Go'yo hech qanday asossiz ko'p qon ketadi. Keyinchalik hayz ko'rish aksari kechikadi, vaqt-bevaqt muddatlarda yuz beradi, ko'p va davomli qon ketadi.

Teri gemorragiyalari har xil kattalikda – petexiyalardan tortib, katta-katta dog'lardek bo'ladi. Ular, odatda, gavda va qo'l-oyng'larning oldingi yuzasidan joy oladi. Qontalashlarning nechog'liq eskiligiga qarab, tusi avval jigarrang-qizil bo'lsa, keyin asta-sekin har xil – ko'k, yashil, sariq tusga kiradiki, bu teriga xarakterli ko'rinish beradi. «Qoplon terisi» kasallarning taxminan uchdan bir qismida taloq kattalashgan bo'ladi.

Verlgof kasalligi ayrim hollarda qizlarda ham uchrab turadi. Inyeksiya qilingan joylarda qon quylishi paydo bo'ladi. O'tkir va surunkali turi farq qilinadi. O'tkir turi autoimmun trombositopeniya

natijasida kelib chiqadi. Surunkali turi qaytalangan va remissiya davrining almashinishi bilan ifodalanadi. Verlgof kasalligi infeksiya, jarohatlar, homiladorlik, operatsiyalar natijasida qaytalanishi mumkin.

Laboratoriya tahlili. Trombotsitlar miqdori 1 mm³-da 5000—10000 ga tushib qoladi (me'yorda 250000—350000), 1 mm³ qonda ($250 \cdot 10^9$ — $1500 \cdot 10^9/l$). Qon ketayotgan vaqtida neytrofilli leykositoz kuzatiladi, gohida leykopeniya, chimchilash (шипка) va jgut alomati musbat. Ko'p qon yo'qotilishi sababli normaxrom tipli kamqonlik paydo bo'ladi. Qon ketish uzoq davom etib va qaytalanish sababli gipoxrom temir yetishmovchiligidan kamqonlik rivojlanadi.

Davolash. Shifokor ko'rsatmasiga binoan, vitaminlardan askorbinat kislota — C va K vitaminlari buyuriladi. Qon ketishi boshlanganda, trombotsit massasi yoki qon quyish hammadan ko'ra, tezroq natija beradi. Kasallikning immun xilida glukokortikoid gormonlar, ayniqsa, prednizolon, gidrokortizon, merkaptopurin beriladi. Qon to'xtatuvchi sifatida quruq trombin va qon to'xtatuvchi to'siqlar (gemostatik yoki fibrinli gubkalar) qo'llaniladi. Qonayotgan yuza yoki jarohatni suv, steril suyuqlik bilan yuviladi va mahkamlab tamponlanadi.

Og'ir hollarda taloq olib tashlanadi, shundan keyin qonda trombotsitlar miqdori sezilarli darajada oshadi va qon oqishi ancha kamayadi.

10-bob. ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI VA MODDALAR ALMASHINUVI KASALLIKLARI


10.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar

Endokrin sistemasi ichki sekretsiya bezlarini tashkil etadi, ularning o'ziga xos xususiyati shundaki, tashqariga chiqarish yo'llari bo'lmaydi, shuning uchun ular moddalarni bevosita qon va limfaga chiqaradi. Bu moddalarni organizmning ichki muhitga ajralib chiqish jarayoni ichki yoki endogen (yunon. «*endos*» — ichki va «*krino*» ajrataman) sekretsiya nomini olgan. Endokrin sistemasi tushunchalarning rivojlanishi ichki sekretsiya bezlari va ular ajratadigan biologik aktiv moddalar — gormonlarni tadqiq qilish bilan bog'langan. Ichki sekretsiya bezlarining tuzilishi, funksiyasi va faoliyati buzilishini o'rganadigan fan endokrinologiya nomini olgan.

Endokringa gipofiz bilan uzviy bog'langan markaziy nerv sistemasining bir qismi hisoblanmish gipotalamus (do'mboq osti); gipofiz; g'urrasimon bez (epifiz), qalqonsimon bez, qalqonsimon bezoldi bezlari, me'daosti bezining orolcha (inkretor) qismi, buyrakusti bezlari, me'da va ichak devorida joylashgan. Endokrin hujayralar, tuxumdon va moyak kiradi. Endokrin sistemani tashkil etuvchi ichki sekretsiya bezlarining shakli va katta-kichikligi turlicha bo'lib, tananing har xil qismlaridan joy olgan, gormonlar ajratish ular uchun umumiyydir. Xuddi shuning o'zi ichki sekretsiya bezlariga yagona sistema deb qarash imkonini beradi (41-rasm).

Gormonlar yuqori biologik faol moddalar bo'lib, milligrammning mingdan bir ulushidan oshmaydigan juda kichik konsentratsiyasi ham ta'sir etadi, shu bilan birga, ularning ta'sir ko'rsatish, o'sish va jismoniy rivojlanish, moddalar almashinuvi, jinsiy rivojlanish, shu jumladan, ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishi kabi jarayonlarni belgilab beradi.

Qalqonsimon bez — ichki sekretsianing birmuncha katta bezi bo'lib, u bo'yin sohasida, kekirdakning old tomonida hiqildoqdan biroz pastda joylashgan. Qalqonsimon bez toq organ bo'lib, bo'yincha bilan birikkan ikki palladan iborat.



**41-rasm. Endokrin organlarning joylashishi
(sxematik tasviri):**

- 1—bos miyadagi do'mboqosti sohasi (gipotalamus); 2—miyaning pastki ortig'i (gipofiz); 3—qalqonsimon bez;
- 4—ayrisimon bez; 5—me'daosti bezining orolsimon apparati; 6—urug'don;
- 7—moyak; 8—buyrakusti bezlari;
- 9—qalqonsimon bezoldi bezlari;
- 10—g'uddasimon bez (epifiz).

Katta yoshdagagi kishilarda qalqonsimon bezning vazni 30—40 g. Tuprog'i, suv va oziq-ovqat mahsulotlarida yod yetishmaydigan tumanlarda qalqonsimon bezning vazni birmuncha katta bo'lishi mumkin. Yosh ulg'aygan sari, bezning kichiklashishi kuzatiladi.

Qalqonsimon bezda ikkita gormon — tiroksin va triyodtironin ishlab chiqariladi, bular bevosita qonga ajratiladi. Bu gormonlarning hosil bo'lishi uchun tirozin amino-kislotasi va yod zarur bo'ladi. Qalqonsimon bez tiroksin va triyodtironindan tashqari, kalsitonin ham ishlab chiqaradi. Kalsitonin organizmda kalsiy almashinuvini boshqaradi. Qalqonsimon bez gormonlari organizmgaga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Bu gormonlar to'qima va organlarning yetilishini idora etib, ularning funksional aktivligi o'sish va moddalar almashinuvini belgilab beradi.

Qalqonsimon bez gormonlarining yetishmasligi, bo'lmasligi, shuningdek, ortiqcha bo'lishi organizmn turli kasalliklarga olib keladi. Qalqonsimon bez funksiyasi kamchiligidagi (tashqi muhitda yod yetishmasligi) gipotireoz deh ataluvchi kasallik paydo bo'ladi, ayni vaqtida, barcha moddalar almashinuvini jarayonlarining sekinlashuvi kuzatiladi, shu munosabat bilan ko'pincha organ va to'qimalarda buzilishlar ro'y beradi.

Qalqonsimon bezning orqa tomonidan kattaligi 10—15 mm keladigan no'xatga o'xshash tanachalar bor. Bular qalqonsimon bezoldi bezlari yoki paratireoid bezlardir. Ular soni 2 dan 12 gacha bo'lishi mumkin, ko'proq 4 ta bo'ladi. Qalqonsimon bezoldi bezlari organizmda kalsiy va fosfor almashinuvini rostlab turadigan paragormon — paratireoid gormon ishlab chiqaradi. Bu bezlar o'smadan zararlanganda giperparatireoz kasalligi paydo bo'ladi.

Buyrakusti bezlari ichki sekretsiya bezlari orasida alohida o'rin tutadi. Ular gormonlarining ortiqcha ajralishi ba'zan gipofiz funksiyasining kuchayishi bilan bog'langan. Isenko-Kushing kasalligining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Buyrakusti bezlarining po'stloq qismida yetarli miqdorda gormon ishlab chiqarilmaganida, Addison kasalligi ro'y beradi.

Gipotalamus va gipofiz endokrin sistemasi alohida o'rin tutadi, bular ichki sekretsiyaning boshqa bezlari faoliyatini ishga tushiruvchi bezlar hisoblanadi. Gipotalamusning kimyoviy tuzilishi sodda bo'lib, gipofizga ta'sir ko'rsatadi va uni turli xil murakkab gormonlar ajratishga majbur qiladi.

Gipofiz – ichki sekretsiyaning markaziy bezidir, u kalla suyagi asosidagi turk egaridan joy olgan bo'lib, gipofizar oyoqcha deb atalgan maxsus tuzilma orqali bosh miya bilan birikkan. Gipofizining oldingi, o'rta va orqa bo'lagi bor. Oldingi bo'lak butun bezning 70 % ini tashkil etadi. Oldingi bo'lak yetti xil gormon ajratadi, bular orasida organizmni o'stiradigan gormon bor, u to'qimalarda yuz beradigan biokimyoviy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Gipofiz gormonlari jumlasiga buyrakusti bezlari po'stlog'inining faoliyati stimullovchi adrenokortikotrop, qalqonsimon bez faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi tireotrop, jinsiy bezlarga ta'sir qiluvchi gonotrop, sut bezlari funksiyasini stimullovchi prolaktin gormonlar ishlab chiqariladi. O'rta bo'lak to'qimalarda melanin pigmentining hosil bo'lishi va taqsimlanishi, ko'zning to'r pardasida esa ko'rur purpurini tartibga solib turadigan gormon ishlab chiqaradi.

Orqa bo'lak ancha kichik va miya gipofizar oyoqchasingin go'yo davomi hisoblanadi. Unda bezsimon to'qima bo'lmaydi va tuzilishiga ko'ra, nerv to'qimasiga o'xshab ketadi. Shu sababli, u neyrogipofiz deb ataladi. Gipofizning orqa bo'lagida gormonlar ajratilmaydi, u gormonlarning o'ziga xos yig'iladigan joyidir, bu yerda vazopressin va oksitotsin gormonlari to'planib boradi, bular gipotalamus yadrolarida hosil bo'lib, u yerdan gipofizning orqa bo'lagiga tushadi.

Gipofiz gormonlari sekretsiyasi buzilishi organizmda turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi, ularning xarakteri gipofizning zararlanganlik darajasi va turiga hamda shu bilan bog'langan gormonlarning ortiqcha yoki kam ajralishiga bog'liq.

Gipofiz gormonlari sekretsiyasining ko'pincha bir yo'la bir nechtasi kam hollarda bitta yoki ikkita buzilishi mumkin. O'sish gormonining ortiqcha ajralishi o'sish jarayonining kuchayishi bilan kechadigan ikki kasallikning rivojlanishiga olib keladi. O'sish

gormoni yoshlik paytida ko'proq ajralsa, bo'y proporsional o'sadi, bunday hollarda gigantizm (darozlik) vujudga keladi.

O'sish gormoni 20—25 dan yuqori yoshda ortiqcha ajralsa, akromegaliya deb ataluvchi boshqa kasallik paydo bo'ladi. O'sish gormonining yetarli ajralmasligi bilan bog'langan va o'sishning keskin darajada to'xtab qolishida gipofizar pakanalik yoki gipofizar nanzim kasalligi kelib chiqadi.

10.2. Endokrin sistemasi kasalliklarining asosiy alomatlari va tekshirish usullari

Endokrin sistemasi kasalliklari umumiy kasallik hisoblanadi. U, nafaqat, ichki sekretsiya bezlarida, balki asab sistemasi funksiyasining buzilishiga, yurak-qon tomirlar sistemasining buzilishiga, harakat organlariga, siyidik-tanosil sistemasiga hamda hazm organlari sistemasiga ta'sir etadi va turli xil klinik belgilarni namoyon qiladi.

Bemor vaqt-bevaqt yurak urishi, yurak sohasida og'riq, ba'zida ko'ngilsiz hislarning paydo bo'lishi, ish qilganda nafas qisishi, terlash, serzardalik, oriqlab ketish, xotin-qizlarda hayz ko'rish siklining buzilishi, issiqlab ketish sezgisi, yaxshi uxbay olmaslik, qon bosimining ko'tarilishi, gohida esa pasayishi, qaltirash, ayniqsa, cho'zib turilgan qo'l barmoqlarining hamda bosh, ayrim mushak guruuhlarining qaltirashi, qanoatsiz, shoshma-shosharlik, gohida tana haroratining ko'tarilishi, ich ketishi, me'da sekretsiyasining oshishi, terida sariqlik. Bemorlarda bosh og'rishi, tez charchash, terining qurib qolishi, belda, orqada og'riq paydo bo'lishi, vaznning ortib borishi kuzatiladi.

Bemorni har tomonlama tekshirganda: teri, odatda, qizg'ish, nam, yupqa va elastik bo'ladi (tireotoksikoz), yuzi niqobsimon, rangsiz, xuddi qotib qolgandek ko'zning atrofi kerikkan, terisi quruq, po'st tashlagan, shish, shilliq parda qalinlashganligi miksedema kasalligida ko'rindi.

Buqoq kasalligida qalqonsimon bezning kattalashishi, ko'zni chaqchayishi xarakterli alomatlardan biridir. Endokrin sistemasi kasalliklari bir qancha alomatlari yordamida aniqlanadi.

Masalan, Bazedov kasalligida Grefe alomati tipik hisoblanadi, bunda ko'z soqqasi yuqoridan pastka harakatlanganda ustki qovoq orqada qoladi, natijada, qovoq va rangdor parda orasida skleraning oq yo'li ko'riniq turadi. Mebius alomati — o'z konvergensiyasi yetishmasligi, ya'ni bemorning ko'zi oldiga biror narsani yaqinlashtirganda ko'zlar bir nuqtaga uzoq qarab tura olmaydi, bir yoki har ikki ko'z g'ayriixtiyoriy ravishda bir tomonga og'ib ketadi.

10.3. Ichki sekretsiya bezlari kasalliklarida laborator tekshirish usullarining ahamiyati

Qalqonsimon bez kasalliklarida laboratoriya tekshirish usullari katta ahamiyatga ega. Laboratoriya tekshirish usullaridan asosiy almashinuvni, oqsil bilan birikkan yodni, ^{131}J ning qalqonsimon bezga yutilishini aniqlash usullari, skanerlash qo'llaniladi.

Asosiy almashinuv odamning tinch holatda turgan mahalida sarflaydigan energiyasini xarakterlab beradi. Uni tekshirish 10 minut davomida nahorga yutiladigan kislorod va ajratib chiqariladigan karbonat angidrid gazini aniqlashga asoslangan. Buning uchun maxsus apparat qo'llaniladi. Asosiy almashinuv standartga nisbatan % hisobida ifodalanadi. Sog'lom odamda u — 10 dan +10 % gacha boradi. Diffuz toksik buqoqda asosiy almashinuv ikki barobar kuchayib ketadi, miksedemada esa u aksincha, susaygan bo'ladi.

Oqsil bilan birikkan yod radioaktiv yod yordamida aniqlanadi. Tiretotoksikozda bu yod ancha ko'payadi, miksedemada kamayadi.

^{131}J ning qalqonsimon bezga yutilishi shu organning yodni ushlab olish xususiyatiga asoslangan. Qalqonsimon bezning funksional faolligi nechog'liq yuqori bo'lsa, u shuncha ko'p miqdor yodni yutadi. Bemorga 2—3 mkKi ^{131}J beriladi, keyin esa qalqonsimon bezning qancha radioaktiv yod yutgani oradan 2 va 24 soat o'tkazib turib, yur hisoblagichlari yordamida aniqlanadi. Yodning yutilishi yuborilgan miqdoriga nisbatan % lar hisobida belgilanadi. Sog'lom odamda ^{131}J yutilishi 2 soatdan keyin 8—14 % ni, 24 soatdan keyin 24—36 % ni tashkil etadi. Toksik buqoqda ^{131}J ning yutilishi 1 sutkadan keyin 80—90 % ga yetadi, miksidemada esa 10 % gacha tushib qoladi.

Qalqonsimon bezni skanerlash uning kattaligi bilan shaklini aniqlashga, shuningdek, funksiyasini o'rganishga imkon beradi. Bemorga 20—30 mkKi ^{131}J ichiriladi. Oradan 1 sutka o'tib, radioaktiv yod qalqonsimon bezga hammadan ko'p yutilgandan keyin, uning bezda qancha to'plangani skaner yordamida aniqlanadi. Tekshirish natijalari xar xil zichlikdagi shtrix ko'rinishida qog'ozga tushib boradi. Shtrixlarninig zich bo'lishi qalqonsimon bez funksiyasining kuchayganini, siyrak bo'lishi pasayib qolganini ko'rsatadi. Shu usulning o'zi bilan faol tugunlar («qaynoq» o'choq) bilan passiv tugunlar («sovuq» o'choq)ni topsa bo'ladi.


10.4. Qalqonsimon bez kasalliklari

10.4.1. Endemik buqoq

Endemik buqoq deganda, asosiy alomati qalqonsimon bezning kattalashishidan iborat bo‘lgan butun organizmning kasalligi tushuniladi.

Etiologiyasi: odam organizmiga tashqi muhitdan yodning yetarlicha tushmasligi sababli, endemik buqoq paydo bo‘ladi. Kasallik yod miqdorining kamayib ketishiga bog‘liq bo‘lib, ovqat mahsulotlari va ichimlik suvning yodga kam to‘yinshidan kelib chiqadi. Endemik buqoq, nafaqat, oziq-ovqat mahsulotlarida yod, balki boshqa elementlar: mis, marganes, qo‘rg‘oshin, rux, kobalt, brom va boshqalar miqdorining yetishmasligidan ham paydo bo‘ladi. Bu kasallik tog‘li tumanlar aholisi orasida ko‘p uchraydi. Bemorlarning aksariyat qismini ayollar tashkil qiladi.

Klinikasi. Kasallikning asosiy belgisi qalqonsimon bezning kattalashivi hisoblanadi. Bemor vaqt-bevaqt yurak urishi, ish qilganda nafas qisishi, biroz terlash, serzardalik, oriqlab ketishdan, xotin-qizlar hayz ko‘rish siklining buzilishidan shikoyat qilishadi. Endemik buqog‘i bor qizlarda jinsiy jihatdan yetilish kechikadi. Buqoq juda kattalashib ketsa ba‘zan traxeya, qizilo‘ngach, halqum nervining bosilib qolishiga xos alomatlar paydo bo‘ladi. Bunday hollarda bemorlarning nafas olishi o‘zgarib, ularda quruq yo‘tal paydo bo‘ladi, ovoz bo‘g‘ilib qoladi, yutish qiyinlashadi (42-rasm).



42-rasm. Endemik buqoq.

Yurak-qon tomirlar sistemasi tomonidan: puls labilligi, yurak chap chegarasining kengayganligi, yurak tovushlarining kuchayishi va funksional sistolik shovqin kuzatiladi, maksimal arterial bosim, odatda, normal yoki biroz ko'tarilgan, minimal bosim esa o'rtacha pasaygan, ko'z alomatlari bo'lmaydi. Ko'pincha qo'llar oldinga cho'zib turilganda barmoq uchlarining sal titrashi ko'rindi. Asosiy almashinuv, odatda, biroz oshgan.

Laboratoriya tahlili. Qonda ko'pincha leykopeniya, o'rtacha limfositoz va eritrotsitlar cho'kish reaksiyasining tezlashgani ko'rildi.

Davolash va profilaktikasi. Bolalarga haftada kichik dozada yod berilib, yod profilaktikasi o'tkaziladi. 4 yoshdan 10 yoshgacha — 25 mg/sut, 10 yoshdan 17 yoshgacha—50 mkg/sut; homilador ayollarga 50—75 mkg/sut miqdorda kaliy yodid tavsiya etiladi. Uzoq ta'sir qiladigan yodomarin 200 ham qo'llaniladi.

Shifokor ko'rsatmasiga binoan, tireoidin 0,05—0,2 g.dan ichiladi, kuniga 1 marta. Tireokomb kattalarga kuniga 1 mahal 1 tabletkadan beriladi. Tireotom 0,05 mg kuniga 1—3 tabletkadan beriladi. Triyodtironin gidroxlorid bir kecha-kunduzda 5—20 mkg.dan ichiladi, zarurat tug'ilganda dozasini asta-sekin oshirib borib, kuniga 60—100 mkg.gacha yetkaziladi.

Tugunli va aralash buqoq kasalliklarida jarrohlik yo'li bilan davolash tavsiya etiladi.

Yod qo'shilgan tuz qo'llanish yo'li bilan ommaviy profilaktika o'tkazish katta ahamiyatga ega. Endemik buqoq bilan kasallanish kuzatiladigan tumanlarda yashovchi aholi yod qo'shilgan tuz bilan ta'minlanadi (1 tonna osh tuziga 25 g kaliy yod qo'shiladi, shunday tuzning 10—15 g bilan organizmga yod, ya'ni sutkali yod ehtiyojining yarmi kiritiladi). Aholining sanitariya-gigiyena turmush sharoitlarini yaxshilashdan iborat. Suv manbalarini yaxshilash, ularning sanitariya muhofazasi, aholini yangi meva va sabzavotlar bilan ta'minlash muhim profilaktik ahamiyat kasb etadi.


10.4.2. Bazedov kasalligi.

Tireotoksikoz

Xastalik birinchi bo'lib, 1840-yili nemis shifokori Bazedov tomonidan tasvirlab berilgan. Kasallik asosida tiroksin gormonini ko'p miqdorda ishlab chiqish oqibatida qalqonsimon bezning kattalashib ketishi hamda uni giperfunksiyasi yotadi. Bu kasallik



43-rasm. Qalqonsimon bezning kattalashib ketishi (buqoq).



44-rasm. Tireotoksikoz — ko'zning chaqchayishi.

alomatlar ko'rildi. Qorin og'rib turadi, qayt qiladi, ich ketadi, og'ir hollarda jigar kattalashadi, og'riqli bo'ladi, badan sarg'ayadi, tana harorati subfebril ($37-37,5^{\circ}\text{C}$).

Yurak tez uradi (taxikardiya), puls tezlashib, minutiga 120—140 martagacha. Taxikardiya tinchlikda ham yo'qolmasdan, doimiy bo'lishi bilan ajralib turadi. Yurak chapga kengaygan, yurak tonlari zo'raygan bo'ladi. Arterial bosim ko'tariladi. Ko'pincha miokardiodistrofiya boshlanadi, bu — yurak yetishmovchiligi va titroq aritmiya paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Alomatlari:

1) Grefe alomati — tipik hisoblanadi, bunda ko'z soqqasi yuqorida pastga harakatlanganda ustki qovoq orqada qoladi, natijada, qovoq va rangdor parda orasida skleraning oq yo'li ko'rinish turadi;

bilan 20—40 yoshdagi kishilar kasallanadi. Ayollar erkaklarga nisbatan bir necha baravar ko'proq kasallananadilar. Ichki sekretsiya bezlari kasallari ichida eng ko'p taralgan kasallik hisoblanadi.

Etiologiyasida asab va ruhiy jarohatlar, markaziy nerv sistemasini shikastlanishi (travmasi), ensefalit, gripp, angina, bezgak, saramas (roja), qizilcha (skarlatina), qorintifi kasalliklari, jinsiy bezlar va gipofiz bezini jarohati, yallig'lanishi, quyosh nurining uzoq ta'sir etib turishi katta ahamiyatga ega.

Klinikasi. Nemis shifokori Bazedov kasallikka xos uch xarakterli alomatlarni (uchlik—triada alomati) belgilagan. Bular:

1. Qalqonsimon bezning kattalashib ketishi (buqoq) (43-rasm).
2. Ko'zni chaqchayib turishi (44-rasm).
3. Yurakning tez urishi.

Bundan tashqari, bemorlarda serjahllik, besaranjomlik, yomon uqlash, darmonsizlik, mehnat qobiliyatining buzilishi, ko'p terlash, badanning qizib ketgandek sezgisining paydo bo'lishi, muskullarning quvvatsizligi va titrashi, ozib ketish, qo'l barmoqlari rostlanganda tez-tez titrab turishi hamda butun gavdaga yoyilishi kabi alomatlар ko'rildi. Qorin og'rib turadi, qayt qiladi, ich ketadi, og'ir hollarda jigar kattalashadi, og'riqli bo'ladi, badan sarg'ayadi, tana harorati subfebril ($37-37,5^{\circ}\text{C}$).

2) Mebius alomati – ko'z konvergensiysi yetishmasligi, ya'ni bemorning ko'zi oldiga biror narsa yaqinlashtirilganda ko'zlar bir nuqtaga uzoq qarab tura olmaydi. Bir yoki ikkala ko'z g'ayriixtiyoriy ravishda bir tomonga og'ib ketadi;

3) Delrimpl alomati – ko'zlarni odatdagidan ko'ra, kattaroq ochilib turishi va qovoqlarning me'yordagidan ko'ra, kamroq ochilib-yumilishi.

Ko'zda bo'ladigan bu o'zgarishlarning hammasi tegishli ko'z muskullarini innervatsiya qiladigan simpotik nervlar funksiyasi oshishiga bog'liq. Buqoq konsistensiyasi turlicha: bez (struma) yumshoq, uning ustida pulsatsiya qiladigan shovqinlarni eshitsa bo'ladi. Ayrim hollarda uning faqat bir bo'lagi kattalashadi, ba'zida esa qalqonsimon bez ko'krak orqasida joylashadi va rentgenologik tekshirish yo'li bilan aniqlanadi.

Laboratoriya tahili. Qonda eritrotsitlar, leykotsitlar, neytrofillar soni kamayib, gemoglobin pasayadi. Giperglykemiyaga moyillik paydo bo'ladi, qon zardobidagi xolesterin miqdori ko'pincha past bo'lib chiqadi, qonning ivish xususiyati susayadi, qon yopish-qoqligi kamayib qoladi.

Davolash. Bazedov kasalligiga uchragan bemorlar konservativ va jarrohlik yo'li bilan davolanadilar, konservativ davo dastlab osoyishta rejim yaratishdan, ko'p va sifatli taomlardan iborat. Bemor mehnat qilish, dam olish va uslash rejimiga qat'iy rioya qilishi zarur.

Dori-darmonlardan endokrinolog ko'rsatmasiga binoan, quyidagilar ishlataladi: merkazolil, diyodtirozin, Lyugol eritmasi. So'nggi vaqtarda bu kasallikka radioaktiv yod yuborish yo'li bilan davo qilinmoqda. Qalqonsimon bez yodni yig'ib oladigan bo'lgani uchun yoddan sochiladigan nur faqat shu bez to'qimasiga ta'sir ko'rsatib, uning hujayralarini yemiradi. Kasallikning og'ir shakllariga operatsiya yo'li bilan davo qilinib, bezning bir qismi olib tashlanadi.

10.4.3. Miksedema

Miksedema «shilimshiq shish» demakdir. Kasallik asosida qalqonsimon bez funksiyasining yetishmovchiligi yotadi, ya'ni tiroksin gormonining yetishmasligi natijasida kasallik paydo bo'ladi. 1873-yilda bu kasallik to'g'risida birinchi marta Gallo tasvirlab bergen. Kasallik 30—60 yoshlardagi kishilarda uchraydi. Ayollar erkaklarga

nisbatan 4 baravar ko'p kasallanadi. Bu kasallik ko'pincha yoshi o'tgan ayollarni klimaks davriga to'g'ri kelmoqda.

Etiologiyasi. Bezni travmadan shikastlanishi; qalqonsimon bez atrofiysi; bezni butunlay olib tashlash; qalqonsimon bezning uzoq muddatli giperfunksiyasi; bezning ba'zan ateroskleroz bilan aloqador bo'lgan kasallik involutsiyasi; bezning tug'ma kamchiligi va gipofunksiyasi; endemik buqoq; ayrim kasalliklar: zaxm, revmatizm, tif, sifilis kasalligidan keyin; qalqonsimon bez har xil nurlardan: rentgen, radioaktiv yod ta'siridan keyin kelib chiqadi.

Klinikasi. Bemorlarda darmonsizlik, uyuqchanlik, tez char-chash, bosh og'rishi, qulqoqqa shovqin eshitilishi, badanda chumoli yurgandek sezgining paydo bo'lishi, belda, bo'g'inda, orqada og'riq, vaznning ortib borishi, parishonxotirlik, nutqning buzilishi, sovqotish, ichning qotishi kuzatiladi.

Bundan tashqari, yuzlari shishgan, shish badan va oyoq-qo'llarda ham paydo bo'ladi. Yuz shishishi natijasida u quruqlashadi, ko'zlar yumilib, lablar qalinlashib ketadi, yuzi niqobsimon rangsiz, xuddi qotib qolgandek bo'ladi, ko'zning atrofi kerikkan, bo'yin sohasi, ensa chuqurchalari shishgan (45-rasm). Terisi quruq po'st tashlab turadi, tez infeksiyalanadi, o'ziga xos shishganligiga ko'ra, uni burma qilib yig'ish qiyin.

Odatdagi shishlardan farqli ravishda bosganda, chuqurcha hosil qilmaydi. Boshdagи sochlар o'zining yaltiroqligini yo'qotadi, tushib ketadi, qoshlarning tashqi bo'limlari to'kilib ketishi xarakterli,



45-rasm. Miksedema.

tirnoqlar mo'rt bo'lib qoladi. Shilliq parda qalintashadi, natijada, qulqoq og'irlashadi tovush bo'g'iladi, ta'm bilish sezgisi yo'qoladi.

Nafas olish minutiga 8—12 gacha kamayib, puls minutiga 50—60 zarbgacha sekinlashadi (bradikardiya), tana harorati pasayadi.

Laboratoriya tahlili. Asosiy modda almashinushi past — 40 % ga kamaygan. Qonda xolestirin miqdori oshgan — 300 mg % undan ortiq, eritrotsitlar miqdori pasaygan, gemoglobin miqdori 85 g, EChT tezlashgan, 65 mm/soat, gipoxrom anemiya kuzatiladi. Siyidkdan oqsil ajraladi.

Elektrokardiografiya (EKG)da gramma voltaji past, *P* va *T* tishchaları sust ko'rindi. Og'ir hollarda miokardda distrofik o'zgarishlar va keskin koronaroskleroz topiladi, bu — yurakning ikkala qorinchasi bo'shilig'ining kengayishiga sabab bo'ladi.

Davolash. Kasallikni davolash tireoidin yoki triotiranin bilan o'tkaziladigan o'rribbosar terapiya buyuriladi.

Kaloriyaliligi jihatidan ham, oqsil yog', uglevod va vitaminlar saqlashi jihatidan ham sifatli ovqatlar berish kerak. Semirishga moyillik bo'lsa, sutkalik ovqatdag'i yog' va uglevodlar miqdori kamaytiriladi.

10.5. Qandsiz diabet

Gipofiz orqa bo'lagi yoki unga keluvchi nerv yo'llarining shikastlanishi qandsiz diabetni keltirib chiqaruvchi gormonal yetishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallik infeksiya, gripp va boshqalarning asorati tariqasida ham paydo bo'lishi mumkin.

Klinikasi. Ko'p siyish, tashna bo'lish va buyrak funksiyasining izdan chiqishidan iborat endokrin kasallik. Qandsiz diabetda qonda vazopressin gormonining miqdori kamayib ketadi, bu esa organizmdan suyuqlikning ortiqcha ajralishiga to'sqinlik qiladi. Bu buzilishlarga vazopressin gormonini ishlab chiqaradigan gipotalomus va gipofizga illat yetishi sabab bo'ladi. Bemorlar juda ko'p suv ichib, bir sutkada 4 litrdan 12 litrgacha, ko'p miqdorda siyidik ajratishadi. Qandsiz diabetda siyidikda qand bo'lmaydi va siyidikning solishtirma og'irligi past bo'ladi. Organizm suvsizlangandan teri va shilliq pardalar qurishadi, bemorlar ozib ketadi, darmoni quriydi, boshi aylanadi va og'riydi, ko'ngli ayniydi, ba'zan qusadi. Kasallik uzoq davom etadi.

Laboratoriya tahlili. Organizmning suvsizlanishi tufayli siy-dikning solishtirma og'irligi pasayib ketadi. Qonda eritrotsitlar, gemoglobin va oqsil miqdori ko'payadi.

Davolash. Keltirib chiqaruvchi kasalliklarni davolash va ularning oldini olish lozim. Ayniqsa, yuqumli kasallik bo'lgan sifilis, sil, virusli ensefalit, gripp va boshqa kasalliklarni to'g'ri davolash kerak bo'ladi.

Hayvonlar gipofizining orqa bo'lagidan olinadigan antidiuretik garmonini buyurish patogenetik davo bo'lib hisoblanadi.

10.6. Moddalar almashinuvi kasalliklari

Moddalar almashinuvi – organizmga tashqaridan kira-digan moddalarning kimoviy jihatdan o'zgarishi yig'indisi. Bu moddalarning hujayralarda o'zgarishi organizmning barcha funksiyalari amalga oshishi uchun zarur bo'lgan energiya hosil bo'lishiga olib keladi. Moddalar almashinuvi jarayoni organizmga tashqaridan kirgan turli-tuman organik va anorganik birikmalarning parchalanishi (hazm bo'lishi), o'zgarishi va buning oqibatida hosil bo'lgan mahsulotlarning tashqariga chiqarilishidan iborat.

Moddalar almashinuvi bir-biriga qarama-qarshi, lekin o'zaro bog'langan ikki xil fermentativ jarayonlar, ya'ni assimilatsiya va dissimilatsiya yig'indisidan tashkil topgan. Assimilatsiya va anabolizm jarayoni energiyaning yutilishi bilan bog'liq bo'lib, organizmga tashqi muhitdan kira-digan moddalarning hujayralar tomonidan o'zlashtirilishiga va ularning qayta ishlanishiga olib keladi. Dissimilatsiya yoki katabolizmda hujayraga tashqaridan kirgan yoki organizm hujayralari tarkibidagi moddalarning parchalanishi natijasida energiya hosil bo'ladi.

Oziq-ovqat va boshqa moddalarning parchalanishidan hosil bo'lgan energiya hayot faoliyatining barcha jarayonlarida, ya'ni muskullar qisqarishi nerv impulslarini o'tkazish, gavda haroratini bir me'yorda saqlab turish, sintezning xilma-xil jarayonlari, surilish va sekretsiya jarayonlari, hujayra membranasining ikki tomonlama organik hamda anorganik ionlarning fiziologik konsentratsiyasini saqlab turishi uchun sarf bo'ladi.

Oqsillar organizmda, asosan, tuzuvchi (plastik) material sifatida, uglevodlar va yog'lar esa sarflangan energiya o'rmini qoplash

uchun ishlataladi. Uglevodlar organizmda asosiy energiya manbayi hisoblanadi.

Turli oziq moddalarning organizmga kirgan paytidan, to keraksiz moddalar hosil bo'lguncha va tashqariga chiqarilguncha o'zgarish jarayonlari yig'indisi oraliq moddalar va energiya almashinuvi yoki metabolizm deb ataladi. Oraliq moddalar va energiya almashinuvi shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

1. Ovqat hazm bo'lishi – me'da-ichak yo'lida hazm fermentlari (pepsin, tripsin, ximotrepsin va boshq.) ta'sirida parchalanishi.

2. Hazm bo'lgan oziq moddalarning me'da-ichak yo'lidan qonga so'rilib, turli organ va to'qimalarga yetkazilishi.

3. Ovqat hazm qilish jarayonida hosil bo'lgan moddalarning hujayra va to'qima moddalarga aylanishi va shu organizmga xos birikmalar hosil bo'lishi (biosintez).

4. Bu birikmalarning parchalanib, oraliq va oxirgi almashinuv mahsulotlari hosil bo'lishi.

5. Organizmda oxirgi almashinuv mahsulotlarining chiqarilishi.

Organizmga ovqat bilan kirgan juda ko'p mahsulotlardan moddalar almashinuvi natijasida asosiy energetik ahamiyatga ega bo'lgan uch birikma: *A* asetilkofamenti, α -ketoglutar va oksalatsirka kislotalari hosil bo'ladi. Parchalanish jarayonining oxirgi mahsulotlari (uglekislotalar, suv, mochevina va boshq.), odatda, turli xil fermentativ jarayonlar natijasida vujudga keladi.

Moddalar almashinuvi jarayonida vitaminlar, suv va turli mineral moddalar (natriy, kaliy, kalsiy, fosfor), shuningdek, qator mikroelementlar – magniy, marganes, rux, molibden, stor, kobalt va boshqa anorganik birikmalar katta ahamiyatga ega. Bu moddalar hujayralardagi bioelektrik (nerv impulsini o'tkazish) va osmatik jarayonlarda qatnashadi, tishlar, suyaklar tarkibiga kiradi. Ular ko'pincha fermentlar va nafas pigmentlari (masalan, gemoglobin)ning ta'sir ko'rsatishi uchun zarur moddalardir.

Odam va hayvonlarda modda almashinuvini boshqarishda fermentativ reaksiyalarning nerv-gormonal boshqarilishi yetakchi rol o'ynaydi. Masalan, qonda qand miqdori ancha kamayib ketganda glikogen parchalanishi va glukoza hosil bo'lishini tezlashtiruvchi fermentativ mexanizmlarga ta'sir etadigan adrenalinning ajralishi kuchayadi. Qonda qand ortiqcha bo'lganda, insulin ishlanib chiqishi

tezlashadi, bu jigarda glikogen parchalanishini to'xtatib qo'yadi, oqibatda glukozaning qonga tushishi kamayadi.

Markaziy va vegetativ nerv sistemasi moddalar almashinuvining nerv orqali boshqarilishini ta'minlaydi. Bu jarayon bevosita (trotifik ta'sir) yoki ichki sekretsiya bezlari ajratadigan gormonlar orqali amalga oshiriladi.

Odamning har qanday kasalligi modda va energiya almashinuvining izdan chiqishi bilan kechadi, bu ayniqsa, nerv sistemasi funksiyalari va ichki sekretsiya bezlari buzilishlarida ro'yrost namoyon bo'ladi. Modda almashinuvi noto'g'ri ovqatlanganda (ovqat ortiqcha, kam bo'lganda yoki sifat jihatidan to'la qimmatli bo'l-maganda) buziladi.

Oksidlanish jarayonlari tezligining o'zgarishiga sabab bo'ladigan moddalar va energiya almashinuvidagi umumiyl buzilishning belgilari asosiy almashinuvdagagi o'zgarishlar hisoblanadi. Normada asosiy almashinuv bir kecha-kunduzda 1600—1700 kkal.ni tashkil etadi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilarda u bir kecha-kunduzda 5000 kkal.gacha yetadi.

Qalqonsimon bez funksiyasining kuchayishiga aloqador kasallarda asosiy almashinuv ortib, ushbu bez funksiyasi yetishmov-chilida paydo bo'lgan kasalliklarda, shuningdek, gipofiz, buyrakusti bezlari, jinsiy bezlar funksiyasi susayganda va umuman, och qolganda pasayib ketadi. Oqsil, yog', uglevod, minerallar va suvtuz almashinuvining buzilishi farq qilinadi. Lekin moddalar almashinuvining hamma xili bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, bu bo'linish shartlidir.

Moddalar va energiya almashinuvining izdan chiqishi turli birikmalar o'zaro ta'siri va boshqa moddalarga aylanishining o'zgarishi, metabolizm oraliq mahsulotlarning ko'proq to'planishi, ularning chala yoki haddan ortiq miqdorda ajralishi va normal organizmga yot bo'lgan moddalar hosil bo'lishiga olib keladigan turli jarayonlarning noto'g'ri borishi bilan namoyon bo'ladi. Moddalar va energiya almashinuvi huzilishiga gaz almashinuvi tekshirilib, organizmga tushgan moddalar miqdori bilan undan chiqib ketgan miqdor o'rtaсидаги nisbatga qarab, qon, siyidik va boshqalarning kimyoviy tarkibini aniqlab turib tashxis qo'yiladi. Moddalar va energiya almashinuvining buzilishini davolash, asosan, uni keltirib chiqargan sabablarini bartaraf etishdan yoki modda va energiya almashinuvining izdan chiqishi bilan birga o'tadigan asosiy kasallikka davo qilishdan iborat.

10.7. Qandli diabet

Qandli diabet me'daosti bezi gormoni – insulinning yetarlichcha ishlaniб chiqmasligiga aloqador kasallikdir, bunda organizmning glukozani toplash va yondirish xususiyati yo'qoladi. Shu tufayli, foydalanimagan qand qonda yig'ilib, giperlikemiya yuz beradi. So'ngra qand qondan siydkka tushib, glikozuriya ro'y beradi.

Sog'lom holda inson organizmida 40 TB insulin bo'lishi kerak, shundagina 400 g uglevod, 110 g yog', 105 g oqsil singdirishni ta'minlaydi. Hozirgi vaqtida har bir 100 kishidan 1—2 tasi bemor hisoblanadi.

Ko'proq 40—60 yoshdagи kishilarda uchraydi. Yosh bolalar ham kasallanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, 100 yashar qari kishilar va endi tug'ilgan chaqaloqlarda ham kasallik aniqlangan. Kasallik yosh tanlamaydi. Ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq xastalanishadi. Abu Ali Ibn Sino siydkda qand borligini hamda qandli diabet xastaligining belgilarini aytib o'tgan.

Diabet so'zi «yorib o'tish» ma'nosini anglatadi. Bu kasallikni Sels degan olim birinchi marta aniqlagan. Rus shifokori A.S. Sobolev 1901-yilda me'daosti bezi Langergans orolchalaridan ishlaniб chiqadigan moddaning qondagi qand miqdorini idora etishda juda muhim ahamiyatga ega ekanligini hamda o'sha orolchalarining yemirilishi qandli diabet paydo bo'lishiga olib kelishini ko'rsatib o'tdi. Kanadalik olimlardan Banting bilan Best 1921-yili diabetga qarshi modda – insulinni kashf etib, hayvonlarning me'daosti bezidan shu moddani ajratib olishdi.

Etiologiyasi. Me'daosti bezining yallig'lanishi (pankreatit), me'daosti bezining jarohati, asab-ruhiy buzilish (qo'rqish, uzoq muddat tashvishlanish), irsiy moyillik, jismoniy-ruhiy shikastlanish, me'daosti bezi o'smasi, me'daosti bezi aterosklerozi, zaxm, sil kasalligi, keragidan ko'p ovqat yenish, ayniqsa, uzoq vaqtgacha qandni ko'p miqdorda iste'mol qilish, ortiqcha semirish, yuqumli kasalliklardan so'ng vujudga keladi.

Yuqoridagi ta'sirotlar tufayli, organizmda insulin yetishmaga, jigar va muskullar organizmga kirgan qandni glikogenga aylantira olmaydi, to'qimalar qandni oksidlash, toplash, yondirish, singdirish va uning energiyasidan foydalinish qobiliyatini yo'qotadi, natijada, qonda qand ko'payib ketadi – giperlikemiya ro'y beradi.

Klinikasi. Odatda, qattiq tashnalik, ko'p chanqash (polidipsiya), bemorlar haddan tashqari ko'p suyuqlik ichadilar, lekin bunga ham qoniqmay, og'izlari qurib turadi. Ko'p miqdorda siyidik ajratishadi, sutkasiga 10–15 litr (poliuriya), yeb to'ymaslikka olib keladigan doimiy ochlik sezish, bunda bemorlar juda ko'p ovqat yeyishlariga qaramay, semirish u yodda tursin, hatto ozib ketishadi. Umumiy darmonsizlik, badanning qichishishi, ayollar jinsiy organlarining qichishidan noliydi. Terida yiringli kasalliklar paydo bo'ladi, jinsiy funksianing buzilishi kuzatiladi.

Noto'g'ri yoki yetarli davolanmaganda kasallik zo'rayib, periferek nervlar funksiyasi izdan chiqishi oqibatida, oyoq-ko'llarda og'riq paydo bo'ladi. Qandli diabetda ko'z to'r pardasi tomirlarining o'zgarishi natijasida ko'rishning izdan chiqishi, shuningdek, buyraklar funksiyasining buzilishiga olib keladi.

Bemorni ko'zdan kechirganda, terisi quruq, turgorligi, elastikligi yo'qolgan va uni infeksiyalarga ko'rsatadigan qarshiligi keskin pasayib ketgani aniqlanadi. Bu terida yiringli kasalliklar – furunkuloz, karbunkullarga olib keladi. Qo'l va oyoq kaftlari o'ziga xos sap-sariq tusga kiradi («ozg'inlar diabeti»). Bundan tashqari, qichishish izlari, ekzemalar, dermatozlar, epidermofiliya, soch mikozlari, tirnoqlarning trofik yarasi kuzatilishi mumkin: hazm organlari sistemasida, ko'pincha til shilliq pardasi atrofida yallig'-lanish – glossit ko'rildi, til jigarrang karash bilan qoplangan.

Tishda – tish toshchalari va kariozlar topiladi, afrozli stomatit, pioreya va tishlarning tushib ketganligi kuzatiladi. Qorin palpatsiya qilinganda, jigar sohasida og'riq va u kattalashgan bo'ladi. Kasallikning boshlanishida ishtaha baland bo'ladi, hazm markazini ta'sirlanishi tufayli, bemor o'zini och his qiladi, og'ir shaklida asidozga ishtaha yo'qoladi. Ko'ngil aynishi, quisish, ich ketishi, gohida qorinda og'riq paydo bo'ladi.

Nafasdan aseton hidi keladi, bronxit, pnevmoniya, o'pka sili kasalliklari bilan birga o'tadi. O'pka silini ekssudativ va kavernozi shakllari uchraydi.

Qandli diabet kasalligining 70 % belgilari yurak-qon tomirlar sistemasiga to'g'ri keladi. Bundan 48,6 % ini yurak tomirlari aterosklerozi tashkil etadi. Tomirlardagi o'zgarishlar faqat ateroskleroz kasalligi bilan emas, balki boshqa kasalliklar oqibatida ham kelib chiqadi. Qandli diabet bilan ko'p yillardan beri og'rigan bemorlarda tomirlar o'zgarishi natijasida, og'ir hollarda, oyoqlarda gangrena paydo bo'ladi.

Buyrak va siyidik ajratish sistemasida buyrak tomirlar aterosklerozi rivojlanadi, siyidikdan oqsil ajraladi, gipertoniya va retinopatiya paydo bo'ladi. Interkapillar glomeruloskleroz, o'tkir va surunkali piyelonefrit kasalligi vujudga keladi.

Nerv sistemasida — bosh og'rig'i, bosh aylanishi, uyquning buzilishi, tez charchash, ish qobiliyatining buzilishidan noliydigan turli xil xarakterdag'i og'riqlar paydo bo'ladi, polinevrit rivojlanadi. Parestesiya, gipesteziya, muskullar parezi va falajlar vujudga keladi.

Laboratoriya tahlili: siyidikning solishtirma og'irligi yuqori, aksari hollarda 1030—1050 atrofida o'zgarib turadi. Siyidikda qand 8—10 % gacha topilladi. Bir sutka ichida bir necha yuz garmm qand siyidik bilan ajralib turadi. Siyidikda qon paydo bo'lishi, oqsil ajralishi, keton tanachalarining ajralishi kuzatiladi.

Qonda qand miqdori 200 mg % gacha ko'tariladi (me'yorda 80—120 mg % yoki 5—6 %). Qandli diabeti og'irlashgan bemorlarda qonda keton tanachalari (yog'larning noto'liq parchalanishi mahsulotlari — aseton, asetosirka kislota va betaoksimoy kislotalari) miqdori oshadi.

10.7.1. Qandli diabet kasalligini davolash va profilaktikasi

Diyetoterapiya — 9-parhez. Bemor ovqatidan qand va qandga boy boshqa uglevodlar chiqariladi, shu tufayli, insular apparatning ishi yengillashib, uning funksiyasi tiklanadi. Ovqat kaloriyasi 2500 kkal atrofida bo'lishi kerak. Kaloriyaning qariyb 20 % i oq-sillardan iborat bo'lishi lozim. Taom vitaminlarga, ayniqsa, C va B guruhi vitaminlariga boy bo'lishi darkor.

Ovqatni bo'lib-bo'lib, kuniga oz miqdordan, 5 marta yeyish kerak. Nonushtaga bir sutkalik kaloriyaning 25 %, ikkinchi nonushtaga 10 %, tushlik ovqatga 35 %, ikkinchi tushlikka 10 % va kechki ovqatga 20 % i to'g'ri kelishi lozim. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga tarkibida yengil hazm bo'ladigan uglevodlar tutmagan maxsus oziq-ovqat mahsulotlari: sorbit yoki ksilitli konfetlar, diabetik nonlar, pecheniy, kolbasalar (maxsus) beriladi.

Endokrinolog ko'rsatmasiga binoan, insulin va insulin qatori preparatlari beriladi. Insulin berishdan oldin, qondagi qand miqdori tekshiriladi. 1 TB insulin 4—5 gr qandni parchalaydi. Insulin flakonlarda 1 ml, 5 ml, 10 ml li qilib chiqariladi. 1 ml insulin 40 TBga, 5 ml insulin 200 TBga to'g'ni keladi. Maxsus 1 ml li shprislar ishlataladi.

Insulinni hisoblash

T/r	Shpris darajalari, 1 ml hisobida	Insulin TB	5 g qandni parchalash hisobida
1.	0,1 ml	4 TB	20 gr
2.	0,2 ml	8 TB	40 gr
3.	0,3 ml	12 TB	60 gr
4.	0,4 ml	16 TB	80 gr
5.	0,5 ml	20 TB	100 gr
6.	0,6 ml	24 TB	120 gr
7.	0,7 ml	28 TB	140 gr
8.	0,8 ml	32 TB	160 gr
9.	0,9 ml	36 TB	180 gr
10.	1 ml (1,0)	40 TB	200 gr

Insulinni hisoblab shprisga olish quyidagicha bajariladi:

TB ml	TB ml	TB ml	TB ml
1 TB—0,025 ml	11 TB—0,275 ml	21 TB—0,525 ml	31 TB—0,775 ml
2 TB—0,050 ml	12 TB—0,375 ml	22 TB—0,550 ml	32 TB—0,875 ml
3 TB—0,075 ml	13 TB—0,325 ml	23 TB—0,575 ml	33 TB—0,825 ml
4 TB—0,1 ml	14 TB—0,350 ml	24 TB—0,675 ml	34 TB—0,850 ml
5 TB—0,125 ml	15 TB—0,375 ml	25 TB—0,625 ml	35 TB—0,875 ml
6 TB—0,150 ml	16 TB—0,475 ml	26 TB—0,650 ml	36 TB—0,975 ml
7 TB—0,175 ml	17 TB—0,425 ml	27 TB—0,675 ml	37 TB—0,925 ml
8 TB—0,2 ml	18 TB—0,450 ml	28 TB—0,705 ml	38 TB—0,950 ml
9 TB—0,225 ml	19 TB—0,475 ml	29 TB—0,725 ml	39 TB—0,975 ml
10 TB—0,250 ml	20 TB—0,575 ml	30 TB—0,750 ml	40 TB—1,275 ml

Insulin TBga bo'yicha

1 ml insulin – 40 TB;	6 ml insulin – 240 TB;
2 ml insulin – 80 TB;	7 ml insulin – 280 TB;
3 ml insulin – 120 TB;	8 ml insulin – 320 TB;
4 ml insulin – 160 TB;	9 ml insulin – 360 TB;
5 ml insulin – 200 TB;	10 ml insulin – 400 TB.

Insulin va insulin qatori preparatlarining ta'sir doirasi

T/r	Preparat, insulin	Analogi, chiqish joyi	Ta'sir doirasi (soat bo'yicha)		
			boshlanish vaqti va davomi	maksi- mum	davom etishi
Qisqa ta'siri					
1.	Oddiy insulin	MDH, Vengriya	15–30 min.	2–3	6–7
2.	Suinsulin	Aktrapid Daniya	15–20 min.	2	6–7
3.	Monosuinsulin	MDH	15–20 min.	2	6–7
O'rtacha ta'siri					
4.	Suspenziya – rux – insulin – amorf IRS A	Insulin semulenta Daniya	1–1 1/2	4–6	12–14
5.	Suspenziya – insulin semipong	Daniya	1–1 1/2	4–6	12–14
6.	Insulin B	GFR	1–2	4–8	10–18
Kengroq ta'sir doirasi					
7.	Protamin – rux – insulin PRI		6–8	14–20	24–36
8.	Suspenziya – rux – insulin IRS	Insulin lenta Hindiston, Daniya	1 1/2–2	10–16	24
9.	Suspenziya – insulin long		1 1/2–2	10–16	24
10.	Suspenziya – rux – insulin kristali IRS K	Insulin ultralenta	6–8	12–18	30–36
11.	Suspenziya – in- sulin – ultra long		6–8	12–18	30–36

Insulin, ovqatdan 30—40 minut oldin teri ostiga yoki muskullar orasiga yuboriladi. Dozalari har bir kasalning ahvoli hamda siydigidagi qand miqdoriga qarab, alohida-alohida belgilanadi.

Odatda, insulinni uch muddatda yuboriladi, bunda uning maksimal dozasi tushki ovqatdan oldin, kamroq qismi nonush-tadan oldin va eng kam dozasi kechki ovqatdan oldin yuboriladi. Keyinchalik insulin dozasini birinchi va ikkinchi inyeksiyalar o'rtasida, ikkinchi inyeksiya va kech kirishi va tun bo'yи o'tgan davrda yig'ilgan siydikning bo'lingan porsiyalardagi qand miqdorini aniqlashga asoslanib o'zgartirish lozim. Insulin yuborilgandan keyin, uning samarası 2—4 soatdan keyin, ta'sir kuchi 6 soat davom etadi. Shular orasida ikkinchi marta yuborish mumkin emas. Chunki gipoglikemiya ro'y berishi mumkin (jadvalga qarang). Masalan, bemorning yoshi 23 da, vazni 70 kg, birinchi marta qandli diabet bilan shifokorga murojaat qilgan va u kasalxonada insulin bilan davolashni boshladi, deylik. Glikemiya—18,6 mmol/l, siydikda aseton reaksiysi manfiy. Bemorga ertalab nonushtadan oldin suinsulin 12 TB; tushlikdan oldin 12 TB, kechki ovqatdan oldin 8 TB buyurildi, ikkinchi analizda 11,8 mmol/l. Ertalab 10 TB rux-insulin suspenziyasi va 8 TB suinsulin, tushki vaqtida ovqatdan oldin 8 TB, kechqurun 6 TB suinsulin berildi. Uchinchi tahlil 6,4 mmol/l ertalab 8 TB rux-insulin suspenziyasi 6 TB suinsulin, kunduzi 6 TB, kechqurun 4 TB suinsulin beriladi. Keyin bemorga inyeksiya ertalab ovqatdan oldin 6 TBda rux-insulin suspenziyasi; 6 TB rux-insulin amorf suspenziyasi; 4 TB kechqurun ovqatdan oldin suinsulin beriladi.

Insulin qator preparatlardan amorf rux-insulin suspenziyasi 5 ml.li flakonlarda chiqariladi, teri ostiga ovqatdan oldin 1 ml – 40 TB dan yuboriladi; kristalik «K» 5 ml.li flakonlarda chiqariladi, teri ostiga yuboriladi. Rux-insulin suspenziyasi 5 ml.li flakonlarda chiqariladi 1 ml 40 TB teri ostiga yuboriladi. Insulin «Lente» 5 ml, teri ostiga rux-insulin suspenziyasi 1 ml—40 TB yuboriladi. Inyeksiyalar uchun ishlatiladigan protamin ruxi insulin 5 ml.li flakonlarda chiqariladi. 1 ml—40 TB teri ostiga ovqatdan 30 minut oldin yuboriladi. Suinsulin 5 ml.li flakonlarda chiqariladi. 1 ml – 40 TB teri ostiga yuboriladi. Insulin B 10 ml.li flakonlarda chiqariladi. 1 ml – 40 TB dan teri ostiga ovqatdan 30 minut oldin yuboriladi. Insulin long suspenziyasi 5 ml.li flakonlarda 1 ml 40 TB teri ostiga yuboriladi – komaoldi va diabetik komada bu preparatlar ishlatilmaydi.

Insulin ultralong 5 ml.li flakonlarda 1 ml – 40 TBda teri ostiga yuboriladi. Monoinsulin 5 ml.li flakonlarda chiqariladi, teri ostiga ovqatdan oldin yuboriladi.

Sulfanilamid preparatlardan tolbutamid(butamid, diabetol, dolipol, orabet, orinaza, oterben, rastinon, tolbusal) 0,25 g—0,5 g.dan; karbutamid (alentin, bukarban, glutsidoral, glukofren, isoral, invenal, izoral, nadizan, oranil, talanton) 0,5 g.dan; xlorpropamid (diabinez, mellinez) 0,1—0,25 g.dan; glibenklamid (daonil, maninil, euglikon) 0,005 g.dan; gliklazid (diamikron, predian, diabeton) 0,08 g.dan; glurenorm (glikvidon) 0,03 g.dan; glipizid (glibinez, minidiab) 0,005 g.dan sxema tarzda beriladi. Sulfanilamid preparatlari – davo qilishni sutkasiga 6 yoki 4 tabletkadan (tabletka og'irligi 0,5 g) boshlanadi. Ular 2 marta, masalan, soat 7 va 17 da qabul qilinishi kerak; keyin dozani kamaytira boriladi; 2-kun 5—3 tabletka, 3-kun 4—2 tabletka, 4-kuni 3—2 tabletka, 5-kundan boshlab 1—2 tabletkadan beriladi, davo boshlanishidan taxminan 2 hafta o'tgach, kundalik doza kuniga 2 marta 1— $\frac{1}{2}$ tabletkadan va kuniga, hatto $\frac{1}{4}$, tabletkadan belgilanadi. Davo qilinishi, odatda, 2 va 5-kuni orasida, ba'zida esa birmuncha kechroq uning shifobaxsh ta'siri ko'rindi. Sulfanilamid preparatlari bilan davo qilishda, insulindagi kabi, parhez asta-sekin kengaytirib boriladi.

Kasallikning oldini olish maqsadida me'daosti bezi yallig'lanishi, shikastlanishi, asab-ruhiy ta'sirotlar, yuqumli kasalliklardan saqlanish kerak. Qand va tarkibida qand bo'lgan mahsulotlarni cheklash lozim.

10.8. Diabetik koma (giperglykemik koma)

Qonda keton tanachalari miqdori ancha ko'paygan bemorga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmasa, diabetik koma rivojlanadi. Odatda, komadan bir necha kun avval diabetik komaoldi holati alomatlari paydo bo'ladi. Poliuriya va chanqoqlik kuchayadi. Darmoni quriydi, uyquchanlik boshlanadi. Bu vaqtida bemor yoniga yaqinlashganda og'zidan aseton hidi kelayotganini sezish mumkin. Siyidik qand va keton tanachalari ajrata boshlaydi. Agar bu davorda davolash boshlanmasa, diabetik koma alomati boshlanadi.

Klinikasi. Bemorning umumiylahvoli yomonlashadi. Kuchli darmonsizlik, lohaslik, chanqash, ko'ngil aynishi, quşish, ich ketishi, quloqlarning shang'illashi, bo'shashish, tilning qurishi,

adinamiya oshadi, chuqur shovqinli, ritmik (Kussmaul tipida) nafas olinadi, nafasdan keskin aseton hidi keladi. Puls tezlashadi, arterial bosim pasayadi, mushaklar tonusi pasaygan, ko'z soqqalari yumshoq bo'lib qoladi, tana harorati subnormal, tili jigarsimon karash bilan qoplangan bo'ladi. Yurak tonlari bo'g'iq, qorinning oldingi muskuli taranglashgan. Avvaliga es-hush joyida bo'ladi, keyin bemor hushidan ketadi, bunda pay reflekslari bo'lmaydi, ba'zan arterial bosim pasaygan kollaps manzarasi yuzaga keladi, anuriya paydo bo'ladi.

Laboratoriya tahlili qonda qand 400—1000 mg %, ishqor zapasi 15—30 hajm % (normada 60 hajm %), keton tanachalari 60—150 mg %, oqsilsiz azot 60—140 mg %, xlorid miqdorini kamayishi qonda leykotsitlar miqdorini oshishi — leykositoz 1 mm^3 qonda 15 000 dan 50 000 gacha ($15 \cdot 10^9$ — $50 \cdot 10^9/\text{l}$) normada 6000—8000 mm^3 qonda ($6 \cdot 10^9$ — $8 \cdot 10^9/\text{l}$) neytrofillar chapga siljigan. Siydkda qand 8—10 %, oqsil, qon, keton tanachalari ko'p miqdorda ajraladi (glikozuriya, albuminuriya, ketonuriya).

10.8.1. Giperglikemik komani davolash

Giperglikemik koma holatiga tushgan bemorni zudlik bilan kasalxonaga yotqizish kerak. U yerda endokrinolog ko'rsatmasiga va uning qat'iy nazorati ostida quyidagi davo choralarini amalga oshiriladi:

1. Insulin — 50 TB tomir ichiga 0,9 % — 20 ml fiziologik eritma qo'shib beriladi; insulin 50 TB teri ostiga; keyinchalik hushsizlik holati davom etaversa, insulinni 20—30 TB teri ostiga har 2 soatda yuborish kerak. Insulin bilan bir vaqtida 20—30 ml 40 % li glukoza eritmasidan tomirga yuboriladi.
2. Natriy xlor 500 ml tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi; natriy gidrokorbanat 200—300 ml 4 % tomir ichiga yuboriladi.
3. Strofantin 0,05 %—0,5 ml yoki korglikon 0,06 %—0,5 ml 0,9 % fiziologik eritma yoki 40 %—20 ml glukoza eritmasi qo'shib yuboriladi (asta-sekin),
4. Kofein benzonat natriy 1—2 ml 10 % teri ostiga, kordiamin 0,5 ml—25 % teri ostiga, mezaton 1 ml—1 % muskul orasiga yoki 0,5 ml—1 % tomir ichiga asta-sekin 5 % glukoza eritmasi bilan qo'shib tomir ichiga yuboriladi. Sulfokamfokain 2 ml—10 % teri ostiga yoki muskul orasiga yuboriladi.

5. Asidozni kamaytirish maqsadida fiziologik eritmaga glukoza va soda qo'shib (50 g glukoza, 25 g natriy bikarbonat, 100 g fiziologik eritma) huqqa qilinadi.

6. Askorbinat kislota 5 %—5 ml tomir ichiga glukoza eritmasi bilan qo'shib yuboriladi (qondagi qand miqdori tushgandan keyin tavsya etiladi).

7. Kokarboksilaza 0,05—0,12 g kuniga bir marta muskul orasiga, teri ostiga yuboriladi. Og'ir hollarda sutkalik dozasi 1 g.gacha beriladi.

8. Kaliy xlorid 20—30 ml — 10 % ga 500 ml natriy xlor qo'shib, tomir ichiga yuboriladi.

9. Noradrenalin 1—2 ml 0,2 % ga 250 ml — 5 % li glukoza eritmasi bilan tomir ichiga yuboriladi.

10.8.2. Gipoglikemik koma

Sahabi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorga ko'p miqdorda insulin yuborilgan bo'lsa, gipoglikemik koma boshlanadi. Gipoglikemik koma qonda qand 2,8 mmol.dan pastga tushib ketishi bilan xarakterlanadi. Insulin noto'g'ri berilishidan tashqari, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, parhezning buzilishi, och qolish, yuqumli kasallikkardan keyin, tana haroratining ko'tarilishidan, kuchli jismoniy harakatda bo'lismi, ruhiy holatlarning buzilishi sabab bo'ladi.

Klinikasi. Och qolish sezgisi, bosh og'rishi, darmonsizlik, yurakning tez urishi, qo'zg'aluvchanlik, qo'rqish, qon bosimining pasayishi, taxikardiya, gohida bradikardiya kuzatiladi. Teri nam, terlash, yuzning oqarishi, muskul tonusining kuchayishi, ko'z qora-chig'inining kengayganligi, hushdan ketish.

Laboratoriya tahlili. Qonda qand miqdorining pasayishi, leykositoz, gohida leykopeniya, limfositoz.

Davolash. Gipoglikemik koma holatiga tushgan bemorni zudlik bilan kasalxonaga yotqizish kerak. U yerda endokrinolog ko'rsatmasi va uning qat'iy nazorati ostida quyidagi davo choralarini amalga oshiriladi:

1. Agar bemorning hushi joyida bo'lsa, unga 50—100 g non va 1—2 chaqmoq qand beriladi yoki 1 stakan shirin choy beriladi.

2. Behush holatdagi bemorga 50 ml 40 % li glukoza eritmasidan tomir ichiga yuboriladi. Agar u hushiga kelmasa, 5—10 daqiqa o'tkazib, teri ostiga 500—600 ml 5 % li glukoza hamda 0,5—1 ml 0,1 % li adrenalin eritmasidan takror yuboriladi.

3. Prednizolon, kuniga 0,025—0,05 g.dan (2—3 ga bo'lib) ichiladi, so'ngra dozasi kamaytirilib, 0,01—0,005—0,025 gacha tushiriladi.

4. Gidrokortizon, 100 ml (4 aml) yoki prednizolon 30—60 mg (1—2 ml amp)ga 300—500 ml —5 % li glukoza qo'shib tomir ichiga yuboriladi.

5. Kordiamin 25 % li—2 ml teri ostiga; sulfokamfokain 2 ml—10 % li teri ostiga yoki muskul orasiga yuboriladi. Kamfora 2—4 ml—20 % li teri ostiga.

6. Metionin 2 g kuniga 3 marta; lipokain 0,1 g kuniga 3 marta beriladi.

7. Kokarbaksilaza 0,05—0,1 g kuniga bir marta muskul orasiga, teri ostiga. B_{12} vitamini kunora 100—200 mkg.dan inyeksiya qilinadi, askorbinat kislota 5 % li—2—4 ml tomir ichiga glukoza eritmasi bilan yuboriladi.

8. Glutaminli kislota 0,5 g 4 marta sutka mobaynida tomir ichiga yuboriladi.

9. Natriy gidrokarbonat 200 ml 4 % li tomir ichiga tomchi usulda yuboriladi.

10. Kofein-benzoat natriy 1—2 ml —10 % li teri ostiga yuboriladi.

11. Strofantin 0,05 % li—0,5 ml yoki korglikon 0,06 % li—0,5 ml 0,9 % li—20 ml fiziologik eritma yoki 20 ml—40 % li glukoza eritmasi qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi.

10.9. Podagra

Yunoncha «*podos*» — oyoq, «*aura*» — tutilgan, ya'ni «oyoq qopqonda» ma'nosini bildiradi. Podagra surunkali kasallik bo'lib, organizmda siydik-kislota almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadi. Bu kasallikda qon zardobida siydik-kislota miqdorining ortishi va siydik-kislota natriyli tuzlari — uratlarning to'qimalarda, bo'g'inoldi to'qimalarida yig'ilishi natijasida paydo bo'ladi.

Podagra 40—55 yoshdagи odamlarda uchraydi. Podagrada qonda urat kislota miqdori ko'tariladi va 5—18 mg % atrofida o'zgarib turadi — normada 4 mg % gacha bo'ladi. Qonda urat kislota miqdorining ko'payishi to'lqinsimon xarakterda bo'ladi. Bunday bermorlarda uglevod, yog', oqsil va asosiy almashinuv, odatda, buzilmaydi.

Etiologiyasida irlsiy — konstitutsional moyillik, spirtli ichimliklar (shampanskiy, pivo), go'sht va go'sht mahsulotlarini (loviya,

no'xat, mosh va boshqa dukkakli o'simliklarni ko'p iste'mol qilish), kam harakat qilish, ko'p o'tirish, qo'rg'oshindan zaharlanish, qandli diabet, gipotireoz kabi omillar katta o'rin egallaydi. Ayollarda podagra kasalligi klimakterik davrda uchraydi.

Klinikasi. Kasallik katta va kichik bo'g'lnlarda kuchli og'riq bilan boshlanadi: bosh barmoqning kaft — falanga bo'g'ini, tovon bo'g'intari, tizza va umurtqa pog'analarida paydo bo'ladi.

Og'riqlar vaqt-vaqt bilan, ko'pincha kechasi tutadi, bitta yoki bir necha bo'g'inning qizarishi va shishib chiqishi bilan o'tadi. Tana harorati ko'tariladi ($38-39^{\circ}\text{C}$). Kasallik tez-tez va uzoq xuruj qilib turadigan bo'lsa, shakli o'zgarib ketishi mumkin. Og'riq xurujlariga qorinning dam bo'lishi, ichak funksiyasining buzilishi (qabziyat) ham qo'shilishi mumkin. Keyin og'riq to'xtaydi. Yana qaytalanguncha bir necha kundan 1—2 yilgacha muddat o'tishi mumkin.

Kasallik kuchayib borsa, xurujlar tez-tez qaytalanib, ular orasidagi muddat qisqara boradi va kasallik xronik tus oladi. Ba'zan kasallik o'tkir xurujlarsiz kechib, bunda bo'g'lnlar shakli va funksiyasi buziladi, hatto bemor og'riyotgan bo'g'inini qimirlata olmay qoladi. Podagraniнg o'tkir xurujlari, ayniqsa, xronik shaklga o'tib ketishining oldini olish uchun o'z vaqtida shifokorga murojaat qilishi kerak.

Laboratoriya tahlili. Qon tarkibida siydirik kislotaning o'r-tacha miqdori normada $0,3 \text{ mmol/l}$ ga teng, podagrada esa $0,84 \pm 0,96 \text{ mmol/l}$ gacha ko'tarilishi mumkin. Podagra xuruji paytida qonning umumiy analizida eritrotsitlarning cho'kish tezligi soatiga $25-40 \text{ mm/soat}$ ga yetadi, leykotsitlarning ko'payishi, S-reakтив oqsilning musbat darajasi va yallig'lanishining o'tkir darajasini ko'rsatuvchi reaksiyalar kuzatiladi. Zimnitskiy sinamasi buyrak-larning konsentratsiyalash layoqatini aniqlash maqsadida o'tkazib ko'rildi, siydirik konsentratsiyasining pasayishi hemorda klinik ko'rnishsiz kechayotgan interstitsial nefrit va nefroskleroz kechayotganidan dalolat beradi.

Rentgenografiyada bo'g'in oralig'ining kichrayishi, suyaklarda yumaloq shakldagi nuqson, suyak va tog'ay qismining destruksiysi bo'lishi mumkin.

Davolash. Yengil jismoniy mehnat bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Sport bilan shug'ullanish, doimiy gimnastika, piyoda sayr etishlar organizmida siydirik-kislota ajralishini kuchaytirib, podagra kasalligining oldini oladi. Kasallik birdan xuruj qilgan paytda

qilinadigan davo — bemorni o‘rniga yotqizib qo‘yib, yarimoch holatda saqlaydigan, asosan, sutli ovqatlardan iborat parhez buyurish, ko‘p suyuqlik berilishidir.

Purin moddalarga boy masalliqlar (jigar, miya, buyrak, qovurilgan go‘sht, baliq, ismaloq, shovul, rediska, no‘xat), yog‘lar, qandli moddalar cheklanib qo‘yiladigan parhez buyurishdan iborat.

Dori vositalari sifatida etamid, allopurinol, sinxofen, urodan, indometatsin, kortizon qo‘llaniladi.

Fizioterapeutik davo muolajalaridan shikastlangan bo‘g‘inlarga elektroforez, UVCh, UF-nurlantirish, ultratovushli terapiya, rentgen nur bilan davolash, induktoterapiya, balchiqli applikatsiya, parafinli applikatsiya, radonli, sodali, serovodorodli vannalar qo‘llanishi mumkin.

10.10. Yog‘ bosish (semirish)

Organizm to‘qimalari, asosan, teriosti kletchatkasi, charvi va boshqa organlar atrofida ortiqcha yog‘ yig‘ilishiga semirish yoki yog‘ bosish deyiladi.

Yog‘ bosish, asosan, moddalar almashinuvining buzilishidan iborat. Bunda oziq moddalardan yog‘ hosil bo‘lish jarayoni uning parchalanish jarayonidani ustun bo‘ladi. Aksari, har doim ko‘p ovqat yeyish semirishga olib keladi. Bunda yeyiladigan ovqatning mutlaq miqdori va kaloriyaliligi emas, balki odam organizmining energiya sarfi, mehnat xususiyati, harakat aktivligi, me‘da-ichak yo‘lida surilish sharoitlari va boshqa omillarga aloqador bo‘lgan talabdan ortiqchaligi ahamiyatga ega.

Etiologiyasi. Tartibsiz ortiqcha ovqatlanish, infeksiya, intoksiatsiya, endokrin buzilishlar, markaziy asab tizimi faoliyatining buzilishi, kam harakat qilish, irsiy omillar, spiritli ichimliklarni ichib turish, tez singadigan uglevodlarni iste’mol qilib turish (sariyog‘, yog‘, yog‘li go‘sht, xamir ovqatlar, kartoshka) odam organizmini yog‘ bosishiga olib keladi.

Klinikasi. Odam qanday sabablarga ko‘ra, semirib ketganligiga qarab, konstitutsion, ekzogen, endokrin, serebral semizlik tafovut qilinadi.

Semiz odamning vazniga qarab semizlik to‘rt darajaga bo‘linadi.

- 1-daraja — vazn me’yordagidan 30 % ortiq;
- 2-daraja — vazn me’yordagidan 30—50 % ortiq;

- 3-daraja — vazn me'yordagidan 50—100 % ortiq;
- 4-daraja — vazn me'yordagidan 100 % dan ziyod bo'lishi.

Semizlikning 1- va 2-darajasida bemorlarning mehnat qobiliyati va hayotiy aktivligi buzilmaydi. Yog' bosishning 3—4-darajasidagi bemorlarda ishslash qobiliyati pasayadi, ular tez charchaydi. Bunday bemorlar ko'p terlaydi, chunki yog' qatlami yomon o'tkazuvchi bo'lgani sababli, issiqlik berishni qiyinlashtiradi. Hadeb terlash natijasida issiqlikning muayyan miqdori yo'qotiladi. Bemorlar semizlikdan, jismoniy ish bajarganda halloslab qolishdan noliydarlar. Halloslash tana og'irligi oshishiga hamda perekardda yog' to'qimasi to'planib qolishiga ham bog'liq bo'ladi.

Bunday bemorlarda asta-sekin yurak yetishmovchiligi boshlanib, shishlar paydo bo'ladi, jigar kattalashib ketadi. Yurak toj tomirlar aterosklerozi avj oladi, bu esa ko'krak qisishiga olib keladi. Semizlik oqibatida aksari qandli diabet, o't-tosh va buyrak kasalligi, bronxitlar, pnevmoniyalar, gepertoniya, miokard infarkti va boshqa kasalliklarga sabab bo'ladi.

Yog' bosgan bemorlarda jarrohlik operatsiyasi ancha og'ir o'tadi. Ularni umri o'rtacha umrdan qisqa bo'lishi ishotlangan.

Davolash. Diyetoterapiya— 8- va 8a-parhez buyuriladi. Parhez 1 kg og'irligiga me'yor qilib tuzilgan va sutkalik ratsionda 1,5 g oqsil, 0,9 g yog' va 4,5 g uglevodlar tutadi. Bunday parhez ovqatda umumiy kaloriya miqdorining 18 % ini oqsillar, 28 % ini yog'lar va 54 % ini uglevodlar tashkil etadi. Demak, bu parhez kaloriyaliliği umumiy parhez kaloriyaligining 70 % ini tashkil etadi.

8a-parhez shu bemor uchun normal 1 kg vaznga sutkalik ratsionda 1,5 g oqsil, 0,9 g yog' va 1,5 g uglevodlar tutadi. 8a-parhez bemorlarga statsionar sharoitida va 35—40 kun buyuriladi.

Semizlikda parhez bilan birga organizmning energiya sarfini oshiradigan, yurak-tomir, nafas va boshqa sistemalarni mustah-kamlaydigan oqilona harakat rejimiga ham rivoja qilish lozim. Ertalab badantarbiya qilish, muntazam ravishda piyoda yurish, chang'ida uchish, velosiped minib sayr qilish, suzish, sport o'yinlari tavsiya qilinadi, zarur bo'lganda shifokor davo fizkulturasi, uqalash, suv muolajalarining maxsus to'plamini buyuradi, sanatoriyl-kurortlarda davolanishni tavsiya etadi.

11-bob. SUYAK-MUSHAK TIZIMI VA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA KASALLIKLARI

11.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar

Odam harakat qilish qobiliyatiga ega. Organizmni harakatga keltiradigan a'zolar muskullar, suyaklar, bo'g'inlar, boylamlardan iborat.

Harakat sistemasi organizmning ko'p qismini tashkil qiladi yoki gavdaning umumiy og'irligiga nisbatan 72,45 % ni tashkil etadi. Shu jumladan, muskullar gavdaning 2/5, suyaklar esa 1/5—1/7 qismini tashkil etadi. Harakat apparatining umumiy kasalliklarida, ko'pincha, bo'g'inlar shikastlanadi.

Suyaklarning bir-biriga juda yaqinlashmasdan, o'ttada bo'shliq goldirib qo'shilgan joyi bo'g'in deb ataladi. Odatda, bo'g'inlar ichidagi bo'shliqda sinovial suyuqlik bo'ladi. Har bir bo'g'in, biriktiruvchi suyaklarning bo'g'in ichida turadigan va tog'ay bilan qoplangan uchlari epifizlaridan suyaklarning birikkan uchlarini musta singari o'rab turuvchi bo'g'in xaltasidan; xaltacha ichidagi suyaklar orasida bo'ladigan bo'g'in bo'shlig'idan iborat.

Bo'g'in xaltasi quyidagi ikki qavatdan iborat fibroz to'qimadan tuzilgan. Bular: 1) tashqi qavat; 2) ichki sinovial qavat.

Tashqi fibroz qavat bo'g'in xaltasini mustahkamlash uchun xizmat qilsa, siyrak biriktiruvchi to'qimadan va endotelial hujayralardan tuzilgan ichki qavat xalta yuzasini silliqlash uchun xizmat qiladi. Ichki qavat (sinovial) qavat bo'g'in ichiga shiraga o'xshab cho'ziladigan sarg'ish rangli tiniq suyuqlik — sinovial suyuqlikni chiqaradi. Bu suyuqlik bo'g'in yuzalarini namlab turadi, ba'zi serharakat bo'g'inlarda esa bo'g'inni sovitib, qizishdan saqlab turadi. Ba'zi bo'g'inlarda bo'g'in xaltasi borgan sari yupqalashib borib, sinovial cho'ntaklar (bo'shliqlar)ni hosil qiladi.

Tog'ayda tomirlar ham, nervlar ham yo'q. U sinovial suyuqlikning diffuzlanishi yo'li bilan oziqlanadi. Bo'g'in bo'shlig'i sinovial suyuqlik bilan to'lib turadigan kapillar bo'shliqdir. Sinovial suyuqlik limfa va tomirlar yoki to'qima suyuqligiga o'xshash.

U bo'g'inlarda harakatlarni osonlashtirib kamaytiradi, bakteritsid xossalarga ega. Sinovial parda nerv va tomirlarga boy bo'ladi, shu nerv va tomirlar sinovial parda bilan bo'g'in bo'shilg'i o'rtaida moddalarning jadal almashinib turishini ta'minlab turadi. Suyaklarga birikib, bo'g'inlar ishini yo'lga soladigan va quvvatlab turadigan boylamlar harakati katta rol o'ynaydi.

11.2. Revmatoid artrit

Bu kasallik infeksion-allergik kasalliklar guruhiga kiradi. Revmatoid artritda, asosan, bo'g'in biriktiuvchi to'qimasining yalilganishi bilan kechadi. Revmatoid artritning kelib chiqish sabablarani aniqlanmagan.

Etiologiyasi. Kasallikning rivojlanishida virus infeksiyasi, streptokokk *B* guruhi, mikoplazma rol o'ynaydi; irlsiy omillar;sovqotish, jarohatlar kasallikni rivojlanishiga sabab bo'ladi; kasallik kelib chiqishida tashqi ob-havo, mehnat, turmush tarzi, ichki-jinsiy yog' moddalar almashinuvi hamda endokrin omillarning ahamiyati katta.

Klinikasi. Xastalik asta-sekin, ba'zida o'tkir boshlanadi. Angina, gripp va boshqa kasalliklardan 10—15 kun o'tgach xuruj qiladi. Bo'g'inlar shishib, og'riq paydo bo'ladi. Tana harorati 39°C gacha ko'tariladi. Yurish qiyinlashadi, bo'g'indan qisillagan tovush chiqadi. Bo'g'inlar ushlab ko'rulganda issiq, qizargan, harakati keskin chegaralangan. Shikastlangan bo'g'inlar sohasida mushaklarning atrofiyasi tez rivojlanadi. Ma'lum vaqt o'tgach, aksari sovqotish, yuqori nafas yo'llari katari, charchash kabilardan so'ng xuddi o'sha yoki ilgari shikastlanmagan bo'g'inlarda poliartrit retsidivi yuz beradi.

Surunkali turida (ankiloz) hemorlarda bo'g'inlarning buralishi va chiqishi bilan tobora ankilozlanish alomatlari aniq ko'rindi. Mushaklar va teri keskin atrofiyaga uchraydi. Bo'g'inlarda og'riqlar, deformatsiya, kontraktura (ankiloz), hemorlarning durust harakat qila olmasligi bilan birga, davom etadigan turg'un o'zgarishlar paydo bo'ladi.

Bo'g'inlarni paypaslab ko'rish og'riqqa sabab bo'ladi va bo'g'inlar bo'shilg'ida suyuqlik borligiga xos belgilarni topishga imkon beradi. Revmatoid o'z rivojlanish davrining boshlanishida



46-rasm. Revmatoid tirsak.

revmatik poliartitga biroz o'xshaydi, ammo uchuvchan xarakterga ega emas, revmatizmdagi kabi yurakni zararlantirmaydi.

Rentgentda bo'g'in tirkishining torayib qolganligi, kaft-barmoq bo'g'inlarida suyaklarning o'rnidan chiqib, barmoqlarning tash-qari — ulnar tomoniga qiyshayib qolganligi qayd qilinadiki, buning natijasida qo'l panjalari morj kuraklariga o'xshab qoladi, suyak to'qimasida ekzostozlar — o'siqlar va uzurlar — yeyilib ketgan joylar, suyak chiqiqlari, ankilozlar ko'rinish turadi.

Laboratoriya tahlili. Eritrotsitlar cho'kish tezligi 60 mm/soat, leykositoz, keyinchalik leykopeniya anemiya kuzatiladi. Eozinofillar, limfotsitlar miqdori kamaygan. Revmatoid poliartrit bilan og'rigan bemor qonida gipergammaglobulinemiya borligi, fibrinogen miqdori ko'payib qolganligi aniqlanadi. S-reakтив oqsiliga qo'yilgan reaksiya musbat bo'lib chiqadi.

Davolash. Surunkali streptokokk infeksiyasi o'choqlarini aniqlash va sanatsiya qilish uchun immunologik reaktivlikka, shuningdek, bo'g'inlardagi mahalliy jarayonga ta'sir etish, funksional harakat terapiyasini qo'llash kerak.

Kasallik xuruj qilganda organizmdagi immun o'zgarishlarini bosish maqsadida revmatizmga qarshi vositalar qo'llaniladi (asetilsalitsilat kislota, butadion, indometatsin). Kortikosteroid

preparatlaridan prednizolon, deksametazon ishlataladi. Bu dorilar bo‘g‘in ichiga ham yuborilishi mumkin.

Tarkibida oltin bo‘lgan preparatlardan krizanol qo’llaniladi.

Fizioterapeutik davo. Agar kombinatsiya qilingan davo choralaridan bemor ahvoli sezilarli darajada yaxshilanmasa, bo‘g‘in, bel orqali bir necha marta ultrabinafsha nurlar bilan (kvars lampa yordamida) nurlantirish maqsadga muvofiqdir, yengil issiq muolajalar (tungi isituvchi kompresslar, solluks) qilish tavsya etiladi. 20—30 minutdan parafinli aplikatsiyalar, balchiqli applikatsiyalarni kunora qabul qilinadi.

11.3. Infektion artritlar

11.3.1. So‘zakli artrit

So‘zakli uretrit bilan kasallangan bemorlarda rivojlanadi.

Klinikasi. Kasallik o‘tkir boshlanadi. Mayda va katta bo‘g‘inlar, tizza hamda boldir-tovon bo‘g‘inlari, oyoq panjasni, qo‘l panjasining mayda bo‘g‘inlari shikastlanadi. Ko‘pincha tizza bo‘g‘ini shikastlanishi ko‘proq uchraydi. Shikastlangan bo‘g‘inlarda og‘riq harakati chegaralangan, shish ustidagi teri qizargan bo‘ladi. Axill payining tovon suyagi do‘mbog‘iga yopishish joyida qattiq og‘riq bo‘lishi so‘zak artritiga xos og‘riq, ko‘pincha, tungi vaqtida ko‘proq bezovta qiladi. Aksariyat simmetrik bo‘g‘inlar, suyaklarning bo‘g‘in oxirlari zararlanishi, palpatsiya qilinganda, bularning g‘adir-budurligi bilinadi hamda og‘riq seziladi. Tana harorati 38—39°C gacha ko‘tariladi.

Kontrakturalar, ankirozlar, muskullarning atrofiyasi, axilodinin (tovon suyagiga axill payi birikkan joyning bezillab turishi) tez avj oladi. Tovon suyagida do‘mboq (shpor) shaklidagi ekzostozlar rivojlanishi.

Rentgenda ko‘p hollarda tog‘aylarning yemirilishiga bog‘liq holda bo‘g‘in yoriqlarining torayishi qayd qilinadi. Bo‘g‘in uchlari sohasida osteoporozning tez rivojlanishi aniqlanadi.

Laboratoriya tahlili. Eritrotsitlarning cho‘kish reaksiyasi tezlashgan. Leykositoz, keyinchalik leykopeniya. Borde-jangu reaksiyasi musbat bo‘ladi.

Teri orasiga gonokokk vaksinasi bilan qilinadigan musbat sinovi (1 ml.dan 100000000 bakterial tanaga saqlaydigan 0,2 ml vaksina)

to‘g‘ri tashxis qo‘yishda katta ahamiyatga ega: shu vaksinadan 0,5 ml.ni teri ostiga kiritishga javoban mahalliy va umumiy harorat reaksiyasi ham tashxisiy ahamiyatga ega.

Davolash. So‘zakli artritni davolash uchun antibiotiklar, salitsilatlar, prednizalon, fizioterapiya, ma‘danli suvlar va shifobaxsh balchiqlar ishlataladi.

11.3.2. Zaxmli artrit (sifilitik artritlar)

Sifilis, ya’ni zaxmnning II va III bosqichlarida bo‘g‘inlarning o‘tkir va surunkali kasalliklari paydo bo‘lishi mumkin. Aksariyat simmetrik bo‘g‘inlar, suyaklarning bo‘g‘in oxirlari zararlanadi. Ko‘pincha tizza bo‘g‘inlari shikastlanadi. Bo‘g‘inlarning funksiyalari buziladi. Bemorlarda tungi og‘riq kuzatiladi, palpatsiya qilinganda, bularning g‘adir-budurligi seziladi. Kasallikda ko‘pincha terida o‘ziga xos rozeola toshmalari toshadi. Ba’zi bir bemorlarda bo‘g‘in bo‘shliqlarida og‘riq paydo qilmaydigan suyuqlik ko‘p to‘planadi, ular ustidagi teri qizarmaydi, yon tomonlarida sinovial pardalar bo‘rtib chiqadi.

Boshqa bemorlarda bo‘g‘inlarda suyuqlik to‘planmaydi, biroq sinovial pardalari vorsinkali qatlamlardan qalinlashib, ularning shakli o‘zgaradi. Buni paypaslab ko‘rilganda, osonlikcha aniqlash mumkin. Lekin shunday turlari ham uchraydiki, ularda bo‘g‘inlar sirtdan kam o‘zgaradi. Zaxmli artritlarda, odatda, muskullar atrofiyasi yuz bermaydi.

Bo‘g‘inlarni rentgenologik tekshirish ma’lum tashxisiy ahamiyatga ega. Ko‘pchilik hollarda periostit va osteoskleroz topiladi, ba’zan ularning konturlari yaxshi chegaralangan, mayda yumaloq nuqsonlari bo‘ladi, to‘qimaning gummoz parchalanishi natijasida bo‘lgan bu nuqsonlari shikastlangan suyak epifizida joylashgan.

Osteoporozlar ancha kam uchraydi. Zaxmli artritlarning nuqul sinovial turlarida rentgenografiya hech qanday o‘zgarishlar topmaydi.

Laboratoriya tahlili. Vassermanning musbat reaksiyasi tashxisiy ahamiyatga ega. Biroq u bemorlarning 60—70 % ida musbat bo‘ladi. Eritrotsitlarning cho‘kish reaksiyasi tezlashgan. Chapga siljigan o‘rtacha leykositoz va monositoz qayd qilinadi.

Zaxm artriti unga qarshi vositalar bilan davolanadi.

11.3.3. Brutselloz artriti

Brutselloz (Malta isitmasi, Bang kasalligi, qora oqsoq) — odam va hayvonlarda uchraydigan infekcion kasallik. Brutsellozda, asosan, nerv, yurak-tomir sistemasi va suyak-bo'g'in apparati zararlanadi. Organizmga brutsellalar hazm va nafas yo'llarining shilliq pardalari, shuningdek, shikastlangan teri orqali tushadi.

Brutselloz bilan og'riqan molning xom suti va sut mahsulotlari, shuningdek, chala qovurilgan yoki chala pishirilgan go'shti iste'mol qilinganda, kasallik odamga yuqadi. Bunda oyoq-ko'l, bel muskul bo'g'inlari qattiq og'riydi, ba'zan ruhiy huzilishlar kuzatiladi. Kasallik dam zo'rayib, dam pasayib bir necha oy davom etgach, og'riq kamayib, bemor tuzala boshlaydi, ba'zan yillab cho'zilishi ham mumkin.

Brutsellozda ko'pincha tizza bo'g'ini chanoq-son va boldir-panja bo'g'inlari jarayonga qo'shiladi, dumg'aza yonbosh bo'g'inlarining shikastlanishi xarakterlanadi. Brutselloz artritlari to'lqinsimon isitma jigar va taloqning kattalashib ketishi bilan birga o'tadi. Dumg'aza-yonbosh bo'g'inining yallig'lanishi (sakroileit) brutselloz uchun eng tipik hisoblanadi.

Jarayonning shunday joylanishi aksari yanglishib, bel yoki bel-dumg'aza radikuliti, koksit tashxisi qo'yilishiga sabab bo'ladi. Sakroileitlarda og'riq ancha kuchli bo'lishi mumkin; bemorlar bunda noilojilikdan chalqancha yoki qornini bosib yotadilar. Og'riq, odatda, dumg'aza-dumba sohasida bo'ladi va gavdani sal qimir-latishda, yo'talda va aksirganda dumg'aza hamda yonbosh suyaklarning bo'g'in sathida destruktiv o'zgarishlar aniqlanadi.

Laboratoriya tahlili. Rayt reaksiyasi va Byurnening teri ichi sinamasi musbat natijalar beradi. Periferik qonda gipoxrom anemiya, leykopeniya, neytropeniya, gohida leykositoz, eozinopeniya yoki aneozinofiliya borligi aniqlanadi. EChT hamma vaqt tezlashgan bo'ladi.

Davolash. Brutsellozga qarshi preparatlar bilan davo qilinadi (antibiotiklar, vaksinoterapiya). Remissiya davrida sanatoriy-kurortlarda davolanish tavsiya etiladi.

Shikastlanish darajasi va joylashishiga qarab, fizik usullardan sollyuks, kvars yoki UVCh hamda diatermiya qo'llanishi mumkin. Ba'zida bo'g'indagi qattiq og'riq rentgenoterapiya qo'llanishdan keyin tezda to'xtaydi. Bu sakroileitlarda va boshqa osteoartritlarda, ayniqsa, foydalidir.

11.4. Tizimli qizil yugurik

Bu kollagenozli kasallik bo'lib, uni birinchi bor venalik dermatolog Kapozi 1872-yilda tasvirlab berdi. Kapozi bu kasallikni, nafaqat, suyak-bo'g'in limfatik tugunchalar, balki butun organizmda patologik o'zgarishlar bilan kechishi va barcha a'zolarning funksional o'zgarishlari bilan bir qatorda, ularda degenerativ, distrofik o'zgarishlar bilan kechadigan surunkali kasallik deb ta'rifladi. Xastalik 80 % ayollarda va shu bilan bir qatorda, 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan kishilarda uchraydi.

Etiologiyasida ultrabinafsha, rentgen nurlari, sovqotish, fizioterapevtik muolajalar, dorilar ta'siri, irlsiyat kasallikning kelib chiqishda katta rol o'yaydi.

Klinikasi. Kuchli darmonsizlik, ozish, bo'g'inlarda kuchli og'riq — artralgiya teri va shilliq qavatlarda allergik belgilarni namoyon bo'lishi, tana haroratining ko'tarilishi ($38-39^{\circ}\text{C}$), sovqotish, terlash — kasallikning asosiy belgilari. Teri shilliq qavatlarida, yuzda, quloq suprasida, kaft va barmoqlarning ichki yuzasida eritemali toshmalarni toshishi kuzatiladi. Bo'g'in va muskullarda uzlusiz og'riq va ularni atrofiyasi, limfatik tugunlarni kattalashishi, plevrit, ekssudativ perikardit, buyrak yallig'lanishi — glomerulonefrit, shish va qon bosimi ortib ketishi kuzatiladi.

Bundan tashqari, yurak poroklari, arterit, flebit, meningit, ensefalit, nevrit, konyunktivit bilan birga kechadi.

Laboratoriya tahlili. Qonda EChT tezlashishi, gipoxrom anemiya, leykopeniya, limfopeniya, eozinofiliya, giperproteinemin, giper gammaglobulinemiya.

Davolash. Kasallikning bo'g'in shaklida kortizon, azatioprin, xingamin, aminoxinol, krizanol, tokoferal, butadion qo'llaniladi.

12-bob. KASBGA OID KASALLIKLAR

12.1. Kasbga oid kasalliklar to‘g‘risida ma’lumot

Kasb kasalliklari – noqulay mehnat sharoitlari va kasbga aloqador zararlarning organizmga ta’siri natijasida paydo bo‘ladigan kasallik. Uning ko‘lami mehnatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga, texnologiya sharoitlari va jarayonlariga hamda sanoatning texnik jihatdan qanchalik jihozlangantligiga bog‘liq. Kasb kasalliklari fizik, kimyoviy va biologik omillar ta’sirida paydo bo‘lishi mumkin. Masalan, yuqori atmosfera bosimi sharoitlarda (kessonlarda) ishlaganda, yuqori atmosfera bosimli ish joyidan normal atmosfera bosimli ish joyiga asta-sekin o’tilmaganda kesson kasalligi paydo bo‘ladi.

Doimiy sanoat shovqini va vibratsiya ko‘pincha qulquning og‘irlashishi, vibratsiya kasalligiga sabab bo‘ladi. Ba’zi changlar uzoq vaqt nafasga olinganda pnevmokonioz yoki o’pkaning boshqa kasalliklari kelib chiqadi.

Radioaktiv moddalar bilan muloqotda bo‘linganda va ionlash-tiruvchi nurlar ta’sir etganda nur kasalligini paydo qiladi. Kimyoviy moddalarning organizmga ta’siri kasb kasalliklar rivojlanishiga olib keladigan intoksikatsiya bilan kechishi mumkin. Masalan, sanoat zaharlari (qo‘rg‘oshin, simob, mishyak, anilin va hosilalari, fosfor birikmalari, benzin va boshq.)dan zaharlanganda, shuningdek, ekzema, dermatit, nafas yo‘llari kasalliklari ta’sirlovchi moddalar (mineral moylar, toshko‘mir smolasi va boshq.) ta’sirlarida paydo bo‘lishi mumkin. Bajaradigan ishining tabiatiga ko‘ra, infeksiya yuqqanlar yoki yuqumli material, shuningdek, kasal hayvonlar bilan ishlaydigan odamlar ba’zi infektion yoki parazitar kasalliklar: brutselloz, kuydirgi va boshqa kasalliklar bilan og‘rishi mumkin.

12.2. Pnevmoniozlar

Pnevmonioz (yunon. *pneumok* – o‘pka va *konua* – chang) – zararli changlarni uzoq vaqt yutishdan paydo bo‘ladigan o‘pka kasalliklari guruhiга kiradi.

Etiologiyasi. Pnevmoniozlar ko'pincha tog'-kon, ko'mir, asbest, chinni-fayans, mashinasozlik korxonalarida va sanoatning ba'zi boshqa sohalarida mehnat qiladiganlarda yuzaga keladi.

Pnevmonioz kasalligining kelib chiqishida:

1. Mineral changlar – sement, asbest, silikat va boshqalar.
2. Metall changlari.
3. Ko'mir changlari.
4. O'simlik changlari – paxta, qog'oz, kraxmal tayyorlash uchun xomashyo changlari ta'sir qiladi.

Klinikasi. Bemorlar hansirash, yo'talish, ko'krakning og'rib turishidan nolishadi. Kasallikning dastlabki davrida hansirash, odatda, odam jismoniy ish qilganida, yuqoriga ko'tarilganida, tez yorganida seziladi.

Yo'tal quruq bo'ladi yoki yo'taldan keyin balg'am ajraladi. Kasallar ko'pincha darmonsizlik, tez charchab qolish, to'shosti sohasining og'rib turishi, ko'ngil aynishi, zarda qilishidan shikoyat qilishadi.

Pnevmonioz bilan og'rigan bemorlarda ko'pincha yuqori nafas yo'llarida surunkali yallig'lanishga xos o'zgarishlar uchraydi: atrofik renit, laringit, surunkali bronxit, o'pka emfizemasi. Bronxit ba'zan astmatik xarakterga ega bo'ladi. Kasallik zo'rayib borgan sari, o'pkaning tiriklik sig'imi kamayib, nafas va yurak-tomirlar sistemasining funksiyasi izdan chiqadi.

Pnevmonioz bosqichma-bosqich klinik alomatlari namoyon bo'ladi. Dastlabki bosqichlarida yuqorida aytib o'tilgandek, jismoniy ish vaqtida hansirash, quruq yo'taldan bemorlar nolisalar, keyingi bosqichlarida alomatlarning ko'proq ifodalangan bo'lishi, o'pkaning periferik qismlarida topiladigan tugunchalar sonining ko'payganligi, limfa tugunlarining kattalashganligi, nihoyat, og'ir hollarda nafas yetishmovchiligi va tinch turganda ham bemor hansirashi ro'yrost ifodalangan bo'ladi. O'pkaning tiriklik sig'imi va boshqa funksional sinamalar ko'rsatkichi sezilarli darajada pasayadi. Kasallik tuberkuloz, o'pka, yurak yetishmovchiligi, emfizema kabi asoratlar bilan kechishi mumkin.

Rentgenologik tekshirilganda, o'pka tasvirining ikki diffuz ravishda quyuqlashib, deformatsiyalanib qolgani, bo'laklararo plevraning qalinlashgani, o'pka ildizlarining kengaygani va kattaligi 1—3 mm keladigan silikotik tugunchalarning mayda-mayda, tar-qoq, dumaloq soyalari borligi bilan ifodalanadi.

Laboratoriya tahlili. Qonda leykositoz va eritrotsitlar cho'kish tezligining ortishi kuzatiladi.

Davolash. Kasb va iqlimni o'zgartirish, ishchi-xodimlarni vaqt-vaqt bilan majburiy sur'atda tibbiy tekshiruvdan o'tkazib turish lozim. Ish joylarini changdan xoli qilishga qaratilgan sanitariya-texnika tadbirlari katta ahamiyat kasb etadi.

Dori-darmonlardan shifokor ko'rsatmalariga ko'ra, antibiotiklar, yo'talga qarshi dorilar, balg'am ko'chiruvchi dorilar, antigistamin vositalardan foydalaniladi.

Oksigenoterapiya, ya'ni namlangan kislород berish, chalg'ituvchi vositalar, oyoqqa 100 g xantal kukini bilan vanna qilish, orqaga xantal qog'ozlarini qo'yish, fizioterapevtik muolajalar qilinadi.

12.3. Tebranish kasalligi (vibratsion kasallik)

Vibratsiya (lotin. *vibratio* – tebranish, titrash ma'nosini bildiradi) – qattiq jismilarning mexanik tebranishi, silkinishi. Sanoat va turmushda keng qo'llaniladigan, mexanizatsiyalashtirilgan pnevmatik va elektr asboblar, har xil mashina, stanoklar vibratsiyaga sabab bo'ladi. Ishlab chiqarish va turmushda vibratsiya odamga ta'sir qilib, bir qancha fiziologik funksiyalarning buzilishiga olib kelishi, ta'siri uzoq cho'ziladigan bo'lsa, vibratsiya kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Ishlab turgan odamning, asosan, qo'liga ta'sir ko'rsatadigan mahalliy vibratsiya hamda butun organizmga ta'siri qiladigan (ish o'rni, pol tebranib turadigan bo'lsa) umumiy vibratsiya hal qilinadi.

Mahalliy tebranish ta'sirida kelib chiqadigan tebranish (vibratsion) kasalligida qo'l panjasi og'riydi, sovuqdan qo'l uvushib, barmoqlari oqarib turadi, bel va yurak sohasida ham og'riq paydo bo'ladi. Kasallikda, asosan, tomirlarda qon aylanishi buziladi. Avvaliga qaysi qo'l tebranish ta'siriga ko'proq uchrab turadigan bo'lsa, o'sha qo'l tomirlarida qon aylanishi o'zgaradi. Kasallik zo'rayib borgan sari, bu jarayon ikkinchi qo'l tomirlarigagina emas, balki oyoq panjasi, yurak, miya tomirlariga ham o'tadi: qo'lda, ko'pincha oyoqda ham og'riq turib, sezuvchanlik o'zgaradi.

Qo'l va oyoq panjalari terisining harorati pasayadi. Kasallik uzoq cho'zilib, og'irlashib borgan sari sezuvchanlik ko'proq pasayadi. Endokrin bezlar, ichki organlar almashinuv jarayonlarida ham

bir qator o'zgarishlar kelib chiqadi. Katta amplitudali tebranish muskullar, boylamlar, bo'g'inlar, suyaklarda o'zgarishlar paydo qiladi. Bemorlar darmonsizlik, bosh og'rig'i, uyqu buzilganligidan nolishadi.

Umumiy tebranishda esa miyadagi o'zgarishlarga aloqador hodisalar paydo bo'ladi. Bosh og'rib, aylanadi, ko'pincha, vistibular sistema zararlanadi.

Davolash. Ishlab chiqarish binolari, traktorlar, qishloq xo'jaligi, melioratsiya, yo'l qurilishi mashinalari va yuk tashiladigan transportdagi tebranishlar darajasi sanitariya qonunlari bilan belgilangan. Gigiyenik me'yor belgilash bilan bir qatorda, tebranishni keltirib chiqaradigan kuchlarni muvozanatlash orqali mashinalar, asbob-uskunalarning silkinishi bartaraf etiladi; elastik elementlar va tebranishni so'ndiruvchi vositalar yordamida tebranishni kamaytirish choralar ko'rildi; ishlovchining tebranib turgan yuzaga tarqalishini cheklaydigan yoki butunlay bartaraf etadigan texnologik jarayonlar joriy etiladi, mehnat qilish va dam olishning ma'lum tartibi o'rnatiladi; odamga tebranish ta'sir qilib turadigan vaqtini kamaytirish maqsadida ikki smenada ishlar olib boriladi.

Tebranishni so'ndiruvchi qo'lqop va poyabzal singari individual himoya vositalaridan keng foydalaniladi. Vibratsiya sharoitida ishlash va xavfsizlik texnikasi qoidalariga har bir ishchining be-kam-u ko'st riosa qilishi — kasallikning oldini olishda eng muhim chora hisoblanadi.

Vitaminlar, fizioterapeutik davo, badantarbiya, kurortlarda davolanish buyuriladi. Fizioterapeutik davo, diatermiya, UVCh, diadinamik tok bilan davolanadilar. Bundan tashqari, galvanik vannalar, uqalash, ultratovush gidrokortizon bilan, laziroterapiya, radonli, uglekisloserovodorod, brom, yodli vannalar va balchiqli applikatsiyalardan foydalaniladi.

12.4. Nur kasalligi

Ionlashtiruvchi nurlarning organizmga ta'sir etishidan paydo bo'ladigan kasallik. Nur kasalligi butun gavda yoki uning assosiy qismi tashqaridan nurlanganida, shuningdek, organizmga nafas, me'da-ichak yo'li va teri orqali radioaktiv moddalar kirishi natijasida, u ichkarida nurlanganida paydo bo'ladi. Ionlashtiruvchi nurlarning qisqa vaqt (bir necha minut, soat) ta'sir etishi natijasida

paydo bo'ladigan o'tkir va kamroq dozadagi nur uzoq vaqt (bir necha oylar va yillar) ta'sir etganda ro'y beradigan surunkali nur kasalligi farq qilinadi.

O'tkir nur kasalligi urush vaqtida, atom va termoyadro qurollari portlaganda, tinchlik paytida esa atom sanoati korxonalarida yoki ilmiy tadqiqot institutlarida sodir bo'ladigan avariyalar va baxtsiz hodisalarda kuzatiladi.

Surunkali nur kasalligi ishlab chiqarishda, tibbiyot va ilmiy tadqiqot muassasalarida, mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi qoidalari buzilganda vujudga keladi. Nur kasalligining turlari va klinik belgilari nurlanish xarakteri – umumiy, tashqi, ichki nurlanish dozasi va uning vaqt bo'yicha taqsimlanishiga bog'liq.

Klinikasi. Nurlanish kasalligida markaziy nerv sistemasi, qon yaratish organlari va qon aylanishi, me'da-ichak yo'li zararlanadi, bunda darmonsizlik, bosh og'rig'i, uyquning buzilishi, ko'ngil aynishi bilan kechadigan organizmning umumiy zaharlanishi kuzatiladi.

O'tkir nur kasalligida to'rt davr:

- birlamchi reaksiya davri;
- yashirin davr;
- zo'rayish;
- sog'ayish davri farq qilinadi.

Birlamchi reaksiya davrida qo'zg'alish yoki aksincha, bo'shashish, darmonsizlik, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, ich ketishi ro'y beradi. Ishtaha yo'qoladi, uyqu buziladi. Og'ir hollarda vaqtincha hushdan ketish mumkin. Kasallikning ikkinchi yashirin davrida bemorning umumiy ahvoli ancha yaxshilanadi. Lekin shunga qaramay, kasallik borgan sari zo'rayib boradi va biroz vaqt o'tgandan keyin (bir necha kundan 2–3 haftagacha) kasallikning uchinchi zo'rayish davri boshlanadi. Nur kasalligi qancha og'ir kechsa, yashirin davri shunchalik qisqa – bir necha soat davom etishi mumkin. Katta dozalarda nurlanganda, kasallikning zo'rayish davri umumiy ahvolning keskin yomonlashishi, gavda haroratining ko'tarilishi, ko'pincha qon aralash ich ketishi va qayt qilish bilan boshlanadi. Milk va boshqa shilliq pardalar qonab, yaraga aylanib ketadi, teri ostiga qon quyiladi. 2–3 haftadan keyin soch to'kila boshlaydi. Kamqonlik ro'y berib, asab buzila boshlaydi.

Nur kasalligi o'z vaqtida davolansa, oxirgi – sog'ayish davriga o'tadi. Bemorning ahvoli asta-sekin yaxshilanadi, harorati tushadi,

markaziy nerv sistemasining funksiyasi yaxshilanadi, qon tarkibi me'yorga keladi. O'tkir nur kasalligi bilan og'rigan bermorlarda tez toliqib qolish, bosh og'rig'i, kamqonlik, shuningdek, yuqumli kasalliklarga moyillik kabi asoratlar qoladi. Surunkali nur kasalligi yillab davom etishi bilan, o'tkir nur kasalligidan farq qiladi.

Ko'p hollarda nur bilan muloqotni to'xtatib, bermor ahvolini ancha yaxshilash mumkin. Muloqot davom ettirilganda, kasallik zo'rayib ketadi. Shuning uchun surunkali nur kasalligini davalashda bermorning ionlashtiruvchi nurlar manbayi bilan muloqoti tamomila to'xtatiladi.

Davolash va profilaktika. Nur kasalligining oldini olish uchun ionlashtiruvchi nurlar ta'sir etadigan joyda ishlovchilarni, shuningdek, radiologiya va rentgenologiya kabinetlarida davolanayotgan bermorlarni ortiqcha nur olishdan muhofaza etish kerak. Hozirgi vaqtida sog'liqni saqlash tashkilotlari xavfsizlik texnikasi va mehnat muhofazasi, shuningdek, radiatsion gigiyena talablariga amal qilish ustidan qat'iy nazorat o'rnatgan.

Ionlashtiruvchi nurlar manbayi bilan ishlovchi shaxslar ishga kirganlarida ham, keyinchalik ham maxsus tibbiyot tekshiruvidan o'tishlari zarur. Ishning turiga qarab, ularga qisqartirilgan ish kuni, uzaytirilgan ta'til va oyligiga qo'shimcha haq belgilanadi.

Radioaktiv izotoplar bilan ishlaganda maxsus kiyim (niqob, xalat, kombinezon, qo'lqop) kiyib olish zarur. Radioaktiv moddalar bilan bevosita muloqotda bo'lishni talab etuvchi ishlar ma'lum masofadan boshqariluvchi maxsus avtomatlashtirilgan, radiomanipulatorlar yordamida olib boriladi. Ionlashtiruvchi nurlar bilan ishlovchi kishilar organizmida o'zgarish bo'lsa, ular boshqa ishga o'tkaziladi.

Rentgen kabinetlarida zamonaviy apparatlar va maxsus himoya moslamalari bermorlar va tibbiyot xodimlarini rentgen nurlarining zararli ta'siridan himoya qiladi.

13-bob. O'TKIR ALLERGOZLAR. ALLERGIYA VA ALLERGIK KASALLIKLAR

13.1. Umumiy tushuncha

Allergiya so'zi yunoncha bo'lib, «*allos*» — boshqa, «*organ*» — ta'sir qilaman ma'nosini bildiradi. Demak, allergiya ta'sirga boshqacha javob berish demakdir.

1902-yilda venalik shifokor K. Pirket birinchi bor allergiya to'g'risida tushuncha berib, uning qonunlarini ishlab chiqdi. Zardob anafilaksiyasi hodisasini Artyus bilan bir vaqtida rus olimi G.P. Saxarov kashf etdi. Bu hodisa Artyus-Saxarov fenomeni deb ataladi.

A.M. Bezredka antianafilaksiya usulini ishlab chiqib, desensibilizatsiyalash usulini, ya'ni sensibillangan hayvonlarning ortiqcha sezgirligini, ularga bir moddalarning o'zini takror-takror yuborish yo'li bilan bartaraf etish usulini birinchi marta qo'llay boshladi.

Hozirgi zamонавиу тиббиётда allergiya deb, kishi organizmining har qanday yot moddalarga nisbatan sezuvchanligi oshib ketishi tushuniladi. Inson organizmiga tushib, uning sezuvchanligini oshiradigan har qanday yot narsalarga allergen deyiladi. Allergik kasalliklarni paydo qiluvchi allergenlar turli-tuman bo'lib, ularning soni 7000 dan oshadi.

A.D. Ado allergenlarni ikki katta guruhga — ekzoallergenlar va endoallergentarga bo'ladi.

Ekzoallergenlar — tashqi muhitdan organizmga tushib, uning sezgirligini oshiradi. Bular ham o'z navbatida, yana ikki turkumga — mikrobsiz allergenlar va mikroblı allergenlarga bo'linadi.

Mikrobsiz allergenlar:

1. O'simlik allergenlari: bu turli-tuman yovvoyi o'tlarning changi, guli va daraxtlar changi. Kasallik alomatlari shu o'simliklarning gullah davrida paydo bo'lib, gullah davri tamom bo'lishi bilan to'xtaydi.

2. Uy-ro'zg'or allergenlari: uy changi, kitob changi, yostiq pari va boshqalar.

3. Epidermal allergenlar: mushuk, kuchuk, quyon, eshak, ot, tuya, dengiz cho'chqasi, qo'y, echki, sigir va boshqa hayvonlarning junlari, hatto, odam mo'ylari ham shunga kiradi.
4. Kimyoiy allergenlari benzol, formalin, dust va boshqalar.
5. Dori allergenlari: penitsillin, streptomitsin, tetrasiklin, aspirin, B_1 vitamini va h.k.
6. Ovqat allergenlari: tuxum, baliq, yong'oq, asal, shokolad va boshqalar.
7. Uyda boqiladigan baliqlarga beriladigan dafniya, gamarus, motil.
8. Hasharotlar allergenlari va ularning zararlari: tangachalari, tanasi, asalari, qovog'ari, beli ingichka arilarning zahari. Ular chaqqanda organizm sezgirligini zahariga nisbatan oshiradi.
9. Zardob allergenlari: odam organizmiga turli yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash maqsadida qo'llaniladigan zardoblar.

Mikrobbi allergenlarga Kox tayoqchasi, stafilokokk, streptokokk, pnevmokokk va boshqalar, zamburug' allergenlar, virusli allergenlar kiradi.

Endo (ichki)allergenlarga autoallergenlar kiradi. Bunda organizmnning kasallangan biror joyidagi hujayra va to'qimalar o'sha organizmnning o'ziga begona bo'lib qoladi va turli kasalliklarning avj olishiga sabab bo'ladi.

13.2. Anafilaktik shok

Anafilaksiya yunon so'zidan olingan bo'lib, «*ana*» — yana, «*aphylaxis*» — himoyasiz, himoya qila olmaydigan ma'nosini bildiradi. Uchrab turadigan hamma shokning, shu jumladan, anafilaktik shokning umumiyligi xususiyati turli a'zo to'qimalarining qon bilan ta'minlanishining batamom izdan chiqishidir. Anafilaktik shok yurak va qon aylanish doiralarining o'tkir buzilishi oqibatida quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi.

1. Teri rangining oqish-ko'kimtir yoki marmarsimon rangga kirishi, sovuq, nam bo'lishi.
2. Tirnoqosti sathida qon oqishining haddan tashqari sekinalashuvi.
3. Halovatsizlik, es-hushning xiralashuvi.
4. Hansirash, nafas olishning qiyinlashuvi — dispnoe.
5. Siyidik miqdorining kamayishi, ya'ni kam siyish — oliguriya.

6. Tomir urishning tezlashuvi — taxikardiya.
7. Qon bosimining pasayib ketishi kabi holatlar ana shular jumlasidandir.

Shokning belgilari mayda (kapillar) qon tomirlarga qon kelishining kamayishidan boshlanadi. Shuning uchun ham teri sovuq, nam va ko'kimir-oqish tusga ega bo'ladi. Bosh miyaga qon kelishining kamayishi, avvaliga, bemorda bezovtalik belgilarini keltirib chiqarsa, keyinchalik es-hushning xiralashib, yo'qolishiga olib keladi.

Nafas a'zosi bo'lmish o'pkaga qon kelishining kamayishi, o'z navbatida, nafas qisishiga olib kelsa, ajralib chiqayotgan siyidik miqdorining kamayishi — buyrak doirasida qon aylanishining kamayishi oqibatidir.

Kasallik sabablari:

1. Tashxis va davolash maqsadida ishlatiladigan vositalar — dori-darmonlar, immun zardoblar; o'zida yod saqlagan rentgen kontrast moddalar va boshqa turli testlar uchun; teri orqali allergik kasalliklarni davolash va aniqlash maqsadida ishlatiladigan allergenlar; kolloid holatdagi qon o'rnnini bosuvchilar; qon quyish hamda shu jarayonda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatoliklar.

2. Hayvonlar zahari: asalari, oddiy beli ingichka ari, qovog'ari va boshqalar chaqqanda.

3. Dori-darmonlar ishlatishdan kelib chiqadigan anafilaktik shokni ularning tutgan o'rniqa qarab quyidagilarga bo'lish mumkin:

- tabiiy (penitsillin, bitsillin) va yarim sintetik penitsillinlar (oksatsillin, ampitsillin va boshq.) guruhi;

- tetrasiklin guruhiiga kiruvchi dori-darmonlar, (tetrasiklin, rondonmitsin, metasiklin, morfosiklin, glikosiklin va boshq.);

- streptomitsin va aminoglikozidlar (neomitsin, kanamitsin, gentamitsin va boshq.) guruhi;

- fenotiazid va ba'zi bir xil gistaminga qarshi ishlatiluvchi dorilar (aminazin va uning analoglari pipolfen, diprazin);

- o'z tarkibida yod saqlaydigan barcha dori-darmonlar (Lyugol eritmasi, sayodin, yod, kontrast dorilar);

- B₁ vitamini (tiamin bromid) va kokarboksilaza;

- barbituratlar (fenobarbital medinil va boshq.) guruhiiga kiruvchi dorilar;

- pirazolin turkumiga kiruvchi dorilar (analgin, antipirin, amidopirin, butadion), asetilsalitsilat kislota va fenilpropianatlari (brufen va boshq.);

- novokain sulfanilamid va uning turkumiga kiruvchi dorilar;
- etilendiamen (suprastin va boshq.) guruhi bilan eufillin guruhi;
- sefalosporin guruhi.

Odatda, anafilaktik shok konstitutsiyasida anomaliyasi bo'lgan hamda allergik kasalliklarga moyilligi bor bolalarda yoki katta yoshdagilarda sodir bo'ladi.

Klinikasi. Kasallikning ikki xil ko'rinishi bo'lib, ularning belgilari jihatidan juda tez o'tadigan hamda sekinroq rivojlanadigan turlari bo'lishi mumkin.

Tez, yashin tezligida o'tadigan anafilaktik shokda kasallikning belgilari haddan tashqari tez boshlanib, rivojlanadi va bir necha daqiqa davomida o'lim bilan tugaydi. Bemorlarda oldiniga holsizlik, to'sh orqasida og'riq, ko'ngil aynishi, o'lim talvasasi paydo bo'lib, tezda hushini yo'qotadi. Bularning hammasi shunchalik tez sodir bo'ladiki, bemor qanday qilib hushini yo'qotganligini aytib ulguradi, xolos. Bu holda bemordan sovuq ter chiqib, rangi bo'zarib ketadi. Ayniqsa, yuz ko'rinishi alohida tusga kirib, bir necha daqiqa ichida o'zgarib ketadi. Tomir urishi ipsimon, kuchsiz va yuzaki yoki bilinar-bilinmas bo'ladi.

Kuchsiz va yuzaki tomir urishi sharq tibbiyotida «vey» deb ataladi, tomirni qattiqroq bosib ko'rish bilan aniqlanadi. Bunday puls — «vey» odam tanasining quvvati nihoyatda pasayganda sodir bo'ladi, qattiq ko'ngil ozishi, terlash alomatlari bilan kechib, kasallikning nihoyatda xavfiliqidan darak beradi.

Bilinar-bilinmas puls yuzaki va ipsimon bo'lib, ipak matosining suv yuzasida qalqib yurishiga o'xshaydi. Bunday pulsning paydo bo'lishi qon aylanmayotganligidan va kislород yetishmasligidan dalolat beradi. Jigarda va buyrakda xavfli bo'shliq paydo bo'lganligi hamda uni tezda tiklash darkorligini ko'rsatadi. Bunda qon bosimi bir zumda pasayib, uni aniqlash qiyin bo'ladi, ko'pincha og'izdan ko'pik ajraladi. Agar anafilaktik shok halqum shishi bilan sodir bo'lsa, stridor tusga kiradi (stridor — hiqilda o'sgan o'sma, hiqildaq mushaklari innervatsiyasining buzilishi tufayli vujudga keladigan xirillab ovoz chiqishi). Bunda bemorning terisi ko'karib, bo'yin venalari bo'rtib chiqqani yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ko'pincha bemorda klinik tortishuvlar alomatlari sodir bo'lib, u siyidigi va ichini tutolmaydi. Ayrim hollarda tabiiy a'zolarning teshiklaridan (og'iz, qulqoq, jinsiy a'zolardan) qon ketishi alomati ham kuzatiladi.

Anafilaktik shokning sekinroq o'tadigan turida kasallikning shiddatli boshlanishi kuzatilmaydi. Bemor tanasida issiqlik belgisi, qulq shang'illashi, holsizlik, tomoq qichishi alomati, ko'z shilliq pardasida yallig'lanishi, yosh oqishi, quruq qattiq chiyillash alomati bilan yo'tal, butun organizm bo'ylab qichishish sezgisi, qorinda tutib-tutib bo'ladigan qattiq og'riq, ich ketishi va siyishga kuchanish alomatlari (tenezmlar) paydo bo'ladi.

Bemor ko'zdan kechirilganda, terining qizarishi, qavariq toshmalarining toshishi, ko'z qovoqlarida va qulq pardasida shish bilan bir qatorda, allergik konyunktivit, rinit, o'pkada esa chiyillagan xirillash alomatlari kuzatiladi. Qon bosimi pasayib, katta yoshdagilarda simob ustuni hisobida 70/40 mm, bolalarda esa bundan ham past bo'ladi.

Bu belgilardan so'ng bemorda alahlash alomatlari paydo bo'lib, es-hushini yo'qotadi, ko'z qorachiqlari kengayib, yorug'likda o'zgarmaydi. Tez hushini yo'qotish, o'tkir kollaps va tirishish bilan ro'y beradigan shiddatli anafilaktik shok xavfli holat bo'lib, bir necha daqiqa ichida bemorni o'limga mahkum qilishi mumkin.

Ba'zi hollarda bemor anafilaktik shok sababli kechikkan asoratlar – allergik miokardit, buyrakning yallig'lanish kasalligi, jigar kasalliklari paydo bo'lib, bu asoratlar bemorning o'limiga ham sababchi bo'lishi mumkin.

Boshdan kechirilgan anafilaktik shokdan 1—2 hafta o'tgandan keyin, bemorda diqqinafas (bronxial astma), qaytalovchi eshakemi, kvinks shishi va boshqa kasalliklar vujudga kelishi ham mumkin.

Davolash va profilaktikasi. Anafilaktik shokda bemorga zudlik bilan yordam ko'rsatish uchun ikki shifokor, tajribali hamshira kerak. Bir shifokor kasalning qon bosimini o'chashi bilan band bo'lsa, ikkinchisi bemorga dori-darmonlar buyurib, uni hamshira yordamida amalga oshirish bilan shug'ullanadi.

Bemorning qon o'zaniga shokka sababchi allergenning tushishini to'xtatish darkor. Buning uchun dori yuborilgan yoki hasharot chaqqan joydan yuqoriga jgut bog'lanadi.

Anafilaktik shokda dori-darmonlar ichida tez yordam berib, o'limdan olib qoladigan adrenalin va uning guruhidagi preparatlar hisoblanadi. Shuning uchun ham shifokor anafilaktik shok kasalligida bemor og'ir xavfli holatdan chiqib, qon bosimi ko'tarilgunga qadar adrenalin qo'llash kerakligini unutmaysligi lozim.

Avvalo, hasharot chaqqan joy atrofiga teri ostiga, mushak orasiga 0,1 %—0,3—05 ml adrenalin eritmasi yuboriladi. Hasharot chaqqan joydan uning nishtarini olib tashlash kerak. U joyni uqalash man etiladi, chunki har bir uqalash harakati qon tomirlariga allergen surilishini tezlashtiradi.

Teri ostiga 0,1 % adrenalin 1—2 ml, kordiamin 25 %—1—2 ml, kofein 10 % 2 ml teri ostiga yuboriladi. Prednizolon venaga, gidrokartizon esa bir vaqtning o'zida mushak orasiga yuborilishi kerak. Adrenalin bilan muolaja qilish 10—12 daqiqada o'z ta'sirini ko'rsatmasa, qon bosimi ko'tarilgunga qadar yana adrenalin qo'llash kerak bo'ladi. Adrenalinni 20 ml —40 % li glukoza bilan venaga yuborish mumkin.

Boshqa vena tomiriga 150—200 ml 5 % li glukozaga 0,5 ml adrenalin yoki noradrenalin aralashtirilib tomchi usulda yuboriladi. Lozim topilsa, ana shu eritmaga 0,05 %—0,5 ml yoki 0,06 —0,5 % li korglukon prednizolon qo'shish mumkin. Kasallikka o'pka shishi qo'shilgan hollarda bu aralashmaga furasemid eritmasini aralashtirish mumkin. Chap yurak og'izchasida yetishmovchilik hamda bronx mushaklarida spazm sodir bo'lsa, 0,9 % li fiziologik eritmaga strofanitin yoki korglukon, eufillin qo'shib tomir ichiga yuboriladi.

Penitsillin antibiotigini qo'llashdan kelib chiqqan anafilaktik shokda mushak orasiga bir marta 1000000 TB penitsillinazani 2 ml fiziologik eritmada eritib yuboriladi. Agar shok bitsillindan kelib chiqsa, 3 kun mobaynida bir mahal penitsillinaza yuboriladi, bolalarga esa 60000 TB qo'llaniladi.

Yurak to'xtab qolgudek bo'lsa, uzun muolaja ignasi yordamida bolalarga 0,3—0,5ml, katta yoshdagilarga esa 1 ml 0,1 % li adrenalin yurak ichiga kiritilib, yurak atrofida yopiq uqalanib, sun'iy nafas oldiriladi.

Tirishish alomatlari paydo bo'lganda, tomir ichiga droperidol 0,25 %—1 ml yuboriladi.

Gistaminga qarshi ishlatiladigan dori-darmonlarni juda ehtiyyotlik bilan qo'llash lozim bo'ladi, chunki bu dorilarning ko'p qismi miyaning po'stloq qavatiga ta'sir qilib, chuqur uyquga sabab bo'ladi va qon bosimini tushiradi. Shularni hisobga olgan holda gistaminga qarshi ishlatiladigan dorilarni qon bosimi ko'tarilgandan keyin zarurat bo'lgandagini qo'llash kerak bo'ladi.

Anafilaktik shok dori-darmonlar yoki ovqat iste'mol qilish oqibatida kelib chiqqan bo'lsa, darhol oshqozonni yuvish va huqna qilib, tanani allergen qoldiqlaridan tozalash lozim bo'ladi.

Agar burunga, ko'z shilliq qavatiga allergen dori tomizish oqibatida shok kelib chiqqan bo'lsa, darhol bu sohalarni oqib turgan suv bilan yuvib, 0,1 % li adrenalin yoki 1 % li gidrokortizon tomiziladi.

Bemorlar anafilaktik shok holatidan chiqarilgandan so'ng 12 kungacha kasalxonada yotishi kerak, chunki bemorda shok holati qaytalanishi mumkin. Elektrokardiogramma va laboratoriya ko'rsatkichlari yaxshi bo'lgandagina uyiga ruxsat beriladi.

Anafilaktik shokda kalsiy glukonat yoki kalsiy xlorid, natriy tiosulfat, novokain kabilarni ishlatalish mumkin emas.

Kasallikning oldini olish chora-tadbirlarini qo'llash lozim. Allergik sezgilari bor har bir bemorga dori-darmon berishdan oldin aniq anamnez yig'iladi. Ayniqsa, boshidan anafilaktik shok xastaligini kechirgan bemorlarga bir vaqtning o'zida 2—3 dorini buyurishdan ehtiyyot bo'lish darkor. Ular shifokorming qattiq nazorati ostida davolanishlari shart.

Ovqat tanovul qilish sababli kelib chiqadigan anafilaktik shokning oldini olish, dori-darmonlardan, sovuqqa allergiyasi bor bemorlar ham allergologiya xonasi yoki markazida dispanser kuzatuvi ostida bo'lishi kerak. Bemorlar ham o'zları qaysi modda va mahsulotlardan allergiyasi borligini bilishlari hamda davolash jarayonida buni shifokorlarga ma'lum qilishlari darkor.

13.3. Dori allergiyasi

Hozirgi vaqtida kasalliklarni davolash maqsadida juda ko'p turlituman dori-darmonlar ishlatilmoqda. Tibbiy amaliyatda qo'llanilayotgan dorilarning soni 6000 turdan oshib ketdi. Keyingi yillarda nerv sistemasini tinchlantiruvchi, uxlaturuvchi, kishi ruhiyatiga ta'sir qiluvchi dorilar va antibiotiklar keng qo'llanilmoqda.

Dorilarni qo'llash natijasida kelib chiqadigan kasalliklarning sababi turli-tuman bo'lib, bularga allergik oqibatlardan tashqari, dorilar dozasining oshib ketishi, sitotoksik hamda immundepressiv holatlar va boshqa xastaliklar kiradi.

Ba'zi holatlarda dori birinchi marta a'zoga kiritilgan zahoti allergik reaksiya paydo bo'ladi, buning boisi ham struktura guruhining bir xilligidir. Kollagenozlar bilan og'rigan, terining zamburug'li va yiringli kasalliklari bilan kasallangan bemorlarning ko'pchiligi dori allergiyasiga moyil bo'ladilar. Nasl-nasabida allergik

kasalliklarga moyillik bo'lgan, allergik diatezi bor bemorlarda ko'pincha dori allergiyasi ham uchraydi.

Klinikasi. Dori allergiyasining klinik ko'rinishlari juda turli-tuman bo'lib, u anafilaktik shok, eshakemi, Kvinke shishi, zardob kasalligi, atopik bronxial astma, Artyus fenomeni, qondagi o'zgarishlar, Layell sindromi va boshqa kasallik belgilari sifatida kechadi. Yuqorida qayd qilib o'tilgan kasalliklarning ko'pchiligi bemor uchun xavfli.

*Dori allergiyasi oqibatida kelib chiqadigan
Artyus fenomeni*

1903-yilda fransuz olimi Artyus Nikolas Moris quyonlar terisi ostiga 5—7 marta ot zardobi yuborganda, dori kiritilgan joyda yallig'lanish yuzaga kelib, to'qimalarda chirish alomati paydo bo'lishini kuzatdi va bu antigen bilan antitana o'rtasida borayotgan reaksiya natijasida paydo bo'lganligini isbotlab berdi. Bu o'ziga xos reaksiya bo'lib, bir hayvon qon zardobi ikkinchi hayvon terisi ostiga qaytiy yuborilganda, shu oqsil modda (zardob)ga to'qima sezuvchanligining oshib ketishi natijasidir. Keyinchalik bunday hodisani odam organizmining biror doriga nisbatan sezgirligi oshib ketganda kuzatish mumkin bo'ladi. Bunda paydo bo'ladiqan belgililar Artyus fenomeni deb ataladi.

Bunday allergik reaksiya antibiotiklarni va boshqa dorilarni dumba mushaklari orasiga yuborilganda og'riqli shish, bitmaydigan oqma yara paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Muolaja qilingan sohada qattiqlik, qichishish, qattiq og'riq paydo bo'ladi. Bu fenomenni inyeksiya natijasida, ya'ni aseptikaning buzilishidan kelib chiqadigan absessdan farq qilishi kerak.

Laboratoriya tahlili. Dori allergiyasining birinchi kuniданоq, oq qon tanachalarining miqdori oshib ketadi — leykositoz, neytrofillar soni kamayadi — neytropeniya, limfotsitlarning miqdori ham kamayadi — limfopeniya, eozinofillar esa oshib ketadi — eozinofiliya. Remor tuzalayotgan davrda esa leykotsitlarning miqdori kamayib, leykopeniya, qonning boshqa tarkibiy qismlarining oshishi kuzatiladi.

Agranulositoz, odatda, dori allergiyasi oqibatida paydo bo'lib, isitma va qonda granulotsitlarning bo'lmasligi bilan ta'riflanadi. Yuqorida ko'rsatilgan kasallikklardan tashqari, dori allergiyasi

natijsida kamqonlik va purpura (trombotsitlar)ning kamayib ketishidan yoki bunga bog'liq bo'limgan holda kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin.

13.4. Kvinke shishi. Eshakemi

Bu kasallik klinik belgilarini birinchi marta nemis shifokori, ichki kasalliklar mutaxassisini Kvinke (1842—1922) tasvirlab bergen. Kasallik a'zolarining shilliq qavatlarida teri osti yog' qavatlarida chegaralangan yoki diffuz shish paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Kvinke shishi 20 yoshdan keyin uchraydi.

Allergik kasalliklarning ko'payishi munosabati bilan Kvinke shishi ko'krak yoshidagi boladan tortib 71 yoshgacha uchramoqda. Ko'pincha bu kasallikka erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq chalinadi.

Kvinke shishi ikki turkumga bo'linadi:

1. Atopik, ya'ni allergik Kvinke shishi.
2. Tug'ma, noallergik Kvinke shishi.

Tug'ma Kvinke shishi qon zardobida C'-l-esteraza ingibitorining yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan bemorlarda uchraydi.

Atopik Kvinke shishi bilan eshakemi o'rtasida uzviy bog'lanish bor. Avvalo, bu kasalliklarning sababchilari bir xil bo'lgani holda bemor organizmi reaktivligining o'zgarishi bilan bog'liqidir.

Allergik xususiyatga ega bo'limgan Kvinke shishi go'daklikdan boshlanib, oila a'zolarining ko'pchiligidagi uchraydi. Bu turdagagi Kvinke shishi nasldan nasiga dominant ko'rinishda o'tadi. Bu ikki xil turdagagi Kvinks shishini farqlashda batatsil yig'ilgan allergologik tahlil yordam beradi.

Etiologiyasi. Kvinke shishi paydo bo'lishida ekzo va endoallergenlar sabab bo'lishi mumkin.

O'simlik changlari ko'pincha Kvinke shishining kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. O'zbekiston iqlim sharoitida o'simlik changlaridan polin (sho'ra), makkajo'xori, chinor guli changlari ko'pincha Kvinke shishi va eshakemi xastaliklari rivojlanishiga olib keladi. Turmush allergenlari: uy changi, yostiq pari, dafniya, kitob changi, jun changlari, gilam changlari ham Kvinke shishi xastaligiga olib keladi. Zardoblar — bo'g'ma, qoqshol kasalligi (stolbnyak) va ko'kyo'talga qarshi ishlataladigan zardobga nisbatan umumiylar harorat ko'tarilishida Kvinke shishi bilan eshakemi birgalikda kuzatiladi.

Zardob yuborilgandan so'ng tananing har yerida qichishish alomati paydo bo'lib, keyin qavariqsimon toshmalar toshadi. Kvinke shishi ko'pincha labda va ayollarning genitaliy a'zolarida kuzatiladi.

Doriga nisbatan terida kelib chiqadigan allergik reaksiyalar orasida eshakemi va Kvinke shishi birinchi o'rinda turadi.

Antibiotiklar ichida penitsillin eshakemi va Kvinke shishini keltirib chiqarishda katta rol o'ynaydi. Ko'pchilik bemorlarda bir vaqtning o'zida 2—3 xil doriga allergik reaksiya borligi aniqlanadi.

Amaliy tibbiyotda ishlayotgan shifokorning, ba'zan bemorlarda qaysi dori-darmonga allergik reaksiya bo'lganligini aniqlab olishi tobora mushkul bo'lib qolyapti. Dorilarga sezgirligi oshib, Kvinke shishini boshidan kechirgan bemorlar sezgirlik oshishiga sababchi bo'lgan dori preparatining hidiga yoki juda oz miqdoriga ham kuchli reaksiya berish qobiliyatini saqlab qoladilar.

Hasharotlar chaqishi — asalari, qovog'ari, beli ingichka ari, uy kanasi va boshqa hasharotlar chaqishiga allergik reaksiya tobora ko'payib, xatarli tus olmoqda. Hasharotlar chaqish soni ham odam tanasi sezgirligini oshirib, allergik reaksiyaning turiga ham ta'sir qilar ekan. Masalan, hasharotlarni birin-ketin chaqishi natijasida allergik reaksiyaning bosqichma-bosqich rivojlanishi tajribada isbotlangan.

Oddiy kimyoviy moddalar, pardoz buyumlari ham allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi — har xil kir yuvish vositalari, turli pardoz bo'yoqlari, kremlar, soch, qosh va kipriklarga qora rang beruvchi ursol kuchli allergiklik xususiyatiga ega.

Fizik omillar — odam tanasiga ta'sir qiladigan quyosh nuri, yuqori yoki past haroratning ta'siri — bronxial astma, allergik rinit konyunktivit, fotofobiya, eshakemi, Kvinke shishi va anafilaktik shok ko'rinishlarida namoyon bo'lishi mumkin. Sovuq ta'sirida yuzaga keladigan eshakemi va Kvinke shishi paydo bo'lishida organizmdagi surunkali infeksiya o'choqlari turtki vazifasini o'tashi ehtimoldan xoli emas (tanzillit, yiringli gaymorit, surunkali kolit).

Gijjalar, yuqumli kasalliklar, oziq-ovqat mahsulotlari eshakemi va Kvinke shishi xastaligini keltirib chiqaradi.

Endogen sezgirlikning oshishi — hayz ko'rish davri, homildaorlik, xavfli o'sma (saraton) kasalliklari ham eshakemi va Kvinke shishi xastaligini rivojlanishi hamda u bilan birqalikda kechishi mumkinligi tajribada isbotlangan.

Klinikasi. Kvinke shishining belgilari nihoyatda o'ziga xos bo'lib, unga tashxis qo'yish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi.

Kasallik to'satdan boshlanadi, tana harorati ko'tarilib, 38—39°C gacha boradi. Kvinke shishida, eshakemi toshmalaridan farqli ravishda qichish sezgisi bo'lmaydi. Ko'pincha labda, ko'z qovoqlarida, jinsiy a'zolarda (erkaklarda ko'pincha yorg'oqda) dastlab achishish, uvushish, bir narsa bosganga o'xhash sezgilari paydo bo'lib, keyin tez orada qichishish sezgisi bo'lmagan oqish rangli shish paydo bo'ladi. Shunday shish dumbada, yelkada, oyoq-qo'llarda ham bo'lishi mumkin. Bu shishni barmoq bilan bosib ko'rilsa, hech qanday chuqurcha hosil bo'lmaydi. Kvinke shishi qoldiqsiz yo'qoladi.

Kvinke shishining tarqalgan shakli teridan tashqari, og'iz bo'shilg'i shilliq qavatini, tilni, tilchani, yumshoq tanglayni va bodomchasimon bezlarni qamrab oladi. Ba'zida til shu qadar shishib ketadiki, u og'iz bo'shilg'iga sig'may qolishi mumkin. Bu holda yutish, gapirish juda qiyinlashadi. Ba'zan Kvinke shishi ko'krak qafasi terisida paydo bo'lsa, bemor qizilo'ngachdan ovqat o'tishi go'yo qiyinlashgandek his qiladi, chunki Kvinke shishi to'sh orqasida og'riq sezgilarini paydo qilib, ko'krak qafasi orqasida og'riq bir narsa borday tuyuladi.

Halqum sohasidagi Kvinke shishi o'zi yakka holda yoki teridagi Kvinke shishi bilan birgalikda paydo bo'ladi. Kasallik belgilari haddan tashqari tez yuzaga kelib, oldiniga bemor bezovtalanadi, o'zini qo'yishga joy topolmaydi, nafas olishi og'irlashadi, u shovqinli tus olib, afoniya paydo bo'ladi, tovush o'zgaradi. Bemor yuzida, bo'ynida ko'karish alomati paydo bo'lib, qon tupuradi. Xuruj belgilari bir necha minutdan yarim soatgacha davom etib, belgililar asta-sekin yo'qoladi.

Kasallikning og'ir hollarida esa shish tez kattalashadi, nafas qisishi, bo'g'ilishi o'sib boradi. Agar tezda traxeostomiya qilinmasa, bemor bo'g'ilib, asfiksiyadan o'ladi.

Kvinke shishi va eshakemi qorin usti terisida paydo bo'lsa, xuddi shunday shish va qavariqsimon toshmalar ichak shilliq qavatlariga ham tarqalishi mumkin. Lekin ko'p hollarda Kvinke shishi ichaklarda yakka holda paydo bo'lishi ham mumkin. Kasallik bordaniga boshlanib, bemor oldiniga ovqat qoldiqlarini, keyin tiniq suyuqlikni qusib tashlaydi. Qusish qorinda juda qattiq og'riq bilan davom etadi. Qusish safro aralash qayt qilish bilan tugashi mumkin.

Kvinke shishi paydo bo'lgan ichak shilliq qavatlarining yuqori qismida ichak harakatlari (peristaltika) yaqqol ko'zga tashlanib, qabziyat (meteorizm) boshlanadi. Agar shish juda katta hajmda

bo'lsa, ichak bo'shlig'i batamom bekilib qolib, ichak devorlarining oziqlanishi buzilishi mumkin.

Ichak yo'llari Kvinke shishi tufayli bekilib qolsa, ichak harakati izdan chiqadi, butun og'iz bo'shlig'ida kuchli og'riq paydo bo'lib, bu og'riq, ayniqsa, yo'g'on ichakning taloq burchagida nihoyatda kuchli bo'lib, Shyotkin belgisi paydo bo'ladi.

Davolash. Kvinke shishini davolash tadbirlari uch guruhga bo'linadi:

1. Dori-darmonlar bilan davolash.
2. Spetsifik usul bilan davolash.
3. Dorilarsiz davolash.

Dori-darmonlar bilan davolash shifokor nazorati ostida, uning ko'rsatmalariga binoan amalga oshiriladi. Asosan, gistograminga qarshi ishlataladigan dorilardan boshlanadi. Gistograminga qarshi dorilarni qo'llashda uning uch davrini hisobga olishga to'g'ri keladi: birinchi davri – davolash ta'siri hosil bo'lish davri; ikkinchi davri – o'r ganib qolish; uchinchisi – allergik asoratlar davri. Ikkinci va uchinchisi davrning bo'imasligi uchun gistograminga qarshi ishlataladigan dorilarni qisqa muddatga 12–15 kunga buyurib, so'ngra almashtirish lozim. Kunduz kuni gistograminga qarshi ishlataladigan bir xil dorini qo'llab, kechqurun muolaja uchun ikkinchi xilini qo'llagan ma'qul.

Agar Kvinke shishi hqilda qo'llashda paydo bo'lsa, bemorni tezda otorinolaringologiya bo'limiga yotqizish lozim. Kasalxonaga bunday bemorlarni jo'natishdan oldin teri ostiga yoki tomir ichiga 0,1 % li adrenalin eritmasidan 0,5 ml, 1–2 ml suprastin yoki tavegil preparatlardan mushak orasiga yuborish kerak. Shu bilan bir qatorda, tomir ichiga yoki mushak orasiga prednizolondan 30–60 mg yuboriladi.

Otorinolaringologiya bo'limida bu dorilarni qo'llashni yana takrorlash kerak bo'ladi. Bu joyda prednizolon va suprastinni 40 % li glukoza eritmasiga qo'shib, tomir ichiga yuboriladi. Katta yoshdag'i odamlarga prednizolon 60 mg, suprastin 2 ml qo'llanishi lozim. Irsiy idiopatik Kvinke shishi hayot uchun xavflidir. Bunday bemorlarda shish hqilda qo'llashni yoki ichak devorida paydo bo'ladi. Gistograminga qarshi dorilar, glukokortikoidlar yordam bermaydi.

Bunday bemorlarning tahlilidan oldin traxeostomiya yoki palaratomiya qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotni olish mumkin. Bunday irsiy Kvinke shishida E-aminokapron kislotani ichish va tomir ichiga yuborish buyuriladi. Xolinergik Kvinke shishida belladonna preparatlari yaxshi natija beradi.

Spetsifik usul bilan davolash surunkali qaytalovchi Kvinke shishida qo'llaniladi. Topilgan allergenga sezgirlik nuqtasi aniqlangan bemorda maxsus usullar (muolaja, elektroforez va boshq.) qo'llash bilan sezgirligi pasaytiriladi, ya'ni tibbiy ibora bilan aytganda, giposensibilizatsiya qilinadi. Sababchi allergen topilmagan taqdirda, surunkali qaytalovchi Kvinke shishini gistaminning yuqori konsentratsiyali eritmasidan boshlab davolash yaxshi natija beradi. Kvinke shishining sababchisi allergenli ovqat bo'lsa, eliminatsiya parhezi qilib, yaxshi natijaga erishish mumkin. Agar sigir sutiga nisbatan Kvinke shishi paydo bo'lsa, shu sut bilan giposensibilizatsiya qilish ham mumkin.

Hozirgi vaqtida allergen topilmagan Kvinke shishida gistoglobulin va allergoglobulinlarni ham qo'llash tavsiya qilinadi. Ularni qo'llash bir yilgacha kasallikning qayta avj olishiga yo'l qo'ymaydi.

Dori-darmonlarsiz davolash usuli — igna bilan olib boriladi.

Profilaktikasi. Kasallikning oldini olish uchun nasl-nasabida allergik kasalliklari bo'lgan bemorlar bilan, ayniqsa, ota-onasida allergiya bo'lgan-bo'lmaganligini so'rash kerak. Ularga allergik xossalari bo'lmagan parhez taomlar buyuriladi. Dori-darmonlarni ham ehtiyyotlik bilan, zarur ko'rsatmalar bo'lgan hollardagina buyurish kerak.

Surunkali oshqozon-ichak kasalliklarini davolashga ahamiyat berish lozim. Infeksiya o'choqlarini yo'qotish choralarini ko'rish darkor. Ayniqsa, bemorlarda gijja kasalliklari bo'lsa, ularni kechiktirmay oila a'zolari bilan birga davolash zarur. Kvinke shishi bilan kasallangan bemor allergologik kabinetlarning allergolog nazorati ostida turishi lozim.

14-bob. GIPO VA AVITAMINOZLAR

14.1. Vitaminlar to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar

Fiziologik ma’lumotlar. Oziq-ovqat mahsulotlarida vitaminlar borligini 1880-yilda rus tadqiqotchisi N. Lunin birinchi marta aniqlagan. 1911-yilda esa polyak tadqiqotchisi Kazimir Funk bu biologik aktiv moddalarni turli mahsulotlardan ajratib olgan. Hozirgi vaqtida 50 dan ortiq juda ko‘p har xil turlari ma’lum. Vitaminlarning har biri muayyan xossalarga ega va organizmga o‘ziga xos ta’sir etadi.

Vitaminlar lotincha so‘zdan olingan bo‘lib «vita» — hayot, «amin» — guruh ma’nosini bildiradi. Ya’ni darmondori ma’nosini o‘zida namoyon qiladi. Odam, hayvon va o‘simliklar organizmining hayot faoliyati uchun zarur moddalar — vitaminlarning kashf etilishi rus olimi N. Lunin nomi bilan bog‘liq. Vitaminlar organizmga, asosan, oziq-ovqatlar bilan kiradi. Ularning ba’zilari ichakda mikroorganizmlar ta’sirida sintezlanadi, lekin hosil bo‘lgan vitamin miqdori organizmni ehtiyojini to‘la qondira olmaydi. Vitaminlarning biologik ahamiyati moddalar almashinuviga rostlovchi ta’sir etishidan iborat.

Vitamin organizmda sodir bo‘ladigan kimyoviy reaksiyalarni kuchaytiradi, organizmning oziq moddalarni o‘zlashtirishiga ta’sir ko‘rsatadi, hujayralarning normal o‘sishiga va butun organizmning rivojlanishiga yordam beradi, organizmda fermentlar tarkibiga kirib, ularning normal funksiyasi va aktivligini ta’minlaydi. Shunday qilib, organizmda biror vitamin yetishmasa yoki butunlay yo‘q bo‘lsa, moddalar almashinuvi buziladi. Oziq-ovqatda vitaminlar yetishmaganda, insonning mehnat qobiliyati pasayib, organizm kasalliklarga hamda tashqi muhitning noqulay ta’siriga bardosh bera olmaydi. Vitamin yetishmasligi yoki mutlaqo bo‘imasligi natijasida avitaminoz yoxud gipovitaminoz kelib chiqadi.

Vitamin yetishmasligiga ovqat ratsionida vitamin kam bo‘lishigina emas, balki ularning ichakda so‘rilishi, to‘qimalarga yetkazib berilishi va biologik aktiv shaklga aylanishining buzilishi ham sabab bo‘ladi.

Shunday qilib, organizmda vitamin normal o'zgarish siklining buzilishi vitamin yetishmasligiga olib keladi. Me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi, kolit, jigar kasalligi va boshqa ko'pgina kasalliklarda vitaminning hazm bo'lishi buziladi va endogen vitamin yetishmasligi paydo bo'ladi. Vitaminlardan tashqari, organizmda turli o'zgarishlarga uchrab vitaminlarga aylanadigan moddalar — provitaminlar ham ma'lum.

Provitaminlarga karotinlar (*A* provitaminini), *D* vitaminiga aylanadigan ba'zi bir sterinlar (ergosterin 7-degidroxolestirin va boshq.) kiradi.

Vitamin yetishmasligi odam iste'mol qiladigan ovqat tarkibida vitaminlarning yetarli bo'lmasligi, ularni o'zlashtirishning buzilishi yoki ichak mikroorganizmlari tomonidan vitaminlar sintez qilinishining pasayishi sababli kelib chiqadigan kasallik holatiga tushuniladi. Doim bir xil ovqat yeyishi oqibatida ovqatda vitaminlar miqdori kamayib, organizmgaga uglevodiarning ko'p, hayvon oqsili va yog'larning kam tushishi, ovqatda sabzavot va mevalar bo'lmasligi, shuningdek, mahsulotlarni noto'g'ri saqlash va ovqat pishirganda va vitaminlarning parchalaniib ketishi vitamin yetishmasligiga sabab bo'ladi. Organizmnинг vitaminlarga bo'lgan ehtiyoji ortishiga olib keladigan omillar, masalan, aqliy va jismoniy toliqish, ruhiy iztirob, havo haroratining yuqori yoki past bo'lishi, kislород tanqisligi, homiladorlik va bola emizish davrida ham (organizmgaga vitamin yetarli tushib turganda ham) vitamin yetishmasligi kuzatiladi.

Vitaminlar yetishmasligi asta-sekin paydo bo'ladi, hatto vitaminlar sarfi ularning organizmgaga tushishidan oshib ketganda ham vitamin yetishmovchiligi birdaniga vujudga kelmaydi. Chunki inson sisatlì ovqatlanganda, ozroq miqdorda vitaminlar zaxirasi yig'ilib boradi, ular sarflanib bo'lgandan keyin, organizmda moddalar almashinuvni buziladi. Qaysi vitamin yetishmasa, o'sha kasallikka xos alomatlar paydo bo'ladi. Qisman vitamin yetishmovchiligi — gipovitaminoz deyiladi. Gipovitaminozni bartaraf etish choralar ko'rilmasa, vitamin yetishmasligining murakkabroq xili — avitaminoz (vitaminlarning to'liq yetishmasligi) kuzatiladi.

Gipovitaminoz belgilari kasallik boshlanishida ro'yrost yuzaga chiqmaydi, bemorning ahvoli o'zgaradi, bo'shashadi, tez charchaydi, injiq bo'lib qoladi, uyqusи buziladi, mehnat qobiliyati pasayadi, ishtaha yo'qoladi. Kasallik boshlanishida bemorning qon va siydigidagi vitamin miqdori laboratoriya tekshiriladi.

Gipo va avitaminozlarning ayrim ko'p uchraydigan turlari haqidagi ma'lumotlarni berishdan avval, ushbu holatlarda yordam qat'iy shifokor nazorati ostida va uning ko'rsatmalariga asoslangan holda olib borilishini ta'kidlab o'tish lozim deb hisoblaymiz.

14.2. *B₁* vitamini (tiamin, anevrin) yetishmasligi

Organizmda uglevodlar almashinuvida birinchi darajali ahamiyatga ega: ovqatda uglevodlar ortiq bo'lsa, ularni o'zlashtirish uchun tiamin ko'proq talab qilinadi. Tiamin bo'lmasa, polinevrit kasalligi ro'y beradi. Organizmga tiamin oziq-ovqat bilan kiradi. Ichak mikroorganizmlari yordamida organizmda qisman tiamin hosil bo'ladi, lekin bu organizmning tiaminga bo'lgan ehtiyojini qoplay olmaydi.

Organizmning *B₁* vitaminiga bo'lgan bir sutkalik ehtiyoji kattalarda 1,3—2,5 mg.ni, bolalarda 0,3—1,7 mg.ni tashkil etadi. *B₁* vitamini yetishmasligi ichak peristaltikasining susayishiga, ich qotishiga, muskullar bo'shashishiga, jismoniy va ruhiy mehnat qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Organizmda bu vitamin bo'lmasa yoki yetishmasa, nerv sistemasining og'ir kasalligi — beri-beri paydo bo'ladi.

Tiamin organizmga oziq-ovqatlar bilan yetarli miqdorda kirib tursa ham, xronik alkogolizm, qandli diabet, me'da-ichak yo'li kasalliklarida uning yetishmasligi yanada ko'payishi mumkin. Ba'zi bir dori moddalari (masalan, antibiotiklar) organizmda tiamin aktivligini pasaytiradi va izdan chiqaradi.

B₁ vitamini ko'pgina oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga kiradi. Achitqilarda, ayniqsa, quruq pivo achitqisida (100 g.da 5 mg), non kvasida ko'p bo'ladi. G'alla va dukkakli o'simliklar donida va ba'zi bir hayvon mahsulotlari (jigar, buyrak, yurak)da ham ancha miqdorda tiamin bor. Tiamin, asosan, donning murtagi va qobig'i (kepagi)da bo'ladi.

Oliy navli un tayyorlash uchun u elanib, kepagi chiqitga chiqariladi. Bunda un tarkibidagi tiamin miqdori kamayib ketadi. Soya, grechixa va javdar yormasi, makkajo'xori va boshqalarda tiamin ko'p bo'ladi. Mahsulotlar pishirilganda, tiamin kam miqdorda parchalanadi, u taom sho'rvasiga chiqadi; qovurilganda ham tiamin deyarli yo'qolmaydi. Quruq oziq-ovqat mahsulotlari saqlanganda tiaminga zarar yetmaydi.



47-rasm. Vitaminli o'simliklar:

1—tirnoqqul; 2—chakanda; 3—qizil sabzi; 4—qovoq;
5—ittikanak; 6—yong'oq.

Farmakologik ta'siri. Sinapslarda nerv qo'zg'alishini o'tkazishga ijobiy ta'sir qiladi. O'rtacha gangliyalarni blokada qiluvchi xossalarga ovqatda tiamin miqdori kamayib ketganida odamda B_1 gipovitaminoz, keyinchalik B_1 avitaminoz (beri-beri) boshlanadi.

Ishlatiladigan o'rni. Gipovitaminoz va B_1 avitaminoz har xil nevritlar, radikulitlar, nevrolygiyalar. Turli sabablarga aloqador perefirik chala falaj (parez) va falajlar. Menyer kasalligi, Korsakov

psixoz, polimiyelit va ensefalomyelit. Vernike kasalligi me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi, ichak atoniysi, miokard distrofiyasi, stenokardiyasi bor bemorlarda toj tomirlarda qon aylanishining izdan chiqqani. Tireotoksikoz, endarteriit, nevrogen dermatozlar, zaharlanish (uglevod sulfid, tetraetil qo'rg'oshin, simob, metil spirti, marginush va boshqalardan zaharlanish).

Ishlatish usuli va dozalari. Katta yoshdagilarga profilaktika maqsadida kuniga 0,00258—0,00645 g.dan berib turiladi. Davo maqsadida kuniga 0,00645—0,0129 g.dan ichiriladi. 3 % li yoki 6 % li eritmasi 0,5—1 ml.dan kuniga 1 mahal muskul orasiga yuboriladi. Davo kursi 15—30 inyeksiyadan iborat.

14.3. *B₂ vitamini (riboflavin, laktoflavin, flavaksin) yetishmasligi*

O'sish jarayonida qatnashadi va o'stiruvchi omillarga kiradi. Oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvida ishtirot etadi. Markaziy nerv sistemasini holatiga rostlovchi ta'sir ko'rsatadi. Ko'z muguz pardasi, to'r pardasi, gavharidagi moddalar almashinuviga ta'sir etadi, yorug'likni sezishga va rang ajratishga yordam beradi. Bolalar organizmining o'sishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Riboflavin organizmga oziq-ovqat bilan kiradi. Unga bo'lgan bir sutkalik ehtiyoj kattalarda 1,5—3,0 mg.ni, bolalarda 0,4—2,0 mg.ni tashkil etadi. Ovqatda riboflavin yetishmasa, og'iz burchagi, lab yoriladi (lab bichilishi), soch to'kiladi, konyunktivit va blefarit yuz beradi. *B₂* vitamini, asosan, hayvon mahsulotlari — tuxum, pishloq, sut, go'shtda hamda g'alla va dukkakli o'simliklar — yeryong'oq, soya, yasmiq, ko'k no'xatda bo'ladi. Achitqi va sutda ko'p, nok, shaftoli, pomidor, sabzi, lavlagi, gulkaram va ismaloqda ham bor. Ovqat mahsulotlarini tayyorlash va pishirishda *B₂* vitamini ko'p nobud bo'lmaydi. Riboflavin ultrabinafsha nurlar ta'siriga juda sezgir, shuning uchun vitamin preparatlari (kukun va tabletkalar)ni va riboflavinga boy oziq-ovqat mahsulotlarini quyosh nuri tushmaydigan joyda saqlash kerak.

Farmakologik ta'siri. Riboflavindan hosil bo'ladigan koferment oqsil bilan birikkan holda oqsillar va yog'lar almashinuvidagi oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini idora etuvchi fermentlar tarkibiga kiradi.

Ishlatiladigan o'rni. Gipo va ariboflavinoz, qichima dermatozlar, surunkali ekzema, neyrodermitlar, fotodermatozlar va boshqa teri

kasalliklari, keratitlar, ko'z shox pardasining xiralashuvi, konyunktivitilar, o'sish va rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi.

Ishlatish usuli va dozalari. Katta yoshli odamlarga 1 % li eritmasi 1 ml (0,01 g)dan 10—15 kun davomida kuniga 1 marta muskullar orasiga yuborib turiladi. Bolalarga xuddi shunday dozalarda 3—5 kun, keyin haftasiga 2—3 marta ishlatiladi. Hammasi bo'lib, 15—20 marta inyeksiya qilinadi. Ko'z kasalliklarida 1 % li eritmasi 10—15 kun davomida 0,2—0,5 ml.dan ishlatiladi.

14.4. B₁ vitamini (nikotin kislota, PP vitamini, nikotinamid, niatsin, pellagra qarshi vitamin) yetishmasligi

Hujayralarning nafas olishida, oqsillar almashinuvida qatnashadi, organizmda o'simlik oqsillarining hazm bo'lishini tezlashdiradi, me'daning sekret va harakat funksiyasini normallashtiradi, me'daosti bezi ishlab chiqaradigan sekretsya va shira tarkibini yaxshilaydi, jigar ishini normallashtiradi. Sog'lom katta yoshdagi odamning bu vitaminga bo'lgan bir sutkalik ehtiyoji 14—28 mg.ni, bolalarda 4—19 mg.ni tashkil etadi.

Organizmda nikotin kislota yetishmasa, pellagra kasalligi ro'y beradi. Nikotin kislota tibbiyotda faqat shu kasallikni davolash va oldini olishda emas, balki boshqa bir qator kasalliklarni davolashda ham yaxshi naf beradi. Bu vitamin ichilganidan bir necha minut o'tgach, kishining yuzi qip-qizarib, lovullab ketadi va issiq yuzdan boshqa organlarga tarqaladi. Nikotin kislota uy parrandasiga go'shtida, mol, buzoq go'shti, jigari, buyragida, achitqi, guruch kepagi, bug'doy murtagida ko'p bo'ladi.

Nikotin kislota yaxshi saqlanishi va pazandachilik ishloviga chidamliligi jihatidan boshqa vitaminlardan ustun turadi. Yuqori harorat, qaynatish, qovurish mahsulotlardagi nikotin kislotaga ta'sir etmaydi, yorug'lik, kislorod, havo, ishqor ta'siriga bardoshli.

Ishlatiladigan o'rni. Pellagra (PP avitaminози), jigar kasalliklari, tomirlar spazmi, ateroskleroz (qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi). Me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi, enterokolitlar, kolitlar, ko'pdan beri bitmay kelayotgan jarohatlar, yaralar va boshqalar, me'da-ichak yo'li o'smalarida simptomatik o'ziga xos bo'lmagan vosita tariqasida ham ishlatiladi.

Ishlatish usuli va dozalari. Profilaktika uchun katta yoshli odamlar kuniga 0,015—0,025 g.dan, bolalar 0,005—0,02 g.dan ichib turishadi. Pellagrada katta yoshli odamlarga 15—20 kun

davomida 0,1 g dan kuniga 2—3 mahal ichish uchun buyuriladi. Natriy nikotinatning 1 % li eritmasi 10—15 kun davomida 1 ml.dan kuniga 1—2 marta parenteral yo'1 bilan yuborib turiladi.

Bolalarga 0,005 g.dan 0,05 g.gacha miqdorda kuniga 2—3 marta ichiriladi. Boshqa zarurat paytlarida katta yoshli odamlarga 0,02—0,05 g.dan 0,1 g.gacha, bolalarga 0,005 g.dan 0,03 g. gacha kuniga 2—3 mahal beriladi. O'smalarda kalendula qo'shilgan nikotin kislota tabletkalari 1—2 donadan kuniga 2—3 mahal ichiriladi.

14.5. C vitamini (askorbat kislota) yetishmasligi

Moddalar almashinuvida, ayniqsa, oqsillar o'zlashtirilishida, biriktiruvchi to'qimalarni normal holatda tutib turishda va tiklanishida muhim ahamiyatga ega. Organizmda C vitamini yetishmasa, qon tomirlari devorining o'tkazuvchanligi ortadi. Tog'ay va suyak to'qimalari strukturasi buziladi, lavsha (singa) kasalligi ro'y beradi. Organizmda askorbinat kislota hosil bo'lmaydi va to'planmaydi. Organizm o'ziga zarur bo'lgan C vitaminini (kattalarning bir kunlik ehtiyoji 60—108 mg, bolalarniki 30—70 mg) oziq-ovqatlar bilan olib kiradi. C vitamini sabzavot va mevalarda bo'ladi. Organizmnинг C vitaminiga bo'lgan kundalik ehtiyoji karam, kartoshka, ko'k piyoz, pomidor va boshqalar hisobiga qondiriladi.

Askorbinat kislota ko'k chuchuk qalampir, qizil qalampir, qora qarag'at, xren, qulupnay, shovul, limon, apelsin va boshqa o'simlik mahsulotlarida bo'ladi. Askorbinat kislotaning tabiiy konsentrati na'matakdir (1500 mg). Askorbinat kislota sintetik usulda ham olinadi, u kukun, achitqi glukoza bilan birgalikda tabletka holida chiqariladi. Askorbinat kislota turli polivitamin preparatlari tarkibiga kiradi. Oziq-ovqat mahsulotlari uzoq saqlanganda va noto'g'ri pishirilganda tarkibidagi vitamin kamayadi. Mahsulotlarni pishirishga tayyorlash jarayonida ulardagi askorbinat kislotaning bir qismi yo'qoladi.

Ishlatiladigan o'rni. Jismoniy va aqliy jihatdan ortiqcha zo'riqish, avitaminoz va C gipovitaminoz (profilaktika va davolash uchun), gemorragik diatezlar, qon ketib turishi (burun, o'pka, jigar, bachaddon va boshq.), Addison kasalligi, infeksiyon kasalliklar, intoksikatsiyalar, me'da-ichak kasalliklari (axiliya, yara kasalligi, enterokolitlar), singa, ya'ni lavsha kasalligining oldini olish uchun va bunga davo qilish uchun ham qo'llaniladi.

Ishlatilish usuli va dozasi. Profilaktika maqsadlarida katta yoshli odamlarga 0,05—0,1 g.dan kuniga 1 marta ichiriladi, davo uchun katta yoshli odamlarga 0,05—0,1 g.dan kuniga 3—5 mahal berib turiladi. Natriy askorbinat ko‘rinishida 5 % li eritmasi 1—3 ml miqdorida parenteral yo‘l bilan yuboriladi. Bir martalik dozasi ko‘pi bilan 0,2 g, bir kecha-kunduzligi 0,5 g.

14.6. A vitamini (retinol) yetishmasligi

Tabiatda keng tarqalgan o’simlik to‘qimalarida A provitaminini (organizmda retinolga aylanadigan karotinoid pigmentlar) holida uchraydi. Ko‘rish pigmentlari hosil bo‘lishida qatnashib, organizmning normal o’sishini, ko‘zning turli darajadagi yorug‘lik nuriga moslashishini ta’minlaydi. Organizmda retinol yetishmasa, teri qurishib oqaradi, qipiqlanadi, muguzlanadi, unda mayda toshmalar paydo bo‘ladi, terining yiringli kasalliklari avj oladi, soch quruq, xira bo‘lib, to‘kila boshlaydi, tirnoq mo‘rtlashib qoladi.

Yorug‘ga qaray olmaslik, shabko‘rlik, konyunktivit, blefaritga, asosan, A vitamini yetishmasligi sabab bo‘ladi. Katta yoshdagi sog‘lom kishining retinolga bo‘lgan sutkalik ehtiyoji 1 mg, bolalar va o’smirlarda 0,4—1 mg. A provitaminini (karotin) o’simliklarda, ayniqsa, ularning yashil barglarida ko‘p. 25—50 g ismaloq, qizil qalampir yoki petrushka yoki 50 g o‘rik, shivist (ukrop), sabzi, shovul katta yoshdagи kishining A vitaminiga bo‘lgan sutkalik ehtiyojini qondiradi. A vitamini hayvon va baliq jigarida, baliq moyida, ayniqsa, ko‘p. A vitamini va karotin mahsulotlarni konservalash va taom tayyorlash jarayonida yaxshi saqlanadi. Retinol farmatsevtika sanoatida draje yoki moyli konsentrat holida chiqariladi.

Ishlatiladigan o‘rnı. Avitaminoz va gipovitaminoz, infektion kasalliklar (qizamiq, ichburug‘, traxeit, bronxit, pnevmoniya), teri kasalliklari (terining jarohatlanishi, kuyishi,sovuoq olishi, teri sili, giperkeratozlar, ixtioz, psoriaz, piidermiya), bir qancha ko‘z kasalliklari (pigmentli retinit, gemeralopiya, kseroftalmiya, konyunktivitlar, ko‘z shox pardasining boshqa kasalliklari), surunkali enterokolitlar, hepatitlar, pankreatitlar.

Ishlatilish usullari va dozasi. Profilaktika maqsadlarida va davo uchun ham ichiladi hamda muskullar orasiga yuboriladi. Har xil darajadagi A vitamini yetishmasligida katta yoshli odamlar uchun davo dozalari kuniga 33000 XB (0,01 g)dan 50000—100000 XB gacha yuboriladi.

14.7. D vitaminini (kalsiferol, D_2 , D_3 , D_4 , vigantol) yetishmasligi

Raxitga qarshi vitamin. 1931-yili Vindaus topgan. D_2 vitaminini—kalsiferol, D_3 —xolekalsiferol. D_2 va D_3 vitaminlari rangsiz kristall, suvda, yog'da, efirda erimaydi. D_2 vitamini kislota va ishqorlarga chidamli. D vitaminini bir qancha provitaminlari bor — ergokalsiferol, ergosterin achitqida (drajji), bug'doyda, tuxum sarig'ida ko'proq uchraydi. D vitaminini miqdorlarining mineral almashinuviga, suyak hosil bo'lismiga ta'sir ko'rsatadi. U bolalarning yoshlik chog'ida, ya'nı skeletning jadal o'sishi va suyaklanishi davrida zarur.

Organizmda D vitaminini yetishmasa, raxit kasalligi paydo bo'ladi. Sog'lom katta yoshdagi kishining D vitaminiga bo'lgan sutkalik ehtiyoji 100 ME, bolalarda 100—140 ME. Tunes, treska va boshqa baliglar moyi kalsiferol manbayi hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlarida bu vitamin kam bo'ladi. Odam organizmida D vitaminini teridagi provitaminga quyosh nuri ta'sir etishidan, provitamin esa xolesterindan hosil bo'ladi. D vitaminini teridan boshqa organlarga tarqalib, asosan, jigar va qon plazmasida to'planadi.

Ishlatiladigan o'rni. Raxit, paratireoid bezlar funksiyasining buzilganligi, tetaniya, osteomalatsiya, osteoporoz, suyaklar sili, sil volchankasi.

Ishlatilish usuli va dozalari. Raxitning oldini olish uchun kuniga 0,0125 mkg (500 XB)dan, unga davo qilish uchun 30—60 kun davomida 10000—15000 XBdan ichiladi (davo kursiga 500000—600000 XB gacha ishlatiladi). Raxitning og'ir xilida 45—60 kun davomida 1000000 XBgacha beriladi. Raxitning bilinmaydigan xillarida kuniga 2000—3000 XBdan ishlatiladi. Badan terisi va shilliq pardalar volchankasida kuniga 100000 XBdan beriladi. 16 yosh-gacha bo'lgan bolalarga ularning yoshiga qarab, kuniga 25000—75000 XB dan buyuriladi. Katta dozalari bilan davo qilishda bir yo'la kuniga 10000—15000 XBdan retinol asetat, tokoferol asetat, askorbinat kislota va B guruhiga mansub vitaminlar ham buyurish tavsiya etiladi.

14.8. E vitaminini (tokoferol) yetishmasligi

Bu vitamin 1922-yilda aniqlangan, rangsiz, yog'simon modda. U suvda erimaydi, lekin yog'da eriydigan modda. E vitaminini o'simliklarning yashil qismida, bug'doy, go'sht, jigar, tuxum

sarig'ida, sut, o'simlik moyi (paxta moyi, kungabogar moyi, soya, palma moyi) va boshqa moylar tarkibida bo'ladi.

E vitamini yetishmasligi bepushtlik, homiladorlik rivojlani-shining buzilishi, spermatozoidlar biologik aktivligining pasayishiga olib keladi.

E vitamini yallig'lanish jarayonlarining oldini oladi. *A* vitamini aktivligini oshiradi, qon bosimini tushiradi. Koronar sklerozlarning va tromboemboliyaning oldini oladi. Oqsil, uglevod, yog' almashinuvida ishtirot etadi.

E vitamini – qizil yugurik (volchanka), atrofik qizil lishay, sklerodermiya, atrofik akrodermatit, Reyno kasalligi, Foks-Fordays kasalligi, tizza yarasini davolashda ishlatiladi. Bu vitamin biologik ta'siri turlicha bo'lgan yetti vitamindan iborat guruh. Muskul faoliyatini va jinsiy bezlar ishini kuchaytiradi, ichki organlarda yog'da eriydigan barcha vitaminlar, ayniqsa, retinol to'planishiga yordam beradi. Katta yoshdagi sog'lom kishilarda *E* vitaminiga bo'l-gan sutkalik ehtiyoj 12—15 ME, bolalarda 5—10 ME. *E* vitamini chidamli bo'lib, 170°C gacha qizdirilganda ham, ultrabinafsha nurlar ta'sirida ham parchalanmaydi.

Ishlatiladigan o'rni. Muskul distrofiyaları, amiotrofik yonlama skleroz, hayz siklining buzilishi, homiladorlikda bola tushish xavfi, spermatogenez va potensiya buzilishi, ba'zi dermatozlar, psoriaz, miokardiopatiyalar, periferik tomirlar spazmi, jigar kasalliklari. Pediatriyada sklerodermiya, gipotrofiya, *D* gipervitaminozida qo'l-laniladi.

Ishlatilish usuli va dozalari. Nerv-muskul sistemasi kasalliklarida kuniga 15—100 mg.dan ichiladi. Spermatogenez va potensiya buzilganda kuniga 100—300 mg.dan beriladi. Odad bo'lib qolgan bola tashlashda homiladorlikning dastlabki 2—3 oyi davomida bir kecha-kunduzda 10—15 mg.dan ishlatiladi. Bola tashlash xavfi tug'ilganida 5—7 kun davomida kuniga 100—150 mg.dan tayinlanadi (progesteron bilan birga). Ateroskleroz va periferik tomirlar kasal-liklarida kuniga 100 mg.dan retinol bilan birga ichiladi.

14.9. *B₁* vitamini (adenin, adenin kislota) yetishmasligi

1931-yilda Jakson tomonidan ochilgan, lekin bu vitamin 20 yil o'tgandan keyin ishlatila boshlangan. Vitamin tromboslebit, rentgen nurlaridan saqlanish, amidopirin va etil spiriti bilan zaharlanishning oldini olish, qonda leykotsitlarni bir me'yorda saqlab turish, qizil

yugurik (volchanka) kasalligini davolash va uning oldini olish uchun ishlataladi. Bundan tashqari, teri, bezgak, psoriaz kasalliklaridan kelib chiqqan qonning tarkibiy qismlarida bo'lgan o'zgarishlarni normal holga keltiradi.

Har kuni bu vitamindan 80—120 mg muskul orasiga yuborish buyuriladi. Vitamin hozirgi vaqtida klinik eksperimental sharoitda o'r ganilmoxda.

14.10. B₅ vitamini (pantotenat kislota, pantoten) yetishmasligi

1935-yilda Williams guruch kepagi tarkibidan sof holda olgan. Vitamin moddalar almashinuvida muhim rol o'yнaydi. Nerv sistemasi hamda buyrakusti va qalqonsimon bezlar ishini me'yorlashtiradi. Sog'lom odamning bu vitaminga bo'lgan sutkalik ehtiyoji 10 mg ga yaqin. Tabiatda juda keng tarqalgan. O'simlik va hayvon to'qimalarida ko'p miqdorda bo'ladi.

Avitaminoz nerv sistemasining bu zilishiga — falajlanish, nevritlarga olib keladi. Pantotenat kislota yetishmasligida bermor darmonsizlikdan, lohaslikdan, uyqusizlikdan, me'da-ichak traktida huzilishlardan shikoyat qiladi.

Qonda trombotsitlar miqdori, oqsil va lipidlar kamayishi kuzatiladi. Jigar va buyrakusti bezlarida funksional o'zgarishlar kelib chiqadi. Pantotenat kislotaning organizmga kirib kelishida, qon tarkibiy qismlarining normal holda kelishi, oqsil va lipidlarning ko'tarilishi, jigar va buyrakusti bezi, me'da-ichak sistemasi ishining tiklanishi, qon bosimining tushishi, qondagi qand miqdorining normal holga kelishi kuzatiladi. Raxit va podagra kasalliklarini davolashda yaxshi natija bermoqda.

Ishlatish usuli va dozalari. Ovgatdan 15—30 minut keyin ichiladi. I martalik dozasi katta yoshli odamlar uchun 0,1—1 g. Bolalar uchun 0,25—0,5 g, katta yoshlilar uchun kundalik dozasi 1,5—3 g, bolalar uchun 0,75—3 g. Davo kursi 1—4 oy, ayrim holdarda 6 oygacha. Oradan 3—6 oy o'tkazib, takroriy davo kursini buyurish mumkin.

14.11. B₆ vitamini (piridoksin) yetishmasligi

Oqsil va yog'ning normal hazm bo'lishini ta'minlab, azot almashtinuvida muhim rol o'yнaydi. Katta yoshdagи kishilarning bu vitaminda bo'lgan bir sutkalik ehtiyoji 1,5—3 mg, bolalarda 0,4—2 mg.

Organizmda piridoksin yetishmasa, bolalar o'smay qoladi, me'da ishi buziladi, kamqonlik yuz beradi. Homiladorlarda stomatit, yuz, bo'yin, bosh terisining yallig'lanishi, qo'zg'aluvchanlik, uyqusizlik kuzatiladi. Piridoksin ko'pgina o'simlik va hayvonlar mahsulotida, masalan, quruq pivo achitqisi, kepak, arpa, tariq, makkajo'xori, no'xat, kartoshka, sabzi, lavlagi, mol va tovuq go'shti, mol jigari, buzoq va qo'y go'shti, tuxum, sigir sutida bo'ladi. Shu bilan birga, oddiy sharoitda odamga B_6 vitaminini yetishmovchiligi sezilmaydi. Kishi organizmi uchun zarur miqdordagi piridoksin ichak bakteriyalari ta'sirida hosil bo'ladi. Piridoksin kislota, ishqor, yuqori harorat ta'siriga chidamli, lekin quyosh nuri ta'sirida parchalanadi. Mahsulotlar qaynatilganda piridoksinga zarar qilmaydi, uzoq vaqt, ayniqsa, issiqda saqlanganda tez buziladi.

Ishlatiladigan o'rni. Homiladorlar toksikozlari, ensefalitdan keyingi parkinsonizm va boshqa turdag'i parkinsonizmlar, xoreya, chaqaqlarda bo'lib turadigan talvasa sindromi, pellagra (nikotin kislota bilan birgalikda), me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi, mikrotsitar gipoxrom anemiya, periferik nerv sistemasi kasalliklari, nur kasalligi, o'tkir va surunkali gepatit, seboreya va eksfoliativ dermatit, ayniqsa, go'dak bolalarda uchraydigan dermatitlar, belbog'li temiratki, neyrodermitlar, ekssudativ diatez, tubazit va silga qarshi boshqa preparatlar ishlatilganda ro'y beradigan zaharlanish hodisalar.

Ishlatilish usuli va dozalari. 0,02—0,05 g.dan kuniga 1—3 mahal ichiladi; 1 % li, 2,5 % li va 5 % li eritmalari 1—2 ml.dan muskul orasiga hamda teri ostiga yuboriladi. Davolash muddati 1—3 oy.

14.12. B_6 vitaminini yoki H_1 (para-aminosolitsil kislota) yetishmasligi

1863-yilda ajratib olingen, lekin hozirga qadar kam o'rganilgan. Nikotin kislotaga yaqin turadi. Hujayralarning o'sishiga yordam qiladi, uning ishtirokida folat kislota hosil bo'ladi. Gormonlar bilan bog'lanishda, ta'sir doirasi keng. U adrenalin va tirotoksin aktivligini pasaytiradi.

Amenoreyada hayz ko'rish ritmini tiklaydi. Ichak tayoqchasi vitaminlarining hosil bo'lishini stimulatsiyalaydi. Me'daosti bezi shirasи ajralishini tezlashtiradi. Mishyak va surmadan zaharlanishning

oldini oladi. B_7 vitamini (H_1) achitqi (drojji)da, jigarda, bug'doya, guruch tarkibida bo'ladi.

Qizil volchanka kasalligida, dermatitda, teri pigmentatsiyasining turli rangda ko'rinishini bartaraf etadi. B_7 vitamini (H_1) sklerodermiya, dermatomiozit, qizil volchanka, Dyuring dermatitida, pemfigus (po'rsildoq yara, pufak) kasalligini davolashda ishlatiladi. Sutkalik dozasi 2—4 g.

14.13. B_8 vitamini (H vitamini, biotin, seboreyaga qarshi omil — antiseboreyali omil) yetishmasligi

U jigar, buyrak, mol sutida, achitqida (drojji), tuxum oqsilida, tomat, soya, no'xatlarda bo'ladi. B_8 vitamini ichak tayoqchasini sintez qiladi. Kislota, ishqor, harorat, kislorodlarga chidamli. Biotin nerv trofikasi hamda yog' almashinuvida ishtirok etadi. U tuxum oqsili — avidin bilan birikma hosil qilgan holda seboreya kasalligiga, soch va tirnoqlar to'kilib ketayotgan eksfoliativ dermatitlarga davo sifatida ishlatiladi.

Bundan tashqari, neyrodermatit, disgidroz va psoriaz kasalliklarida ham ishlatiladi. Allergiya kasalligi, ekzema, Ritter, Reyner kasalliklarida foydalaniladi. Sog'lom odamning bu vitaminga bo'lgan sutkalik ehtiyoji 150—200 mkg. Parenteral yo'l bilan har kuni 150—300 mkg yuboriladi.

14.14. B_9 vitamini (folat kislota, folatsin, B_c vitamini) yetishmasligi

Ba'zi aminokislolar almashinuvida va sintezida, shuningdek, nuklein kislolar sintezida qatnashadi. Ko'mikning qon yaratish funksiyasini kuchaytiradi, B_{12} vitaminining yaxshi o'zlashtirilishiga yordam beradi. Katta yoshdagi odamning B_9 vitaminiga bo'lgan 1 sutkalik ehtiyoji 0,2 mg, bolalarda 0,04—0,2 mg, homilador ayollarda 0,6 mg, emizikli onalarda 0,6 mg.

Organizmda folat kislota yetishmasa, kuchli kamqonlik, me'daichak funksiyasi sezuvchanligining buzilishi ro'y beradi. Folat kislota o'simlik va hayvon mahsulotlarida, ayniqsa, jigar, buyrak va yashil barglarda ko'p. Ichak mikroorganizmlari folat kislotasini ko'p miqdorda sintezlaydi. Bu kislota pazandalik ishlovida tez parchalanadi. Suyuq taom tayyorlashda sabzavot va go'shtdagagi B_9 vitaminining 70—90 %i yo'qoladi.

Ishlatiladigan o'mni. Homiladorlikdagi megaloblastik anemiyada, kattalar va bolalardagi alimentar makrotsitar anemiyada, ionlash-tiruvchi nurlar berilganida, rentgenoterapiyada, leykopeniyada.

Ishlatilish usuli va dozalari. Kattalarga kuniga 1—2 mahal 0,0005—0,001 g (0,5—1 mg)dan ichish uchun buyuriladi. Bolalarga yoshiga yarasha kamroq dozalarda tayinlanadi. Davo kursi 20 kun.

14.15. B_{13} vitamini (orot kislota, uratsil karbonli kislota) yetishmasligi

1905-yilda ochilgan. Tarkibida 324 mg % ot suti, 100 mg % mol suti, 7 mg % ayollar suti, 5 mg % cho'chqa suti bor. Bundan tashqari, jigar, guruchda bo'ladi. B_{13} vitamini ona qornida bolaning rivojlanishiga yordam beradi. U jigar sirrozi, gepatit, xolesistit, me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi, kardit, nefropatiya, Botkin kasalligi, ekzema, neyrodermit, psoriaz, ixtioz kasalliklarida ishlatiladi.

B_{13} vitamini – antibiotik, sulfanilamid preparatlari, diamino-difenilsulfon (DDS) rezoxin, delagilsteroid gormonlarining organizmga yaxshi singishiga yordam beradi.

B_{13} vitamini metionin va B_{12} folat kislota bilan birga yuborilsa, kasallikning rivojlanishini to'xtatadi.

Ishlatilish usuli va dozalari. Katta yoshdagagi kishilarga 4 kun bir tabletkadan kuniga 4 marta, 4 kun bir tabletkadan kuniga 3 marta, 8 kun bir tabletkadan 2 marta, 12 kun 1 tabletkadan beriladi. Bir kurs 28 kunda 56 tabletka 28 g preparatdan qabul qilinadi. Preparat ovqatdan 30 minut oldin yoki 3—4 soatdan keyin ichiladi.

14.16. B_1 , vitamini (pangam kislota) yetishmasligi

1951-yilda Krebz o'rik danagidan ajratib olgan. Bu vitamin yong'oq, o'simlik urug'larida, guruch bo'tqasida, achitqida (drajji), buqa qonida, ot jigarida topilgan.

B_1 , vitamini to'qimalardagi kislorod ochligini (gipoksiya) bartaraf etadi. Jigar to'qimasi regeneratsiyasini tiklaydi, diurezni kuchaytiradi. Qonda xolesterin miqdorini bir me'yorda ushlab turadi. Siyidik haydovchi vosita sifatida ishlatiladi. Buyrak jomlarida filtratsiyani kuchaytiradi. Yurak muskuli trofikasini yaxshilaydi.

B_1 , vitamini yurakning mitral porok kasalligida, miokard infarktida, umumiy skleroz, kardioskleroz, xafaqonlikning II bos-

qichida miya aterosklerozi, qon aylanishi, o'pka, yurak yetishmovchiligidagi surunkali alkogol, giyohvandlik, teri va tanosil kasalliklarida ishlataladi.

Ishlatilish usuli va dozasi. Kattalarga 1 % li eritmasi 1 osh qoshiqdan kuniga 3—4 marta (300—400 mg) 10 kun beriladi. Surunkali kasalliklarda va og'ir bemonrlarga 30—40 kun beriladi. Davo kursi 2500—7500, bolalarga 400—2400 mg beriladi.

14.17. K vitamini (filloxonon, farkoxinon, vikasol) yetishmasligi

1935-yilda Damom tomonidan ochilgan. 1942-yili A.V. Paldin sintez yo'li bilan K_3 -vikasolni ajratib oldi. K_3 vitamini sarg'imir yog'simon suyuqlik, suvda erimaydigan, yog'da eriydigan modda, ultrabinafsha nurlarga, issiqlqa chidamli. K_3 vitamini sarg'imir kristall kukun, suvda erimaydi. Qizdirilganda va ultabinafsha nurlarda erib ketadi. B_3 vitamini vikasol, rangsiz kristall, achchiq, suvda yaxshi eriydi, yuqori haroratga chidamsiz.

K vitamini qon ivishining asosiy omili. Organizmda K vitamini yetishmaganda turli organlar (burun, milk, me'da-ichak va boshq.)dan qon ketishi kuzatiladi. Katta yoshdagagi kishida K vitaminiga bo'lgan sutkalik ehtiyoj 0,2—0,3 mg, homiladorlarda 2—5 mg, go'daklarda 0,001—0,012 mg. Filloxinon salat, karam, ismaloq, qichitqi o'tning yashil qismida bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan vitamindan tashqari, organizm uchun zarar bo'lgan boshqa biologik aktiv moddalar (vitaminsimon birikmalar) ham bor. Bularga: bioflavonoidlar, xolin, inozit, lipoat, orot, pangamat, paraaminobenzoat kislotalari va boshqa moddalar kiradi.

Ishlatiladigan o'rni. Ichakka o't tushmay qolishi natijasida boshlangan sariqlik, o'tkir gepatiitlar, parenximatoz va kapillar qon ketishi (jarrohlik operatsiyalariga tayyorlash va ulardan keyin qo'llaniladi), me'da va o'n ikki barmoqli ichak yarasining qonashi, nur kasalligi, trombopenik purpura, bavosir tugunlari va burundan hadeb qon kelaverishi, homiladorlikning so'nggi oylari (chaqalloqlarda biror joyi qonamasligi uchun), balog'atga yetish oldidan va preklimakterik davrda bachadondan uzoq vaqt qon ketib turishi, o'pka sili, sepsis kasalliklarida, sezilarli gipoprotrombinemiya paytida, antikoagulantlar va K vitamini antagonistlari: dikumarin, fenilin, pepantan va boshqalar ishlataligida qon ketib turishi.

Ishlatilish usullari va dozalari. Katta yoshli odamlarda bir kecha-kunduzda 0,015—0,03 g.dan ichish uchun, 0,01—0,015 g.dan muskullar orasiga yuborish uchun buyuriladi. Katta yoshlilarga ichish uchun eng katta dozalari: bir martalik dozasi 0,03, bir kecha-kunduzlik dozasi 0,06, muskullar orasiga yuborish uchun bir martalik dozasi 0,015, bir kecha-kunduzlik dozasi 0,03 g.ni tashkil etadi.

Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishda bemorga 3—4 kun ilgari preparatni ichib turish buyuriladi. Tug'adigan ayollarga kasalxonaga kelgan zahoti darrov kunlik doza miqdorida preparat tayinlanadi. Agar tug'uruq boshlanmagan bo'lsa, 12 soat oralatib, so'ngra 24 soat oralatib yana beriladi. Chaqaloqlar uchun dozasi ko'pi bilan 0,004 g.

14.18. *P* vitamini (rutin, sitrin) yetishmasligi

1936-yilda Sent-Dberdi bu vitaminini ochgan. Choy bargida, grechixa bargida bo'ladi. *P*vitamini yetishmasligi oqibatida, tomirlar o'tkazuvchanligi buziladi, qon quyilishlar kuzatiladi. Askorbin kislotasi bo'limasa, *P* vitaminining aktivligi kamayadi.

P vitamini jigar, gipertoniya kasalliklarida va siyidik haydovchi sifatida ishlatiladi.

Bu vitamin — na'matak mevasida, qora qarag'at, brusnika, chernika, uzum, olcha, olxo'ri, malina, sabzi, grechixalar tarkibida bo'ladi.

Undan bir qancha kasalliklarda, qizilcha, (skarlatina) sepsis, tif, dizenteriya, revmatizm, pnevmoniya, glomerulonefrit, peritonit, kuyishlarda foydalaniladi. Bundan tashqari, gemorragik diatezlar ko'z to'r pardasiga qon quyilishi, gemorragik vaskulit septik endokardit, allergik kasalliklar, trombositopenik purpura kasalliklarida buyuriladi.

Antikoagulantlar, salitsilatlar, margimushli preparatlar ishlatilganida kapillarlar shikastlanishining oldini olish va bunga davo qilish uchun ham shu preparatdan foydalaniлади.

Ishlatilishi. Kattalarga 0,02—0,05 g.dan kuniga 2—3 mahal ichish uchun beriladi. Tarkibida *P* vitamini bo'lgan preparatlardan askorutin, kversetin, rutin qo'llaniladi. Askorutin 1 tabletidan kuniga 2—3 mahal ichiladi. Kversetin katta yoshlilarga 0,02 g.dan kuniga 3—5 mahal buyuriladi. Davolanish muddati 5—6 hafta. Rutin katta yoshli odamlarga 0,02—0,05 g.dan kuniga 2—3 mahal ichish uchun beriladi.

14.19. B_1 vitamini (karnitin) yetishmasligi

«O'sish vitamini» ham deyiladi. U o'simlik va hayvon to'qimalarida, ayniqsa, muskul to'qimasida ko'p bo'ladi. B_1 vitamini oziq-ovqat mahsulotlari orgali organizmga tushadi.

Karnitin organizmda oqsillar biosintezida ishtirok etadi. Yog' va oqsil almashinuvini me'yorashtiradi. Chala tug'ilgan bolalarning rivojlanishi hamda ularning o'sishida qatnashadi.

Jigarda yog' distrofiyasi va lipid almashinuvi, qonda ishqor zaxiralari tikelaydi, ketokislota hosil bo'tishini pasaytiradi, giper-tireozda asosiy almashinuvni normallashtiradi, oshqozon shirasi sekretsiyasini stimullaydi, homilaning rivojlanishiga yordam berib, jigarda glikogen sarflanishini ko'paytiradi. Homila tana hajmining ko'payishiga oqsil sarflanishini idora qiladi. Bolaning umumiy tonusini, teri turgorligi va rangini yaxshilaydi.

Tug'ilgan bolaning ishtahasini yaxshilab, vaznni oshiradi. Skelet va muskullarning o'sishiga yordam beradi. Haroratni me'yorashtiradi, taxikardiyani pasaytiradi, ta'sirlanish va qo'zg'alish jarayonlari, umumiy darmonsizlikning oldini oladi.

Ishlatilish o'rni va dozasi. 20 % li eritmasi ichish uchun ishlatiladi. Eritma suv, kompot, kisel, choyga qo'shib ichiladi. Katta yoshdag'i kishilarga 2,0 g.dan (2 choy qoshiq) kuniga ikki marta beriladi. Bir kecha-kunduzda dozasi 4 g (4 choy qoshiq) 1—2 oy beriladi. Surunkali gastrit va pankreatit kasalligida 0,5 g (1 choy qoshiq) kuniga 2 marta beriladi. Tireotoksikozda, o'sish uchun 0,25 g.dan kuniga 2—3 marta, bir kecha-kunduzda 0,5—0,75 g ($1/2$ — $3/4$ choy qoshig'i) beriladi. Davolanish muddati 20 kun, so'ng 1—2 oy tanaffus qilinib, muolaja yana takrorlanadi. Karnitin berishdan oldin 3 ml 20 % li eritmasi 200 ml 5 % li glukozaga qo'shiladi.

15-bo‘b. KECHIKTIRIB BO‘LMAYDIGAN HOLATLARDA SHOSHILINCH YORDAM KO‘RSATISH

Kechiktirib bo‘lmaydigan holatlarga oid ma'lumotlar mazkur o‘quv qo‘llanmaning tegishli boblarida berilgan. Lekin ushbu bobda yana bir bor kechiktirib bo‘lmaydigan holatlarni yuzaga keltiradigan sabablar, ularning asosiy belgilari va ko‘rsatiladigan yordam choralarini haqida qisqacha ma'lumotlar berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Albatta, ushbu holatlarda yordam qat’iy shifokor nazorati ostida va uning ko‘rsatmalariga asoslangan holda olib borilishi zarur.

15.1. Anafilaktik shokda shoshilinch yordam ko‘rsatish

Sabablari. Organizmga dori moddasi ilk bor tushganda, organizmning shu doriga nishbatan sezgirligi oshib ketadi va antitelo paydo bo‘ladi. Bu antitelolarning bir qismi turli to‘qimalarga singib ketsa, bir qismi qonga aralashib ketadi. Shu sezgirligi oshgan organizmga uning sezgirligi oshishiga sababchi bo‘lgan allergen ikkinchi marta tushganda, u qonga va to‘qimadagi antitelo (allergik antitelo) bilan birikadi, huning natijasida biologik aktiv moddalar (gistamin, bradikinin, seratonin) ajraladi.

Shu tufayli, silliq mushaklar siqiladi va natijada qon tomirlarning o‘tkazuvchanlik qobiliyati oshib ketadi. Organizm to‘qimalarida esa kislorodni o‘zlashtirish qobiliyati buziladi. Antibiotiklar, sulfanilamid preparatlar, zardob, vaksina, oqsil preparatlari, rentgen-kontrast moddalar, har xil hasharotlarning chaqishi ham anafilaktik shokka sabab bo‘ladi.

Belgilari. Anafilaktik shokning eng ko‘p uchraydigan belgilariga nafas va qon tomir yo‘llaridagi o‘zgarish alomatlari kiradi, ya’ni bronxlar siqilib qon bosimi pasayib ketadi. Bemorlarda besar-jonomlik, quvvatsizlik, nafas chiqarishning qiyinlashuvi, yo’tal, ko‘krak qafasi siqilishi, o‘lim vahimasi paydo bo‘ladi, bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i bezovta qiladi, badan qizib ketayotgandek bo‘lib, teriga qichishadigan toshmalar toshadi.

Bemor karaxt va besaranjom bo'ladi. Yuzi qizarib, qon quyilayotgandek his etadi. Hansirash, o'pka shishi, siydik tuta olmaslik holatlari paydo bo'ladi. Odamning rangi oqarib, pulsi qo'lga unnamaydi. Bemor hushini yo'qotadi, ko'z qorachiqlari kengayib, yorug'likka reaksiya ko'rsatmay qo'yadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, yotish tartibi, vahimaga tushmaslik;
- 2) namlangan kislород berish;
- 3) adrenalin gidroxlorid 0,1 %—1 ml teri ostiga, muskullar orasiga, ba'zan tomir ichiga;
- 4) prednizolon 1 ml tomir ichiga (75—150 mg) yoki 0,025—0,05 g.dan 2—3 ga bo'lib ichiladi. So'ngra dozasi kamaytilib, 0,01—0,005—0,0025 g.gacha tushiriladi;
- 5) dimedrol 1 %—2 ml muskul orasiga; suprastin 2 %—2 ml muskul orasiga; pipolfen 2,5 %—1—1,5 ml muskul orasiga;
- 6) kalsiy xlор 10 %—10 ml tomir ichiga asta-sekin;
- 7) seduksen (diazepam) 1—2 ml muskul orasiga;
- 8) noradrenalin gidrotartrat 2—4 mg (0,2 % li eritmasidan 1—2 ml miqdorida) preparat 500 ml 5 % li glukoza eritmasida tomir ichiga tomchilab yuboriladi (arterial bosimni kuzatib horib);
- 9) 200 ml 4 % li natriy gidrokarbonat tomir ichiga tomchi usulida;
- 10) sulfokamfokain 10 %—2 ml teri ostiga yoki muskul orasiga kofein-benzoat natriy 10 %—2 ml teri ostiga;
- 11) heparin 10 000 TB muskul orasiga;
- 12) strofantin 0,05 %—0,5—0,75 ml preparati glukoza yoki fiziologik eritma qo'shib tomir ichiga yuboriladi. Korglikon 0,06 % li 0,5—0,75 ml 20 ml—0,9 % li fiziologik eritma qo'shib tomir ichiga yuboriladi;
- 13) laziks 4—6 ml (40—60 mg) tomir ichiga;
- 14) penitsillinaza 1000 000 TB—2 ml natriy xlорид eritmasi qo'shib yuboriladi (penitsillindan shok bo'lsa);
- 15) poliglukin 400 ml tomir ichiga, reopoliglukin 0,2 % li 2—4 ml 5 % li 500 ml glukoza qo'shib, tomir ichiga, tomchi usulida yuboriladi;
- 16) dori yuborilgan joyni yoki chaqqan joyga adrenalin 0,1 %—0,5 ml yuboriladi;
- 17) dori yuborilgan yoki chaqqan joyning yuqorisiga jgut qo'yish;
- 18) tavegil 1 tabletkadan ichishga buyuriladi.

15.2. Bronxial astma xurujida shoshilinch yordam ko'rsatish

Sababi. Bronxial astma kasalligi.

Belgilari. Bo'g'ilish xuruji, xurujsimon yo'tal, oynasimon balg'am ajratish, hansirash, ko'krak qafasida og'riq, nafas chiqarishning qiyinlashuvi, nafas qisishi bemorlarni astmatik holatga, ya'ni majburiy holatga tushib qolishiga olib keladi. Bemorning yuzi kerkib,sovutq ter bosadi.

Oyoq-qo'llari muzlaydi. Urib ko'rilmganda, qutichasimon tovush eshitiladi. Balg'arnda eozinofill hujayralari, Kurshman spirallari, Sharko-Leyden kristallarining bo'lishi, qonda esa eozinofillar miqdorining ko'payishi asosiy belgilari hisoblanadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, aeratsiya;
- 2) adrenalin gidroxlorid 0,1 %—0,2—0,4 ml teri ostiga;
- 3) eufillin 2,4 %—10 ml tomir ichiga, glukoza 40 %—10 ml yoki fiziologik eritma 0,9 %—10 ml;
- 4) atropin sulfat 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 5) berotek — ingalatsiya uchun;
- 6) mezaton 1 %—1 ml teri ostiga yoki muskul orasiga;
- 7) efedrin gidroxlorid 0,025 % — $\frac{1}{2}$ —1 tabletkadan;
- 8) salutan, salbutamid ingalatsiya uchun;
- 9) alupend—ingalatsiya uchun;
- 10) novodrin 0,05— $\frac{1}{2}$ tabletka til ostiga;
- 11) prednizolon 60 mg muskul orasiga, prednizolon 0,005 g 1 tabletkadan sutka davomida 10—12 tabletkadan ichish uchun;
- 12) korglikon 0,06 %—0,5 ml yoki strofantin 0,05 %—0,5 ml glukoza 40 %—15 ml tomir ichiga qo'shib asta-sekin yuboriladi;
- 13) natriy gidrokarbonat 150—200 ml 3 —4 % tomir ichiga tomchi usulida;
- 14) bemegrid 0,5 %—10 ml ga 40—30 ml 0,9 % li fiziologik eritma qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 15) reopoliglukin yoki fiziologik eritma 1000 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 16) laziks 1 %—4—6 ml (40—60 mg) tomir ichiga;
- 17) reoksigenatsiya 100 ml namlangan kislrorod bilan beriladi;
- 18) bronxlardan shilimshiqqlarni chiqarish;
- 19) oyoqqa issiq vanna qilish — yengil hollarda;
- 20) natriy yod 5—7 ml 10 % tomir ichiga asta-sekin;

- 21) bromgeksin yoki mukalatin $\frac{1}{2}$ —1 tabletidan sut bilan;
- 22) astmatin 1—2 marta sutka mobaynida 1—2 tabletidan beriladi;
- 23) astman 1 kukunidan beriladi;
- 24) astmolizin 1 ml teri ostiga yoki muskul orasiga;
- 25) arpenal 5 %—1 ml muskul orasiga;
- 26) tropatsin 0,01 g, 1 tabletidan kuniga 2 marta;
- 27) suprastin 2 %—1 ml muskul orasiga yoki tomir ichiga;
- 28) antastman $\frac{1}{2}$, tabletidan kuniga 2—3 marta beriladi;
- 29) gistoglobulin 1 ml yoki 3 ml teri ostiga;
- 30) ximotripsin ingalatsiya.

15.3. Astmatik holatda shoshilinch yordam ko'rsatish

Sababi. Bronxial astma kasalligi.

Belgilari. Bemorda rangi oqorgan, lablari ko'kargan holda jismonan toliqish va zo'riqish belgilari hamda qo'rqish kuzatiladi. Qon bosimi kasallikning boshida ko'tarilib, keyin pasayadi. Keyinchalik bemorning ahvoli og'irlashib, ko'karish kuchayib boradi, qisqa muddat ichida yoki asta-sekin bemor hushini yo'qotadi va barcha reflekslar so'na boshlaydi, «tovushsiz o'pka» va kuchli yurak tonlari eshitiladi, tomir urishi tezlashgan va pasaygan bo'ladi, gipotoniya, kollaps kuzatiladi.

Nafas olish markazining falaji natijasida bemor o'ladi. Klinik manzarasi bosqichma-bosqich namoyon bo'ladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) eufillin 2,4 %—20 ml tomir ichiga;
- 2) prednizolon 90—120 mg tomir ichiga 5 %—500 ml glukoza bilan qo'shib tomchi usulida yuboriladi;
- 3) natriy gidrokarbonat 4 %—200 ml tomir ichiga;
- 4) kislorod ingalatsiyasi;
- 5) heparin 10000—20000 asta-sekin;
- 6) fiziologik eritma 500 ml tomir ichiga;
- 7) strofantin 0,05 %—0,5 ml yoki korglikon 0,06 %—1 ml 20 ml fiziologik eritma bilan qo'shib (yoki glukoza) tomir ichiga yuboriladi;
- 8) laziks 60 mg tomir ichiga;
- 9) balg'amni suyultirish maqsadida 10 %—10 ml natriy yodid (yod bilan davolashga allergiya bo'lmasa) yuboriladi;
- 10) 200—250 ml qon chiqarib, so'ngra infuzion davolash o'tkaziladi;

(1) rivojlanayotgan degidratatsiyaga qarshi kurashish maqsadida kuniga 2 l va undan ko'p suyuqliklar (osh tuzining izotonik eritmasi, 5 % li glukoza eritmasi, reopoliglukin) yuboriladi.

15.4. Asfiksiya (bo'g'ilish)

Organizmda kislorod yetishmay, karbonat angidrid ko'payib ketishi natijasida paydo bo'ladigan patologik holat. Asfiksiya nafas yo'llarining ichki yoki tashqi tomondan to'silib qolishi.

Sabablari. Bo'g'ma kasalligida kekirdak va bronxlarga shilimshiq tiqilib qolishi, nafas yo'llarida yot jismlar, quruq massa turib qolishi, suvgaga cho'kish, tomoq bo'g'ilishi.

Belgilari. Asfiksiya bordan paydo bo'ladi, nafas va yurak faoliyati buziladi yoki to'xtaydi. Markaziy nerv sistemasida kuchli buzilishilar vujudga keladi. Bemorda hansirash, bo'g'ilish, qo'rqish, ko'karish, taxikardiya, ortopnoe, giperkaliyemiya, qonda ph pasayadi. To'qimalarda kislorodning keskin yetishmasligi tufayli organlarda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Nafasning bir necha sekunddan bir necha minutgacha to'xtab qolishi va terminal holatda nafas olish (nafas harakatlarining siyraklashib qolishi) kuzatiladi. Asfiksiyada nafas yo'llari o'tkazuvchanligining buzilishi natijasida bemorning yuzi ko'karib, ba'zan to'q zangori yoki qoramrtusga kiradi.

Avvaliga, es-hushi joyida bo'lib, nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tiklashga urinadi; qattiq yo'taladi, og'ir ahvoldan qutulishga harakat qiladi. Bora-bora hushini yo'qotib, talvasa tuta boshlaydi. Ko'z qorachiqlari avval torayadi, so'ngra kengayadi. Bosh va orqa miyadagi nerv markazlari karbonat angidrid gazidan ta'sirlanishi natijasida arterial bosim oshishi mumkin, yurak urishi tezlashadi, ko'pincha bemor beixtiyor siyib qo'yadi yoki ichi ketadi.

Asfiksiyaning qancha davom etishi nafas buzilishi darajasiga bog'liq. Nafas yo'llari butunlay to'silib qolganda, asfiksiya 3—6 minut cho'zilib, shundan keyin o'lim yuz beradi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) kelib chiqishiga qarab, yordam ko'rsatish;
- 2) nafas yo'llarini tozalash;
- 3) laringoskop orqali — intubatsiya;
- 4) traxeostomiya;
- 5) korglikon 0,06 %—0,5 ml yoki strofantin 0,05 %—0,5 ml, glukoza 40 %—15,0 yoki 0,9 % fiziologik eritma qo'shib, tomir ichiga yuboriladi;

- 6) eufillin 2,4 %—10 ml tomir ichiga yuboriladi;
- 7) noradrenalin 0,2 %—2 ml glukoza 5 % li 250—500 ml qo'shib tomir ichiga yuboriladi;
- 8) prednizolon 90—120 mg tomir ichiga 100 ml—0,9 % li fiziologik eritma tomchi usulida yuboriladi;
- 9) laziks 40—80 mg tomir ichiga;
- 10) qon quyish 250—300 ml tomir ichiga;
- 11) poliglukin 6 %—800 ml tomir ichiga;
- 12) adrenalin 0,1 %—0,5 ml fiziologik eritma 15—20 ml 0,9 % lisi tomir ichiga yuboriladi;
- 13) gidrokortizon 125 mg tomir ichiga yuboriladi;
- 14) deksazon 8 mg muskul orasiga yuboriladi;
- 15) natriy gidrokarbonat 200 ml tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi.

15.5. Buyrak sanchig'ida shoshilinch yordam ko'rsatish

Sababları. Buyrak-tosh kasalligi, siydik dimlanishi, buyrakdag'i o'smalar, buyrak sili, buyrak ishemiyasi, buyrak va siydik yo'llarining yallig'lanishi.

Bulguları. Xuruj o'tkir boshlanadi, bel sohasida kuchli xuruj-simon og'riq paydo bo'ladi. Og'riq, ko'pincha, qorin sohasida, siydik pufagi sohasida, chov sohasida, jinsiy organlarda va oyoqqa tarqaladi. Og'riq bir necha soatgacha davom etadi, hatto kunlab og'ir hollarda og'riq butun qorin sohasini egallab, dispeptik holatlarga olib keladi. Ko'ngil aynishi, qusish, meteorizm kuzatiladi.

Ichaklar pareziga, axlatning tutilib qolishiga, qorinning dam bo'lishiga, tana haroratining ko'tarilishiga olib keladi. Sanchiq, gohida o'tkir appenditsit, xolesistit, ichak tutilishi, me'da va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, to'g'ri ichakning yallig'lanishi belgilariga o'xshab ketadi. Og'riqlar tabiatan chidab bo'lmaydigan darajaga yetadi. Bemor o'zini qo'yarga joy topolmay qoladi.

Og'riq kuchliligidan bemor to'shakda u yoqdan bu yoqqa ag'anaydi. Buyrak sanchig'i tutgan mahalda, odatda, mikro va makrogematuriya paydo bo'ladi. Siyidikda anuriya yoki oliguriya, dizuriya, proteinuriya, qonda esa eritrositoz, leykositoz kuzatiladi, qon bosimi ko'tariladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) atropin 0,1 %—1 ml teri ostiga;

- 2) platifillin 0,2 %—1 ml teri ostiga;
- 3) papaverin 2 %—2 ml teri ostiga;
- 4) no-shpa 2 %—2—3 ml muskul orasiga;
- 5) promedol 1 %—1 ml teri ostiga;
- 6) pantopon (omnopon) 1 %—1 ml teri ostiga;
- 7) morfin 1 %—1—2 ml teri ostiga;
- 8) antipirin 0,25 g 1 tabletkadan kuniga 3 mahal;
- 9) belladonna 1 tabletkadan kuniga 3 mahal;
- 10) sistenal 20 tomchidan;
- 11) issiq vanna, bel sohasiga grelka qo'yish;
- 12) novokainli blokada;
- 13) kateterizatsiya;
- 14) antibiotiklar;
- 15) avisan 0,05 g kuniga 7 tabletkadan;
- 16) analgin 50 %—2 ml muskul orasiga yuboriladi.

15.6. Gipertonik krizda shoshilinch yordam ko'rsatish

Sababi. Arterial gipertoniya.

Belgilari. Bosh og'rishi, bosh aylanishi, qaltirash, yurakning tez urishi, yurak sohasida og'riq, nafas yetishmasligi sezgisi, ko'ngil aynishi, qushish, ko'rish qobiliyatining buzilishi, darmonsizlik, issiqlab ketish sezgisi paydo bo'ladi.

Arterial qon bosimi ancha ko'tariladi. Hushdan ketish, og'ir hollarda miyaga qon quyilish — insult alomatlari yuzaga chiqadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) magneziy sulfat 25 %—5—10 ml muskul orasiga, tomir ichiga;
- 2) dibazol 1 % 4—6—10 ml tomir ichiga glukoza eritmasi yoki natriy xlor eritmasi bilan qo'shib yuboriladi yoki dibazol 5 ml muskul orasiga;
- 3) klofellen 0,01 %—1 ml tomir ichiga asta-sekin yoki muskul orasiga yuboriladi;
- 4) droperidol 0,25 % 2—4 ml tomir ichiga yoki muskul orasiga yuboriladi;
- 5) korinfar 1 tabletka til ostiga, agarda 15—20 minut davomida qon bosimi tushmasa, yana takrorlash lozim;
- 6) aminazin 2,5 %—0,5—1 ml muskul orasiga yoki tomir ichiga yuboriladi (insult vaqtida 0,25 ml.dan beriladi);

- 7) furosemid 1—2 tabletka (40—80 mg);
- 8) obzidan 1 mg tomir ichiga;
- 9) laziks 10 ml tomir ichiga 15 ml fiziologik eritma bilan yuboriladi;
- 10) eufillin 2,4 % 10 ml tomir ichiga;
- 11) strofantin 0,05 %—0,5 ml yoki korglikon 0,06 %—0,5 ml glukoza yoki fiziologik eritma bilan qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 12) noradrenalin 0,2 %—0,1—0,2 ml tomir ichiga fiziologik eritma bilan qo'shib yuboriladi;
- 13) agarda qon bosimi tushsa, pentamin 5 %—0,2 ml 1 mg muskul orasiga yoki tomir ichiga yuboriladi.

15.7. Giperglykemik komada shoshilinch yordam ko'rsatish

Sababi. Qandli diabet.

Belgilari. Chanqash, umumiy darmonsizlik, uyquchanlik, lohaslik, ishtaha yo'qligi, ko'ngil aynishi, quşish, ich ketishi, qulogqlar shang'illashi, bo'shashish, tilning qurishi, nafasdan aseton hidi kelishi, ketonimiya, poliuriya, albuminuriya, glikozuriya kuzatiladi. Oq'ir hollarda nafas izdan chiqadi. Qon bosimi pasayib, puls tezlashadi, muskullar tonusi pasayganda, ko'z sohalari yumshoq bo'lib qoladi. Tana harorati subnormal bo'lib, tili jigarsimon karash bilan qoplangan bo'ladi. Yurak tonlari bo'g'iq, qorinning old muskuli taranglashgan, siydikdan aseton hidi ajraladi. Ketonuriya, qonda — leykositoz, qoldiq azot, keton tanachalari oshib ketadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) insulin 50 TB tomir ichiga 20 ml—0,9 % li fiziologik eritma bilan qo'shib yuboriladi. Insulin 30 TB teri ostiga;
- 2) natriy xlor 500 ml tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi, natriy gidrokarbonat 200—300 ml 4 % tomir ichiga yuboriladi;
- 3) strofantin 0,05 %—0,5 ml yoki 0,06 %—0,5 ml korglikon fiziologik eritma bilan qo'shib tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 4) kofein-benzoat natriy 1—2 ml 10 % teri ostiga, kordiamin 25 % —0,5 ml teri ostiga;
- 5) mezaton 1% 1 ml muskul orasiga yoki 0,5—1 ml tomir ichiga 5 % glukoza eritmasi bilan qo'shib, tomir ichiga yuboriladi;

- 6) sulfokamfokain 10 %—2 ml teri ostiga yoki muskul orasiga;
- 7) asidozni kamaytirish maqsadida fiziologik eritmaga glukoza va soda qo'shib (50 g glukoza, 26 g natriy biokarbonat, 100 g fiziologik eritma) huqna qilinadi;
- 8) askorbinat kislota 5 %—5 ml tomir ichiga glukoza eritmasi bilan qo'shib yuboriladi;
- 9) kokarbaksilaza 0,05—0,1 g kuniga 1 marta muskul orasiga, teri ostiga yuboriladi, og'ir hollarda sutkalik dozasi 1 g.gacha beriladi;
- 10) kaliy xlorid 20—30 ml 10 % ga 500 ml natriy xlor qo'shib, tomir ichiga yuboriladi;
- 11) noradrenalin 1—2 ml 0,2 % ga 250 ml 5 % li glukoza eritmasi bilan tomir ichiga yuboriladi.

15.8. Gipoglikemik komada shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. Gipoglikemik koma qonda qand 2,8 mmol/l.dan pastga tushib ketishi bilan xarakterlanadi. Insulinning noto'g'ri berilishidan keyin yuz beradi. Spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, parhezning buzilishi, och qolish, yuqumli kasalliklar, tana haro-ratining kuchli ko'tarilishi, kuchli jismoniy harakatda bo'lish, ruhiy holatlar buzilishidan kelib chiqadi.

Belgilari. Och qolish sezgisi, bosh og'rishi, darmonsizlik, yurakning tez urishi, qo'zg'aluvchanlik, qo'rqish, qon bosimining pasayishi, taxikardiya, gohida bradikardiya kuzatiladi. Qonda leykositoz, limfasitoz, gohida leykopeniya kuzatiladi. Terining namligi, terlash, yuzning oqarishi, muskul tonusining kuchayishi, qaltirash, ko'z qorachig'inining kengayganligi va qonda qand miqdorining pasayib ketganligi kuzatiladi.

Yordam ko'rsatish.

- 1) agar bemorning hushi joyida bo'lsa, unga 50—100 g non va 1—2 chaqmoq qand beriladi yoki 1 stakan shirin choy beriladi;
- 2) behush holatdagagi bemorga 50 ml 40 % li glukoza eritmasidan tomir ichiga yuboriladi. Agar hushiga kelmasa, 5—10 daqiqa o'tkazib, teri ostiga 500—600 ml 5 % li glukoza hamda 0,5—1 ml 0,1 % li adrenalin eritmasidan takror yuboriladi;
- 3) prednizolon, kuniga 0,025—0,05 g (2—3 ga bo'lib) ichiladi, so'ngra dozasi kamaytirilib, 0,01—0,005 g.gacha tushiriladi.
- 4) gidrokortizon, 100 ml (4 amp.) yoki prednizolon 30—60 mg (1—2 amp.)ga 300—500 ml —5 % li glukoza qo'shib, tomir ichiga yuboriladi;

5) kordiamin 25 %—2 ml teri ostiga sulfokamfokain 2 ml—10 % teri ostiga yoki muskul orasiga yuboriladi. Kamfora 2—4 ml 20 % teri ostiga;

6) metionin 1 g kuniga 3 marta, lipokain 0,1 g kuniga 3 marta beriladi;

7) kokarboksilaza 0,05—0,1 g kuniga 1 marta muskul orasiga, teri ostiga, B_{12} vitamini kunora 100—200 mkg.dan inyeksiya qilinadi. Askorbinat kislota 5 %—2—4 ml tomir ichiga glukoza eritmasi bilan yuboriladi;

8) glutaminli kislota 0,5 g 4 marta sutka mobaynida tomir ichiga yuboriladi;

9) natriy gidrokarbonat 200 ml—4 % tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi;

10) kofein benzoat-natriy 1—2 ml—10 % teri ostiga yuboriladi;

11) strofantin 0,05 % —0,5 ml yoki 0,06 —0,5 ml glukoza 40 % li 15 ml yoki fiziologik eritma 0,9 %—15 ml qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;

12) adrenalin 0,1 %—1 ml teri ostiga.

15.9. Jigar sanchig'ida shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. O't-tosh kasalliklari, jigar yallig'lanishi, jigar sirrozi, o't dimjanishi, yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, jismoniy zo'riqish, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish.

Belgilari. Xurujsimon og'riq, tez va kuchli bo'ladi. Og'riq bir necha minutdan, bir necha soatgacha, gohida 2—3 kungacha davom etadi. Bemor qo'zg'aluvchan bo'lib, rangi oqarib ketadi. Sovuq ter bilan qoplangan bo'ladi.

Xuruj vaqtida bemor bezovtalanadi. Holatini o'zgartirib turadi, ko'ngli aynib, o'tli qusadi, tana harorati ko'tarilgan bo'ladi,sovqotadi, qonda leykositoz, ich qotishi, badanda sariqlik ko'rildi. Qorni kattalashib, uning muskul taranglashadi. Jigar kattalashgan, og'riqli bo'ladi.

Yordam ko'rsatish:

1) tinchlik, yotish tartibi, issiq grelka qo'yish lozim;

2) atropin 0,1 %—1 ml teri ostiga;

3) papaverin 2 %—2 ml teri ostiga;

4) platinillin 0,2 %—1 ml teri ostiga;

5) no-shpa 2 % 2—3 ml muskul orasiga;

- 6) morfin 1 %—1 ml teri ostiga; pantopon 2 %—1 ml teri ostiga;
- 7) fentanil 0,25 %—1—2 ml muskul orasiga;
- 8) glukoza 5 %, 40 %—20 ml tomir ichiga;
- 9) promedol 1 %—1 ml teri ostiga.

15.10. Jigar komasida shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabahlari. O'tkir virusli gepatit, jigar sirrozi, zaharli moddalar va mahsulotlardan zaharlanish.

Belgilari. Bemor qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi, uyqusizlik, bosh og'rishi, quşish, tana haroratining ko'tarilishi, darmonsizlik, lohaslik, ishtaha pasayishi, taxikardiya, badan sarg'ayishi, og'izdan jigar hidi kelishi, bo'g'in reflekslarining pasayishi. Siyidik tuta bilmaslik. Kasallik avj olganda, qon bosimi pasayadi, ko'z qorachig'i yorug'da o'zgarmaydi.

Puls notejis, bemorlar qattiq uyquga — behushlik holatiga tushadilar. Bu paytda bemorning nafas olishi tezlashadi, nafasi Kussmaul yoki Cheyn-Stoks holatida, yurak tovushlari bo'g'iq bo'ladi. Paylarda aniqlanadigan reflekslar yo'qoladi, markaziy asab sistemasi zaharlanganda yuzaga keladigan, o'zgargan reflekslar paydo bo'ladi.

Yordam ko'rsatish.

- 1) glukoza 10 %—500 ml, insulin 12 TB tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi;
- 2) prednizolon 60 mg tomir ichiga;
- 3) glutaminli kislota 1 % 30 ml tomir ichiga;
- 4) askorbinat kislota 5 %—5 ml muskul orasiga;
- 5) xolin xlorid 20 %—20 ml, glukoza 5 %—200 ml qo'shib tomir ichiga tomchi usulida;
- 6) kokarboksilaza 300—500 mg /sutka 100 mg.ga 200 ml 5 % li glukoza qo'shib, sutkasiga 4 marta tomir ichiga;
- 7) ATF 1 %—2 ml muskul orasiga sutkasiga 2 marta;
- 8) vikasol 1 %—1—2 ml muskul orasiga 2 marta;
- 9) insulin 4—5 TB muskul orasiga;
- 10) tiamin bromid 3 %—3—4 ml yoki 6 %—1—2 ml muskul orasiga, piridoksin gidroxlorid 5 %—2 ml tomir ichiga, sianokobalamin 500 mg muskul orasiga;
- 11) gemodez 400 ml tomir ichiga asta-sekin;
- 12) seduksen 0,5 %—2 ml muskul orasiga yuboriladi.

15.11. Ichak sanchig‘ida shoshilinch yordam ko‘rsatish

Sabablari. Asab va boshqa a’zolar kasalliklari sabab bo‘lishi mumkin. O’t ajralishi, me’daosti bezi suyuqligining kam ajralishi, ichaklar devorining buzilishi, allergiya va boshqa hazm organlari sistemasi kasalliklari oqibatida kelib chiqadi.

Belgilari. Qorinda xurujsimon og‘riq paydo bo‘ladi. Og‘riq bir necha minutdan, bir necha soatgacha davom etadi. Keyinchalik og‘riq kuchayib, butun qorin sohasini egallaydi. Og‘riq qorinning yon tomonlariga, qorinning pastki qavatiga va bel sohasiga o‘tadi. Ko‘pincha og‘riqni o‘tkir appenditsit, me’da yarasi hamda xolesistit bilan almashtiriladi. Bemor qorinning dam bo‘lishi yoki ich ketishidan shikoyat qiladi. Ich ketishi ko‘pincha nonushtadan so‘ng boshlanadi.

Yordam ko‘rsatish:

- 1) atropin 0,5—1 ml 0,1 % teri ostiga;
- 2) promedol 1 %—1 ml teri ostiga, pantopan 2 %—1 ml teri ostiga, morfin 1 %—1 ml teri ostiga;
- 3) antipirin 0,25 l shamchadan (svecha) to‘g‘ri ichakka yuboriladi. Bellodonna ekstrakti 0,015 kuniga 3 mahal;
- 4) no-shpa 2 %—2—3 ml muskul orasiga;
- 5) platiillin 2 %—1 ml teri ostiga;
- 6) papaverin 2 %—2 ml teri ostiga;
- 7) metatsin 0,1 %—1 ml muskul orasiga;
- 8) xlor dizetoksid 0,005 bir tabletkadan 2—3 marta;
- 9) diazepam 0,005 bir tabletkadan 1—2—3 marta;
- 10) trioksazin 0,3 bir tabletkadan kuniga 2 marta;
- 11) valerian 20—30 tomchi kuniga 3 marta;
- 12) issiq vanna, psixoterapiya, diyetoterapiya (parhez qilinadi).

15.12. Kollapsda shoshilinch yordam ko‘rsatish

Sabablari. Tomirlar yetishmovchiligi, hayot uchun eng kerak bo‘lgan organizm funksiyalarning buzilishi, yuqumli kasalliklar, intoksikatsiya, gipo-giperglikemik holat, buyrakusti bezi yetishmovchiligi, pnevmoniya, zaharlanish.

Belgilari. Arterial bosimning keskin pasayib ketishi va periferiyada qon aylanishining dag‘al sur’atda izdan chiqishi bilan xarakterlanadigan o‘tkir tomirlar yetishmovchiligi kuzatiladi. Bemorning yuzi ozib, ko‘zları ichiga tortib ketadi, rangi bo‘zarib, badanini

mayda-mayda ter bosadi, qo'l-oyoqlari muzlab, ko'karib ketadi, besaranjom, nafasi tezlashgan, yuza bo'ladi. Pulsi tezlashgan, yaxshi to'lishmaydi, yumshoq bo'ladi. Arterial bosimi pasayib ketadi, u nechog'liq ko'p pasaysa, kollaps shunchalik og'ir bo'ladi. Kasallik belgilari, asosiy kasallikka bog'liq bo'ladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, qat'iy yotish tartibi, issiq qilish, qahva ichirish;
- 2) kordiamin 25 %—0,5—1 ml teri ostiga;
- 3) mezaton 1 %—0,5 —1 ml tomir ichiga;
- 4) gidrokortizon 100—50 mg tomir ichiga asta-sekin;
- 5) noradrenalin 0,2 %—1—2 ml, glukoza 5 %—250 ml qo'shib, tomir ichiga tomchi usulida yuboriladi;
- 6) kamfora 20 %—2—4 ml teri ostiga;
- 7) strixnin 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 8) kofein-natriy benzoat 10 %—1—2 ml teri ostiga;
- 9) analeptik aralashma 0,5—1 ml teri ostiga, muskul orasiga — kofein 0,01, karazol 0,01, strixnin nitrat 0,00005, pikrotoksin 0,00005, distillangan suv 1 ml;
- 10) namlangan kislород berish;
- 11) glukoza 5 %—500 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 12) qon quyish 500 ml tomir ichiga tomchi usulida, plazma quyish 250 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 13) strofantin 0,05 %—0,5—0,75 yoki korglikon 0,06 %—0,5—0,75 ga glukoza 40 %—15 ml yoki 0,9 %—15 ml fiziologik eritma qo'shib tomir ichiga tomchi usulda;
- 14) kelib chiqayotgan sabablarini bartaraf etish;
- 15) efedrin hidroxlorid 5 %—1 ml teri ostiga, atropin 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 16) deksametazon 0,4 %—1 ml tomir ichiga.

15.13. Kardiogen shokda shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. Miokard infarkti, miokardit, kardiomiopatiya, toksik shikastlanish, klapanlar yorilishi, og'ir yurak poroklari, tromb, taxikardiya, bradikardiya, yurak bo'l macha-qorincha o'tkazuvchanligining buzilishi.

Belgilari. Markaziy nerv sistemasining kuchli buzilishi, qo'zg'алиш, muskullarning tarang tortishib turishi, tana haroratining ko'tarilishi, badan ko'karib, muzdek bo'lib qolishi, sovuq ter chi-

qishi, ko'zlar kirtayib, yuzning ozishi, puls ipsimon bo'lib, qon bosimi va puls pasayib ketishi. Nafas yuza, tezlashgan yoki sekin-lashgan bo'ladi.

Odamning esi kirdi-chiqdi bo'lib turadi. Og'ir hollarda bemor hushidan ketadi, nafasi so'nib boradi. Qon bosimi va pulsini aniqlab bo'lmaydi. Ko'z qorachig'i kengayib ketib, yorug'likka reaksiya ko'rsatmay qo'yadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) adekvatli og'riqsizlantirish;
- 2) poliglukin 200—400 ml tomir ichiga;
- 3) reopoliglukin 200—400 ml tomir ichiga;
- 4) noradrenalin 0,2 %—0,5 ml tomir ichiga;
- 5) dopamin 200 mg (50 mg) tomchi usulida;
- 6) mezaton 0,5—1 ml tomchi usulida (qo'shib);
- 7) soda 4,0 %—200 ml tomir ichiga tomchi usulida (tezlikda);
- 8) glukortikoid (gidrokortizon 125 mg yoki prednizolon 60 mg yoki deksazon 4 mg) tomir ichiga to'g'ridan to'g'ri;
- 9) alfa-blokatorlar. Droperidol 1 ml yoki aminazin 2,5 %—1,0 g.ga fiziologik eritma 20 ml qo'shib tomir ichiga;
- 10) heparin, trental, troksevazin;
- 11) strofantin 0,05 %—0,5—0,75 yoki korglikon 0,06 %—0,5—0,75 ml.ga gluukoza 40 % 15 ml yoki 0,9 %—15 ml fiziologik eritma qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 12) droperidol 0,25 %—1—4 ml tomir ichiga;
- 13) seduksen 0,5 %—2 ml muskul orasiga;
- 14) kordiamin 25 %—1—2 ml teri ostiga;
- 15) efedrin 5 %—1 ml teri ostiga;
- 16) prednizolon 90—120 mg tomir ichiga;
- 17) kislodorterapiya;
- 18) natriy gidrokarbonat 5 %—200 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 19) dimedrol 1 %—2 ml teri ostiga;
- 20) pipolfen 25 %—1 ml muskul orasiga;
- 21) novokainamid 10 %—10 ml tomir ichiga;
- 22) atropin sulfat 0,1 %—1 ml teri ostiga.

15.14. Miokard infarktida shoshilinch yordam ko'rsatish

Belgilari. Ko'krak qafasida qattiq, ba'zan siqadigan, bosadigan yoki achishtiradigan o'ta kuchli og'riq paydo bo'ladi. Og'riq ko'pincha to'sh orqasida bo'lib, yurak uchi sohasida, ko'krak

qafasining chap yoki o'ng yarmida, chap yelka, o'mrov, qo'l, bo'yin, pastki jag'ga, orqaga, ba'zida qoringa, oyoqlarga tarqaladi. Og'riq bir necha soatdan 2—3 kun, ba'zida undan ko'p vaqt davom etadi.

Nitroglitserin berilsa, og'riq to'xtamaydi. Shu xususiyati bilan kasallik stenokardiya kasalligidan farqlanadi. Bundan tashqari, bo'g'ilish xuruji, qo'zg'aluvchanlik, o'limdan qo'rqish hissi, ko'ngil aynishi, quşish, sovuq ter chiqishi, tana haroratining ko'tarilishi, pulsning sustligi, qon bosimining pastligi, yurak tonlarining bo'g'iqligi va qonda leykositoz, EChT tezlashishi kuza tiladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) qat'iy yotish tartibi;
- 2) morfin 1 %—1—2 ml tomir ichiga, muskul orasiga, teri ostiga;
- 3) droperidol 0,25 %—1—4 ml tomir ichiga;
- 4) fentanil 0,005 %—1—2 ml tomir ichiga;
- 5) pantopon 1 %—1—2 ml tomir ichiga, muskul ichiga teri ostiga;
- 6) atropin 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 7) dimedrol 1 %—1 ml teri ostiga, pipolfen 2,5 %—1 ml muskul orasiga;
- 8) heparin 15 000—20 000 TB tomir ichiga;
- 9) analgin 50 %—2 ml, dimedrol 1 %—1 ml fiziologik eritma 0,9 %—5 ml, papaverin gidroxlorid 2 %—1—2 ml qo'shib yuboriladi;
- 10) promedol 2 %—1 ml teri ostiga;
- 11) seduksen 0,5 %—2 ml tomir ichiga glukoza bilan 40 %—5 ml qo'shib yuboriladi;
- 12) aminazin 2,5 %—1—2 ml muskul orasiga, propazin 2,5 %—1—2 ml muskul orasiga;
- 13) eufillin 2,4 %—10 ml tomir ichiga;
- 14) no-shpa 2 %—2—3 ml muskul orasiga;
- 15) yurak to'xtaganda, uqlananib, sun'iy yo'l bilan nafas oldiriladi. Defibrillatsiya qilinadi.

15.15. Surunkali yurak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish

Sahablari. Yurak tomirlari: yirik tomirlarining rivojlanish anomaliyalari, arterial gipertoniya, kardioskleroz, perikardit, yurak

aortasining zaxmdan shikastlanishi, revmokardit, nafas, jigar, buyrak kasalliklarining surunkali kechishi, ovqatga yolchimaslikdan paydo bo'ladigan ba'zi kasalliklar oqibatida kelib chiqadi.

Belgilari. Hansirash, butun badanning shishib ketishi, ko'karish, yurak sohasida og'riq, taxikardiya, aritmiya, balg'am tuflash, yo'tal, umumiy darmonsizlik, uyqusizlik ishtahaning pasayib ketishi, jigar va taloq kattalashib ketishi, bemorning o'ng tomonida qovurg'alar ostida og'riq kuzatiladi, jigar sohasining og'ir bo'lib turganini his qilib turadi. Shishlar, odatda, badanning hammadan ko'ra pastroq qismlaridan, oyoq panjalaridan hoshlanadi, keyin boldir, son, belga, qorinning oldingi devoriga tarqaladi, keyinchalik yuzlar shishadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, kasalxona tartibi;
- 2) kislorodterapiya, yurakni uqalash (yurak to'xtaganda), sun'iy nafas oldirish, defibrillatsiya (yurak to'xtaganda);
- 3) morfin 1 %—1—2 ml teri ostiga, pantopon 1 %—1—2 ml teri ostiga;
- 4) atropin 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 5) dimedrol 1 %—1 ml muskul orasiga, pipolsen 2,5 %—1 ml;
- 6) droperidol 0,25 %—1—4 ml tomir ichiga;
- 7) nitroglitserin 0,0005 1 tabletka til ostiga;
- 8) strofantin 0,05 %—0,5—0,75 g yoki korglikon 0,06 %—0,5—0,75 g ga glukoza 40 %—15 ml yoki fiziologik eritma 0,9 %—15 ml tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 9) mezaton 1 %—0,5 ml teri ostiga yoki muskul orasiga;
- 10) limonnokisli natriy 50—250 ml —2 % tomir ichiga;
- 11) adonizid 15 ml—20 tomchidan;
- 12) digoksin 0,25—1 ml 5 %—10 ml glukoza eritmasi bilan tomir ichiga;
- 13) kordiamin 25 %—1 ml teri ostiga;
- 14) strixnin 0,1 %—1 ml teri ostiga;
- 15) lantozid 15 ml—20 tomchidan;
- 16) selanid 0,02 %—1 ml 40 %—20 ml glukoza eritmasi bilan tomir ichiga yuboriladi;
- 17) qon chiqarish;
- 18) kordigid 0,0008 №10 1 tabletkadan kuniga 2 marta;
- 19) kofein-natriy benzoat 10 %—1 ml teri ostiga;
- 20) laziks 4—6 ml (40—60 mg) tomir ichiga.

15.16. O'pka shishida shoshiinch yordam ko'rsatish

Belgilari. Hansirash, yo'tal, qonli ko'pixsimon balg'am ajralishi, bemorning rangi oqarib ketib, badani muzdek ter bilan qoplanadi, terisi och ko'k tusga kirib qoladi. Puls tezlashgan, avvaliga, puls tarang bo'lib, keyinchalik arang bilinadigan bo'lib qoladi. Nafasi bo'g'ilib borayotgan bermor ko'pincha o'zidan ketib qoladi va ba'zan xuruj boshlanganidan bir necha minut o'tib halok bo'ladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) qat'iy yotish tartibi;
- 2) yarimo'tirgan holda boshini yuqoriga ko'tarish, qo'lga va oyoqqa grelka qo'yish yoki oyoqqa issiq vanna qilish;
- 3) bronxlardan shilimshiqlarni chiqarish;
- 4) strofantin 0,05 %—0,5—0,75g yoki korglikon 0,06 %—0,5—0,75 g.ga glukoza 40 %—15 ml yoki fiziologik eritma 0,9 %—15 ml tomir ichiga asta-sekin;
- 5) laziks 1 %—2—4 ml tomir ichiga;
- 6) fentanil 0,005 %—2 ml tomir ichiga;
- 7) droperidol 0,25 %—4—5 ml.ga fiziologik eritma 0,9 %—10 ml tomir ichiga;
- 8) morfin 1 %—1 ml teri ostiga, pantopon 1 %—1 ml teri ostiga;
- 9) kofein-natriy benzoat 10 %—1 ml teri ostiga;
- 10) eufillin 2,4 %—10 ml tomir ichiga;
- 11) lobelin 1 %—2 ml teri ostiga;
- 12) kordiamin 25 %—1 ml teri ostiga;
- 13) sulfokamfokain 10 %—2—4 ml muskul orasiga;
- 14) pentamin 5 %—1 ml teri ostiga;
- 15) benzogekson 2,5 %—1 ml teri ostiga;
- 16) mezaton 1 %—1 ml teri ostiga yoki muskul orasiga;
- 17) qon chiqarish 400—500 ml;
- 18) sun'iy nafas oldirish (og'ir hollarda).

15.17. O'tkir nafas yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. Bronxial astma, zotiljam, o'sma, ateletkaz, surunkali bronxit, plevrit, emfizema, bronxflarning yot moddalar bilan beklilib qolishi, asfiksiya, o'pka silining boshlanish jarayoni va boshqa kasalliklarning asorati sifatida kelib chiqadi.

Belgilari. Hansirash, lablarning ko'karib turishi yoki butun badanning ko'karib qolishi kuzatiladi. Bemorning nafas olishi yuzaki bo'ladi, natijada nafas to'xtab qoladi, bu asoratlar to'satdan yoki asta-sekin boshlanishi mumkin.

O'pkaning tiriklik sig'imi pasayib ketadi, bemor koma holatiga tushib qoladi, nafas yuzaki past bo'lib, nafas markazi falajlanadi. Bradikardiya, ba'zida taxikardiya kuzatiladi. Traxeyada kuchli shovqinli, nafas eshitiladi. Bemorlar besaranjom bo'lib, sovuq ter chiqadi. Gohida og'ir hollarda bemor hushidan ketadi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, yotish tartibi, og'ir hollarda – traxeostomiya, sun'iy nafas oldirish;
- 2) promedol 1 %—1—2 ml tomir ichiga;
- 3) dimedrol 1 %—1 ml muskul orasiga, suprastin 2 %—1—2 ml tomir ichiga;
- 4) namlangan kislород berish;
- 5) prozerin 0,05 %—1 ml teri ostiga;
- 6) natriy xlor 20 %—10 ml tomir ichiga;
- 7) termopsis 180 ml 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal, tripsin 0,005 g, natriy xlorid 1—2 ml qo'shib muskul orasiga;
- 8) kaly yod 20 %—1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal;
- 9) eufillin 2,4 %—10 ml ga 20 %—10 ml glukoza qo'shib tomir ichiga.

15.18. O'tkir yurak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. Miokardit, aritmiya, yurakdagi operatsiyalar vaqtida, tug'ma yurak, orttirgan yurak poroklari, revmokardit, pnevmoniya, bronxial astma, bosh miyadagi qon aylanishining buzilishi, revmatizm, o'pka kasalliklari va boshqa kasalliklarning asorati sifatida kelib chiqadi.

Belgilari. Kasallik birdan boshlanadi. Bir necha minut ichida avval taxikardiya, keyinchalik bradikardiya, hansirash, taxipnoe, yo'tal, balg'am ajralishi, quşish kuzatiladi.

Bemorning yuzi oqargan, sovuq ter bosgan, shilliq qavatlar ko'kargan, yurak tonlari bo'g'iq bo'ladi. Galop ritmi eshitiladi. Hushdan ketish, bezovtalanish, qo'zg'aluvchanlik, ko'ngil aynishi kuzatiladi. Bo'yin venalari kattalashgan, shish, puls tezlashgan, qon bosimi pasaygan, yurak ritmi buzilib, jigar kattalashgan. O'tkir

chap qorincha yetishmovchiligidə (yurak astması, o'pkı shishi). Yurak astmasında — havo birdan yetishmay qolganini sezib, bermor birdan uyg'onib ketadi, o'rniga o'tirib oladi yoki deraza yoniga keladi, teri oqarib ketadi, ko'karadi, quruq yo'tal, balg'am ajraladi. Puls tezlashadi, qon bosimi ko'tarilib ketadi. Urib ko'rulganda, o'pkadan qutichasimon tovush eshitiladi, nafas susaygan, mayda pufaksimon xirillashlar eshitiladi. Yurak tonlari bo'g'iq, xuruj bir necha minutdan, bir necha soatgacha davom etadi.

Bo'yin venalari bo'rtib, jigar kattalashadi, o'ng qovurg'a ostida og'riq, kollaps ro'y beradi, bermorning rangi oqarib ketadi. Yuzy chakak-chakak bo'lib, burni cho'chchayib qoladi. Og'ir hollarda teri zahil tortib, ko'kish tusga kiradi. Nafas tezlashib, yuza bo'lib qoladi, bermor qimirlamay, atrofdagilarga loqayd bo'lib yotadi, savollarga arang javob beradi, uning haddan tashqari darmoni qurib, muzlab ketayotganidan noliydi. Davo kor qilmay qo'ysa, hayot uchun eng muhim organlar (bosh miya, yurak) funksiyalarining buzilishi natijasida bermor nobud bo'ladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) tinchlik, yotish tartibi;
- 2) strofantin 0,05 %—0,5—0,75 g yoki korglikon 0,06 %—0,5—0,75 g.ga 40 %—15 ml glukoza yoki 0,9 %—15 ml fiziologik eritma qo'shib, tomir ichiga asta-sekin yuboriladi;
- 3) furasemid (laziks) 4—6 ml 1 % tomir ichiga;
- 4) sulfakamfokain 10 %—3 ml muskul orasiga, kordiamin 25 %—3—4 ml teri ostiga. Kofein-natriy benzoat 10 %—2—3 ml teri ostiga;
- 5) prednizolon 90—120 mg tomir ichiga 0,9 %—20 ml fiziologik eritma qo'shib yuboriladi;
- 6) droperidol 2,5 %—5 ml muskul ichiga yoki tomir ichiga;
- 7) kislorodterapiya, qon chiqarish 300—400 ml, yurakni uqlash, sun'iy nafas oldirish;
- 8) eufillin 2,4 %—5—10 ml.ga 40 %—20 ml glukoza qo'shib tomir ichiga;
- 9) merkuzał 0,5—1 ml kuniga bir marta 4—5 kun;
- 10) kalsiy xlор 5 %—1 osh qoshiqdan kuniga 3—4 marta;
- 11) fonurit 0,25 g, haftasiga 2—3 marta;
- 12) gipotiazid 0,025—0,05 ml 1—2 marta kuniga;
- 13) erizimin 0,5—1 ml.ga 40 %—20 ml glukoza eritmasi bilan 1—2 marta yuboriladi.

15.19. O'tkir buyrak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish

Sabablari. O'tkir nefrit, kimyoviy zaharli moddalarning organizmiga ta'siri, o'tkir infeksiya, qorin tifi, anaerobli sepsis, vabo, o'tkir gastroenterokolit, shok va boshqa kasalliklardan keyin kelib chiqadi.

Balgilar. Ishtahaning pasayishi, ko'ngil aynishi, umumiyligda lohaslik, nerv sistemasining buzilishi, uyqusizlik, qo'zg'aluvchanlik, kamqonlik, hansirash, o'pkaning shishishi, tana haroratining ko'tarilishi, terlash, sovqotish, oyoq-qo'l mushaklarining qaqshab og'rishi, nerv-ruhiyatning buzilishi, quşish, ich ketishi, siydikda oqsil va eritrotsitlar paydo bo'lishi. Diurez kamayadi—oligonuriya, siydikning solishtirma og'irligi pasayadi. Kreatinin, mochevina, qoldiq azot qon plazmasida ko'payadi. O'tkir huyrak yetishmovchiligi nafas va yurak faoliyatining buzilishlariga olib keladi.

Yordam ko'rsatish:

- 1) glukoza 5 %—200—500 ml tomchi usulida;
- 2) insulin 8—19 TB teri ostiga;
- 3) natriy xlor 10 %—10 ml tomir ichiga;
- 4) kalsiy glukonat 10 %—10 ml tomir ichiga;
- 5) natriy gidrokarbonat 5 %—100—200 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 6) B₁ vitamini 6 %—1—2 ml muskul orasiga;
- 7) natriy laktat 1,55 %—200—300 ml tomir ichiga tomchi usulida;
- 8) natriy bikarbonat 4 %—200 ml tomir ichiga, tomchi usulida;
- 9) qon quyish;
- 10) antibiotiklar;
- 11) heparin 5000 TB teri ostiga;
- 12) kofein-natriy benzoat 10 %—1 ml teri ostiga;
- 13) tanani isitish;
- 14) dopamin 0,5 %—4 %—200 mg ga 400 ml glukoza qo'shib tomir ichiga;
- 15) laziks 2 %—2 ml muskul orasiga;
- 16) tinchlantiruvchi vositalar.

«ICHKI KASALLIKLAR» FANIDA KO'P QO'LLANILADIGAN ATAMALAR IZOHİ

Abscess (xo'ppoz) — har xil to'qima va organlarda yiringning chegaralangan chirishi.

Avitaminoz — organizmda bir yoki bir necha vitaminlar bo'lmasligidan vujudga keladigan kasallik.

Avtofagiya — o'z-o'zini yeb qo'ymoq.

Agglutinatsiya — korpuskular zarrachalar — bakteriyalar, eritrotsitlar, leykotsitlar trombotsitlar, to'qima hujayralari, korpuskular kimyoviy aktiv zarrachalarning bir-biriga yopishib qolib, cho'kmaga tushishi.

Agoniya (kurash) — o'lim arafasida ro'y heradigan holat.

Agranulositoz — periferik qonda neytrofil granulotsitlarning keskin kamayishi yoki bo'lmasligi bilan ta'riflanadigan alomati.

Adaptasiya — evolutsion takomillanish davrida tirik organizmnинг tashqi muhitning doimo o'zgarib turadigan sharoitlariga moslanishi.

Adgeziya — ulanish, yopishish, bitib qolishi (plevra adgeziyasi — plevaraning bitib qolishi. Quruq va ekssudativ plevritdan sog'aygandan so'ng qoladi).

Adenit — limfa tuguni (bezi) ning yallig'lanishi.

Adinamiya — behollik, qarilik, ochlik, uzoq cho'zilgan kasallikdan ro'y heradigan madorsizlik.

Azotemiya — qonda oqsil almashinuvi azot saqlovchi mahsulotlarining ortiqcha konsentratsiyasi (yig'ilishi).

Allergenlar — allergiyaga sabab bo'ladiyan antigen moddalar.

Allergiya — organizmnинг reaktivligi o'zgarishi hilan bog'liq holda turli moddalarga sezuvchanligining oshishi.

Albuminuriya — albuminlarning siyidik bilan chiqishi.

Anamnez — bermordan, uni yaxshi biladiganlardan, bemor o'zi haqida va kasallikning kelib chiqishi to'g'risida so'rab olingan ma'lumotlar majmuasi.

Anasarka (istisqo) — teriosti kletchatkasining shishib ketishi.

Anatoksinlar — maxsus ishlov berilgandan so'ng o'z zaharli xususiyatini yo'qotib, antigen va immunogen xossalariini saqlab qolgan bakterial toksinlar.

Anafilaksiya — organizmga perenteral yo'l bilan allergen yuborilgan zahoti kelib chiqadigan allergik reaksiyaning turi.

Anaeroblar — kislорodsiz muhitdagina yashaydigan mikroorganizmlar (bakteriyalar).

Angiospazm — arteriyaning tortishib, torayib qolishi, bunda qon oqimi keskin kamayadi yoki to'xtaydi.

Anevrizma — qon tomir devorining do'mbayib chiqishi yoki cho'zilishi tufayli qon tomirining anchagina kengayishi.

Anemiya — hajm birligida qonda eritrotsitlar va gemoglobin kamayishi bilan ta'riflanadigan holat, kamqonlik.

Ankiloz — bo'g'inning harakatsiz qotib qolishi, harakatsizlanishi.

Anoksiya — to'qimalarda kislorod yo'qligi.

Anomaliya — tuzilishning tug'ma nuqsoni.

Anoreksiya — batamomi ishtaha yo'qligi.

Antigenlar — organizmga tushib, immunologik javob reaksiyasi paydo qiladigan har qanday moddalar o'ziga xos maxsus antitelolar hosil qilish bilan ifodalanadi.

Antitelolar — organizmga antigenlar tushganida qon va to'qimalarda paydo bo'ladigan oqsil immun moddalar.

Anuriya — siydiq chiqmasligi, buyraklarning siydiq ajratmay qo'yishi.

Apnoe — nafasning vaqtincha to'xtab qolishi.

Aptializm — so'lak chiqmasligi, og'iz qaqrashi.

Aritmiya — yurak normal ritmining buzilishi.

Arterioskleroz — arteriyalarning o'zgarishi, bunda ularning devorlari qattiq va qalin bo'lib qoladi.

Asistoliya — yurak blokadasida sistolanening tushib qolishi, yurak faoliyati susayganida yurak qisqarishlarining keskin susayishi.

Aspiratsiya — nafas yo'llariga ovqat qoldiglari, qon, tish protezlari va yet jismlar tushib qolishi.

Astma — birdan bo'g'ilish, nafas siqib qolishi, bronxlar teshigining birdan torayib qolishiga yoki o'tkir yurak, asosan, chap qorincha yetishmovchiligiga bog'liq bo'ladi (yurak astmasi).

Asfksiya — bo'g'ilish: qonda birdan kislorod yetishmasligi va organizmda karbonat angidrid yig'ilib qolishi bilan ifodalanadigan patologik holat va organizmning hayot uchun muhim funksiyalari, asosan, nerv sistemasi, nafas va qon aylanish sistemasi faoliyati buzilishi bilan ta'riflanadi.

Assit — qorin istisqosi—qorin bo'shlig'ida ko'p miqdorda erkin suyuqlik (odaida, transsudat) yig'ilishi.

Atelektaz — o'pka pufakchalarining havosizlanishi yoki ularda havo kam bo'lishi natijasida o'pka yoki bir qismining puchayishi.

Ateroskleroz — arteriya devorlarining zichlashuvi va elastikligining yo'qolib ketishi, teshigining torayib qolishi bilan ta'riflanadigan surunkali kasallik, organlarning qon bilan ta'minlanishi buzilishiga olib keladi.

Atrofiya — hujayralar, to'qimalar va organlarning kichrayib qolishi, shuningdek, ularda sifat o'zgarishlari paydo bo'lishi bilan ifodalanadigan jarayon.

Auskultatsiya — ishlab turgan ichki organlardan chiqadigan tovushlarni eshitish, organlarning qanday ishlayotganini bilish uchun qo'llaniladigan tekshirish usuli.

Autogemoterapiya — odamni o'z qoni bilan davolash.

Axiliya (me'da axiliyasi) — me'da shirasida butunlay xlorid kislota va fermentlar bo'imasligi.

Axoliya — o'n ikki barmoqli ichakka o't tushmay qolishi.

Asetonuriya — siyidik bilan ko'p miqdorda aseton chiqishi

Asidoz — organizmda kislota-ishqor muvozanatining buzilishi: qon va to'qimalarda uchuvchan va uchmaydigan kislotalar anionlarining haddan tashqari ko'p bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Bazedor kasalligi — kattalashgan qalqonsimon bez funksiyasi kuchayganda kelib chiqadigan kasallik.

Bakteriyemiya — qonda bakteriyalar bo'lishi.

Bakteruriya — yangi siyidikda bakteriyalar bo'lishi.

Balneologiya — kurortologyaning mineral suvlari, ularning fizik-kimyoviy xususiyati, fiziologik hamda har xil kasalliliklarda organizmga ta'sirini o'r ganadigan, davolash-profilaktika maqsadida qo'llanishini ishlab chiqadigan bo'limi.

Beri-beri — ovqatda B₁ vitamini (anevrin) yetishmasligidan kelib chiqadigan o'tkir, o'rtacha o'tkir yoki surunkali kasallik.

Bigeminiya — aritmiya, bunda yurak har bir normal qisqorganidan so'ng ekstrasistola ro'y beradi (qo'shimcha sistola).

Blastoma — chin o'sma, mustaqil rivojlanish xususiyatiga ega bo'lgan o'sma.

Bradikardiya — yurak urishining sekinlashuvi, minutiga 60 martadan kam urishi.

Bradipnoe — nafas olishning beixtiyor sekinlanishi, susayishi, minutiga 12—10 va bundan ham kamroq marta nafas olish.

Bronxit — bronx shilliq pardasining yallig'lanishi.

Bronxopnevmoniya — ingichka mayda bronxlarning yallig'lanib, o'pka to'qimasiga ham o'tib ketishi natijasida hosil bo'lgan kasallik.

Bronxospazm — mayda bronxlar va bronxiolalar teshigining torayishi.

Bronxoektatik kasallik — nafas organlarining kasalligi, bronxlar kengayishi (bronxoekta zlar) bilan o'tib, uzoq davom etadi, ko'pincha avj olib boradi va yiringli asoratlar qoldiradi.

Bulimiya — ochlikni patologik kuchli his qilish, ko'pincha to'shosti sohasida og'riq, achishish sezish bilan o'tadi.

Vazodilatatsiya — qon tomirlar kengayishi.

Vaksina — mikroblar va ularning hayot faoliyatida paydo bo'ladigan mahsulotlardan olinadigan preparatlar odam va hayvonlar kasalligining oldini olish yoki davolash maqsadida aktiv immunizatsiya uchun ishlatiladi.

Vaksinatsiya — yuqumli kasalliklarga qarshi aktiv immunitet hosil qilish.

Vaksinoterapiya — vaksina bilan davolash.

Venopunksiya (venepunksiya) — qon olish yoki qon, dori eritmalar, qon o'rnnini bosuvchi suyuqlik kabilarni quyish uchun teri orqali venaga igna kiritish.

Vibratsion kasallik — vibratsiya ta'sirida kelib chiqadigan kasbiy kasallik.

Volchanka (qizil yugurik) — ko'p ichki a'zolarni qamraydigan, biriktiruvchi to'qimani va qon tomirlarni shikastlaydigan kollagen kasalliklar guruhiga oid og'ir kasallik.

Galaktozuriya — galaktoza (aldegidli qand)ning siyidik bilan chiqishi (qand, bazedov kasalligi, jigar kasalliklarida, origlab ketganda).

Gastrit — me'da shilliq pardasining yallig'lanishi, me'da katari.

Gastroduodenit — me'da va o'n ikki barmoqli ichak shilliq pardasining yallig'lanishi.

Gastroskopiya — me'dani ichki yuzasini maxsus asbob-gastroskop yordamida tekshirish usuli.

Gastroenteroklit — me'da va ichak yo'llarining o'tkir yallig'lanishi, ingichka va yo'g'on ichaklar yoki ularning bo'limlari kasallanadi.

Gelioterapiya — quyosh nurlari bilan davolash usuli.

Gelmintozlar — parazit qurtlar — gelmintlar keltirib chiqaradigan odam, hayvon, o'simliklar kasalliklari.

Gelmintlar (gijjalar) — ichak parazitlari, odam, hayvon va o'simliklarda kasallik keltirib chiqaradi.

Gemagglutinatsiya — qizil qon tanachalarining yopishish va so'ng cho'kish jarayoni, buni gemaglutininlar (eritrotsitlarni yopishishga olib keluvchi antitelolar) bakteriya va viruslar, eritrotsitlar yuzasiga surilib qolish xususiyatiga ega bo'lgan moddalar keltirib chiqaradi. Gemagglutinatsiya reaksiyasiga qon quyish va qon guruhini aniqlash qonuniyatları asoslangan.

Gematopoez — qon yaratilishi — qon shaklli elementlari (qizil va oq qon tanachalari)ning hosil bo'lishi.

Gematologiya — qon tarkibi va xossasini, shuningdek, qon kasalliklarini o'rganuvchi fan.

Gematoma — suyuq va quyulib qolgan qonga to'la to'qimalardagi chegaralangan bo'shliq.

Gematuriya — siyididan qon ajralishi.

Gemoliz (gematoliz, eritrositoliz) — eritrotsitlarning yemirilish jarayoni: bunda eritrotsit tarkibidagi gemoglobin plazmaga o'tib ketadi.

Gemometr, gemoglobinometr — qondagi gemoglobin miqdorini aniqlaydigan asbob.

Gemorragiya — qon tomir devori buzilishi natijasida undan qon oqishi, gavda bo'shliqlariga va to'qimaga qon quyilishi.

Gemostaz — gavdaning ayrim qismlarida qon tomirlarida qon yurishining to'xtab qolishi.

Gemoterapiya — qon, uning tarkibiy qismlari va ulardan tayyorlangan preparatlar bilan davolash.

Genetika — kasallikning kelib chiqishi, paydo bo'lishi, vujudga kelishi va rivojlanishi.

Gepatit — jigar parenximasining yallig'lanishi.

Gepatomegaliya — jigarning haddan tashqari kattalashuvi.

Gepatoptoz — jigarning pastga tushishi, jigarning odatdan tashqari pastda joylashuvi va harakatchan bo'lib qolishi.

Gepatosplenomegaliya — jigar bilan taloqning kattalashuvi.

Geratriya — yoshi o'tgan va keksalarda uchraydigan kasalliklar hamda ularni davolash haqidagi fan.

Gerontologiya — tirik organizmlar, shu jumladan, odam tuzilishi qonuniyatlari o'rganadigan biologiya va tibbiyotning bir bo'limi.

Gigantizm — yosh va jinsga mos kelmaydigan bo'yning haddan tashqari o'sib ketishi, nihoyatda baland bo'yli.

Gidremiya — qonda suv miqdorining ortib ketishi, qonning suyulishi (kamqonlikda, yurak va buyrak kasalliklarida bo'ladi).

Gidronefroz — buyrak kasalligi, uning bo'shlilari turg'un kengayishi va to'qima hajmining kichrayishi bilan ta'riflanadi, bunda buyrakda gemosirkulatsiya va siyidik oqib chiqishi izdan chiqishi oqibatida uning asosiy funksiyalari susayishi zo'rayadi.

Gidroperikard — yurak xaltasi bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi.

Gidroterapiya — suv bilan davolash: harorati har xil suvni umumiyligi va mahalliy vanna, shuningdek, dush ko'rinishida davolash va kasallikning oldini olish maqsadida ishlatalish.

Gidrotoraks (ko'krak istisqosi) — yallig'lanishga oid bo'limgan suyuqlik (transsudat)ning plevra bo'shlig'iga yig'ilishi.

Gipergidroz — ko'p terlash.

Giperglikemiya — qonda qand miqdorining me'yordan ko'p bo'lishi.

Giperemiya — mikrosirkulator sistemaga qon oqib kelishi kuchayishi tufayli periferik tomirlar sistemasining hiror uchastkasida qon to'liqligining oshishi, qizarish.

Giperpnoe — nafas olishning tezlashuvi va odatdagidan ko'ra chuqurroq bo'lish holati.

Gipertireoz, gipertireoidizm — qalqonsimon bez faoliyatining kuchayishi va u bilan bog'liq kasalliklar.

Gipertrofiya — to'qima, a'zo yoki uning bir qismi hajmining kattalashuvi.

Gipovitaminozlar — organizmda vitaminlar kamayishi bilan bog'liq kasalliklar.

Gipoglikemiya — qonda qand miqdorining kamayishi.

Gipoksiya — to'qimalarda kislород miqdorining kamayishi.

Gipostenuriya — buyraklar konsentratsion (yig'ish) qobiliyatining pasayishi: buyrak naychalarining glomerular filtrati konsentrash qobiliyatining yo'qolishi natijasida solishtirma og'irligi past siydkning ajralishi.

Gipotireoz — qalqonsimon bez faoliyatining pasayishi va u bilan bog'liq kasalliklar.

Gipotoniya — arterial qon tomir bosimining pasayishi.

Gipoxolesterinemiya — qonda xolesterin miqdorining kamayishi.

Gippokrat yuzi — qorindagi a'zolarning og'ir kasalliklarida yuz bichimining o'zgarishi, buni dastlab Gippokrat tasvirlagan.

Glikozuriya — siyidik bilan glukozaning ajralib chiqishi, bu qandli diabetning asosiy elementlaridan biri.

Glomerulonefrit — buyrak jomchalarining yallig'lanishi, arterial tomirlarda qon bosimining ortishi bilan kechadi.

Gonit, gonartrit — tizza bo'g'inining yallig'lanishi.

Dekompensatsiya — kompensatsiyaning buzilishi, muvozanatning yo'qolishi: bir yoki bir necha a'zolar faoliyati buzilishi natijasida kelib chiqadigan patologik holat.

Dekstrakardiya — yurakning ko'krak qafasining o'ng tomonida tug'ma joylashgan bo'lishi.

Desensibilizatsiya — biron-bir modda ta'siriga organizmning oshgan o'ta sezuvchanligini kamaytirish yoki bartaraf etish.

Diabet — ko'p miqdorda siyidik ajrab chiqishi bilan yoki organizmdan ayrim kimyoviy moddalarning ajrashi bilan kechadigan kasallik; qandli diabet (qandli siyish, qand kasalligi) — murakkab neyroendokrin buzilishlardan kelib chiqadi; bunda asosiy o'rinni me'daosti bezining orolchalaridagi β -hujayralari insulinni kam ishlab chiqarishi egallaydi.

Diareya — ich ketish, ichak peristaltikasi zo'rayganda ich ketishi, tez-tez va suyuq ich surishi.

Diastola — yurakning mushak devori bo'shashidan uning bo'shliqlari kengayishi va qonga to'lishi.

Diatezlar — organizmning ba'zi kasalliklarga moyillik holati.

Diaforez — haddan tashqari ko'p terlash, ter ajralishi.

Diyetoterapiya — bemorlarni maxsus ovqatlar bilan davolash.

Dizuriya — qovuqdan siyidik chiqishining qiyinlashuvi natijasida siyishning izdan chiqishi.

Dilatatsiya — yurakning hir yoki ikkala bo'l machasining, bir yoki ikkala qorinchasining kengayishi.

Disgevziya — ta'm bilishning buzilishi.

Dispanserizatsiya — kasalliklarni aniqlash va davolashga qaratilgan sog'liqni saqlash chora-tadbirlari sistemasi; aholining muayyan guruhi salomatligi ustidan o'rnatiladigan shifokor nazorati.

Dispepsiya — ovqat hazm qilishning buzilishi.

Disseminatsiya — patologik jarayonning qon yoki limfa orqli tarqalishi, mas., sil, o'sma tarqalishi.

Distoniya — mushak va qon tomirlar tonusining me'yordan o'zgarishi, og'ishi; ha'zi to'qimalarda tonusning oshgan yoki pasaygan bo'lishi.

Distrofiya — ovqat moddalari kam iste'mol qilinganda to'qimalar, a'zolar va umuman, organizm oziqlanishining buzilishi.

Disfagiya — og'riqli yutim: halqum mushaklari falajlanishi natijasida yutimning buzilishi.

Disfunksiya — organizm sistemalari, a'zolari va to'qimalar funksiyasining buzilishi.

Diurez — siyidik hosil bo'lishi va chiqishi.

Donor — kasallarni davolash uchun ixtiyoriy ravishda qon yoki biror organini beruvchi kishi.

Duodenit — o'n ikki barmoqli ichakning yallig'lanishi.

Ileus — ichak tutilishi, ichak harakatlanishining falaji.

Immunizatsiya — odam va hayvonlar orasida yuqumli kasalliklarning oldini olish choralar sifatida ularda immunitet hosil qilish usuli.

Immunitet — organizmning infeksiyani yoki biron-bir infeksion moddani o'ziga yuqtirmasligi.

Ingalatsiya — dori moddalarni nafasga tortish yo'li bilan organizmga dori kiritish usuli.

Induratsiya — har xil patologik jarayonlar tufayli a'zo yoxud to'qima-ning qattiqlanishi.

Inertlik — harakatsizlik, behollik, bo'shashishlik.

Inkapsulatsiya — g'iloflanish, g'ilofga o'ralish, organizmga tushgan yot moddalarning biriktiruvchi to'qima bilan qoplanishi.

Intoksikatsiya — organizmning tashqaridan kiritilgan yoki o'zida hosil bo'lgan zahartlar bilan zaharlanishi.

Infarkt — qon bilan ta'minlanishning to'xtashi natijasida o'lgan to'qima sohasi.

Infuziya (quyish, inyeksiya) — ko'p miqdorda suyuqlik (fiziologik eritma, eritrotsitar massa, plazma, qon o'rnni bosadigan suyuqlik va h.k.)larni, odatda, tomchi usulida teri ostiga, venalarga yoki to'g'ri ichakka yuqori ko'tarib qo'yilgan asbob yo irrigator yordami bilan yuborish.

Irradiatsiya — og'riqning shikastlangan sohadan yoki kasal a'zodan yon tomonlarga tarqalishi.

Ishemiya (mahalliy kamqonlik) — organizmning ayrim bo'lagida, a'zo yoki to'qimada qonning kam bo'lislis holati.

Ishuriya — har xil sabablarga ko'ra, siyidik to'xtashi, qovuq siydikdan bo'shay olmaydi.

Kaverna — qisman to'qimasi o'lib va o'lgan massa suyuqlanib ketishi natijasida hosil bo'ladigan bo'shiq.

Kalkulez — buyrak jomida, o't pufagida yoki qovuqda tosh hosil bo'lisi.

Kalsifikatsiya — ohaklanish, to'qimalarda erimaydigan kalsiy tuzlarining to'planishi, qattiqlanish.

Kardialgiya — yurak sohasidagi og'riq.

Kardioplegiya — yurak falaji, yurak zarbasi.

Kardioskleroz — yallig'lanish yoki qon aylanish yetarli bo'lmasligi oqibatida yurakning mushak qatlamida biriktiruvchi to'qima (keyin chandiq) rivojlanishi bilan bog'liq patologik holat.

Kardiospazm — qizilo'ngachning me'daga kiradigan qismi — kardiyaning torayib qolishi, qizilo'ngachning yuqori bo'limlari kengayib qoladi.

Kardiosentez — yurakka sanchish (igna bilan), yurakni punksiya qilish.

Karsinoma — rak — yassi yoki bez epiteliysidan rivojlanadigan xavfli o'sma; tez o'sishi; yemiruvchi xususiyati, yaraga aylanishga moyilligi, metastazlar hosil qilish va qaytalanish bilan ajralib turadi.

Katar (kataral yallig'lanishi) — shilliq pardanining ekssudat (serozli ekssudat) hosil bo'lishi bilan o'tadigan yallig'lanish.

Kaxeksiya — tinkani quritadigan har xil kasalliklarda, surunkali zaharlanishlarda oziqlanish to'la sifatli bo'lmaganda, ro'y beradigan klinik-anatomik alomat; haddan tashqari ozish, jismoniy bo'shashish va umumiy asteniya holatlari bilan ta'riflanadi.

Kolit — yo'g'on ichak shilliq pardasining yallig'lanishi.

Kollaps — yurak faoliyatining keskin susayib ketishi va tomirlar tonusining pasayishidan kelib chiqadigan holat.

Koma — qattiq hushdan ketish: diabetik koma — insulin yuborib turish to'xtatilganda, ovqatlanish tartibi qo'pol buzilganda, o'tkir yuqumli kasallikda yoki qand kasalligiga duchor bo'lgan odam jarohatlanganda kelib chiqadi.

Kompensatsiya — baravarlashtirish, organizmda kasallik sababli yuz bergan buzilishlarni tegishli moslamalarni rivojlantirish yo'li bilan to'g'rilash, izga solish, masalan, klapanilardagi nuqsonlarda yurak mushagining gipertrofisi.

Konstitutsiya — organizmning funksional va morfologik xususiyatlarining majmuasi.

Kontraktura — yumshoq to'qimalar (teri, mushak, boylam, fassiya yoki asablar)ning shikastlanishi oqibatida bo'g'in harakatining chegaralanih qolishi.

Koprologiya — najas tekshirishga taalluqli ta'llimot.

Koronarit — yurak toj arteriyalarining yallig'lanishi.

Koronaroskleroz — yurak-toj arteriyalarining sklerozi.

Krizis — patologik jarayon kechishining keskin o'zgarishi.

Kumulatsiya — to'planish. Bemorga herilayotgan dorining organizmda to'planishi.

Laparotomiya — qorinni kesish — qorin bo'shlig'ini ochish.

Laringit — hiqildoq yallig'lanishi.

Leykemiya (oq qonlik) — sistema kasallik bo'lib, oq qon tanachalari hosil qiladigan to'qimalarning o'sib, ko'payib ketishi bilan ta'riflanadi.

Leykozlar — retikular stroma dastlabki hujayralarining avj oluvchi geperplastik va metaplastik o'sib qalinlashishi hamda ularning qon parenximasining turli hujayralariga dastlab o'tishi bilan xarakterlanadigan sistema kasalliklari.

Leykopeniya — perifirik qonda leykotsitlar sonining kamayishi.

Leykopoez — leykotsitlarning hosil bo'lishi.

Leykositoz — perifirik qonda leykotsitlar sonining ortib ketishi.

Liyenit (splenit) — taloq yallig'lanishi.

Lizis — isitmali kasalliklarda haroratning sekin-asta pasayishi.

Limfadenit — limfatik tugunlarning o'tkir yoki surunkali yallig'lanishi.

Limfangit — limfatik tomirlarning yallig'lanishi.

Limfopeniya — perifirik qonda limfotsitlar sonining kamayishi.

Limfositoz — perifirik qonda limfotsitlar sonining ko'payishi: surunkali yuqumli kasalliklarda kuzatiladi.

Litiaz — tosh kasalligi, asosan, buyraklarda, qovuqda va o't pufagida toshlar hosil bo'lishi.

Lyamblioz — ingichka ichak, o't yo'llari, jigarda parazitlik qiluvchi eng sodda ichak parazitlari — lyambliyalar keltirib chiqaradigan kasallik.

Mantu reaksiyasi (tuberkulinli sinama) — allergik diagnostik sinamalardan biri, sil kasalligini aniqlash uchun ishlataladi.

Mediastinum (ko'ks oralig'i) — o'ng va chap o'pkalar orasidagi joyalashgan ko'krak qafasining o'rta qismi: old qismida — yurak, buqoq (ayrisimon) bezi, qon tomirlar, diafragmaning asab tolalari joyalashgan; orqa qismida qizilo'ngach, aortaning ko'krak qismi, adashgan asab tolalari va boshqalar joyalashgan.

Metastaz — surilish, o'tish — o'sma hujayralarinining boshlang'ich o'choqdan organizmning boshqa joylariga o'sib o'tishi.

Meteorizm — hazm yo'lida ko'p yel (gaz) to'planishi: bir qancha kasalliklarning tez uchrab turadigan helgisi.

Migratsiya — ko'chib yurish, surilish.

Miksедема (shilliqli shish) — qalqonsimon bez faoliyatining izdan chiqishi yoki susayishi natijasida kelib chiqadigan kasallik.

Miokardit — yurak mushaklarining yallig'lanishi.

Mitsetizm — qo'ziqorinlardan zaharlanish.

Nanizm — jismoniy o'sishdan orqada qolish.

Nanomeliya — pakana odamlarda boshning juda kichik bo'lishi.

Nekroz — hujayra yoki hujayralar to'plamining tipik to'qima bilan chegaralangan holda halok bo'lishi (to'qimaning mahalliy o'limi).

Nekronefroz — buyrak kanalchalari epiteliysining nekroزلانishi va buyrak jomchalarining biroz buzilishi bilan xarakterlanadigan degenerativ o'zgarish.

Nekropsiya — o'lgan kishi jasadini tekshirish.

Nefrit — buyraklarning yallig'lanishi, asosan, buyrak jomchalarini yallig'lanadi.

Nefroanginoskleroz — buyraklarning arteriolosklerotik o'zgarishi, gipertoniya kasalligi sababli yuz beradi.

Nefroz — buyrak kasalligi, asosan, buyrak kanalchalarining degenerativ zararlanishi.

Nefrozonefrit — buyrak jomchalari yallig'lanishining buyrak kanalchali degenerativ o'zgarishlari bilan birga o'tishi.

Nefrolitaz — buyrakda tosh hosil bo'lishi.

Nefroma — buyrak o'smasi.

Nefropiyelit — buyrak parenximasи va jomingning yallig'lanishi.

Nefroskleroz — gipertoniya kasalligi yoki buyraklar yallig'lanishi natijasida qo'shuvchi to'qima o'sib, buyrakning kattalashishi, buyrak yetishmovchiligi belgilari bilan o'tadi.

Nefrosirroz — buyrak sirrozi — qo'shuvchi to'qimaning o'sib ketishi sababli buyrakning burishib, kichrayib qolishi.

Nikturiya — buyrak kasalliklarida uchraydi, tunda siyib qo'yish bilan xarakterlanadigan patologik alomat (tungi diurezning ko'payishi).

Nisha (tochka) — me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligida rentgenologik yo'l bilan tekshirishda me'da devorlardidan tashqarida ko'rindigan kichkina chuqurcha.

Nefrektaziya — buyrak kanalchalarining kengayib ketishi.

Oligouriya — siyidikning kam ajralishi.

Opsiuriya — suyuqlik ichgandan so'ng siyishning kechikib ketishi.

Ortopnoe — nafas qisishining yuqori darajasi, bunda kasal faqat o'tirib nafas oladi.

Panarteriit — arteriya qon tomiri hamma qavatining yallig'lanishi.

Panartrii — bo'g'inlarning yoki bo'g'inni tashkil qilgan barcha tuzilmalar (tog'ay, paylar, sinovial qavat, boylam apparati)ning yallig'lanishi.

Pankardit — yurak barcha qavatlarining bir vaqtida yallig'lanishi.

Pankolit — yo'g'on ichak hamma qismalarining bir vaqtida yallig'lanishi.

Pankreatit — oshqozonosti bezining yallig'lanishi.

Patogenez — kasallikning rivojlanish mexanizmi.

Patronaj — tibbiyot yordamiga muhtoj bo'lgan kasallarga uyiga borib qarab turish va tegishlichcha yordam berish.

Perikardit — yurak tashqi qavati (yurak xaltasi)ning yallig'lanishi.

Peritonit — qorin pardasining yallig'lanishi.

Piyelit — buyrak jomchasingning yallig'lanishi.

Piyemiya — qonda yiring bo'lishi.

Pionefrit — buyrakning yiringli yallig'lanishi.

Poliuriya — ko'p siyidik ajratish.

Proktit — to'g'ri ichak yallig'lanishi.

Revmokardit — revmatizm kasalligi tufayli yurak qavatlarining (perikard, miokard, endokard) yallig'lanishi.

Retinopatiya (gipertonik) — gipertoniya natijasida ko'z to'r pardasining oziqlanishi buzilib, unda katta-kichik qontalashlar shishi va tugunchalar paydo bo'lishi.

Taxikardiya — yurak urishining tezlashishi.

Taxipnoe — tez-tez, yuza-yuza nafas olish .

Toksemiya — sepsis, shuningdek, boshqa infektion kasalliklarda mikrob zaharining qonga o'tishi.

Uremiya — azotli chiqindi moddalarning organizmda yig'ilib qolishi tufayli ro'y bergen autointoksitsiya.

Xolangit — o't yo'llarining kataral yoki yiringli yallig'lanishi.

Xolangiolit — o't yo'llari kapillarlarining yallig'lanishi.

Xolesistit — o't pufagi shilliq pardalarining yallig'lanishi.

Xolesistografiya — o't pufagiga kantrast modda yuborib, rentgen apparati yordamida uning tasvirini olish.

Sirroz — organ va to'qimalarda qo'shuvchi to'qimaning o'sishi.

Sistit — qovuqning yallig'lanishi.

Ezofagit — qizilo'ngachning yallig'lanishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *V.A. Galkin.* Ichki kasalliklar. T., «Meditina», 1989.
2. *V.I. Porkovskiy.* Infekcion kasalliklar. T., 1990.
3. *F.M. A'zamxo'jayev.* Xirurgik kasalliklar. T., 1991.
4. *B.M. Makkolen.* Внутренние болезни. М., 1992.
5. *E.I. Salimov.* Xatarli allergik holatlar. T., 1993.
6. *K. Bahodirov.* Ichki kasalliklarda tashxis va diagnostika. T., 1993.
7. *V.M. Majidov.* Yuqumli kasalliklar. T., 1993.
8. *O'B. Sharopov.* Ichki kasalliklar. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 1994.
9. *A.A. Чиркин.* Диагностический справочник терапевта. Т., 1994.
10. *L.S. Zalikina.* Bemorlarning umumiylar parvarishi. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 1995.
11. *Q.G'. G'aniyev.* Sil kasalliklari. T., 1995.
12. *N.M. Kamolov.* Ichki kasalliklar. T., 1996.
13. *E.Y. Qosimov.* Ichki kasalliklar profilaktikasi. T., 1998.
14. *N.R. Paliyev.* Meditsina hamshirasi spravochnigi. T., 1998.
15. Терапевтический справочник Вашингтонского университета. (Под редакцией Ч. Кери, Ч. Ли, К. Велте). М., 2000.
16. *G.O. Haydarov, Sh.H. Ermatov.* Ichki kasalliklar. T., Abu ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2002.
17. *Э. В. Смолева.* Сестринское дело в терапии. Ростов на-Дону, «Феникс», 2003.
18. *Н. И. Федюкович.* Внутренние болезни. Ростов на-Дону, «Феникс», 2004.
19. *T.P. Obukhovets.* Сестринское дело в терапии: практикум. Ростов на-Дону, «Феникс», 2005.

M U N D A R I J A

So'zboshi.....	3
<i>1-bob. «Ichki kasalliklar» fanining rivojlanish tarixi</i>	
1.1. Tibbiyotdag'i rivojlanish davrlari.....	5
1.2. Fanga katta hissa qo'shgan o'zbek olimlari.....	15
1.3. Kasallik haqida tushuncha.....	18
1.4. Etiologiya to'g'risida tushuncha.....	19
1.5. Patogenez haqida tushuncha.....	23
1.6. Kasallikning kechishi.....	25
1.7. Bemorlarni parvarish qilish.....	27
1.8. Shoshilinch yordam ko'rsatish tizimi.....	28
<i>2-bob. Bemorni bevosita va bilvosita tekshirish usullari</i>	
2.1. Subyektiv tekshirish usullari.....	29
2.2. Obyektiv tekshirish usullari.....	32
2.3. Tana tuzilishi.....	34
2.4. Palpatsiya (ushlab ko'rish, paypaslab ko'rish).....	40
2.5. Perkussiya (urib ko'rish, tukillatib ko'rish).....	42
2.6. Auskultatsiya (eshitib ko'rish).....	43
<i>3-bob. Bemorlarni tibbiy asbob-uskunalar yordamida tekshirish</i>	
3.1. Rentgenoskopiya va rentgenografiya.....	45
3.2. Endoskopiya.....	49
3.3. Ultratovush tashxisi (UTT).....	50
3.4. Kompyuter tomografiysi.....	51
3.5. Magnit-rezonansli tomografiya (MRT).....	51
3.6. Skanerlash.....	52
3.7. EKG olish va uni sharflash.....	52
<i>4-bob. Laborator tekshirish usullari</i>	
4.1. Qonni laboratoriya tekshirvi. Qon tizimining fiziologiyasi.....	55
4.2. Gemoglobin va uning miqdorini aniqlash.....	58
4.3. Eritrotsitlar. Eritrotsitlar miqdorini aniqlash.....	60
4.4. Leykotsitlar. Leykotsitlar miqdorini aniqlash.....	63
4.5. Trombotsitlar. Trombotsitlar miqdorini aniqlash.....	65
4.6. Qonning rang ko'rsatkichini aniqlash.....	66
4.7. Eritrotsitlar cho'kish tezligini (EChT) aniqlash.....	67
4.8. Qon surtmasini tayyorlash.....	67
4.9. Qon guruhlari. Qon guruhi aniqlash.....	68

4.10. Rezus-faktorning mos kelish-kelmasligini sinash	70
4.11. Retikulotsitlarni bo'yash va sanash	70
4.12. Qalın tomchi tayyorlash	71
4.13. Qon ivuvchanligini aniqlash	71
4.14. Siyidik tahlili	72
4.15. Siydikning solishtirma og'irligini aniqlash	74
4.16. Siydikdagi oqsil miqdorini aniqlash	74
4.17. Siydikni biokimiyoviy tekshirish	75
4.18. Zimnitskiy sinaması	79
4.19. Siydikni Ambyurje usuli bo'yicha tekshirish	80
4.20. Siydikni Nechiporenko usuli bo'yicha tekshirish	80
4.21. Siydikni Addis-Kakovskiy usulü bo'yicha tekshirish	80
4.22. Balg'amni tekshirish	81
4.23. Najasni tekshirish	83
4.24. Me'da suyuqligini tekshirish	88
4.25. Me'danining sekretor funksiyasini sinov nonushtasidan keyin tahlil qilish	90
4.26. O'n ikki harmoqli ichak suyuqligini tekshirish (duodenal zondlash)	95

5-bob. Nafas olish a'zolari kasalliklari

5.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumot	97
5.2. Nafas olish a'zolari kasalliklarining asosiy alomatlari	102
5.3. Nafas olish a'zolari kasalliklarini tekshirish	106
5.4. Nafas olish a'zolarini rentgenologik tekshirish	110
5.5. Bronxitlar	111
5.5.1. O'tkir bronxit	111
5.5.2. Surunkali bronxit	112
5.5.3. Bronxial astma	113
5.6. O'tkir pnevmoniylar	117
5.6.1. O'pka zotiljami — krupoz pnevmoniya	117
5.6.2. O'choqli pnevmoniya	119
5.6.3. Krupoz va o'choqli pnevmoniyalarni davolash, oldini olish	121
5.7. O'pka yiringlashi	123
5.7.1. O'pka absesssi va gangrenasi	123
5.7.2. Bronxoektatik kasallik	127
5.8. O'pka emfizemasi va pnevmoskleroz	129
5.9. Plevritlar	131
5.9.1. Quruq plevrit	132
5.9.2. Ekssudativ plevrit	132
5.10. O'pka sili	135
5.11. Spetsifik profilaktika	139
5.12. DOTS (JSST tavsija qilgan silga qarshi kurashish strategiyasi) dasturi bo'yicha davolash	141
5.13. O'pka saratonii	142

6-bob. Yurak-qon tomirlar tizimi a'zolari kasalliklari

6.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar	145
6.2. Yurak-qon tomirlar tizimi a'zolari kasalliklarining umumiy alomatlari va tekshirish usullari	150

6.3. Yurak-qon tomirlar tizimi kasalliklarini asbob-uskunalar yordamida tekshirish	157
6.3.1. Arterial qon bosimini o'chash texnikasi	157
6.3.2. Fonokardiografiya (FKG)	160
6.3.3. Sfigmografiya (SMG)	161
6.3.4. Ossillografiya	161
6.3.5. Ballistikardiografiya (BKG)	162
6.3.6. Exokardiografiya (EXKG)	162
6.3.7. Koronarografiya (KG)	163
6.3.8. Kapillaroskopiya (KPG)	163
6.3.9. Qon aylanish a'zolarini rentgenologik tekshirish	163
6.4. Revmatizm	164
6.5. Revmokardit	167
6.6. Yurak poroklari	171
6.6.1. Mitral klapan yetishmovchiligi	172
6.6.2. Chap bo'l macha-qorincha teshigining torayishi (mitral stenoz)	174
6.6.3. Aorta klapanlari yetishmovchiligi	175
6.6.4. Aorta og'zining stenozi	177
6.6.5. Uch tavaqali klapan yetishmovchiligi	178
6.7. Yurakning murukkab poroklari	179
6.7.1. Yurak poroklarining kechishi. Qon aylanishi yetishmovchiligi	180
6.7.2. Yurak poroklari, qon aylanishi yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarni davolash, parvarish qilish	181
6.8. Ateroskleroz	182
6.9. Arterial gipertoniya	185
6.10. Gipertonik kriz	189
6.11. Yurakning ishemiya kasalliklari. Stenokardiya (ko'krak qisishi)	190
6.12. Miokard infarkti	194
6.12.1. Miokard infarktida bemorlarni davolash, parvarish qilish.	
Miokard infarktining profilaktikasi	197
6.12.2. Kardiogen shokda yordam ko'rsatish	199
6.13. Yurak astmasi	200
6.14. O'tkir tomir yetishmovchiligi	201
6.14.1. Hushdan ketish	201
6.14.2. Kollaps	202
6.15. Qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi	203

7-bo'b. Ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari

7.1. Kasallik haqida umumiy tushuncha	205
7.2. Jigar va o't yo'llari a'zolarining qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlari	208
7.3. Hazm a'zolari tizimi kasalliklarining umumiy alomatlari va tekshirish usullari	211
7.4. Me'da kasalliklari	216
7.4.1. Gastrit	216
7.4.2. O'tkir gastrit	217
7.4.3. Surunkali gastritlar	218
7.5. Me'da va o'n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi	222
7.6. Me'da saratoni	226
7.7. Ichak kasalliklari	227

7.7.1. Enterit	227
7.7.2. O'tkir enterit	227
7.7.3. Surunkali enterit	229
7.8. Koliitlar	230
7.8.1. O'tkir kolit	231
7.8.2. Surunkali kolit	232
7.9. Jigar kasalliklari	234
7.9.1. Surunkali gepatit	234
7.9.2. Jigar sirrozi	236
7.10. O't pufagi kasalliklari	239
7.10.1. Xolesistit	239
7.10.2. O'tkir xolesistit	240
7.10.3. Surunkali xolesistit	241
7.11. O't-tosh kasalligi (xolelitiaz)	242
7.11.1. O't sanchig'i xuruji	244
7.12. Me'daosti bezi kasalliklari	244
7.12.1. Pankreatit	244
7.12.2. O'tkir pankreatitlar	244
7.12.3. Surunkali pankreatit	245

8-bob. Buyrak va siyidik ajratish yo'llari kasalliklari

8.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumot	247
8.2. Siyidik hosil bo'lishi	249
8.3. Buyrak va siyidik ajratish yo'llari kasalliklarining asosiy alomatlari hamda tekshirish usullari	251
8.3.1. Siyidik ajratish a'zolari kasalliklarida tekshirish usullari	253
8.4. O'tkir diffuz glomerulonefrit (o'tkir nefrit)	254
8.5. Surunkali diffuz glomerulonefrit (surunkali nefrit)	256
8.6. Buyrak yetishmovchiligi. Uremiya	257
8.7. Surunkali diffuz glomerulonefrit, buyrak yetishmovchiligi, uremiyalarn davolash va profilaktikasi	258
8.8. Piyelonefrit. Piyelit	259
8.9. Sistit	261
8.10. Buyrak-tosh kasalligi	262

9-bob. Qon va qon ishlab chiqarish a'zolari kasalliklari

9.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar	264
9.2. Qon tizimi kasalliklarining asosiy alomatları va tekshirish usullari	267
9.3. Anemiya (kamqonlik)	268
9.4. O'tkir postgemorragik anemiya	269
9.5. Surunkali postgemorragik anemiya	270
9.6. Temir yetishmasligidan paydo bo'ladigan anemiya (temir tanqisligi anemiyasi)	271
9.7. B_{12} vitaminini (folat kislota) yetishmasligidan kelib chiqadigan anemiya (Addison-Birmer kasalligi)	272
9.8. Gemolitik anemiya	274
9.9. Gipoplastik anemiya (aplastik)	275
9.10. Leykozlar	276

9.11. O'tkir leykoz	277
9.12. Surunkali leykoz	278
9.13. Gemorragik diatezlar	280
9.14. Gemofiliya	280
9.15. Gemorragik vaskulit (Shenley-Genox sindromi, gemorragik kapillarotoksikoz)	281
9.16. Trombotsitopenik purpura (Verlgof kasalligi)	283

10-boh. Ichki sekretsiya bezlari va moddalar almashinuvi kasalliklari

10.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar	285
10.2. Endokrin sistemasi kasalliklarining asosiy alomatlari va tekshirish usullari	288
10.3. Ichki sekretsiya bezlari kasalliklarda laborator tekshirish usullarining ahamiyati	289
10.4. Qalqonsimon bez kasalliklari	290
10.4.1. Endemik buqoq	290
10.4.2. Bazedov kasalligi.Tireotoksikoz	291
10.4.3. Miksedema	293
10.5. Qandsiz diabet	295
10.6. Moddalar almashinuvi kasalliklari	296
10.7. Qandli diabet	299
10.7.1. Qandli diabet kasalligini davolash va profilaktikasi	301
10.8. Diabetik koma (giperglikemik koma)	305
10.8.1. Giperglikemik komani davolash	306
10.8.2. Gipoglikemik koma	307
10.9. Podagra	308
10.10. Yog' bosish (semirish)	310

11-boh. Suyak-mushak tizimi va biriktiruvchi to'qima kasalliklari

11.1. Qisqacha anatomik-fiziologik ma'lumotlar	312
11.2. Revmatoid artrit	313
11.3. Infektion artritlar	315
11.3.1. So'zakli artrit	315
11.3.2. Zaxmli artrit (sifilitik artritlar)	316
11.3.3. Brutselloz artriti	317
11.4. Tizimli qizil yugurik	318

12-boh. Kasbga oid kasalliklar

12.1. Kasbga oid kasalliklar to'g'risida ma'lumot	319
12.2. Pnevmoniozlar	319
12.3. Tebranish kasalligi (vibratsion kasallik)	321
12.4. Nur kasalligi	322

13-boh. O'tkir allergozlar. Allergiya va allergik kasalliklar

13.1. Umumiyl tushuncha	325
13.2. Anafilaktik shok	326
13.3. Dori allergiyasi	331
13.4. Kvink shishi. Eshakemi	333

14-bo'b. Gipo va avitaminozlar

14.1. Vitaminlar to'g'risida umumiy ma'lumotlar	338
14.2. <i>B₁</i> vitamini (tiamin, anevrin) yetishmasligi	340
14.3. <i>B₂</i> vitamini (riboflavin, laktoflavin, flavaksin) yetishmasligi	342
14.4. <i>B₃</i> vitamini (nikotin kislota, PP vitamini, nikotinamid, niatsin, pellagraga qarshi vitamin) yetishmasligi	343
14.5. C vitamini (askorbat kislota) yetishmasligi	344
14.6. A vitamini (retinol) yetishmasligi	345
14.7. D vitamini (kalsiferol, <i>D₁</i> , <i>D₂</i> , <i>D</i> vigantol) yetishmasligi	346
14.8. E vitamini (tokosferol) yetishmasligi	346
14.9. <i>B₆</i> vitamini (adenin, adenin kislota) yetishmasligi	347
14.10. <i>B₅</i> vitamini (pantotenat kislota, pantoten) yetishmasligi	348
14.11. <i>B₉</i> vitamini (piridoksin) yetishmasligi	348
14.12. <i>B₁₂</i> vitamini yoki <i>H</i> (para-aminosolitsil kislota) yetishmasligi	349
14.13. <i>B₁₃</i> vitamini (<i>H</i> vitamini, biotin, seboreyeqa qarshi omil—antiseboreyali omil) yetishmasligi	350
14.14. <i>B₉</i> vitamini (folat kislota, folatsin, <i>B_c</i> vitamini) yetishmasligi	350
14.15. <i>B₁₅</i> vitamini (orot kislota, uratsil karbonli kislota) yetishmasligi	351
14.16. <i>B₁₆</i> vitamini (pangam kislota) yetishmasligi	351
14.17. K vitamini (filloksinon, farkoxinon, vikasol) yetishmasligi	352
14.18. P vitamini (rutin, sitrin) yetishmasligi	353
14.19. B vitamini (karnitin) yetishmasligi	354

15-bo'b. Kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda shoshilinch yordam ko'rsatish

15.1. Anafilaktik shokda shoshilinch yordam ko'rsatish	355
15.2. Bronxial astma xurujida shoshilinch yordam ko'rsatish	357
15.3. Astmatik holatda shoshilinch yordam ko'rsatish	358
15.4. Asfiksiya (bo'g'ilish)	359
15.5. Buyrak sanchig'ida shoshilinch yordam ko'rsatish	360
15.6. Gipertonik krizda shoshilinch yordam ko'rsatish	361
15.7. Giperlikemik komada shoshilinch yordam ko'rsatish	362
15.8. Gipoglikemik komada shoshilinch yordam ko'rsatish	363
15.9. Jigar sanchig'ida shoshilinch yordam ko'rsatish	364
15.10. Jigar komasida shoshilinch yordam ko'rsatish	365
15.11. Ichak sanchig'ida shoshilinch yordam ko'rsatish	366
15.12. Kollapsda shoshilinch yordam ko'rsatish	366
15.13. Kardiogen shokda shoshilinch yordam ko'rsatish	367
15.14. Miokard infarktida shoshilinch yordam ko'rsatish	368
15.15. Surunkali yurak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish ..	369
15.16. O'pka shishida shoshilinch yordam ko'rsatish	371
15.17. O'tkir nafas yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish ..	371
15.18. O'tkir yurak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish ..	372
15.19. O'tkir buyrak yetishmovchiligidagi shoshilinch yordam ko'rsatish ..	374
«Ichki kasalliklar» fanida ko'p qo'llaniladigan atamalar izohi	375
Foydalilanilgan adabiyotlar	385

A80 JAMOA. Ichki kasalliklar. Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «ILM ZIYO», 2013, 392-b.

**UO'K 616.1/4 (076)
KBK 54.1**

ISBN 978-9943-16-137-5

**YO'LDOOSH LATIPOVICH ARSLONOV,
TO'RA ABDULLAYEVICH NAZAROV,
ABDUMANNOP ABDUSAMIYEVICH BOBOMURODOV**

ICHKI KASALLIKLAR

Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2013

**Muharrir I. Usmonov
Badiiy muharrir Sh. Odilov
Texnik muharrir F. Samadov
Musahih M. Ibrohimova**

Noshirlik litsenziyasi Al № 166, 23.12.2009-y.

2013-yil 31-mayda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90¹⁶.
«Tayms» harfida terilib, ofset usulida chop etildi. Bosma tabog'i 24,5.
Nashr tabog'i 23,0. 817 nusxa. Buyurtma № 39

«ILM ZIYO» nashriyot uyi. 100129, Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30-uy.
Sharhnomalar № 30—2013.

**«PAPER MAX» bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30-uy.**