

А.А. РАҲИМҚОРИЕВ, М.А. ТЎХТАХОДЖАЕВА


ГЕОМЕТРИЯ

8

**Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфҳои 8-уми
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ**

Нашри чоруми такмилёфта ва пурракардашуда

*Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ўзбекистон ба нашр
тавсия намудааст*



ТОШКАНД
«YANGIYO'L POLIGRAPH SERVICE»
2019

Муқарризон:

Н.А. Умарова — омӯзгори калони МХБТИ – ХТХ вилояти Тошканд;

Г.А. Фозилова — омӯзгори фанни математикаи мактаби таълими миёнаи умумии рақами 274-уми ноҳияи Юнусободи шаҳри Тошканд.

Китоби дарсӣ аз тарафи таълими маркази Республика 25 – уми ноябри соли 2018 дар асоси модули блоки фанҳои аниқ ва дастури таълими миёнаи умумӣ барои синфи 8-ум навишта шудааст. Ба китоби дарсӣ мувофиқи нишондоди таълими миёнаи умумӣ мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни математика ва талаботи ба фаолияти саводхонии донишомӯзон гузошта шуда акс ёфтааст. Китоби дарсӣ барои дар донишомӯзон ташаккул додани элементҳои компетенсиявии фанниро фаро гирифтааст.

Дар ҷараёни аз нав тақмилсозӣ фикрҳои экспертон ва тақризчиён ба инобат гирифта шуд.

Дар охири ҳар як боб тестҳо ва намунаи корҳои назоратӣ оварда шудааст, ки ин барои ба корҳои назоратӣ пухта тайёрӣ دیدан кӯмак мерасонад.







Дар рукни маълумотҳои таърихӣ оиди хизматҳои бузурги олимону файласуфонамон, ки дар ин соҳа ҳиссаи беқиёс ва корҳои илмию таърихӣ гузоштаанд, шинос хоҳед шуд.

Дар рукни «забони англисиро меомӯзем» тарҷумаи истилоҳҳои муҳими математикӣ дар мавзӯҳои додашуда ба забони англисӣ оварда шудааст.

Аз масъалаҳои ба қисми такрорӣ додашуда дар давоми сол истифода хоҳед бурд.

Барои аз худ намудани донишҳои ба ҳар як мавзӯҳои додашуда ба Шумо муваффақиятҳо орзумандем!

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢИ КИТОБИ ДАРСӢ:

-  - Қоида, ҳосият, таърифҳо;
-  - Савол ва супоришҳои ғаёлуқунанда;
-  - Машқҳои дар синф иҷроқунанда;
-  - Машқҳои инкишофдиҳанда;
-  - Намунаи ҳалли масъалаҳо;
-  - Машқҳо барои супориши вазифаи хонагӣ.

Аз ҳисоби маблағҳои бунёди мақсадноки китоби Республика ба иҷора ҷоп шудааст

ТАКРОРИ МАВОДҲОИ ДАР СИНФИ 7-УМ ОМУҲТАШУДА

1. Масъалаҳо доир ба периметр, биссектриса ва баландии секунҷа

Савол, масъала ва супоришҳо

1. Периметр, медиана, баландӣ ва биссектрисаи секунҷа чист?
2. Биссектрисаи секунҷаи периметраш ба 18 см баробар буда онро бо ду секунҷаҳои периметраш ба 12 см ва 15 см баробар ҷудо мекунад. Биссектрисаи секунҷаро ёбед (расми 1).
3. Медианаи ба асоси секунҷа фаровардашуда онро ба ду секунҷаҳои периметрҳояш ба 18 см ва 24 см баробар буда ҷудо мекунад. Тарафи паҳлӯии хурди секунҷаи додашуда ба 6 см баробар аст. Тарафи паҳлӯи калони онро ёбед (расми 2).
4. Дар секунҷаи ABC , ки $AB=BC$ ва медианаи BD ба 6 см баробар аст. Периметри секунҷаи ABD ба 24 см баробар аст. Периметри секунҷаи дода шударо ёбед (расми 3).

Дода шудааст: дар $\triangle ABC$: $AB=BC$, $BD=6$ см – медиана, $P_{ABD}=24$ см.

Ёфтани лозим: $P_{ABC}=?$

Ҳал. 1) $P_{ABD}=AB+BD+AD$, аз ин:




$$24=AB+AD+6, AB+AD=24-6, AB+AD=18 \text{ (см).}$$

2) $AB=BC$ ва $AC=2AD$, дар ин ҳолат

$$P_{ABC}=AB+BC+AC=2(AB+AD)=2 \cdot 18=36 \text{ (см).}$$

Ҷавоб: $P_{ABC}=36$ см.



5. Ду тарафи секунҷа ба 0,5 дм ва 8,7 дм баробар аст. Дар ҳолати адади натуралӣ дарозии будани тарафи сеюмро доништа ҳамин тарафро ёбед.
6. Биссектрисаи секунҷаи периметраш ба 30 см баробар буда онро бо секунҷаҳои периметраш ба 16 см ва 24 см баробар буда ҷудо мекунад. Биссектрисаи секунҷаро ёбед.




7. Баландии секунҷаи периметраш ба 36 см баробар буда онро бо секунҷаҳои периметраш ба 18 см ва 24 см баробар буда чудо мекунад. Баландии секунҷаро ёбед.
8. Периметри секунҷаи баробарпахлӯ 22,5 см, тарафи пахлӯиаш бошад, 0,6 дм. Асоси ҳамин секунҷаро ёбед.


2. Аломатҳои баробарии секунҷаҳо, масъалаҳо доир ба суммаи кунҷҳои секунҷа ва хосиятҳои кунҷи берунӣ

9. Дар секунҷаҳои ABC ва DEF : $AB = DE$, $AC = DF$, $\angle A = \angle D$. Оё ин секунҷаҳо баробаранд?
10. Нисбати кунҷҳои дохилии ба кунҷи берунии 117° -а ҳамсоя набудан секунҷа $5:4$ аст. Кунҷҳои дохилии секунҷаро ёбед.
11. Дар секунҷаҳои баробартарафи ABC , биссектрисаҳои AD ва BE дар нуқтаи O якдигарро мебуранд. Кунҷи байни биссектрисаҳои AOE -ро ёбед.
12. Оё дар секунҷаи баробарпахлӯ кунҷи асоси он кунд шуда метавонад? *Ҳал.* Ба мо маълум аст, ки дар секунҷаи баробарпахлӯ кунҷҳои назди асос баробаранд. Аммо суммаи ду кунҷи кунд аз 180° калон мебошад. Ин ба теоремаи доир ба суммаи кунҷҳои дохилии секунҷа муқобил аст. *Ҷавоб:* не, шуда наметавонад.
13. Нисбати кунҷҳои дохилии ҳамсоя набуда, ба кунҷи берунии 180° -аи секунҷа мисли $2:7$ аст. Кунҷҳои дохилии секунҷаро ёбед.
14. Ду тараф ва кунҷи як секунҷа мувофиқан бо ду тараф ва кунҷи секунҷаи дуюм баробаранд. Оё ин секунҷаҳо баробаранд?
15. Дар секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ тарафҳои AB ва A_1B_1 , BC ва B_1C_1 баробар, инчунин ба тарзи мувофиқ ба тарафҳои AB ва A_1B_1 гузаронида, медианаи CD ва C_1D_1 ҳам баробар аст. Баробарии секунҷаро исбот кунед.
16. Дар расми 4 $AB = AC$ ва $AE = AD$. $BD = CE$ буданшаро исбот кунед.
17. Дар расми 5 $AD = CF$, $AB = FE$ ва $CB = DE$. $\angle 1 = \angle 2$ буданашро исбот намоед.
18. Кунҷи B -и секунҷаи ABC ба 42° ва кунҷи берунии назди қуллаи A ба 100° баробар аст. Кунҷи ACB -ро ёбед.
19. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC кунҷи C рост аст, кунҷи берунии қуллаи A ба 136° баробар аст. Кунҷи B -ро ёбед.





БОБИ 1. ЧОРКУНЧАҲО



§ 1.


ЧОРКУНЧАҲОИ АСОСӢ ВА ХОСИЯТҲОИ ОНҲО

1. ХОСИЯТИ КУНҶҲОИ ДОХИЛӢ ВА БЕРУНИИ БИСӢРКУНҶА



1. Бисёркунҷаҳо. Шакли аз порчаҳои $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$ сохта шударо дида мебароем. Порчаҳо ҳаминтавр чойгиранд, ки ҳеҷ кадоми аз ду порчаи ҳамсоя (онҳо ба қуллаи умумӣ соҳиб) дар як хати рост намехобад, порчаҳои ҳамсоя набуда бошад, ба нуқтаи умумӣ соҳиб нестанд (расми 1). Ин гуна шакл **бисёркунҷа** ном дорад. Нуқтаҳо (қуллаҳо)-и A_1, A_2, \dots, A_n **қуллаҳои бисёркунҷа**, порчаҳои $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$ бошад, **тарафҳои бисёркунҷа** номида мешавад.

Тарафҳои бисёркунҷа ба шумораи қуллаҳои он, яъне ба шумораи кунҷҳо баробар аст. Қуллаҳо (тарафҳо)-и бисёркунҷа муофики шуморааш ба **секунҷаҳо, чоркунҷаҳо, панҷкунҷаҳо** ва ҳоказо тақсим мешаванд.

Агар хати шикастаи сарбаста якдигарро набурад, ин **хати шикастаи содда** ном дорад. Он нуқтаҳои ба хати шикаста тааллуқ надоштаи ҳамвориро ба ду соҳа – **соҳаҳои дохилӣ ва берунӣ** ҷудо намуда, ин чунин вазифаи ҳудуди умумиро иҷро менамояд. Дар расми 1 соҳаи дохилӣ ранг карда нишон дода шудааст.



Таърифи 1. Бисёркунҷае, ки аз хати рости ягон тарафро дарбаргиранда дар як нимҳамворӣ воқеъ аст, **бисёркунҷаи барҷаста** номида мешавад. Дар ин ҷо ҳуди хати рост ба ҳамин нимҳамворӣ тааллуқдошта ба ҳисоб меравад.




Масалан, дар расми 2, a ва 3, бисёркунҷаи барҷаста, дар расми 2,6 бошад, бисёркунҷаи ғайрибарҷаста тасвир ёфтааст. Секунҷаи дилхоҳ – бисёркунҷаи барҷаста аст (расми 3).

2. Хосияти кунҷҳои дохилӣ ва берунии бисёркунҷа.

Таърифи 2. *Кунҷи дохилии қуллаи додашудаи бисёркунҷа гуфта, кунҷеро меноманд, ки онро ҳамон тарафҳои дар қулла бархӯранда (вохӯранда) ҳосил кардаанд.*

Теоремаи 1.

Суммаи кунҷҳои дохилии n -кунҷаи барҷаста ба $180^\circ (n-2)$ баробар аст, дар инҷо n -адади тарафҳо мебошад.




Исбот. $A_1A_2A_3\dots A_n$ – барҷастаи додашуда кунҷи n ва $n > 3$ бошад (расми 4). Аз яке қуллаҳо, масалан аз нуқтаи A_1 ҳамаи диагоналҳои бисёркунҷаро мегузаронем. Ин диагоналҳо онро ба $(n-2)$ -то секунҷа ҷудо мекунад.

Дар ҳақиқат, *секунҷаҳои канори* ($\triangle A_1A_2A_3$ ва $\triangle A_1A_{n-1}A_n$) аз ду тараф ва аз як диагонали бисёркунҷа сохта шудааст. Бинобар ин, адади секунҷаҳо $(n-2)$ -то, яъне аз адади тарафҳои бисёркунҷа дуто кам мебошад. Суммаи кунҷҳои бисёркунҷа ба суммаи кунҷҳои секунҷаи онро ташкилкунанда, яъне, $S_n = 180^\circ(n-2)$ баробар аст. Теорема исбот шуд.

Таърифи 3. *Кунҷи берунаи дар қуллаи бисёркунҷа додашуда гуфта, кунҷи ҳамсои дар дохили ҳамин қуллаи он бударо меноманд.*

Теоремаи 2.

Дар n -кунҷаи барҷаста суммаи кунҷҳои берунии аз ҳар қулла яктоғӣ гирифта шуда, ба 360° баробар аст.



Исбот. Дар ҳар як қуллаи бисёркунҷа яктоғӣ кунҷи берунӣ месозем. Суммаи кунҷи дарунии бисёркунҷа ва кунҷи ҳамсои он ба 180° (расми 5) баробар аст. Суммаи ҳаммаи кунҷҳои дарунӣ ва берунии аз ҳар як қулла яктоғӣ гирифташуда, ба $180^\circ n$ баробар аст. Вале суммаи ҳаммаи кунҷҳои дарунии бисёркунҷа ба $180^\circ(n-2)$ баробар аст. Дар ин

ҳолат суммаи ҳаммаи кунҷҳои берунии аз ҳар қулла яктоғӣ гирифташуда, ба $180^\circ n - 180^\circ(n-2) = 180^\circ n - 180^\circ n + 360^\circ = 360^\circ$

Масъалаи 1. Дар n -кунҷаи баробартараф (мунтазам) ҳар як кунҷи дохилии (a_n) ба чӣ баробар аст?

Ҳал. Ба мо маълум аст, ки суммаи кунҷҳои n -кунҷаи барҷастаи дилхоҳ ба $180^\circ (n-2)$ баробар аст. Дар бисёркунҷаи мунтазам кунҷҳо баробар аст, пас
$$\alpha_n = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$
 аст.

Масъалаи 2. Дар n -кунҷаи баробартараф (мунтазам) ҳар як кунҷи берунӣ (β_n) ба чӣ баробар аст?

Ҳал. Ба мо маълум аст, ки дар n -кунҷаи барҷастаи дилхоҳ суммаи кунҷҳои берунии аз ҳар як қулла якто гирифташуда, ба 360° баробар аст.

Бинобар ин дар n -кунҷаи баробартараф ҳар як кунҷи берунӣ ба инҳо баробар аст:
$$\beta_n = \frac{360^\circ}{n}.$$




Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Кунҷи дохилии қуллаи додашудаи бисёркунҷа гуфта чӣ гуна кунҷро меноманд? Кунҷи берунӣ – чӣ?
- 2) Суммаи кунҷҳои дохилии n -кунҷаи барҷаста ба чӣ баробар аст?
2. Суммаи кунҷҳои бисёркунҷа ба 1) 1080° 2) 1620° 3) 3960° баробар аст. Бисёркунҷа чанд тараф дорад?
3. 1) Суммаи кунҷҳои дохилии 1) чоркунҷа; 2) дувоздакунҷа; 3) Сикунҷа; 4) панҷоҳкунҷа – ро ёбед.
Намуна. 1) $S_{13} = 180^\circ \cdot (13 - 2) = 180^\circ \cdot 11 = 1980^\circ.$
4. Агар сето суммаи кунҷҳои дохилии чоркунҷа мувофиқан 240° , 260° ва 280° бошад, кунҷи аз ҳама хурди онро ёбед.
5. Кунҷи дохилии бисёркунҷаи барҷаста ба: 1) 150° ; 2) 170° ; 3) 171° баробар буда, чанд тараф дорад?
6. Суммаи кунҷҳои дохилии бисёркунҷа аз суммаи аз ҳар як қулла яктогӣ гирифташудаи кунҷи берунӣ се маротиба калон аст. Микдори тарафҳои ҳамин бисёркунҷа чандто аст? Ба чойҳои ҳоли адади мувофиқ гузоред.
Ҳал. Мувофиқи шарти масъала, $180^\circ(n-2) = \dots \cdot 360^\circ$. Аз ин ҷо $180^\circ(n-2) = \dots \cdot 2 \cdot 180^\circ$, $n-2=6$, $n=\dots$. Ҷавоб: $n=\dots$.
7. Бисёркунҷаи барҷастаи ҳар як кунҷи беруниаш ба: 1) 18° , 2) 24° , 3) 60° баробар буда чанд тараф дорад?
8. Агар се кунҷи чоркунҷа кунд бошад, онгоҳ кунҷи чоруми он тез мешавад. Онро исбот кунед.
9. Ҳар як кунҷи берунии бисёркунҷаи барҷаста ба: 1) 15° , 2) 45° , 3) 72° баробар бошад, он чанд тараф дорад?
10. Кунҷҳои чоркунҷаи барҷаста ба ададҳои 1, 2, 3 ва 4 мутаносибанд. Ҳамин кунҷҳоро ёбед.

2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

1. Параллелограмм. Дар ҳамворӣ чоркунҷаи ҳангоми буриши ду хати рости параллел бо ду хати рости параллели дигар ҳосил шударо дида мебароем (расми 1). Ин чоркунҷа бо номи *махсус* соҳиб буда, онро **параллелограмм** меномем.



Таъриф: Чоркунҷае, ки тарафҳои муқобилаш байни ҳамдигар параллел аст, **параллелограм** номида мешавад.

Агар $ABCD$ параллелограмм бошад, $AB \parallel DC$ ва $AD \parallel BC$ мешавад (расми 1).

Масъалаи 1. Дар расми 2 $\triangle ABC = \triangle CDA$ параллелограмм будани чоркунҷаи $ABCD$ – ро исбот кунед.

Ҳал. Аз баробарии секунҷаҳои ABC ва CDA баробариҳои зерин бармеояд: $\angle 1 = \angle 3$ ва $\angle 2 = \angle 4$. 1 ва 3 – кунҷи доҳилии ивазшавандае мебошад, ки дар натиҷаи буриши хатҳои рости параллели AB ва CD бо бурандаи AC ҳосил шудааст баробаранд. Ҳаминтавр, кунҷҳои 2 ва 4 барои хатҳои рости параллели BC ва AD , инчунин кунҷҳои ивазшавандаи доҳилии бурандаи ҳосил шудаи AC буданаш баробар аст. Мувофиқи аломати хатҳои рости параллел ба $AB \parallel DC$ ва $BC \parallel AD$ соҳиб мешавем. Пас, дар чоркунҷаи $ABCD$ тарафҳои муқобил бо чуфт-чуфташ параллел, яъне мувофиқи таъриф $ABCD$ – параллелограмм.




Аз нуқтаи дар як тарафи параллелограмм хобидаи перпендикуляри ба хати рости тарафи муқобилро дарбаргиранда фароварда шуда, **баландии** параллелограмм номида мешавад. Ба як тарафи параллелограмм баландиҳои бешумор гузаронидан мумкин (расми 3). Онҳо масофаҳои байни хатҳои рости параллел буда байни ҳам баробаранд. Аз қуллаи параллелограмм ба тарафҳои гуногуни он ду баландии аз ҳамдигар фарқкунанда гузаронидан мумкин. Масалан, дар расми 4, BP ва BF – баландиҳо мебошанд.

2. Хосиятҳои параллелограмм.

Теоремаи 1

(Хосияти 1) Суммаи кунҷҳои ба як тараф часпидаи параллелограмм ба 180° баробар аст.

Исбот: Кунҷҳои ба як тарафи параллелограмм часпида, кунҷҳои



дарунии як тарафа мебошад. Барои ҳамин суммаи онҳо ба 180° баробар аст. Теорема исбот шуд.

Теоремаи 2.

(Хосияти 2) Тарафҳои муқобил ва кунҷҳои муқобили параллелограмм байни худ баробаранд.

Исбот: Бигзор $ABCD$ – параллелограмми додашуда бошад, яъне $AB \parallel CD$ ва $BC \parallel AD$. Диагонали AC –и параллелограммро мегузаронем (ниг. ба расми 2) инчунин секунҷаҳои ABC ва CDA – ро дида мебароем. Ба онҳо AC – тарафи умумӣ. 1 ва 3 кунҷҳои дохилии ивазшавандае мебошад, ки дар натиҷаи буриши хатҳои ростии параллели AB ва CD бо бурандаи AC ҳосил шудааст баробаранд. Кунҷҳои 2 ва 4 бошад, кунҷҳои дохилии ивазшавандае мебошад, ки дар натиҷаи буриши хатҳои ростии параллели AD ва BC бо бурандаи AC ҳосил шудааст баробаранд. Пас, мувофиқи аломати дуҷуми баробари секунҷа, секунҷаҳои ABC ва CDA баробаранд. Хусусан, аз ин ҷо $AB=CD$, $AD=BC$ ва $\angle B=\angle D$, инчунин $\angle 1+\angle 4=\angle 2+\angle 3$, яъне $\angle A=\angle C$ ҳосил мешавад.

Масъалаи 2. Суммаи дуто кунҷҳои параллелограмм ба 172° баробар аст. Кунҷҳои онро ёбед.


Ҳал. Параллелограмми $ABCD$ додашуда бошад. Азбаски дар параллелограмм суммаи кунҷҳои ҳамсоя ба 180° баробар аст, бинобар ин кунҷҳои додашуда, кунҷҳои ҳамсоя нестанд, пас онҳо кунҷҳои муқобиланд. $\angle A+\angle C=172^\circ$ бошад. Аз баробар будани кунҷҳои муқобил дар параллелограмм ҳар яки онҳо ба $\angle A=\angle C=172^\circ:2=86^\circ$ баробар мешавад. Суммаи ҳамаи кунҷҳои параллелограмм ба 360° баробар, барои ҳамин ду кунҷи боқимонда $\angle B=\angle D=(360^\circ-172^\circ):2=94^\circ$ мешавад. *Ҷавоб:* $86^\circ, 94^\circ, 86^\circ, 94^\circ$.


Теоремаи 3

(Хосияти 3). Диагоналҳои параллелограмм бурида мешавад ва дар натиҷаи буриш ба ду қисми баробар ҷудо мешавад.

Исбот. Бигзор $ABCD$ – параллелограмми додашуда буда, O – AC ва BD нуқтаи буриши диагоналҳо бошад (расми 5). Исбот мекунем, ки $AO=OC$ ва $DO=OB$ аст.

Секунҷаҳои $AOD=COB$ -ро дида мебароем. Дар ин секунҷаҳо $AD=BC$ (аз рӯи хосияти 2-юми параллелограмм тарафҳои муқобили он баробар аст), $\angle 1=\angle 2$ ва $\angle 3=\angle 4$ (чунки кунҷи дохилаи ивазшавандаест, ки дар натиҷаи буриши хати ростии параллели AD ва BC бо бурандаҳои AC ва BD ҳосил шудааст). Бинобар ин мувофиқи аломати дуҷуми баробари секунҷаҳо $\triangle AOD=\triangle COB$. Аз ин ҷо $AO=CO$ ва $DO=OB$, яъне буриши диагоналҳои AC ва BD нуқтаи- O бо ду тақсим мешавад. Теорема исбот шуд.






Масъалаи 3. Аз хосияти 3 истифода бурда параллелограмм созед.
Қадами 1. Ду хати рости буранда гузаронида нуқтаи буриши онҳоро бо ҳарфи O ишорат мекунем (расми 6 а). **Қадами 2.** Бо ёрии сиркул дар яке хатҳои рост порчаҳои баробари OA ва OC ба хати рости дуюм бошад, порчаҳои баробари OB ва OD -ро мегузарем (расми 6 б). **Қадами 3.** Нуқтаҳои A, B, C ва D -ро пай дар пай пайваस्त намуда, параллелограмми мо чустаро ҳосил мекунем (расми 6, в).

Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Чӣ гуна чоркунҷа параллелограмм номида мешавад? Суммаи кунҷҳои ба як тарафи параллелограмм ҳаспанда ба чӣ баробар аст?
- 2) Оиди диагоналҳои параллелограмм чӣ гуфтан мумкин? Суммаи тарафҳои ҳамсоияи параллелограмм 20 см, фарқаш ба 12 см баробар аст. Тарафҳои ҳамин параллелограммро ёбед.
3. Периметри параллелограмм 152 см, яке аз тарафҳои он аз дуюмаш 25 см зиёд. Тарафҳои параллелограммро ёбед.
4. Суммаи ду кунҷҳои параллелограмм ба: 1) 70° ; 2) 110° ; 3) 170° баробар бошад, ҳамаи кунҷҳои онро ёбед.
5. Дар параллелограмми $ABCD$: $AB=7$ см, $BC=11$ см, $AC=14$ см, $BD=12$ см; O -нуқтаи буриши диагоналҳо буданаш маълум бошад, периметри секунҷаҳои ABO ва BOC -ро ёбед.
6. Суммаи тарафҳои ҳамсоияи параллелограмм 20 см, фарқаш ба 12 см баробар аст. Тарафҳои ҳамин параллелограммро ёбед.
7. Нисбати ду тарафи параллелограмм ба 5:3, периметраш бошад, ба 6,4 дм баробар аст. Тарафҳои параллелограммро ёбед.
8. Дар расми 7, баъзе бузургиҳои элементҳои параллелограмм нишон дода шудааст. Боз кадом бузургиҳоро ёфтан мумкин?




3. АЛОМАТҶОИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

Аз мавзӯҳои гузашта маълум шуд, ки барои тадбиқ намудани хосиятҳои параллелограмм дар бисёр ҳолатҳо ба параллелограмм будани чоркунҷаи додашуда боварӣ ҳосил намудан лозим. Онро мувофиқи таъриф (нигаред ба масъалаи 1, мавзӯи 2). Дар бисёр мавридҳо аломатҳои дар амалиёт татбиқшавандаи параллелограммро исбот менамоем. Акнун бо аломатҳои параллелограмм шинос мешавем.

Теоремаи 1.


(Аломати 1). Агар ду тарафи чоркунҷа баробар ва параллел бошад, ин чоркунҷа параллелограмм аст.

Исбот. Бигзор дар чоркунҷаи $ABCD$ $AB \parallel CD$ ва $AB = CD$ бошад (расми 1). Диагонали BD -и онро мегузаронем. Дар натиҷа мо дорои ду секунҷаи баробари ABD ва CDB мешавем (нисбат ба ду тараф ва кунҷи байни онҳо), чунки дар он $AB = CD$ (аз рӯи шарт), тарафи BD умумӣ, $\angle 1 = \angle 2$ (чунки дар натиҷаи буриши хатҳои рост



параллели AB ва DC кунҷи ивазшавандаи дохилии дар натиҷаи буриши BD ҳосилшуда аст). Аз баробарии секунҷаҳо бармеояд ки $\angle 3 = \angle 4$ аст. Ин кунҷҳо, кунҷҳои дохилии ивазшаванда мебошанд, ки дар натиҷаи буриши хатҳои рост AD ва BC ва буранди BD ҳосил шудаанд. Пас, $AD \parallel BC$. Ҳамин тавр, тарафҳои муқобилхобидаи чоркунҷаи $ABCD$ бо ҷуфти худ параллеланд. Аз рӯи таърифи параллелограмм чоркунҷаи $ABCD$ – параллелограмм мебошад. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Ба тарафҳои BC ва AD -и параллелограмми $ABCD$ порчаҳои баробар гузошта шудааст: $BE = DF$ (расми 2). Чоркунҷаи $BEDF$ оё параллелограмм шуда метавонад?





Ҳал. Тарафҳои муқобили BE ва DF –и чоркунҷаи $BEDF$ баробар ва параллеланд. Барои ҳамин, аз рӯи аломати 1-и параллелограмм чоркунҷаи $BEDF$ параллелограмм аст. *Ҷавоб:* ҳа, мешавад.

Теоремаи 2.

(Аломати 2). Агар тарафҳои муқобилхобидаи чоркунҷаҳо бо ҷуфти худ баробар бошад, ин чоркунҷа параллелограмм аст.

Исбот. Дар чоркунҷаи $ABCD$, $AB = CD$ ва $BC = DA$ бошад. Диагонали AC -и онро мегузаронем (расми 3). Дар натиҷа, секунҷаҳои ABC ва CDA ҳосил мешавад. Аз рӯи аломати 3-и баробарии секунҷаҳо, ин секунҷаҳо




(тарафи AC -умумӣ, ба сифати теорема бошад, $AB=CD$ ва $BC=DA$) баробар аст. Аз баробарии секунҷаҳои CAB ва ACD баробари кунҷҳо бармеояд. Ин кунҷҳо бошад, AB ва DC хатҳои рост, инчунин кунҷҳои ивазшавандаи дохилии бурандаи ҳосилкардаи AC мебошад. Аз рӯи аломати параллелии хати рост, $AB \parallel CD$. Ҳаминтавр, дар чоркунҷаи $ABCD$ тарафҳои AB ва CD баробар ва параллел аст. Яъне, аз рӯи аломати 1-уми параллелограмм $ABCD$ чоркунҷаи-параллелограмм аст. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 2. Аз нуқтаи додашуда, хати рост гузаранда ва ба хати рост додашуда хати рости параллелро созед.

Ҳал. a -хати рост, B -нуқтаи дар он ҷабада бошад. Ба хати рости a нуқтаҳои A ва D -ро ишора мекунем (расми 4). Аз нуқтаҳои B, D бо равиши мувофиқ, радиусҳои давраҳои AD ва AB мегузаронем. Нуқтаи буриши онҳоро бо C ишора мекунем. Хати рости BC мегузаронем, ки он хати рости мо ҷустуҷӯ карда мебошад. Дар ҳақиқат, тарафҳои муқобилхобидаи чоркунҷаи $ABCD$ баробар аст. Мувофиқи аломати 2-юми параллелограмм, чоркунҷаи $ABCD$ -параллелограмм аст. Бинобар ин $BC \parallel AD$.

Теоремаи 3.

(Аломати 3). Агар диагоналҳои чоркунҷа ҳамдигарро буранд ва дар нуқтаи буриш ба ду қисми баробар ҷудо шаванд, ин чоркунҷа параллелограмм мебошад.



Исбот. Дар чоркунҷаи $ABCD$ нуқтаи буриши диагоналҳо O – бошад. Аз рӯи шарт $AO=OC$ ва $BO=OD$ (расми 5). Секунҷаҳои AOB ва COD -ро дида мебароем. Дар ин секунҷа $\angle 1 = \angle 2$ (кунҷҳои вертикалӣ) $AO=CO$ ва $BO=DO$ (аз рӯи шарт). Пас, аз рӯи аломати якуми секунҷаҳои AOB ва COD баробар аст. Аз баробарии ин секунҷаҳо тарафҳои мувофиқи онҳо ва баробарии кунҷҳои онҳо бармеояд: $AB=CD$, $\angle 3 = \angle 4$. Аз рӯи аломати хати рост, $AB \parallel CD$ чунки кунҷҳои 3 ва 4 хатҳои рости AB ва CD , инчунин кунҷҳои ивазшавандаи дохилии бурандаи ҳосил кардаи AC мебошад. Дар чоркунҷаи $ABCD$ барои $AB=CD$ ва $AB \parallel CD$ буданаш аз рӯи аломати 1-уми параллелограмм, чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм мешавад. Теорема исбот шуд.

Савол, масъала ва супоришҳо




- 1) Агар ду тарафи чоркунҷа баробар ва параллел бошад, оё исбот карда метавонед, ки ин чоркунҷа параллелограмм аст?
- 2) Аломатҳои 2-3 – и параллелограммро ифода кунед.

2. (Масъалаи фаолкунанда) 1) Ду порчаи баробар ва параллел дода шудааст. Охирҳои онҳо бо порчаҳои якдигарро набуранда пайваст карда шудаанд. Оё чоркунҷаи ҳосилшуда параллелограмм шуда метавонад?
- 2) Агар ду кунҷи муқобили чоркунҷа баробар бошад, оё он параллелограмм шуда метавонад?
3. Дар чоркунҷаи $ABCD$ тарафҳои AB ва CD параллел, $AB=CD=11$ см, $AD = 5$ см, периметри ҳамин чоркунҷаро ёбед.
4. Агар: 1) $\angle 1=70^\circ$, $\angle 3=110^\circ$, $\angle 2 \neq \angle 4$; 2) $\angle 1=\angle 2=60^\circ$, $\angle 3=115^\circ$ бошад, дар он ҳолат чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм шуда метавонад (расми 6)?
- Ҳал. 1) Дар чоркунҷаи $ABCD$ ду тарафи AB ва CD параллел мебошад, чунки $\angle 1+\angle 3=70^\circ+110^\circ=180^\circ$. Ин кунҷҳо – AB ва DC кунҷҳои дохилии яктарафаи бурандаи AD ҳосилкунанда мебошад. Аз он сабаб, ки $AB \parallel DC$ аст, $\angle 1=\angle 4$ мешавад (кунҷҳои мувофиқ). Ду тарафи боқимондаи чоркунҷаи $ABCD$ ва тарафҳои AD ва BC параллел нестанд, чунки кунҷҳои яктарафаи дохилии 1 ва кунҷҳои 2 баробар нестанд ($\angle 1=\angle 4 \neq \angle 2$). Пас, чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм шуда наметавонад.

Ҷавоб: не, чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм шуда наметавонад.


2) Мисли банди 1 ҳал карда мешавад.

5. Миёнаҳои тарафи AB -и параллелограмми $ABCD$ аз нуқтаи E ва миёнаҳои тарафи CD аз нуқтаи F иборат аст. Параллелограмм будани чоркунҷаи $EBFD$ –ро исбот кунед (расми 7).
6. Дар чоркунҷаи $ABCD$ $AD=BC$, $\angle 1=\angle 2$ (расми 8). Параллелограмм будани чоркунҷаи $ABCD$ –ро исбот кунед.
7. Дар чоркунҷаи $ABCD$ тарафҳои AB ва CD параллел, $AB=CD=9$ см, $AD=4$ см периметри ҳамин чоркунҷаро ёбед.
8. Дар чоркунҷаи $ABCD$: $AB=CD$, $AD=BC$ кунҷи A , аз кунҷи B се маротиба калон. Кунҷҳои ҳамин чоркунҷаро ёбед.
9. Биссектрисаҳои яке аз кунҷҳои параллелограмм тарафи муқобилро бурида, аз он порчаҳои 4 см ва 5 см –ро ҳосил мекунад. Периметри параллелограммро ёбед.



4. РОСТКУНЧА ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

Таъриф. Параллелограмме, ки ҳамаи кунҷҳои ростанд, **росткунча** номида мешавад (расми 1).




Аз он сабаб, ки росткунча ҳолати махсуси параллелограмм аст, он дарои як қатор хосиятҳои параллелограмм мебошад: тарафҳои муқобилхобидаи росткунча баробаранд; диагоналҳои росткунча дар як нуқта бурида шуда, ба ду ҳиссаи баробар тақсим мешаванд; диагонали росткунча онро ба ду секунҷаи росткунҷаи баробар тақсим мекунад.

Хусусиятҳои ба худ хоси росткунҷаро дида мебароем.

Теоремаи.

Диагоналҳои росткунча байни худ баробаранд.



Исбот. Бигзор дар росткунҷаи $ABCD$ диагоналҳои AC ва BD дода шуда бошад. Исбот мекунем, ки $AC=BD$ аст (расми 2).

Секунҷаҳои росткунҷаи ACD ва DBA нисбат ба ду катет (AD – тарафи умумӣ, $CD=BA$) баробар аст. Аз ин ҷо баробар будани гипотенузаи ин секунҷаҳо, яъне $AC=BD$ бармеояд.

Аз ин теорема чунин теоремаи чаппа бармеояд аломати росткунча.

Теоремаи чаппа.

Агар диагоналҳои параллелограмм баробар бошад, он росткунча аст.

Исбот. Дар параллелограмми $ABCD$ диагонали AC ва BD баробар бошад (расми 2). Секунҷаҳои ABC ва DCA аз рӯи се тараф баробар аст ($AB=DC$, $BD=CA$, AD – ин тарафи умумӣ). Аз ин $\angle A=\angle D$ бармеояд. Тарафҳои муқобили параллелограмм баробар, бинобар ин $\angle A=\angle C$ ва $\angle B=\angle D$. Ҳаминтавр $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D$. Параллелограмм чоркунҷаи барҷаста, барои ҳамин ҳам $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$. Аз ин ҷо $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90^\circ$ яъне, росткунча будани параллелограмми $ABCD$ бармеояд. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Периметри росткунҷаи $ABCD$ ба 24 см, диагонали BD -и он бошад, ба 9 см баробар аст. Периметри секунҷаи ABD -ро ёбед.

Ҳал. $AB + AD = P_{ABCD} : 2 = 24 : 2 = 12$ (см) суммаи тарафҳои ҳамсоя (расми 2).

$$P_{ABD} = AB + AD + BD = 12 + 9 = 21 \text{ (см)}.$$

Ҷавоб: $P_{ABD} = 21$ см.


Масъалаи 2. Росткунҷаи $ABCD$ биссектрисаи кунҷи B -и тарафи AD -ро дар нуктаи P мебурад ва онро ба порчаҳои $AP=17$ см ва $PD=21$ см таксим мекунад (расми 3). Периметри ин росткунҷаро ёбед.

Ҳал. 1) Аз он сабаб, ки $ABCD$ –росткунҷа аст, $AD \parallel BC$ ва бинобар ин $\angle 2 = \angle 3$. Вале, мувофиқи шарт $\angle 2 = \angle 1$, пас, $\angle 1 = \angle 3$ ҳамчунин $\triangle ABP$ –секунҷаи баробарпахлӯи асосаш BP . Ҳаминтавр, $AB = AP = 17$ см.

$$2) AD = AP + PD = 17 + 21 = 38 \text{ (см)};$$


$$P_{ABCD} = 2(AB + AD) = 2 \cdot (17 + 38) = 2 \cdot 55 = 110 \text{ (см)}.$$

Ҷавоб: $P_{ABCD} = 110$ см.



Савол, масъала ва супоришҳо

- 1) Чӣ гуна параллелограмро росткунҷа меноманд?
- 2) Чӣ гуна хусусиятҳои бо худ хоси росткунҷа ҳаст?
 - 3) Аломатҳои росткунҷаро ифода намоед.
2. Дар росткунҷаи $ABCD$: $AB=9$ см, $BC=7$ см.
 - 1) Масофаи аз нуктаи C то тарафи AD -ро ёбед.
 - 2) Масофаи байни хатҳои рости AB ва CD -ро ёбед.
3. Периметри росткунҷа 24 см. Суммаи масофаи нуктаи дилхоҳи дохилро то тарафҳои он муайян кунед.
4. Периметри росткунҷаи $ABCD$ ба 24 см баробар аст. Нуктаи P миёнаҳои порчаи BC , $\angle APD=90^\circ$ (расми 4). Тарафҳои ин росткунҷаро ёбед.
5. Агар диагоналҳои чоркунҷа баробар буда, дар нуктаи буриш ба ду ҳиссаи баробар чудо кунед, исбот кунед, ки ин чоркунҷа росткунҷа аст.
6. Тарафҳои параллелограмм 4 см ва 7 см. Оё диагоналҳои ин параллелограмм: 1) 12 см ва 5 см; 2) 10 см ва 3 см; шуда метавонад?
7. Периметри росткунҷа ба 42 см, яке аз тарафҳояш аз дуомаш ду маротиба калон аст. Тарафҳои росткунҷаро ёбед.



5-6. ХОСИЯТҲОИ РОМБ ВА КВАДРАТ

1. РОМБ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН.

Таъриф. Параллелограмме, ки ҳамаи тарафҳояш баробаранд, **ромб** номида мешавад (расми 1).

Ромб ғайр аз хосиятҳои умумии параллелограмм боз дорои чунин хосиятҳост.

Теорема.

Диагоналҳои ромб байни худ перпендикуляр буда, кунҷҳои ромбро ба ду ҳисса тақсим мекунад.

Исбот. Бигзор ромби $ABCD$ додашуда бошад (расми 2). Исбот мекунем, ки $AC \perp BD$ буда, ҳар як диагонал кунҷҳои мувофиқи ромбро ба ду ҳиссаи баробар чудо мекунад (масалан, $\angle BAC = \angle DAC$).




Аз рӯи таърифи ромб $AB = AD$, бинобар ин, $BAO = DAO$ секунҷаи баробарпахлӯ аст. Аз он сабаб, ки ромб параллелограмм аст, диагоналҳои он дар нуқтаи буриш ба ду ҳиссаи баробар чудо мешавад, яъне $BO = OD$. Пас, AO – медианаи секунҷаи баробарпахлӯи BAO мебошад. Мувофиқи хосияти секунҷаи баробарпахлӯи, медианаи ба асоси он гузаронидашуда ҳам биссектриса, ҳам баландӣ мебошад. Бинобар ин, $AC \perp BD$ ва $\angle BAC = \angle DAC$, ки исботаш талаб карда шуда буд.



Масъалаи 1. Тарафи диагонали BD -и ромби $ABCD$ кунҷи 35° -ро ҳосил мекунад. Кунҷҳои онро ёбед.

Ҳал. $\angle ABD = 35^\circ$, гӯем (расми 3). Онгоҳ $\angle CBD = 35^\circ$ (мувофиқи хосияти ромб). $\angle ABC = 2\angle ABD = 2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$, $\angle ADC = \angle ABC = 70^\circ$ (мувофиқи хосияти 2-4 параллелограмм), $\angle DAB = 180^\circ - \angle ABC$ (параллелограмм мув. хосияти 1). Пас $\angle DAB = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$, $\angle BCD = \angle DAB = 110^\circ$ (мувофиқи хосияти 2-и параллелограмм). *Ҷавоб:* $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$.

Масъалаи 2. Оё периметрҳои ҳар гуна ромб баробар аст?

Ҳал. Ромбҳои периметрҳояшон баробар аз якдигар бо кунҷҳояшон фарқ мекунанд. Агар кунҷи тези ромб 1) ба 40° баробар бошад, онгоҳ кунҷҳои боқимондааш бо равиши мувофиқ $140^\circ, 40^\circ, 140^\circ$ мешавад; 2) ба 15° баробар бошад, онгоҳ кунҷҳои боқимонда бо равиши мувофиқ $165^\circ,$





15°, 165° мешавад ва ҳоказо. Бинобар ин, ба ҷои кунҷи тез ҳар гуна кунҷи кундро гирифтани мумкин.

Ҷавоб: ҳа, мумкин.

2. Квадрат ва хосиятҳои он.

Таъриф. Росткунҷае, ки ҳамаи тарафҳои баробаранд, **квадрат** ном дорад.

Аз рӯи таърифи квадрат ва ромб маълум мешавад, ки квадрат аз ромбе иборат аст, ки ҳамаи кунҷҳои рост аст (расми 4, а). Аз он сабаб, ки квадрат ҳам параллелограмм, ҳам росткунҷа ва ҳам ромб буда, дорой ҳамаи хосиятҳои онҳо низ мебошад. Хосиятҳои асосии квадратро меорем:

1. Дар квадрат ҳамаи кунҷҳо ростанд.
2. Диагоналҳои квадрат баробаранд.
3. Диагоналҳои квадрат перпендикуляр буда, дар нуқтаи буриш ба ду қисми баробар тақсим мешаванд ва кунҷҳои квадратро ба ду қисми баробар тақсим мекунад (расми 4).

Ин хосиятҳо мустақилона исбот кунед.

Масъалаи 3. Исбот кунед, ки агар диагоналҳои ромб баробар бошад, онгоҳ ингуна ромб квадрат аст.

Исбот. Барои он ки ромб параллелограмм аст, дар он ҳол аз рӯи аломати росткунҷа, росткунҷа будани ромби диагоналҳои баробар бармеояд ва пас он яъне, квадрат мешавад.

Масъалаи 4. Диагоналҳои чоркунҷа перпендикуляр ва байни якдигар баробар аст. Оё ин чоркунҷа квадрат мешавад?


Ҳал. Яке аз чоркунҷаҳои шартӣ масъаларо қаноаткунонанда дар расми 5-ум тасвир ёфтааст. Дар ин ҷо яке аз диагоналҳо ба ду қисми баробар ҷудо шудааст. Аммо он хосияти 2-юми квадрат ва як қисми шартҳои дар хосияти 3-юм овардашударо, яъне шартҳои байни якдигар перпендикуляр бударо қаноат мекунонад ҳалос. Ду диагоналҳои чоркунҷа дар нуқтаи буриш ба ду қисми баробар ҷудо шуданаш

мумкин. Фақат дар ҳамин ҳолат чоркунча квадрат шуда метавонад.
Ҷавоб: чоркунча квадрат шуданаш шарт нест.



Савол, масъала ва супоришҳо

- 1) Ромб чист? Хосияти ромбро гӯед.
- 2) Квадрат чист? Хосиятҳои квадратро номбар кунед.
- 3) Квадратро бо ёрии мафҳумҳои: а) «параллелограмм»; б) «ромб»; в) «росткунча» таъриф диҳед.
2. Тарафи квадрат ба 20 см баробар. Масофаи байни аз нуқтаи буриши диагоналҳо ба яке аз тарафҳо ро ёбед.
3. Тарафи ромби $ABCD$ ба 24 см, кунҷи A бошад, ба 30° баробар аст. Масофаи аз қуллаи B то тарафи ба он муқовилхобидаи AD -ро ёбед (расми 6). Ба қойҳои ҳоли ададҳои мувофиқро гузоред.
Ҳал. Масофаи аз нуқтаи B то хати рости AD ба дарозии перпендикулярӣ аз нуқтаи B ба ҳамин хати рост фароварда шуда, яъне ба дарозии порчаи BP баробар аст. Секунҷаи ABP – ро дида мебароем. Дар он $\angle APB = 90^\circ$, $\angle ABP = 30^\circ$. Онгоҳ $BP = 0,5 \cdot AB = 0,5 \cdot 24 = 12$ (см) (Мувофиқи хосияти муқобили кунҷи 30° -нок) Ҷавоб: $BP = 12$ см.
4. (супориши амалӣ) 1) Аз ду секунҷаи баробар; 2) Аз чор секунҷаи баробар чӣ хел ромб ва квадрат ҳосил кардан мумкин аст? Ҳалли имкондоштаи онро нишон диҳед?



5. Квадрат ба дохили секунҷаи росткунҷаи баробарпахлӯ ҳамин тавр кашида шудааст, ки ду қуллаи он ба гипотенуза ва ду қуллаи боқимондааш ба катетҳо мебарояд. Гипотенуза ба 21 см баробар буданаш маълум бошад тарафи квадратро ёбед.
6. Нисбати диагоналҳо ва тарафҳои байни кунҷи ҳосил шудаи ромб ба мисли 2:7. Кунҷҳои ромбро ёбед.
7. Миёнаҳои тарафҳои квадрат пайи ҳам пайваस्त карда шудаанд. Дар натиҷа чӣ гуна шакл ҳосил мешавад?
8. Иббот кунед, ки ҳамаи баландҳои ромб байни худ баробаранд.
9. Тарафҳои чоркунча ба нисбати 2:4:5:7 аст. Периметри он ба 108 см баробар. Тарафҳои ҳамин чоркунчаро ёбед.
10. Периметри ромбро ёбед, ки яке аз кунҷҳои он 60° , дарозии диагонали хурдаш 16 см аст.
11. Нисбати кунҷи байни диагоналҳои ромб ва тарафҳои ҳосилшуда 5:4 аст. Кунҷҳои ромбро ёбед.
12. Баландии росткунча 32 см, бараш ба 28 см баробар аст. Тарафи квадрате ёбед, ки ба периметри ин росткунча баробар бошад.
13. Тарафи аз ҳама хурди чоркунча ба 5 см баробар аст, тарафҳои аз пешинааш 2 см – и калон. Периметри ҳамин чоркунчаро ёбед.

7–8. ТРАПЕТСИЯ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

1. Таърифи трапетсия. Ба мо маълум аст, ки ба ҳар гуна параллелограмм ду чуфт тарафҳои параллел мебошад. Акнун мо фақат бо як чуфт тарафи параллел соҳиббуда шинос мешавем.

Таърифи 1. Чоркунҷае, ки фақат ду тарафаи параллел буда, ду тарафи дигари параллел нест, **трапетсия** номида мешавад.

Тарафҳои параллели трапетсия *асосҳо* он, тарафҳои параллел набудани трапетсия, *тарафҳои паҳлӯӣ* номида мешавад. Дар трапетсияи $ABCD$ тарафҳои AD ва BC *асосҳо*, тарафҳои AB ва CD бошад, *тарафҳои паҳлӯӣ* аст (расми 1).

Таърифи 2. Агар яке аз тарафҳои трапетсия ба асоси он перпендикуляр бошад, трапетсияро, **трапетсия росткунҷа** меноманд (расми 2).

Таърифи 3. Трапетсияе, ки тарафҳои паҳлӯиаш баробар аст, **трапетсияи баробарпаҳлӯ** номида мешавад.

Дар расми 3 трапетсияи $ABCD$ – и баробарпаҳлӯ тасвир шудааст: $AB = CD$

2. Аломати трапетсия. Акнун шартҳои зарарурии трапетсия шудани росткунҷаро дида мебароем.




Теорема.

Агар суммаи ду кунҷи ба як тараф часпидаи чоркунҷа ба 180° баробар бошад ва суммаи ду кунҷи ба тарафҳои ҳамсояи он часпанда аз 180° фарқ кунад, ин гуна чоркунҷа трапетсия мешавад.

Исбот. Дар чоркунҷаи $ABCD$ $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle A + \angle D \neq 180^\circ$ бошад, исбот кунед, ки чоркунҷаи $ABCD$ трапеция шуда метавонад.

Якун, параллели як чуфт тарафҳои муқобилро нишон медиҳем. Хатҳои ростии AB , BC (l_1) ва AD (l_2)-ро мегузаронем (расми 4). Ҳаминтавр $\angle A + \angle B = 180^\circ$ бошад. Дар он ҳолат порчаҳои AD ва BC аз рӯи аломати параллели, параллел мешавад. (Агар ҳангоми ду хати ростии a ва b бо хати ростии сеюми c бурида шудан, суммаи кунҷҳои дохилии як тарафа ба 180° баробар бошад, дар он ҳолат хатҳои ростии a ва b параллел мешавад).

Дуом, параллел набудани ду тарафи дигари чоркунҷаи $ABCD$ -ро нишон



медиҳем. Барои ин, $\angle A + \angle D \neq 180^\circ$ дар ин ҳолат порчаҳои AB ва DC параллел шуда наметавонад (аз рӯи аксиомаи 5-уми хатқои рости параллели Евклид, яъне шарти зарурии параллел нашудани хатқои рост иҷро намешавад). Пас, чоркунҷаи $ABCD$ трапетсия будааст. Мо ҳамроҳ аломати трапетсияро исбот кардем. Онро ифода мекунем.

Аз ин теорема чунин натиҷа бармеояд.

Натиҷа. Агар як кунҷи трапетсия 90° бошад, он боз як кунҷи 90° дорад.

Тарифи 4. Аз нуқтаи яке аз асосҳои трапетсияи перпендикулярӣ ба хати росте, ки асоси дуюми онро гузаронида шуда ифода мекунад, **баландии трапетсия** ном дорад. .

Ҳар гуна перпендикуляре, ки ба асоси трапетсия фарворда шудааст, ба сифати баландӣ қабул кардан мумкин аст. Ба трапетсияи дилхоҳ, баландӣ гузаронидан мумкин аст (расми 5).

3. Хосияти трапетсияи баробар.

Бигзор $ABCD$ – трапетсияи баробарпахлӯ бошад. Дар он $AD = a$ – асоси калон, $BC = b$ – асоси хурд аст. Аз қуллаи B -и асоси хурд баландии BP мегузаронем (расми 6). Асоси P -и баланди асоси AD -ро ба порчаҳои AP ва PD ҷудо карда шавад.

Теоремаи.

Баландии трапетсияи баробарпахлӯ, ки аз қуллаи кунҷи кунд фарворда шудааст, асоси калони трапетсияро ба қисмҳои ҷудо мекунад, ки ба нимфарқ ва нимсуммаи асосҳо баробар аст, яъне:




$$AP = \frac{a-b}{2}, \quad PD = \frac{a+b}{2}.$$

Исбот. Аз қуллаи C , $CF \perp AD$ -ро мегузаронем. Секунҷаҳои росткунҷаи ABP ва DCF баробаранд: $AB = DC$. Аз он сабаб, ки мувофиқи шарт $BP = CF$ бошад, BC ва AD масофаи байни хатқои рости параллел барои буданаш, аз баробарии секунҷаҳо $AP = FD$ бармеояд.

Аз рӯи аломати хати рост, $BP \parallel CF$, чунки $BP \perp AD$, $CF \perp AD$. Барои масофаи байни хатқои рост баробар буданаш $BC = PF = b$.

Ҳаминтавр $AP = FD = \frac{AD - PF}{2} = \frac{a-b}{2}$, $PD = AD - AP = a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$

Пас, $AP = \frac{a-b}{2}$ ва $PD = \frac{a+b}{2}$ аст. Теорема исбот шуд.



Масъалаи 1. Баробар будани кунҷҳои дар асоси трапетсияи баробарпахлӯ бударо исбот кунед.

Ҳал. $ABCD$ трапетсияи баробарпахлӯ, яъне $AB = DC$ ва $AD \parallel BC$ баробарии кунҷҳои ба асосҳои AD ва BC часпидаро исбот мекунем ($\angle A = \angle D, \angle B = \angle C$).


Аз қуллаҳои кунҷи кунди трапетсия (B ва C) ба асоси AD перпендикуляр мегузаронем: $BP \perp AD, CF \perp AD$ (ниг. ба расми 6). Секунҷаҳои росткунҷаи ABP ва DCF (мувофиқи катет ва гипотенуза) баробар аст. $AB=DC$ – мувофиқи шарт, $BP=CF$ аз баски BC ва AD масофаи байни хатҳои рости параллел аст. Аз баробарии секунҷаҳо $\angle A = \angle D$ бармеояд.

Кунҷҳои A ва B , C ва D мувофиқан дар натиҷаи буриши хатҳои рости параллели AD ва BC бурандаҳои AB ва CD кунҷҳои дарунии яктурафа мебошад. Бинобар ин $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ва $\angle C + \angle D = 180^\circ$. Аз ин ҷо $\angle B = \angle C$ ҳосил мешавад:

Ҳаминтавр, кунҷҳои асоси дар трапетсияи баробарпахлӯ буда баробар будааст: $\angle A = \angle D$ ва $\angle B = \angle C$. Ҳаминро исбот кардан лозим буд.

Масъалаи 2. Асоси хурди трапетсия ба тарафи паҳлӯи баробар, диагонали он бошад, ба тарафи паҳлӯи перпендикуляр аст. Кунҷҳои трапетсияро ёбед.

Ҳал. Трапетсияи баробарпахлӯи $ABCD$ дода шудааст, дар он $AD \parallel BC, AB = BC = CD, AC \perp CD$ бошад (расми 7). Мувофиқи шарти масъала, AC – асоси секунҷаи баробарпахлӯи ABC аст пас, $\angle BCA = \angle CAB, \angle A = \angle D$, чунки кунҷҳои назди асосҳои трапетсияи баробарпахлӯ баробар аст, кунҷҳои CAD ва BCA бошад, кунҷҳои дарунии ивазшавандаи хатҳои рости параллели $AD \parallel BC$ ва бурандаи AC ҳосил кардааст баробар мебошад, яъне $\angle CAD = \angle BCA$.




Пас, $\angle A = 2 \angle CAD$, мувофиқи шарт, ACD кунҷи рост, бинобар ин $\angle CAD + \angle D = 90^\circ$, лекин $\angle D = \angle A$, дар ин ҳолат $90^\circ = 3 \angle CAD$, пас, $\angle CAD = 30^\circ$ ва дар он ҳолат

$$\angle D = \angle A = 60^\circ, \angle C = \angle B = 120^\circ.$$

Ҷавоб: $\angle A = \angle D = 60^\circ, \angle B = \angle C = 120^\circ$.

Масъалаи 3. Нисбати тарафҳои трапетсияи баробарпахлӯ ба мисли 1:1:1:2 мебошад. Кунҷҳои ин трапетсияро ёбед.

Ҳал. Дар трапетсияи $ABCD, AB=BC=CD=1$ ва $AD=2$ бошад. Миёнаҳои тарафи AD -ро бо P ишора мекунем (расми 8). Тарафҳои AP ва BC –и чоркунҷаи $ABCP$ баробар ва параллел аст.



Пас, аз рӯи аломати параллелограмм, ин чоркунҷна параллелограмм мешавад. Аз ин рӯ, $PC=AB=1$.

Ҳамаи тарафҳои секунҷаи PCD ба 1 баробар аст, барои ҳамин $\angle PDC=60^\circ$.


Ҳаминтавр, дар трапетсияи $ABCD$, $\angle A = \angle D = 60^\circ$ ва $\angle B = \angle C = 120^\circ$.

Ҷавоб: $\angle A = \angle D = 60^\circ$ ва $\angle B = \angle C = 120^\circ$.



Савол, масъала ва супориш

- 1) Чӣ гуна чоркунҷаро трапетсия мегӯянд?
- 2) Чӣ гуна трапетсия: а) трапетсияи баробарпахлӯ; б) трапетсияи росткунҷа мегӯянд?
2. Баландие, ки аз қуллаи трапетсия намегузарад, онро ба дуто трапетсияи росткунҷа ҷудо мекунад. Шаклро сохта нишон диҳед.
3. Дар трапетсияи росткунҷа, нисбати тарафҳои паҳлӯӣ ба 1:2 аст. Кунҷи аз ҳама калони трапетсияро ёбед.
4. Асосҳои трапетсия 12 см ва 20 см, паҳлӯҳои 4 см ва 11 см. Аз қуллаи асоси хурд ба тарафи хурд хати рости параллел гузаронида шудааст. Периметри секунҷаи ин хати рости параллел ҷудо кардаро ёбед.
5. Аз трапетсияи $ABCD$, ки асосҳои AD ва BC мебошад, кунҷҳои B ва C -ро ёбед, ки дар он $\angle A = 75^\circ$ ва $\angle D = 55^\circ$ (расми 9). Ба ҷойҳои холӣ ҷавобҳои мувофиқро нависед.



мувофиқро нависед.

Ҳал. Кунҷҳои A ва B , C ва D хатҳои рости AD ва BC – ро бо бурандаҳои ... ва ... мебурад ва дар ..., нуқтаи буриш $\angle A + \angle B = \dots^\circ$ ва $\angle C + \angle D = \dots^\circ$. Мувофиқи шарт, $\angle A = 75^\circ$ ва $\angle D = 55^\circ$, онгоҳ $\angle B = \dots^\circ - \angle A = \dots^\circ - \dots^\circ = \dots^\circ$ ва $\angle C = \dots^\circ - \angle D = \dots^\circ - \dots^\circ = \dots^\circ$.

Ҷавоб: $\angle B = \dots^\circ$, $\angle C = \dots^\circ$.

6. Яке аз кунҷҳои тези трапетсияи баробарпахлӯ ба 60° , тарафи паҳлӯӣ бошад, ба 16 см баробар аст. Агар суммаи асосҳои трапетсия ба 38 см баробар бошад, асосҳои онро ёбед.
7. Баландии аз қуллаи кунҷи кунди трапетсияи баробарпахлӯ гузаронидашуда асоси калони онро бо порчаҳои 3 см ва 17 см ҷудо мекунад. Асосҳои онро ёбед.
8. Иббот кунед, ки диагонаҳои трапетсияи баробарпахлӯ баробаранд.
9. Дар трапетсия: 1) сето кунҷи рост 2) сето кунҷи тез 3) суммаи сето кунҷ ба 180° оё баробар шуда метавонад. Ҷавобатонро асоснок кунед.
10. Дар трапетсияи росткунҷа нисбати кунҷи аз ҳама калон ва кунҷи аз ҳама хурд ба 5:4 баробар аст. Кунҷҳои ҳамин трапетсияро ёбед.
11. Асоси хурди трапетсияи $ABCD$ ба 6 см, периметри секунҷаи ABE ($BE \parallel CD$) ба 36 см баробар аст. Периметри ҳамин трапетсияро ёбед.
12. Диагонали трапетсияи баробарпахлӯ кунҷи кунди онро бо ду қисми баробар тақсим мекунад. Асосҳои трапетсия 10 см ва 20 см аст. Периметри онро ёбед.

9. ТЕОРЕМАИ ФАЛЕС

Теорема

Агар хатҳои рости параллели тарафҳои кунҷро бурранда аз як тарафи он порчаҳои баробарро ҷудо кунад, аз тарафи дуюм низ порчаҳои баробар ҷудо мекунад.

Исбот. Бигзор аз қуллаи кунҷи O ба тарафи (нури a) порчаҳои баробари OA_1 , OA_2 ва OA_3 гузаронида ва интиҳои онҳо ба воситаи (A_1 , A_2 , A_3) ба тарафи дуюм (нури b) дар нуқтаҳои буриши B_1 , B_2 , B_3 бо хатҳои рости байни худ параллели A_1B_1 , A_2B_2 ва A_3B_3 гузаронида шуда бошад (расми 1).

Акнун баробарии порчаҳои ҳосилшудаи B_1B_2 ва B_2B_3 , яъне агар $OA_1=OA_2=OA_3$ бошад, онгоҳ $B_1B_2=B_2B_3$ буданашро исбот мекунем. Барои ин аз нуқтаи B_2 ба нури a хати рости параллели CD мегузаронем (расми 2). Ин хати рост бо хатҳои рости A_1B_1 ва A_3B_3 ба таври мувофиқ дар нуқтаҳои C ва D буранд. Чоркунҷаҳои $A_1CB_2A_2$ ва $A_2B_2DA_3$ – параллелограмм (мувофиқи таъриф), чунки тарафҳои муқобили онҳо аз рӯи шарт ва сохт параллел аст. Ҳаминтавр, $OA_1=OA_2=OA_3$ инчунин тарафҳои муқобили параллелограмм буданаш $A_1A_2=CB_2$ ва аз $A_2A_3=B_2D$ ва $CB_2=B_2D$ соҳиб мешавад.



Дар секунҷаҳои B_1B_2C ва B_3B_2D $CB_2=B_2D$ (мувофиқи исбот), инчунин, $\angle 1=\angle 2$ (кунҷаҳои вертикалӣ), $\angle 3=\angle 4$ (A_1B_1 ва A_3B_3 хатҳои рости параллел инчунин CD барои кунҷаҳои ивазшавандаи дохилаи аз буриши буранда ҳосилшаванда буданаш).

Мувофиқи аломати дуҷуми баробарии секунҷаҳои, ин секунҷаҳо байни ҳам баробар $\triangle B_1B_2C=\triangle B_3B_2D$. Аз ин $B_1B_2=B_2B_3$ бармеояд.

Ҳамин тавр, агар $OA_1=OA_2=OA_3$ бошад, $B_1B_2=B_2B_3$ шудонаш исбот шуд. Исботи ҳамин талаб карда шуда буд. Исбот шуд. Исботи ҳамин талаб карда шуда буд.

Дар хотир доред! Дар шартҳои теоремаи Фалес ба ҷои кунҷ ду хати рости дилхоҳро (ҳар чӣ гуна) гирифтани мумкин аст. Дар ин ҳолат хулосаи теорема ба таври пешина мешавад. Мувофиқи аломати 2-юми баробарии секунҷаҳо, ин секунҷаҳо байни ҳам баробар $\triangle B_1B_2C=\triangle B_3B_2D$, аз ин $B_1B_2=B_2B_3$ бармеояд.

Натиҷа. Хати рости параллеле, ки ду хати рости додашударо мебурад ва дар яке аз онҳо порчаҳои баробарро ҷудо мекунад, дар хати дуюм низ порчаҳои баробар ҷудо мекунад.



Масъалаи 1. (порчаро ба ҳиссаҳои баробар тақсим кардан.) Порчаи додашудаи AB -ро ба n -то ҳиссаҳои баробар тақсим кунед.

Ҳал. Бигзор порчаи AB дода шуда бошад. Онро ба n -то ҳиссаҳои баробар тақсим мекунем. Аз нуқтаи A нури ба хати рости AB нахобанда нури AC -ро мегузаронем ва дар он аз нуқтаи A саркарда n -то порчаҳои баробари $AA_1, A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$; яъне мо аз шarti масъала истифода бурда, порчаи AB -ро ба чанд ҳисса ҷудо кардан зарур бошад, ҳамонқадар порчаи баробарро мегузорем (расми 3, $n=6$). Баъд аз он хати рости A_nB -ро мегузаронем (нуқтаи A_n -интиҳои порчаи охирин) ва бо ёрии нуқтаҳои $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{n-1}$ дар хати рости A_nB хатҳои рости параллел мегузаронем. Ин хатҳои рости порчаи AB -ро дар нуқтаҳои $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{n-1}$ мебурад ва онро мувофиқи теоремаи Фалес ба n -то ҳиссаҳо тақсим мекунад:

$$AB_1 = B_1B_2 = \dots = B_{n-1}B.$$

Пас, ҳар гуна порчаро ва қисмҳои баробари дилхоҳ тақсим кардан мумкин.

Масъалаи 2. Тарафи BC -и секунҷаи ABC ба чор қисми баробар тақсим шуда, бо воситаи он ба тарафи AB -и дарозиаш 18 см хатҳои рости параллел гузаронидаанд. Дарозии порчаҳои дар дохили секунҷа мондаи хатҳои ростро ёбед.

Дода шудааст: Дар $\triangle ABC$:

$$BB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3C, AB = 18 \text{ см}; B_1C_3 \parallel B_2C_2 \parallel B_3C_1 \parallel AB.$$

Ёфтани лозим: B_1C_3, B_2C_2, B_3C_1 (расми 4).

Ҳал. 1) $A_1B_3 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_1 \parallel AC$ мегузаронем.



2) Мувофиқи теоремаи Фалес:




$$AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3B = AB : 4 = 18 : 4 = 4,5 \text{ (см)}.$$

2) $AA_1B_3C_1$ чоркунҷа – параллелограмм чунки $AA_1 \parallel C_1B_3$ (мувофиқи шарт) ва $A_1B_3 \parallel AC_1$ (мувофиқи сохтан). Пас, $AA_1 = C_1B_3 = 4,5$ (см).

3) Мувофиқи таъриф, $AA_2B_2C_2$ чоркунҷа – параллелограмм, чунки $AA_2 \parallel C_2B_2$ (мувофиқи шарт) ва $A_2B_2 \parallel AC_2$ (мувофиқи сохтан). Пас,

$$AA_2 = C_2B_2 = 2AA_1 = 2 \cdot 4,5 = 9 \text{ (см)}.$$







4) Мувофиқи таъриф, $AA_3B_1C_3$ чоркунҷа-параллелограмм, чунки $AA_3 \parallel C_3B_1$ (мувофиқи шарт) ва $A_3B_1 \parallel AC_3$ (мувофиқи сохтан) Пас,
 $AA_3 = C_3B_1 = 3AA_1 = 3 \cdot 4,5 = 13,5$ (см).

Ҷавоб: $C_1B_3 = 4,5$ см, $C_2B_2 = 9$ см, $C_3B_1 = 13,5$ см.



Савол, масала ва супоришҳо

- 1) Теоремаи Фалесро гӯед.
- 2) Оё теоремаи Фалес танҳо барои кунҷҳо мавқеъ дорад?
- 3) Порчаи додашуда чӣ тавр ба n - қисми баробар тақсим карда мешавад?
2. (Супориши амалӣ) Бо ёрии сиркул ва хаткашак порчаи AB -ро бо: 1) дуто; 2) се то; 3) шашто; 4) ҳафтто ҳиссаи баробар тақсим кунед.
3. Дода шудааст: $\angle A$, $AB = BD = 7$ см, $BC \parallel DE$, $CE = 5$ см (расми 5).
 Ёфтан лозим: AC .
4. Дода шудааст: $\angle aOb$, $OA = AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4$,
 $AB \parallel A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3 \parallel A_4B_4$, $OB_4 = 8$ см (расми 6).
 Ёфтан лозим: OB_1, OB_2, OB_3 .
5. Дар параллелограмми $ABCD$ нуқтаи M тарафи BC нуқтаи N миёнаҳои тарафи AD хатҳои рости BN ва MD тарафи параллелограммро ба диагонали AC ба се ҳиссаи баробар тақсим мекунад. Онро исбот кунед (расми 7).
6. Дар трапетсияи $ABCD$ ба воситаи қуллаи B хати рости BK -и ба тарафи CD параллел гузаронидаанд (расми 8).
 1) $KBCD$ – параллелограмм буданаширо исбот кунед.
 2) Агар $BC = 4$ см, $P_{ABK} = 11$ см бошад, периметри трапетсияро ёбед.
7. Бо ёрии сиркул (паргор) ва хаткашак порчаи AB -ро ба: 1) чорто; 2) панҷто ҳиссаи баробар ҷудо кунед.
8. Маълум аст, ки $a \parallel b$. Дар асоси маълумотҳои расми 9 x -ро ёбед.
9. Дода шудааст: $\angle aOb$, $OA = AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4$,
 $AB \parallel A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3 \parallel A_4B_4$, $OB_4 - B_3B_4 = 18$ см
 (ниг. ба расми 6).
 Ёфтан лозим: OB_1, OB_2, OB_3 .



10-11. ХОСИЯТИ ХАТИ МИЁНАИ СЕКУНЧА ХОСИЯТИ ХАТИ МИЁНАИ ТРАПЕТСИЯ

1. Хосияти хати миёнаи секунча.

Таъриф. *Хати миёнаи секунча гуфта, порчаеро меноманд, ки миёнаҷои ду тарафи онро пайваст мекунад.*

Дар секунҷаи ABC бигзор $AD=DB$ ва $CE=EB$ бошад, дар он ҳол DE хати миёна мешавад (аз рӯи таъриф). Нисбат ба хати миёнаи DE тарафи AC асосӣ ҳисоб мешавад (расми 1). Дар ҳар гуна секунча се хати миёна вучуд дорад (расми 2).

Теоремаи 1.

Хати миёнаи секунча ба тарафи сеюми он параллел ва дарозии он бошад, ба нисфи дарозии ин тараф баробар аст.

Дода шудааст: дар $\triangle ABC$: $AD=DB$, $CE=EB$, DE (расми 3).

Исбот кардан лозим: 1) $DE \parallel AC$; 2) $DE = \frac{1}{2} AC$.




Исбот. 1) Порчаи DE хати миёнаи секунҷаи ABC бошад. Бо воситаи нуқтаи D ба тарафи AC хати рости параллел мегузаронем. Ин хати рост мувофиқи теоремаи Фалес порчаи BC -ро бурида мегузарад, яъне DE хати миёнаро дар бар мегирад. Аз рӯи сохт, $DE \parallel AC$.

2) Акнун хати рости миёнаи EF мегузаронем. Аз рӯи исботи банди 1-ум, он ба тарафи AB параллел мешавад. $EF \parallel AB$, аз ин $EF \parallel AD$. Барои байниҳам параллел будани тарафҳои муқобили чоркунҷаи $ADEF$ аз рӯи он таъриф параллелограмм мешавад. Аз рӯи хосияти параллелограмм $DE = AF$, аз рӯи теоремаи Фалес барои $AF = FC$ буданаш $DE = \frac{1}{2} AC$.

Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Периметри секунча ба p баробар аст. Периметри секунҷаи куллаҳояш ба миёнаҷои тарафҳои секунҷаи додашуда бударо ёбед.

Ҳал. Тарафҳои секунҷаи ҳосилшуда хати миёнаи секунҷаи додашуда мебошад (расми 2). Пас, онҳо ба нисфи тарафҳои мувофиқ баробар аст. Аз ҳамин



сабаб периметре, ки мо барои дарёфташ будем ба нисфи периметри секунҷаи додашуда баробар мебошад:

$$P_{DEF} = DE + EF + FD = 0,5(AC + AB + BC) = 0,5p. \quad \text{Ҷавоб: } 0,5p.$$

2. Хосияти хати миёнаи трапетсия.

Таъриф. Порчаи миёнаҷои тарафҳои паҳлӯии трапетсияро пайвасткунанда **хати миёнаи трапетсия** ном дорад.

Ба мо трапетсияи $ABCD$ додашуда, дар он AD ва BC – асосҳои трапетсия; AB ва DC тарафҳои паҳлӯии он, нуктаҳои E ва F миёнаҷои тарафҳои паҳлӯӣ аст (расми 4). Дар ин ҷо EF – хати миёна мешавад.

Теоремаи 2.

Хати миёнаи трапетсия ба асосҳои он параллел ва дарозии он ба нисфи суммаи дарозии асосҳои трапетсия баробар аст.

Исбот. Бигзор EF – хати миёнаи трапетсияи $ABCD$ – и асосҳои AD ва BC бошад, ($AD \parallel BC$) хати ростии BF мегузаронем ва нуктаи буриши он ба хати рост AD –ро бо P ишора мекунем. (расми 5). Аз рӯи аломати дуҷони баробарии секунҷаҳо, секунҷаҳои BCF ва PDF баробаранд (аз рӯи шарти $CF = DF$, $\angle 1 = \angle 2$ кунҷҳои вертикалӣ ва $\angle 3 = \angle 4$ BC ва AD хатҳои ростии параллел ва CD кунҷҳои яктарафаи ивазшаванда барои буданаш). Аз баробарии ин секунҷаҳо $BF = PF$ ва $BC = DP$ ҳосил мешавад (бармеояд) ва пас EF – хати миёнаи секунҷаи ABP мешавад. Дар асоси хосияти хати миёнаи секунҷа:

$$EF \parallel AP \text{ ва } EF = \frac{1}{2} AP.$$

Ба $AD \parallel BC$ соҳиб мешавем. Аз сабаби, EF буданаш ба ҳарду асос параллел мешавад ва ин тавр ифода ёфтаниш мумкин:



$$EF = \frac{1}{2} AP = \frac{1}{2}(AD + DP) = \frac{1}{2}(AD + BC).$$

$$\text{Пас, } EF \parallel AD \parallel BC \text{ ва } EF = \frac{1}{2}(AD + BC).$$

Теорема исбот шуд.

Натиҷа. Хати ростии аз миёнаҷои тарафи паҳлӯии трапетсия гузаранда ба асосҳои он параллел шуда, тарафи дуҷони паҳлӯиро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад.


Инро мустақил исбот кунед.





Савол, масала ва супоришҳо




- 1) Хати миёнаи секунча чист?
- 2) Дар секунча чандто хати миёна сохтан мумкин?
2. Тарафҳои секунча ба 5 см, 7 см ва 11 см баробар аст. Тарафҳои секунчаи куллааш дар хати миёнаи секунчаи додашуда воқеъ бударо ёбед.
3. Тарафҳои секунчаи хати миёнааш ба 6 см, 7 см ва 9 см баробар бударо ёбед.
4. Диагонали трапетсия хати миёнаи онро (EF) аз қуллаи E сар карда ба порчаҳои 5 см, 7 см ва 4 см тақсим мекунад (расми 6). Асосҳои трапетсияро ёбед.



5. Ҳар як тарафи секунчаи ABC бо се порчаи баробар тақсим шудааст ва нуқтаҳои ҷудо карда шуда бо ёрии порчаҳо пайваस्त карда шудааст. Агар секунчаи ABC ба P баробар бошад, периметри шакли дар расми 7 ҳосилшударо ёбед.

6. Асосҳои трапетсия ба: 1) 4,5 дм ва 8,2 дм; 2) 9 см ва 21 см баробар аст. Дарозии хати миёнаи он чӣ қадар аст?

7. Дар трапетсияи $ABCD$ (расми 8), порчаи EF ба тарафи CD параллел нуқтаи E бошад, миёнаҳои AB , исбот намоед, ки $EF=0.5 CD$ аст.
8. Дарозии номаълуми дар расми 9 бударо ҳисоб кунед.
9. Ҳар як диагоналҳои трапетсия хати миёнаи онро ба порчаҳои 6 см –а ҷудо мекунад. Асосҳои ҳамин трапетсияро ёбед.
10. Диагонали трапетсияи баробарпахлӯ ба 6 см баробар буда, он бо асоси он кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Хати миёнаи трапетсияро ёбед.
11. Асоси калони трапетсия аз асоси хурдаш 3 маротиба калон ва хати миёнаи он ба 20 см баробар. Асосҳои трапетсияро ёбед.
12. Периметри трапетсия ба 40 см, суммаи тарафҳои параллел набуда, ба 16 см баробаранд. Хати миёнаи ин трапетсияро ёбед.



12. ТАТБИҚ ВА МАШҚИ АМАЛӢ

1. Масъалаҳо доир ба тадқиқот.

Масъалаи 1. Бисёркунҷаи тарафаш n -то бударо созед ва диагоналҳои онро созед, дар он : 1) $n=5$; 2) $n=7$; 3) $n=8$ шумораи диагоналҳои гуногуни бисёркунҷаи (d_n). Бо роҳи мулоҳизаронӣ формулаи ҳисобкуниро ёбед.

Ҳал. 1) $n=5$. Аз қуллаи **2** то AC ва AD , B аз қуллаи **2** то BD ва BE диагоналҳо мебарояд (расми 1).

Аз он шумораи диагоналҳои аз қуллаи бисёркунҷаи барҷаста бароянда аз шумораи тараф (қулла)-ҳои он 3-то кам, яъне ба $5-3=2$ баробар буданаш бармеояд. Барои ёфтани шумораи ҳамаи диагоналҳои аз қуллаҳо бароянда шумораи тарафҳои онро ба 2 зарб мезанем:

$$5 \cdot (5-3) = 5 \cdot 2 = 10.$$

Дар ин ҳосили зарб ҳар як диагонал 2 маротабгӣ ба ҳисоб гирифта шудааст. Аммо AC ва CA , BD ва DB ва ҳоказо. Яъне, як диагоналро бо ду тарз ифода намудан аст, яъне онҳо диагоналҳо нестанд. Аз ҳамин сабаб ҳосили зарби ҳосилшударо ба 2 тақсим намуда, адади ҳамаи диагоналҳои гуногунро меёбем:



$$5 \cdot 2 : 2 = 5.$$

Пас, адади диагоналҳои гуногуни ҳамаи панҷкунҷаҳои барҷаста ба инҳо баробар аст.

$$d_5 = \frac{5 \cdot (5-3)}{2} = \frac{5 \cdot 2^1}{1 \cdot 2} = 5.$$

Ҷавоб: 5-то.

2) $n=7$. Миқдори диагоналҳои ҳархелаи ҳафткунҷаи барҷаста ба мисли масъалаи болоӣ ҳал карда мешавад. Аз рӯи муҳокимарониҳо дар асоси қонуниятҳои муайяншуда, миқдори диагоналҳои ҳафткунҷаро ин тавр меёбем (расми 2):



$$d_7 = \frac{7 \cdot (7-3)}{2} = \frac{7 \cdot 4}{2} = 14.$$

Ҷавоб: 14-то.

3) $n=8$. Миқдори диагоналҳои ҳархелаи ҳашткунҷаи барҷастаро аз рӯи ҳалли масъалаҳои болоӣ ёфта мешавад. Аз рӯи муҳокимарониҳо дар асоси қонунияти муйяншуда миқдори диагоналҳои ҳашткунҷаи барҷастаро ин тавр меёбем (расми 3):

$$d_8 = \frac{8 \cdot (8-3)}{2} = \frac{4 \cdot 8 \cdot 5}{2} = 20.$$

Ҷавоб: 20-то.

Пас, миқдори диагоналҳои гуногуни бисёркунҷаи барҷаста аз рӯи формулаи зерин ёфта мешавад:

$$d_n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Дар хотир доред! Диагоналҳои аз як қуллаи n -кунҷаи барҷаста бароянда, онро ба $(n-2)$ -то секунҷа тақсим мекунад.

Масъалаи 2. Оё бисёркунҷа 25-то диагонал дошта метавонад?

Ҳал. Миқдори диагоналҳои гуногуни ҳамаи кунҷаҳои n ба $d_n = \frac{n(n-3)}{2}$ баробар аст.

Пас, $\frac{n(n-3)}{2} = 25$. Дар ин маврид $n(n-3) = 50$ ё ки $n(n-3) = 2 \cdot 5 \cdot 5$. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки адади 50-ро ба намуди ҳосили зарби ададҳои натуралӣ аз якдигар 3 ҷузъ фарқ кунанд, ифода кардан мумкин нест. Бинобар ин миқдори ҳамаи диагоналҳои бисёркунҷаи барҷаста 25-то шуда наметавонад.

Ҷавоб: не мавҷуд нест.

Масъалаи 3. Адади секунҷа ва чоркунҷаҳои расмҳои дар хонаи математика таъсир шуда 15-то миқдори тарафҳои онҳо 53-то. Дар расмҳо чантоғӣ секунҷа ва чоркунҷа тасвир шудааст?

Ҳал. Шумораи тарафҳои чоркунҷаҳо ба ададҳои дилхохи натуралӣ ба 4 каратӣ аст, яъне адади чуфт мешавад. Дар ҳолати тоқ будани миқдори секунҷаҳо ҳосили ҷамъ тоқ мешавад. Дар асоси шarti масъала муодила тартиб медеҳем. $3x + 4y = 53$; ҳолатҳои мувофиқи зеринро дида мебароем.

Ба ҷои ададҳои номаълуми муодилаҳо ададҳои мувофиқро гузошта, ҳалли онро қаноткунандаро меёбем:

Ҳолати 1. $x = 1$ ва $y = 14$ бошад, дар ин ҳолат $3 \cdot 1 + 4 \cdot 14 = 53$, яъне $59 \neq 53$.

Ҳолати 2. $x = 3$, $y = 13$; $3 \cdot 3 + 4 \cdot 12 = 53$, яъне $57 \neq 53$.

Ҳолати 3. $x = 5$, $y = 10$; $3 \cdot 5 + 4 \cdot 10 = 53$, яъне $55 \neq 53$.

Ҳолати 4. $x = 7$, $y = 8$; $3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 = 53$, яъне $53 = 53$.

Ҳолати 4, шarti масъаларо қаноат мекунонад, аз ин сабаб ҳолатҳои дигаро намебинем.

Ҷавоб: 7-то секунҷа, 8-то чоркунҷа.

Машҳои иловагӣ барои мустаҳкамкунӣ.

1. Миқдори диагоналҳои аз як қуллаи бисёркунҷаи барҷаста бароянда 13-то. Миқдори тарафҳои ҳамаи бисёркунҷа чандтоанд? Миқдори ҳамаи диагоналҳо-чӣ?
2. Бисёркунҷаи миқдори диагоналҳои он: 1) ба миқдори тарафҳои он баробар; 2) аз миқдори тарафҳои он кам оё мавҷуд ҳаст?

МАТЕРИАЛҲОИ ИЛОВАГИИ ИНКИШОФДИҲАНДАИ КОМПЕТЕНСИЯИ АМАЛӢ





ПАРКЕТҲОИ БИСӖРКУНЧАИ МУНТАЗАМ


Шумо албатта дар бораи паркет тасаввурот доред. Дар бисёр мавридҳо хонаҳо полҳои иншоотҳои гуногун бо паркетҳои росткунча, квадрат ва шашкунҷаи мунтазам дода шудааст.

Аз нуқтаи назари математикӣ, паркет – ин якдигарро набурида бо ҳам зич ҷойгир намудани шаклҳои геометрӣ дар ҳамворӣ мебошад. Аввал паркетҳои бисёркунҷаи мунтазам – квадрат, чоркунча ва шашкунҷаро дида мебароем. Дафтари аз як хел квадратча (катак)-ҳо сохта шуда мисоли аз ҳама соддаи паркетҳо мебошад. Дар расми 1-ум аз бисёркунҷаҳои мунтазам; дар расми 2-юм аз квадрат ва шашкунҷаи мунтазам; дар расми 3-юм бошад, аз шашкунҷаи мунтазам квадратҳо ва секунҷаҳои баробартараф; дар расми 4-ум паркетҳои зебо аз шашкунҷаҳои мунтазам ва секунҷаҳо тасвир карда шудааст.


Паркет гуфта чунин пӯшондани ҳамвориро бо бисёркунҷаҳо меноманд, ки дар он ду бисёркунҷаи дилхоҳ ба тарафи умумӣ ё ки ба қуллаи умумӣ соҳиб мешавад, ё худ ба қуллаҳои умумӣ соҳиб намешавад. Агар паркет аз бисёркунҷаҳои мунтазам ташкил ёфта бошад ва ба атрофи ҳар як қулла бисёркунҷаҳо бо як хел усул ҷойгир шуда бошанд, паркетро *мунтазам* меноманд.

Давоми паркетҳо секунҷаи баробартараф, квадратҳо ва шашкунҷаи мунтазам ва паркетҳои ҳамвориро пӯшонда мисол шуда метавонад. Ғайр аз бисёркунҷаи мунтазам мавҷуд набудани дигар бисёркунҷаҳои мунтазामी ҳамвории пӯшонандаро дида мебароем ва





5



6

исбот мекунем. Барои ин ба 360° баробар будани суммаи кунҷҳои бисёркунҷаи аз як қуллаи паркети бароянда истифода мебарем.

Барои он панҷкунҷаи мунтазамро дида мебароем. Ба мо маълум аст, ки суммаи кунҷҳои дохили панҷкунҷаи мунтазам ба 108° баробар аст. Ба як қуллаи паркет се то панҷкунҷаи мунтазамро ғунҷонидан мумкин нест; чунки дар ин ҳолат суммаи кунҷҳо $324^\circ < 360^\circ$ мешавад. Агар миқдори панҷкунҷаи мунтазам 4-то ё ки аз он бисёр бошад, онҳо суммаи кунҷҳо $432^\circ > 360^\circ$ мешавад. Бинобар ин паркети аз панҷкунҷаи мунтазам сохта вучуд надорад. Ба монанди ҳамин паркетет мавҷуд нест, ки ба як қуллаи он қисмҳои паркетҳои аз се то ё ки аз он зиёд ҳафткунҷа ва ҳашткунҷаи мунтазам ва ҳоказоро ҷойгир намудан лозим бошад, чунки ҳар як кунҷи он аз 120° калон ва суммаи онҳо аз 360° калон мешавад. Аз ҳамин сабаб паркетҳои аз ҳафткунҷаи мунтазам, ҳашткунҷаи мунтазам ва ҳоказо сохта

шуда мавҷуд нест. Паркетҳои (расми 5) аз секунҷаҳои баробартараф квадрат ва шашкунҷаи мунтазам аз паркетҳои дар расми 3 буда, бо тарзи ҷойгиршавиашон фарқ мекунад. Дар расми 6 бошад, паркети аз секунҷаҳои баробартараф ва квадрат сохта шуда тасвир карда шудааст. Дар ҳар ду паркети овардашуда ҳам қонунияти умумиро дидан мумкин аст, яъне суммаи кунҷҳои дохилии шаклҳои дар атрофи ҳар як қулла буда, ба 360° баробар буданаш худ аз худ маълум аст. Масалан, дар расми 5, $60^\circ + 90^\circ + 90^\circ + 120^\circ = 360^\circ$, яъне, дар атрофи як қулла якта секунҷаи баробартараф 2-то квадрат ва якто шашкунҷаи мунтазам ҷой гирифтаанд. Дар расми 6-ум бошад, дар атрофи як қулла 3-то секунҷаи баробартараф (ҳар як кунҷи дохилӣ бо 60°) ва 2-то квадрат (ҳар як кунҷи дохилӣ бо 90°) ҷойгир шудааст. Дигар намудҳои паркетҳои ҳамвории пӯшонандаро бо чадвал меоварем. Паркетҳои дар расмҳои 5 ва 6 бударо сохта бинед.

| α_1 | α_2 | α_3 | α_4 | α_5 | α_6 | $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots = 360^\circ$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | Паркети аз секунҷаҳо сохташуда |
| 60° | 60° | 120° | 120° | | | Паркетҳои аз секунҷаҳо ва шашкунҷаҳо сохташуда |
| 60° | 90° | 90° | 120° | | | Паркетҳои аз секунҷа, квадрат ва шашкунҷа сохташуда |
| 60° | 150° | 150° | | | | Паркетҳои аз секунҷа ва дувоздаҳкунҷаҳо сохташуда |
| 90° | 90° | 90° | 90° | | | Паркети аз квадратҳо сохташуда |
| 120° | 120° | 120° | | | | Паркети аз шашкунҷаҳо сохташуда |

13–14. КОРИ НАЗОРАТӢ. ИСЛОӢ НАМУДАНИ ХАТОГИӢО

1. Периметри росткунча ба 40 см, нисбати тарафҳояш ба 3:5 баробар аст. Тарафҳои ҳамин чоркунҷаро ёбед.
2. Яке аз тарафҳои параллелограмм аз дигараш 4 маротиба калон аст, периметраш ба 30 см баробар. Тарафҳои параллелограммро ёбед.
3. Кунҷи тези трапетсияи росткунча ба 45° баробар. Тарафи хурди паҳлӯӣ, инчунин асоси хурди он ба 16 см баробар аст. Асоси калони трапетсияро ёбед.
4. Дар трапетсияи $ABCD$. AD – асоси калон бо воситаи қуллаи B хати рости ба тарафи CD параллел ва тарафи AD -ро дар нуктаи E буранда гузаронида шудааст, $BC = 7$ см, $AE = 4$ см. 1) Хати миёнаи трапетсияро; 2) агар периметри секунҷаи ABE ба 17 см баробар бошад, периметри ҳамин трапетсияро ёбед.

ТЕСТИ 1.

Худро санҷед!

1. Яке аз кунҷҳои чоркунҷаи барҷаста рост, боқимондааш бошад, ба нисбати 3:4:8. Кунҷи хурди чоркунҷаро ёбед.
А) 72° ; В) 54° ; Д) 144° ; Е) 90° .
2. Агар ҳар як кунҷи дохилии бисёркунҷаи барҷаста 156° бошад, он чанд тараф дорад?
А) 10-то; В) 15-то; Д) 12-то; Е) 8-то.
3. Периметри параллелограмми $ABCD$ ба 32 см, диагонали $BD = 9$ см баробар. Периметри секунҷаи ABD – ро ёбед.
А) 16 см; В) 25 см; Д) 23 см; Е) 41 см.
4. Параллелограмми суммаи ду кунҷаш ба 100° баробарро ёбед?
А) 120° ; В) 110° ; Д) 150° ; Е) 130° .
5. Яке аз кунҷҳои ромб ба 150° баробар аст, диагонали хурдаш бошад, ба 4,5 см баробар. Периметри ромбро ёбед.
А) 27 см; В) 18 см; Д) 13 см; Е) 21,5 см.
6. Трапетсияи $ABCD$ -и хати миёнаи трапетсия онро ба ду трапетсияи хатҳои миёнааш ба 13 см ва 17 см баробар ҷудо мекунад. Асоси калони трапетсияро ёбед.
А) 19 см; В) 21 см; Д) 18 см; Е) 30 см.
7. Хати миёнаи секунҷа аз асоси он 5,4 см кӯтоҳ аст. Суммаи хати миёнаи секунҷа ва асоси онро ёбед.
А) 13,5 см; В) 16,2 см; Д) 10,8 см; Е) 21,6 см.
8. Периметри трапетсияи баробарпаҳлӯ 36 см, хати миёнааш 10 см. Дарозии тарафи паҳлӯиро ёбед.
А) 10 см; В) 8 см; Д) 12 см; Е) 13 см.
9. Хати миёнаи трапетсия 9 см, яке аз асосҳои он аз дигараш 6 см кӯтоҳ аст. Асоси калони трапетсияро ёбед.
А) 15 см; В) 18 см; Д) 12 см; Е) 10 см.

Забони англисиро меомӯзем!



Бисёркунча – polygon

Росткунча – rectangle

Ромб – rhombus

Квадрат – square

Баландӣ – height

Периметр – perimeter

Диагонал – diagonal

Параллелограмм – parallelogram

Трапетсия – trapezoid

Кунҷ – angle



Маълумотҳои таърихӣ



Абӯрайхон Берунӣ
(973–1048)

Дар математикаи Миср ва Бобулистони қадим, намудҳои зерини чоркунча воҷеҳданд: квадратҳо, росткунҷаҳо, трапетсияҳои росткунҷа ва баробарпаҳлӯ. Аз олимони осеимииёнагӣ **Абӯрайхони Берунӣ** намудҳои чоркунҷаҳо ро муфассал омӯхтааст. Ў дар асари худ «Китоб дар бораи санъати астрономӣ» савол мегузорад: «Чоркунҷа чӣ намуд дорад?» ва чунин ҷавоб медиҳад:

*«**Якум** – **квадрат**, ҳамаи тарафҳои он баробар, хатҳои пайваस्तкунандаи кунҷ (нӯғ)-и муқобилхобида, яъне диагоналҳо баробаранд.*

*Дуюм – **росткунҷа**, нисбат ба квадрат дарозтар, ҳамаи кунҷҳои он рост, аз ҳар тараф ҳар хел, танҳо тарафҳои муқобилхобида ва диагоналҳои он баробаранд.*

*Сеюм – **ромб**, чор тарафаи он баробар, аммо диагоналҳои он гуногун, танҳо ду тарафи муқобилхобидаи онҳо баробаранд.*


*Чорум – **ромбoid**, диагоналҳои он гуногунанд, танҳо дутогӣ тарафҳои муқобил баробаранд.*

*Чоркунҷае, ки аз ин гуна шаклҳо фарқ мекунад, **трапетсия** номида мешаванд».*


Квадрат калимаи лотинӣ буда, маънои «чоркунҷа»-ро дорад. Берунӣ калимаи арабии «*мураббаъ*»-ро истифода кардааст. Ба забони лотинӣ айнан ҳамин калимаи арабӣ тарҷима шудааст. Росткунҷа дар забони арабӣ «*мустатил*» – «кашишхӯранда» ном дорад.

Ба миён омадани мафҳуми **ромб** ба тарзи гуногун фаҳмонида мешавад. Он аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънои «*ҷисми гарданда*», «*тобхӯранда*»-ро дорад. Мафҳуми зерин ба геометрия аз сабаби ба ромб монанд будани хати бодбарак дохил гардидааст. Дар забони арабӣ мафҳуми «*ромб*»-ро «*муайян*» қабул кардаанд.

Трапетсия калимаи юнонӣ, маънои «*мизча*»-ро дорад. Маънои айнани луғавии он – чорпоя. Дар ҳақиқат, калимаи юнонии «*трапедзион*» мизча, мизи ғизохӯриро мефаҳмонад. Берунӣ «*трапетсия*»-ро «*муҳарриф*» номидааст, ки ин тарҷимаи айнан калимаи юнонии «*трапедзион*» мебошад.



БОБИ II. МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИ ТАРАФҲО ВА КУНЧҲОИ СЕКУНЧАИ РОСТКУНЧА




§ 3.

ФУНКСИЯҲОИ ТРИГОНОМЕТРИИ КУНЧИ ТЕЗ

15. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС ВА КОТАНГЕНСИ КУНЧИ ТЕЗ

Тригонометрия, як қисми математика буда, он вобастагии байни тарафҳо ва кунҷҳои секунча, хосиятҳои функцияҳои тригонометрӣ ва муносибатҳои байни онҳоро меомӯзад. „Тригонометрия“ аз калимаи юнони “trigon” – секунча ва “metrezis” ченкунӣ гирифта шуда, маъноаш ба забони тоҷикӣ “**ченкардани секунчаҳо**” мебошад. Вазифаи асосии тригонометрия аз ҳалли секунчаҳо иборат аст. Секунча яке аз шаклҳои асосии геометрия мебошад. Бинобар ин омӯхтани геометрияро давом медиҳем. Мақсади асосии боб, ягон элементи секунчаро (тарафҳо ва кунҷҳо)-ро ба воситаи дигар элементҳояш ифода намудан мебошад.



Бигзор секунчаи росткунҷаи ($\angle C = 90^\circ$) катетҳояш $BC = a$ ва $AC = b$, гипотенузааш $AB = c$ ва кунҷи тезаш $\angle A = \alpha$ додашуда бошад (расми 1).

Нисбати тарафҳои секунчаҳоро чуфт-чуфт мегирем:

$\frac{a}{c}$ – нисбати катети муқобили кунҷи α бар гипотенуза;

$\frac{b}{c}$ – нисбати катети ба кунҷи α часпида бар гипотенуза;

$\frac{a}{b}$ – нисбати катети муқобили кунҷи α ба катети ба кунҷи часпида;

$\frac{b}{a}$ – нисбати катети ба кунҷи α часпида ба катети муқобили ҳамон

кунҷ;

$\frac{c}{b}$ – нисбати гипотенуза ба катети ба кунҷи α часпида;

$\frac{c}{a}$ – нисбати гипотенуза ба катети муқобили кунҷи α ҳамин тавр

ҳамагӣ 6-то нисбатро ҳосил намудем.

Ба монанди ҳамин барои кунҷи тези дуюм (B) ҳам бо ҳамин тартиб нисбатҳоро тартиб додан мумкин.

Чор нисбати аввалин бо номҳои махсус ифода карда мешавад.

Таърифи 1. Синуси кунҷи тези секунҷаи росткунҷа гуфта, нисбати катети муқобили кунҷ бар гипотенузаро меноманд.

Синуси кунҷи α -ро бо $\sin\alpha$ ишорат намуда, он “Синус алфа” хонда мешавад. Мувофиқи таъриф:

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}.$$

Таърифи 2. Косинуси кунҷи тези секунҷаи росткунҷа гуфта, нисбати катети ба кунҷ часпида бар гипотенузаро меноманд.

Косинуси кунҷи α -ро бо $\cos\alpha$ ишорат намуда, он “Косинуси алфа” хонда мешавад. Мувофиқи таъриф:

$$\cos\alpha = \frac{b}{c}.$$

Таърифи 3. Тангенси кунҷи тези секунҷаи росткунҷа гуфта, нисбати катети муқобили кунҷ бар катети ба кунҷ часпидаро меноманд.

Тангенс кунҷи α -ро бо $\tan\alpha$ ишорат намуда, он “Тангенс алфа” хонда мешавад. Мувофиқи таъриф:

$$\tan\alpha = \frac{a}{b}.$$

Таърифи 4. Котангенси кунҷи тези секунҷаи росткунҷа гуфта, нисбати катети ба кунҷ часпида ба катети муқобили кунҷро меноманд.

Котангенс кунҷи α -ро бо $\cot\alpha$ ишорат намуда, он “Котангенс алфа” хонда мешавад. Мувофиқи таъриф:


$$\cot\alpha = \frac{b}{a}.$$

Аз сабаби дар секунҷаи росткунҷа аз гипотенуза хурд будани катет синус ва косинуси кунҷи тез аз як хурд мебошад. Дар секунҷаи росткунҷа катетҳо байни ҳам баробар аст. Яке аз дуум хурд ё калон шуданаш мумкин.

Бинобар ин қиматҳои тангенс ва котангенс аз 1 хурд ба 1 баробар, инчунин аз 1 калон шуда метавонад.

Масъала: Дар секунҷаи ABC $\angle C=90^\circ$, $AB=10$ см, $BC=8$ см, $AC=6$ см (расми 2). Қиматҳои функсияи тригонометрии кунҷи A -ро ёбед.

Ҳал. Мувофиқи таъриф:



$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{8}{10} = 0,8; \quad \operatorname{tg} A = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3};$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{6}{10} = 0,6; \quad \operatorname{ctg} A = \frac{3}{4} = 0,75;$$

Ҷавоб: $\sin A=0,8$; $\cos A=0,6$; $\operatorname{tg} A=1\frac{1}{3}$; $\operatorname{ctg} A=0,75$.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Аз тарафҳои сеунҷаи росткунҷа чӣ хел нисбатҳо тартиб додан мумкин ва он чӣ тавр хонда мешаванд?

2) Дар сеунҷаи росткунҷа синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷи тез гуфта чиро меноманд ва онҳо чӣ хел ишорат карда мешаванд?

2. Ҳар як каср мувофиқи таъриф кадом функсияи тригонометрии кунҷи K -ро ифода мекунад (расми 3).

а) $\frac{KN}{KM}$; б) $\frac{MN}{KN}$; в) $\frac{MN}{KM}$; г) $\frac{KN}{MN}$?



3. Дар $\triangle ABC$, $\angle C=90^\circ$, $AB=6$ см, $BC=5$ см, $AC=\sqrt{11}$ см (расми 1). Қиматҳои синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷҳои A ва B -ро ёбед.

4. Дар сеунҷаи росткунҷа оё синуси кунҷи тез ба: а) $0,98$; б) $\sqrt{2}$; в) $\sqrt{5}-2$ баробар шуда метавонад?

5. Дар сеунҷаи росткунҷаи MNL $\sin N = \frac{24}{25}$. Аз ин баробарӣ кадом тарафи сеунҷаро ёфтан мумкин (расми 4).

6. Дар сеунҷаи MNL $\angle L=90^\circ$, $MN=13$ см $ML=12$ см $NL=5$ см (расми 4). Қиматҳои синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷи M -ро ёбед.

7. Дар сеунҷаи ABC $\angle L=90^\circ$, $AB=17$ см $BC=8$ см $AC=15$ см. Қиматҳои синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷҳои A ва B -ро ёбед.



Доништан Ҷойданок аст!




- Калимаи «**синус**» аз забони латинӣ гирифта шуда, маънояш «**сарҳамӣ**»-ро мефаҳмонад.
- Калимаи «**тангенс**»-ро аз забони латинӣ тарҷума намоем маънояш «**расанда**» мебошад.
- Калимаҳои «**косинус**» ва «**отангенс**» \sin ва «**complementi tangens**» калимаҳои мухтасари «**синуси пурқунанда**» ва «**тангенс пурқунанда**» мебошад.

16. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС ВА КОТАНГЕНСИ КУНЧИ ТЕЗ (ДАВОМАШ)

1. Функцияҳои тригонометрии кунчи тез.

Функцияи тригонометрии кунчи тез дар секунҷаи росткунҷа қиматҳои синус, косинус, тангенс ва котангенс фақат вобаста ба бузургии кунчи тез ва ба интихоби секунҷаи росткунҷа новобаста будани онро нишон медиҳем.



Дар секунҷаи росткунҷаи ABC ва $A_1B_1C_1$ ($\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$) $\angle A = \angle A_1$ бошад (расми 1). Мувофиқи хосияти асосии таносуб:

$$\frac{BC}{AB} = \frac{B_1C_1}{A_1B_1}; \quad \frac{AC}{AB} = \frac{A_1C_1}{A_1B_1}; \quad \frac{BC}{AC} = \frac{B_1C_1}{A_1C_1}; \quad \frac{AC}{BC} = \frac{A_1C_1}{B_1C_1}$$

Қисмҳои чап ва рости ин баробарӣ мувофиқан ба синус, косинус, тангенс ва котангенси кунҷҳои A ва A_1 баробар аст. Пас,

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{B_1C_1}{A_1B_1} = \sin A_1, \quad \operatorname{tg} A = \frac{BC}{AC} = \frac{B_1C_1}{A_1C_1} = \operatorname{tg} A_1,$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{A_1C_1}{A_1B_1} = \cos A_1, \quad \operatorname{ctg} A = \frac{AC}{BC} = \frac{A_1C_1}{B_1C_1} = \operatorname{ctg} A_1.$$

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки синус, косинус, тангенс ва котангенси кунчи тези A аз интихоби секунҷа вобаста нест. Агар қимати кунчи тез тағйир ёбад, ин нисбатҳо албатта тағйир меёбад.

Ҳамин тавр, синус, косинус, тангенс ва котангенси кунчи тез фақат аз бузургии кунчи тез вобаста аст.

Синус, косинус, тангенс ва котангенси кунчи тезро функцияҳои тригонометрӣ меноманд. Аз баробариҳои дар боло оварда шуда чунин ҳулосаи асосӣ бармеояд.

Агар барои кунҷҳои тези A ва A_1 ягон функцияи тригонометрӣ баробар бошад, онгоҳ кунҷҳои тези A ва A_1 ба ($\angle A = \angle A_1$) баробар мешавад.

Бо тарзи дигар гӯем, *ба ҳар як қимати функцияи тригонометрӣ кунчи тези ягона мувофиқ меояд.*

2. Ифода намудани тангенс ва котангенс бо ёрии синус ва косинус.

Аз таърифи синус ва косинус баробариҳои зерин ҳосил мешавад (ниг. ба мавзӯи 15).

$$\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{b}{c} : \frac{a}{c} = \frac{b \cdot c}{c \cdot a} = \frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha, \quad \text{яъне} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \quad (1)$$

$$\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{b}{c} : \frac{a}{c} = \frac{b \cdot c}{c \cdot a} = \frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha, \quad \text{яъне} \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}. \quad (2)$$

Ҳаминтавр тангенс ва котангенс кунчи тез бо ёрии синус ва косинус чунин таъриф дода мешавад.

Нисбати синуси кунчи тез бо косинуси он тангенс ҳамин кунч номида мешавад.

Нисбати косинуси кунчи тез бо синуси он котангенс ҳамин кунч номида мешавад.

Баробарии (1) ва (2)-ро аъзо ба аъзо зарб намуда, баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = 1 \Leftrightarrow \operatorname{tg}\alpha \times \operatorname{ctg}\alpha = 1. \quad (3)$$

Пас, **ҳосили зарби тангенс ва котангенс кунчи тези α ба 1 баробар аст.** Аз ин ҷо байни худ чаппа будани функцияҳои тангенс ва котангенс кунчи тези α бармеояд. Ҳаминтавр мо барои кунчи тези α -сето **баробарии** нав (*айният*)-ро ҳосил намудем.

3. Муносибатҳои байни тарафҳо ва кунҷҳои секунҷаи росткунҷа.

Аз таърифҳои функцияҳои тригонометрӣ қоидаҳои зерин бармеояд.

Қоидаи 1. Катети муқобили кунчи α ба ҳосили зарби гипотенуза ва синуси кунчи α баробар аст:

$$a = c \sin\alpha.$$

Қоидаи 2. Катети муқобили кунчи α ва ҳосили зарби катети дуюм тангенс кунчи α баробар аст:

$$a = b \operatorname{tg}\alpha.$$

Қоидаи 3. Катети ба кунчи α часпида ба ҳосили зарби гипотенуза ва косинуси кунчи α баробар аст:

$$b = c \cos\alpha.$$

Қоидаи 4. Катети ба кунчи α часпида ба нисбати катети муқобили кунҷ ба тангенс кунчи α баробар аст:

$$b = \frac{a}{\operatorname{tg}\alpha}$$

Қоидаи 5. Нисбати катети муқобили кунҷ бар тангенс кунчи α ба гипотенузаи α баробар аст:

$$c = \frac{a}{\sin\alpha}.$$

Қоидаи 6. Нисбати катети ба кунҷ часпида бар косинуси кунчи α ба гипотенузаи α баробар аст:

$$c = \frac{b}{\cos\alpha}.$$

Масъала: Дар секунҷаи ABC кунҷи C ба 90° баробар аст. Агар:

- 1) $AB=18$ см ва $\sin A = \frac{1}{3}$ бошад, катети BC -ро; 2) $AC=15$ см ва $\cos A = \frac{5}{6}$ бошад, гипотенузаи, AB -ро; 3) $BC=26$ см $\operatorname{tg} A = \frac{13}{15}$ бошад, катети AC -ро ҳисоб кунед.

Ҳал. 1) Аз қоидаи 1 истифода бурда, катети BC -ро меёбем:

$$BC = AB \sin A = 18 \cdot \frac{1}{3} = 6 \text{ (см).}$$

Ҷавоб: 6 см.

2) Аз қоидаи 6 истифода бурда, гипотенузаи AB -ро меёбем:

$$AB = \frac{AC}{\cos A} = 15 : \frac{5}{6} = 15 \cdot \frac{6}{5} = 3 \cdot 6 = 18 \text{ (см).}$$

Ҷавоб: 18 см.

3) Аз қоидаи 4 истифода бурда, катети AC -ро меёбем:

$$AC = \frac{BC}{\operatorname{tg} A} = 26 : \frac{13}{15} = 2 \cdot 15 = 30.$$


Ҷавоб: 30 см.

Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Функсияи тригонометрии кунҷи тез чист?

2) Бузургии кунҷи тези синус, косинус, тангенс ва котангенс ба чӣ вобаста аст?

2. Дуруст будани кадоме аз баробарии дода шудаи зеринро муайян кунед (расми 2). Ҷавобатонро асоснок кунед.



а) $c = \frac{a}{\sin \alpha}$; б) $b = c \sin \alpha$; в) $c = a \operatorname{tg} \alpha$; г) $a = \frac{b}{\operatorname{ctg} \alpha}$.

3. Оё тангенс кунҷи тези секунҷаи росткунҷа ба $\sqrt{2}$; 0,001 ва 100 баробар шуда метавонад? Ҷавобатонро асоснок кунед.

4. Дар секунҷаи ABC кунҷи C ба 90° баробар аст. Агар

1) $BC=10$ см ва $\operatorname{tg} A = \frac{5}{8}$ бошад, катети AC -ро;

2) $BC=8$ см ва $\sin A = 0,16$ бошад, гипотенузаи AB -ро ҳисоб кунед.

5. 6-то муносибати байни тарафҳо ва кунҷҳои секунҷаи росткунҷаро барои кунҷи B низ ҳосил кунед (расми 2).

6. Дар секунҷаи ABC кунҷи C ба 90° баробар аст. Агар $BC=4$ см ва $\sin A = 0,25$ бошад, гипотенузаи AB -ро ҳисоб кунед.

7. Дар секунҷаи ABC кунҷи C ба 90° баробар аст. Агар $AC=2$ см ва $\cos A = 0,4$ бошад, гипотенузаи AB -ро ҳисоб кунед.

8. Дар секунҷаи ABC кунҷи C ба 90° баробар аст. Агар $BC=14$ см ва $\cos B = \frac{7}{25}$ бошад, гипотенузаи AB -ро ҳисоб кунед.

17. ТЕОРЕМАИ ПИФАГОР ВА ИСБОТҲОИ ГУНОГУНИ ОН

1. Теоремаи Пифагор – яке аз муҳимтарин теоремаҳои геометрия мебошад.

Дар бораи ҳаёти математики машҳури юнонӣ *Пифагор* маълумот хеле кам аст. Мактаби Пифагор чудо кардани шаклҳо, шаклҳои хати ростро ба шаклҳои баробар иваз намуда, теоремаро бо усули геометрӣ исбот намуда, барои ҳалли масъалаҳо истифода кардан аз асарҳои математики юнон маълум аст. Дар ташаккули геометрия чун фан Пифагор ва мактаби ӯ ҳиссаи калон гузоштаанд. Теоремаи зерин бо номи Пифагор машҳур аст.

Теорема.

(Теоремаи Пифагор.) Дар секунҷаи росткунҷа квадрати гипотенуза ба суммаи квадрати катетҳои он баробар аст.

Ин теорема дар бораи секунҷаҳои росткунҷа мебошад ва таносуби байни масоҳати квадратҳои ба тарафҳои секунҷа баробарро дар назар дорад. Пифагор исботи назариявии ин теоремаро овардааст. Ҳолатҳои хусусии муносибатҳои геометрии бо теоремаи Пифагор муайяншуда пеш аз Пифагор ҳам дар байни халқҳои гуногун маълум буд, аммо шакли умумии теорема ба мактаби Пифагор тааллуқ дорад.



Бигзор секунҷаи росткунҷаи ABC , ки катетҳояш a ва b ва гипотенузааш c аст, додашуда бошад. Дар ин ҳолат теоремаи Пифагор бо формулаи

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad (1)$$

ифода меёбад. Дар ин ҷо a^2 , b^2 , c^2 – ба масоҳати тарафҳояш a , b , c баробар аст. Бинобар ин, баробарии зерин баробарии тарафро ба *дарозии гипотенуза, баробарии масоҳати квадратро ба суммаи нишон* медеҳад (расми 1)

2. Исботи теоремаи Пифагор ба воситаи косинуси кунҷи тез.

Исбот: ABC – секунҷаи росткунҷаи додашуда буда, кунҷи C -и он рост бошад. Баландии CD -ро аз қуллаи C -и секунҷаи росткунҷа мегузaronем (расми 2).



Аз секунҷаҳои росткунҷаи ACD ва ABC мувофиқи таърифи косинуси кунҷ:

$$\cos A = \frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB}.$$

Аз ин $AD \cdot AB = AC^2$ (2).

Аз секунҷаҳои росткунҷаи BCD ва ABC ва мувофиқи таърифи косинуси кунҷ:

$$\cos B = \frac{BD}{BC} = \frac{BC}{AB}.$$

Аз ин $BD \cdot AB = BC^2$ (3).

Баробарии (2) ва (3) - ро аъзо ба аъзо ҳам карда $AD + DB = AB$ буданро ба ҳисоб ғрифта баробарии

$$AC^2 + BC^2 = AB \cdot D + BD \cdot AB = AB \cdot (AD + BD) \cdot AB = AB^2$$

ҳосил мекунем. Теорема исбот шуд.

Тарафҳои секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C = 90^\circ$) -ро мувофиқан бо: $a = BC$; $b = AC$; $c = AB$ ишора намуда, формулаи Пифагорро ҳосил менамоем.


$$c^2 = a^2 + b^2.$$



3. Исботи теоремаи пифагор ба воситаи масоҳатҳо.

Секунҷаи росткунҷаи катетҳояш a , b ва гипотенузааш ба c баробар дода шудааст. Исбот мекунем, ки барои ин секунҷа теоремаи Пифагор мавҷеъ дорад, яъне исбот мекунем, ки

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Исбот. Барои ин, ду квадрат месозем, ки тарафҳояш ба $(a + b)$ баробар мебошад. Квадратро бо усули дар расми 3 нишондодашуда, ба секунҷаҳои росткунҷа ва квадратҳо ҷудо мекунем. Нишон медиҳем, ки чоркунҷаи дар расми 3, a овардашуда, квадрат аст. Дар ҳақиқат, пеш аз ҳама ин чоркунҷа ромб аст, чунки гипотенузаи секунҷаи росткунҷаи катетҳои тарафҳои он a ва b ба c баробар аст. Барои ёфтани бузургии





кунчи x -и нақша $\angle x + \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$, $\angle 3 = \angle 2$ ва $\angle 1 = 90^\circ - \angle 2$ -ро ба эътибор гирифта, меёбем: $\angle x = 90^\circ$. Барои ин яке аз кунҷҳои ин чоркунча ба 90° баробар буда ромб, яъне квадрат аст.

Ҳарду квадрати мушоҳидашаванда баробарандоза аст. Ҳамчунин, масоҳати квадрати якум ба $4S_{\Delta} + c^2$ баробар, масоҳати квадрати дуюм ба $4S_{\Delta} + a^2 + b^2$ (расми 3, б).

Бинобар ин,

$$4S_{\Delta} + c^2 = 4S_{\Delta} + a^2 + b^2.$$

Пас, $c^2 = a^2 + b^2$. Теорема исбот шуд.

Масъала. Аз расми 4 дарозии порчаҳои номаълумро ёбед.

Ҳал. 1) $\triangle ABC$ секунҷаи росткунҷа $\angle B = 90^\circ$ (расми 4) мувофиқи теоремаи Пифагор: $x^2 = 5^2 + 3^2$, аз ин $x^2 = 34 \Rightarrow x = \sqrt{34}$ ($x > 0$).

2) $\triangle ACD$ -секунҷаи росткунҷа $\angle CAD = 90^\circ$. (расми 4) мувофиқи теоремаи

Пифагор: $y^2 + (\sqrt{34})^2 = 7^2$, аз ин $y^2 + 34 = 49$, $y^2 = 15$, $y = \sqrt{15}$ ($y > 0$).

Ҷавоб: $x = \sqrt{34}$ см; $y = \sqrt{15}$ см.

Савол, масъала ва супоришҳо


- 1) 1) Чӣ гуна исботҳои теоремаи Пифагорро медонед?
- 2) Ибораи «квадрати гипотенуза», «квадрати катет»-ро чӣ хел мефаҳмед?
2. Катетҳои секунҷаи росткунҷаи a ва b дода шудааст. Агар: 1) $a = 5$, $b = 12$; 2) $a = 4\sqrt{2}$, $b = 7$; 3) $a = 0,7$, $b = 2,4$; 4) $a = 5$, $b = 6$; 5) $a = \frac{5}{13}$, $b = \frac{12}{13}$ бошад, гипотенузаи C -ро ёбед.
3. Диагоналҳои ромб: 1) 12 см ва 16 см 2) 14 см ва 48 см; периметри ромбро ёбед.
4. Дарозии порчаҳои номаълумро ёбед (расми 5).
5. Дар секунҷаи росткунҷа a ва b - катетҳо, c -гипотенуза. Агар 1) $a = 1,2$, $c = 1,3$; 2) $a = 7$, $c = 9$; 3) $a = 1,5$, $c = 1,7$; 4) $a = 2$, $c = 2,5$ бошад, катети b -ро ёбед.
6. Тарафҳои росткунҷа: 1) 2,4 дм ва 7 см; 2) 50 см ва 12 дм; 3) 8 дм ва 1,5 м. Диагонали онро ёбед.

18. ТЕОРЕМАИ БА ТЕОРЕМАИ ПИФАГОР ЧАППА

1. Баъзе натиҷаҳои теоремаи Пифагор.

Аз байни натиҷаҳои теоремаи Пифагор дутояшро дида мебароем.

Натиҷа. Дар секунҷаи росткунҷа катети дилхоҳ аз гипотенуза хурд аст.



Исбот. Бигзор ABC – росткунҷа ва $\angle C = 90^\circ$ бошад (расми 1). Катети дилхоҳи секунҷаи росткунҷа аз гипотенуза хурд буданашро исбот мекунем.

Дар ҳақиқат, аз рӯи теоремаи Пифагор барои катетҳо чунин муносибат мавҷеъ дорад:

$$AC^2 = AB^2 - BC^2 \text{ ва } BC^2 = AB^2 - AC^2$$

Аз ин ҷо

$$AC^2 < AB^2 \text{ ва } BC^2 < AB^2$$


буданаш бармеояд.

Пас, $AC < AB$ ва $BC < AB$. Натиҷа исбот карда шуд.

2. Теоремаи чаппа ба теоремаи Пифагор.

Теорема.

Агар квадрати яке аз тарафҳои секунҷа ба суммаи квадратҳои ду тарафи боқимондаи он баробар бошад, он гоҳ ин секунҷа, секунҷаи росткунҷа мешавад.



Исбот. Дар секунҷаи ABC бигзор $AB^2 = AC^2 + BC^2$ бошад. Исбот мекунем, ки $\angle C = 90^\circ$ аст (расми 2).

Секунҷаи росткунҷаи $A_1B_1C_1$ -и ёридиҳандаро, ки кунҷи C_1 -и он рост аст аз назар мегузаронем. Дар он $A_1C_1 = AC$ ва $B_1C_1 = BC$. Аз рӯи теоремаи Пифагор $A_1B_1^2 = A_1C_1^2 + B_1C_1^2$ аст, пас,

$$A_1B_1^2 = AC^2 + BC^2.$$

Аммо, аз рӯи шарти теорема

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 \text{ ва пас } A_1B_1^2 = AB^2.$$

Аз ин ҷо: $A_1B_1 = AB$ пайдо мекунем.

Ҳаминтавр, секунҷаи ABC ва $A_1B_1C_1$ нисбат ба се тараф баробар аст. Бинобар ин, $\angle C = \angle C_1$, яъне баробар будани кунҷи қуллаи C -и секунҷаи ABC бармеояд.

Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Агар тарафҳои секунҷа. 1) $a=5$; $b=11$, $c=12$;
2) $a=\sqrt{85}$, $b=7$, $c=6$ бошад, оё он секунҷаи росткунҷа шуда метавонад?

Ҳал. Квадрати секунҷаи ду тарафи хурди b -ро меёбем:

$$5^2 + 11^2 = 25 + 121 = 146.$$

Квадрати тарафи калонро ҳисоб мекунем: $12^2 = 144$.

Натиҷаҳои ҳосилшударо муқоиса кунем, муносибати зерин: $a^2 + b^2 \neq c^2$ бармеояд. Ва пас, секунҷа росткунҷа набудааст.

Ҷавоб: $a=5$, $b=11$ ва $c=12$ бошад, секунҷа, секунҷаи росткунҷа намешавад.

2) Суммаи квадратҳои ду тарафи хурдро ҳисоб мекунем.


$$7^2 + 6^2 = 49 + 36 = 85.$$

Акнун квадрати тарафи калонро ҳисоб мекунем: $(\sqrt{85})^2 = 85$. Пас, $85 = 85$ – бамавқеъ аст. Дар натиҷа ба $b^2 + c^2 = a^2$ соҳиб мешавем. Аз ин ҷо ин секунҷа, секунҷаи росткунҷа буданаш маълум мешавад.

Ҷавоб: $a = \sqrt{85}$, $b=7$ ва $c=6$ бошад, секунҷа, секунҷаи росткунҷа мешавад.

3. Перпендикуляр ва моил.

Бигзор l – хати рост ва A нуқтаи дар он воқеъ набуда бошад. Мувофиқи таъриф, масофаи аз ҳама хурди нуқтаи A то хати рости l ба дарозии перпендикуляри AC аз A то l фароварда шуда баробар мешавад (расми 3). Дарҳақиқат барои ҳар як $B \in l$ секунҷаи ACB – секунҷаи росткунҷа, аз ин ҷо AC ва CB – катетҳо, AB бошад, гипотенуза мешавад. Порчаи CB проексияи моили AB дар хати рости l меноманд.



Теоремаи Пифагор, моили AB , перпендикуляри AC ва CB – дарозии проексияҳои онро бо чунин баробарӣ ифода мекунад:

$$AB^2 = AC^2 + CB^2.$$

Бинобар ин ҳамеша $AB > AC$ ё ки $AB > BC$ ба тарзи дигар гӯем, проексияи перпендикуляр ва моили аз нуқта гузаронидашуда аз моил хурд мешавад.

Ҳаминтавр, моилҳои баробар ба проексияҳои баробар соҳиб аст; аз ду моил проексияи кадомаш калон бошад, ҳамонаш калон мешавад.

Масъалаи 2. Агар диагоналҳо ба 10 см ва 24 см баробар бошад, тарафҳои онро ёбед.

Ҳал. Аз буриши диагоналҳои ромб, ки дар нуқтаи буриш ба ду қисм чудо мешавад истифода мебарем. Дар он ҳол катетҳои тарафи ромб ба 5 см ва 12 см баробар буда, гипотенузаи секунҷаи росткунҷа мешавад:

$$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169, \text{ яъне } 169 = 13^2.$$

Яъне, тарафи ромб ба 13 см баробар будааст.

Ҷавоб: 13 см.

? Савол, масъала ва супоришҳо



1. 1) Теоремаи ба теоремаи Пифагор чаппаро гӯед.
- 2) Проексияи моил ба хати рост гуфта чиро мефаҳмед?
- 3) Оё катет аз гипотенуза хурд буданаш дуруст аст?
2. Оё тарафҳои секунҷаи росткунҷа ба ададҳои: 1) 11 см, 7 см, 17 см; 2) 3 см, 1,6 см, 3,4 см; 3) 3 см, 4 см, 6 см; 4) 2 см, $\sqrt{7}$ см, $\sqrt{11}$ см шуда метавонад? Ҷавобатонро асоснок кунед.
3. Дар $\triangle ABC$ $AB=13$ см, $BC=20$ см, BD – баландии секунҷа ва он ба 12 см баробар аст. Дарозии проексияҳои тарафҳои AB ва BC -и ба тарафи AC фароварда шуда ва дарозии тарафи AC -ро ёбед (расми 4). Дар ҷойҳои холӣ ҷавобҳои мувофиқро ёбед.

Ҳал. $\triangle ABD$ ва $\triangle BCD$ секунҷаи росткунҷа аст, чунки $\angle ADB = \angle BDC = 90^\circ$. Проексияи ба тарафи AC будаи тарафҳои AB ва BC мувофиқан аз порчаҳои AD ва CD иборат аст.

Мувофиқи теоремаи Пифагор аз $\triangle ABD$:
 $AD^2 = AB^2 - BD^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$ (см).
 Аз ин $AD = 5$ см мувофиқи теоремаи Пифагор аз $\triangle BCD$, $CD^2 = BC^2 - BD^2 = 20^2 - 12^2 = 400 - 144 = 256$ (см). Аз ин $CD = 16$ см $AC = AD + DC = 5 + 16 = 21$ (см).

Ҷавоб: $AD = 5$ см, $CD = 16$ см, $AC = 21$ см.

4. Дарозии номаълумро ёбед (расми 5, 6).
5. Дарозии ду тарафи секунҷаи росткунҷа ба 6 см ва 8 см баробар аст. Дарозии тарафи сеюмро ёбед. Масъала чандҳо ҳал дорад?
6. Оё тарафҳои секунҷаи росткунҷа ба ададҳои зерин баробар шуда метавонад:
 - 1) $a=12$, $b=35$, $c=37$;
 - 2) $a=11$, $b=20$, $c=25$;
 - 3) $a=18$, $b=24$, $c=30$;
 - 4) $a=9$, $b=12$, $c=15$?



19. БАЪЗЕ ТАТБИҚҲОИ ТЕОРЕМАИ ПИФАГОР

Бигзор, тарафҳои секунҷаи додашудаи ABC a , b ва c бошад.

Аз қуллаи C ба тарафи AB -и он баландии $CD = h_c$ гузаронидашударо меёбем (расми 1, a).

Аз рӯи ҷӣ гуна ҷойгир шудани нуқтаи D , ки асоси баландӣ аст, нисбат ба порчаи BA ҷӣ гуна ҷойгиршавиашон се ҳолатро мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳолати 1. Бигзор нуқтаи D , нуқтаи дохилии порчаи AB бошад. Агар $AD = x$ бошад, дар он ҳолат $DB = c - x$ мешавад (расми 1, a). Аз рӯи теоремаи Пифагор $\triangle ADC$ ва $\triangle BDC$ росткунҷаанд:

$$h_c^2 = b^2 - x^2 \quad (1) \quad \text{ва} \quad h_c^2 = a^2 - (c - x)^2 \quad (2).$$

Аз ин ҷо баробарии зерин ҳосил мекунем: $b^2 - x^2 = a^2 - (c - x)^2$.

Аз ин

$$b^2 - x^2 = a^2 - c^2 + 2cx - x^2, \quad \text{яъне} \quad b^2 = a^2 - c^2 + 2cx.$$

Аз муодилаи охири x -ро меёбем:

$$x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \quad \text{ё ки} \quad x^2 = \frac{(b^2 + c^2 - a^2)^2}{4c^2}.$$

ин қимати (1) x^2 -ро ба баробарӣ гузошта, ҳосил мекунем:

$$h_c^2 = b^2 - \frac{(b^2 + c^2 - a^2)^2}{4c^2} = \frac{4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{4c^2}.$$

Сурати ин касрро ба зарбкунанда ҷудо карда, ҳосил мекунем:

$$h_c^2 = \frac{(2bc - (b^2 + c^2 - a^2))(2bc + (b^2 + c^2 - a^2))}{4c^2} = \frac{(2bc - b^2 - c^2 + a^2)(2bc + b^2 + c^2 - a^2)}{4c^2}.$$


Шакли ҳарду зарбкунандаи сурати ифодаро тағйир медиҳем:

$$2bc - b^2 - c^2 + a^2 = a^2 - (b - c)^2 = (a - b + c)(a + b - c) \quad \text{ва}$$

$$2bc + b^2 + c^2 - a^2 = (b + c)^2 - a^2 = (b + c - a)(b + c + a).$$

Дар ин ҳол:

$$h_c^2 = \frac{(a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b + c + a)}{4c^2},$$



$$\text{Аз ин } h_c = \frac{1}{2c} \sqrt{(a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(b+c-a)}.$$

Нимпериметри секунҷаро бо p ишора мекунем, дар он ҳол,

$$a+b+c=2p,$$

$$a-b+c=a+b+c-2b=2p-2b=2(p-b),$$

$$a+b-c=a+b+c-2c=2p-2c=2(p-c),$$

$$b+c-a=a+b+c-2a=2p-2a=2(p-a).$$

Ифодаи ҳосилшударо ба чои ифодаи зери реша гузошта, натиҷаи зеринро ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} h_c &= \frac{1}{2c} \sqrt{16p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{1}{2c} \cdot 4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \\ &= \frac{2}{c} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \end{aligned}$$

Айнан ҳаминтавр,


$$h_a = \frac{2}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{ва} \quad h_b = \frac{2}{b} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Ҳолати 2. Нуқтаи D дар давоми AB меҳобад, яъне $DB=c+x$. Дар ин чо низ натиҷаи қайдшуда ҳосил мешавад (расми 1, б).

Ҳолати 3. Нуқтаи D бо нуқтаи B , яъне бо катети баландии $h=a$ болои ҳам меояд. Секунҷа росткунҷа аст (расми 1, в).

Савол, масъала ва супоришҳо

1. Баландии секунҷаи тарафҳояш: 1) 10 см, 10 см, 12 см; 2) 17 дм, 17 дм, 16 см; 3) 4 дм, 13 дм, 15 см-ро ёбед.
2. Тарафҳои секунҷаи баробарпахлӯи баландиаш ба h баробарро ёбед. Агар 1) $h=6$ см; 2) $h=1,5$ дм бошад, тарафашро ёбед.
3. Тарафҳои секунҷа: 1) $a=5$ см-, $b=7$ см-, $c=6$ см-; 2) $a=13$ дм, $b=14$ дм, $c=15$ дм; 3) $a=24$ см, $b=25$ см, $c=7$ см Баландии ба тарафи калон фаровардашударо ёбед.
4. Агар тарафи секунҷаи баробартараф ба 12 см баробар бошад, баландии онро ёбед.
5. Тарафҳои секунҷа $a=8$ см, $b=10$ см ва $c=12$ см. Баландии калонтарин ва хурдтарини ин секунҷаро ёбед.
6. Баландии хурдтарини секунҷаи тарафҳояш ба: 1) 17, 65, 80; 2) 8, 6, 4; 3) 24, 25, 7; 4) 30, 34, 16; 5) 15, 17, 8 баробарро ёбед.
7. Тарафҳои секунҷа $a=16$ см, $b=12$ см ва $c=8$. Баландии хурдтарини ин секунҷаро ёбед.
8. Баландии норвонро ёбед (расми 2).



**20–21. АЙНИЯТҲОИ АСОСИИ ТРИГОНОМЕТРӢ
ВА НАТИҶАҲОИ ОН**

1. Айниятҳои асосии тригонометрӣ.

Айнияти вобастагии байни функсияҳои тригонометрии як кунҷро ҳосил мекунем.

Теорема.

Барои ҳаргуна кунҷи тези α баробарии
 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
ҷой дорад.

Исбот. Бигзор дар секунҷаи дилхоҳи ABC кунҷи назди куллаи A ба α баробар бошад (расми 1).

Мувофиқи теоремаи Пифагор: $BC^2 + AC^2 = AB^2$.
Ҳар ду тарафи баробариро ба AB^2 тақсим намуда,
баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$\left(\frac{BC}{AB}\right)^2 + \left(\frac{AC}{AB}\right)^2 = 1.$$

Аммо $\frac{BC}{AB} = \sin\alpha$, $\frac{AC}{AB} = \cos\alpha$. Ҳаминтавр,

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1. \quad (1)$$

баробарии (1) – ро айнияти **асосии тригонометрӣ** меноманд. Ба мо вобастагии байни муносибати функсияҳои тригонометрии як кунҷ маълум аст:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (2), \quad \operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \quad (3), \quad \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = 1 \quad (4).$$

(1)-ро ба $\cos^2\alpha$ тақсим намуда, айнияти (5)-ро ҳосил мекунем

$$\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \quad \text{ё ки} \quad 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}. \quad (5)$$

ҳарду қисми баробарии (1)-ро ба $\sin^2\alpha$ тақсим намуда, айнияти (6)-ро ҳосил мекунем:


$$1 + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{1}{\sin^2\alpha} \quad \text{ё ки} \quad 1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}. \quad (6)$$

2. Натиҷаҳои айниятҳои асосии тригонометрӣ.

Барои ҳаргуна кунҷи тез, баробарии зерин ҷой дорад:

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha \Rightarrow \sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}. \quad (7)$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha}. \quad (8)$$



Масъалаи 1. Агар $\cos\alpha = \frac{2}{3}$ бошад, қиматҳои $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$ -ро ҳисоб кунед.

$$\text{Ҳал. 1) } \sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

$$2) \operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\sqrt{5}}{3} : \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}; \quad 3) \operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{2}{3} : \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Ҷавоб: } \sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad \operatorname{ctg}\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Масъалаи 2. Ифодаро содда кунед:

$$1) 1 + \frac{1 - \sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}; \quad 2) 1 - \frac{\cos^2\alpha - 1}{\cos^2\alpha}.$$

Ҳал. Ҷамъшавандаҳоро ба махраҷи умумӣ меоварем ва аъзоҳои монандро ислоҳ намуда, аз айнияти (6) истифода бурда меёбем:

$$1 + \frac{1 - \sin^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{\sin^2\alpha + 1 - \sin^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{1}{\sin^2\alpha} = 1 + \operatorname{ctg}^2\alpha.$$

Ҷавоб: $1 + \operatorname{ctg}^2\alpha$.

2) Фарқро ба махраҷи умумӣ оварда, аъзоҳои монанди суратро ислоҳ намуда, аз айнияти (5) истифода намуда ҳосил мекунем:

$$1 - \frac{\cos^2\alpha - 1}{\cos^2\alpha} = \frac{\cos^2\alpha - (\cos^2\alpha - 1)}{\cos^2\alpha} = \frac{\cos^2\alpha - \cos^2\alpha + 1}{\cos^2\alpha} = \frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2\alpha.$$

Ҷавоб: $1 + \operatorname{tg}^2\alpha$.

Масъалаи 3. Ифодаро содда кунед: $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha + 2\sin^2\alpha \cos^2\alpha$.

Ҳал. Аз формулаҳои квадратӣ суммаи ду адад ва айниятҳои асосӣ истифода бурда, ифодаро содда мекунем.

$$\sin^4\alpha + \cos^4\alpha + 2\sin^2\alpha \cos^2\alpha = (\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^2 = 1. \quad \text{Ҷавоб: } 1.$$



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Қадом баробариро айнияти асосии тригонометрӣ меноманд?
- 2) Қадом баробариҳои функсияи тригонометрӣ ифодакунандаро ме-донед?
- 3) Аз айниятҳои асосии тригонометрӣ чӣ натиҷа бармеояд?

2. Агар: 1) $\sin\alpha = \frac{12}{13}$ бошад, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$ -ро; 2) $\cos\alpha = 0,8$ бошад, $\sin\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$ -ро; 3) $\cos\alpha = 0,28$ бошад, $\sin\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$ -ро ёбед.

3. Агар $\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{12}$ бошад, $\sin\alpha$ ва $\cos\alpha$ -ро ёбед.

Намуна: Агар $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{3}$ бошад, $\sin\alpha$ ва $\cos\alpha$ -ро ёбед.

$$\text{Ҳал. } \frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = 1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9}. \quad \text{Пас, } \cos^2\alpha = \frac{9}{25}$$

$$\text{Аз он } \cos\alpha = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}.$$

Акнун $\sin\alpha$ -ро ҳисоб мекунем: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \Rightarrow \sin\alpha = \operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$.

Ҷавоб: $\sin\alpha = \frac{4}{5}$; $\cos\alpha = \frac{3}{5}$.

4. Ифодаро содда кунед: 1) $1 + \sin^2\alpha + \cos^2\alpha$; 2) $\frac{\sin^2\alpha}{1 - \cos^2\alpha}$; 3) $\frac{1 - \sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}$.

Намуна: Ифодаро содда кунед: $1 + \sin^2\alpha - \cos^2\alpha$.

Ҳал. Барои содда намудан чамъшавандаҳоро ба гурӯҳҳо ҳосил мекунем:

$$1 + \sin^2\alpha - \cos^2\alpha = \underbrace{1 - \cos^2\alpha}_{\sin^2\alpha} + \sin^2\alpha = \sin^2\alpha + \sin^2\alpha = 2\sin^2\alpha.$$

Ҷавоб: $2\sin^2\alpha$.

5. Ифодаро содда намоед:

$$1) \frac{(1 - \sin\alpha)(1 + \sin\alpha)}{\sin^2\alpha}; \quad 2) \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}; \quad 3) \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sin\alpha}.$$

6. Катетҳои секунҷаи росткунҷа 7 см ва 24 см баробар аст. Қиматҳои кунҷи аз ҳама хурди функцияҳои тригонометриро ёбед.

7. Агар: 1) $\operatorname{tg}A = 2$; 2) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) $\cos\alpha = \frac{15}{17}$ бошад, A қиматҳои кунҷи тези функцияҳои тригонометриро ёбед.

8. Ифодаро содда кунед: $\frac{1 - \operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{tg}^4\alpha}{\cos^2\alpha}$.

Ҳал:

$$\frac{1 - \operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{tg}^4\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1}{\cos^2\alpha} (1 - \operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{tg}^4\alpha) = (1 + \operatorname{tg}^2\alpha)(1 - \operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{tg}^4\alpha) = 1 + \operatorname{tg}^6\alpha.$$

Барои содда намудан аз айнияти (5) ва формулаи $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ истифода кардем.

Ҷавоб: $1 + \operatorname{tg}^6\alpha$.

9. Агар: 1) $\sin\alpha = \frac{8}{17}$ бошад, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$; 2) $\cos\alpha = 0,6$ $\sin\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ ва $\operatorname{ctg}\alpha$ -ро ёбед.

10. Муайян намоед, ки синус ва косинуси як кунҷ мувофиқан ба ададҳои зерин баробар аст ё не: 1) $\frac{1}{2}$ ва $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $\frac{1}{3}$ ва $\frac{3}{4}$.

11. Муайян намоед, ки тангенс ва котангенс як кунҷ мувофиқан ба ададҳои зерин баробар аст ё не:

$$1) 0,4 \text{ ва } 2,5; \quad 2) 1,1 \text{ ва } 0,9; \quad 3) \sqrt{5} + 2 \text{ ва } \sqrt{5} - 2.$$

12. Ифодаро содда кунед: 1) $\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha - \cos^2\alpha$; 2) $\cos\alpha - \cos\alpha \cdot \sin^2\alpha$.

13. Катетҳои секунҷаи росткунҷа ба 8 см ва 15 см баробар аст. Қимати аз ҳама хурди кунҷи функцияи тригонометрии секунҷаро ёбед.

14. Ифодаро содда кунед: 1) $(1 - \cos\alpha)(1 + \cos\alpha)$; 2) $\sin\alpha - \sin\alpha \cos^2\alpha$.

22. ФОРМУЛАҶО БАРОИ ФУНКСИЯҶОИ ТРИГОНОМЕТРИИ КУНҶИ ПУРКУНАНДА


Формулаҳо барои функсияҳои тригонометрии кунҷи пуркунанда.

Кунҷи пуркунанда гуфта, ду кунҷи суммаиш ба 90° баробар бударо кунҷҳои пуркунанда меноманд. Кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа ба кунҷҳои пуркунанда мисол шуда метавонад, чунки суммаи онҳо ба 90° баробар аст.

Айниятҳои асосие, ки мо дида баромадем барои омӯхтани муносибатҳои байни функсияҳои гуногуни тригонометрии як кунҷ имкон медиҳад. Акнун муносибатҳои байни ду кунҷи секунҷаи росткунҷаро дида мебароем.

Теорема.

Барои ҳар гуна кунҷи тези α $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ —и секунҷаи росткунҷа баробарии зерин ҷой дорад.



Исбот. Секунҷаи росткунҷаи гипотенузааш AB -ро дида мебароем (расми 1). Агар $\angle A = \alpha$ бошад, дар он ҳол ба $\angle B = 90^\circ - \alpha$ баробар мешавад. Кунҷҳои тези секунҷаро бо синус ва косинус ифода мекунем.

Мувофиқи таъриф:

$$\sin B = \frac{AC}{AB} \quad \text{ва} \quad \cos A = \frac{AC}{AB},$$

яъне $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$;

$$\sin A = \frac{BC}{AB} \quad \text{ва} \quad \cos B = \frac{BC}{AB}, \quad \text{яъне}$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha.$$

Теорема исбот шуд. Аз теоремаи исботшуда чунин натиҷа мебарояд.

Натиҷа. Барои ҳар гуна кунҷи тези α баробарии зерин ҷой дорад: $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg}\alpha$; $\operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg}\alpha$.

Исбот нашудани ин баробариҳоро аз формулаҳои болои истифода бурда, ба худатон ҳавола мекунем.

Кунҷҳои A ва B тез – якдигарро то 90° пур мекунад. Онҳо кунҷҳои пуркунандаи якдигаранд. Ҳаминро ба эътибор гирифта, формулаҳои дар боло ҳосил шуда чунин хонда мешавад:

– Синуси кунҷи додашуда, ба косинуси кунҷи пуркунанда баробар аст;

– Косинуси кунҷи додашуда, ба синуси кунҷи пуркунанда баробар аст;

– Тангенси кунҷи додашуда, ба котангенси кунҷи пуркунанда баробар аст;

– Котангенси кунчи додашуда, ба тангенси кунчи пуркунанда баробар аст.

Масъалаи 1. Бигзор кунҷҳои A ва B – кунҷҳои рости секунҷаи росткунҷа бошад. Агар $\sin B = \frac{1}{\sqrt{5}}$ бошад, $\operatorname{tg} A$ -ро ёбед.

Ҳал. $\sin B = \cos A$, пас, $\cos A = \sin B = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Акнун синуси кунҷи α –ро аз натиҷаи айнияти асосии тригонометрӣ истифода бурда меёбем:

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Тангенси кунҷро бо ёрии синус ва косинус меёбем:

$$\operatorname{tg} A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 2. \quad \text{Ҷавоб: } 2.$$

Масъалаи 2. Агар $\operatorname{ctg} x = \operatorname{tg} 20^\circ$ бошад, кунҷи тезро ёбед.

Ҳал. $\operatorname{tg} 20^\circ = \operatorname{ctg}(90^\circ - 20^\circ) = \operatorname{ctg} 70^\circ$, пас, $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} 70^\circ$.


Аз ин $x = 70^\circ$.

Ҷавоб: $x = 70^\circ$.



Савол, масъала ва супоришҳо


- 1) Кунҷҳои пуркунанда чист?
- 2) Кадом муносибатҳои пуркунандаи байни ду кунҷи тези секунҷаи росткунҷа ро медонед? Формулаҳои мувофиқро ёбед.
- 3) Агар: 1) $\sin x = \cos 40^\circ$; 2) $\cos x = \sin 76^\circ$; 3) $\operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} 56^\circ$; 4) $\operatorname{ctg} x = \operatorname{tg} 16^\circ$ бошад, кунҷи тези x -ро ёбед.
4. Кунҷҳои A ва B кунҷи тези секунҷаи росткунҷа бошад. Агар $\cos A = 0,6$ бошад, $\sin B$ ва $\cos B$ -ро ёбед.
5. Синус ва косинуси як кунҷ мувофиқан ба ададҳои зерин баробар аст ё не муайян кунед: 1) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ва $\frac{2}{\sqrt{5}}$; 2) 0,3 ва 0,4.
6. A ва B – кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа. Агар $\sin B = 0,5$ бошад, $\cos A$ ва $\operatorname{tg} A$ -ро ёбед.
7. Дарозии номаълумро ёбед (расми 2). Инчунин синус, косинус, тангенс ва котангенси кунҷҳои тезро ёбед.
8. Агар $\sin(90^\circ - \alpha) = 0,8$ бошад, $\cos \alpha$ ва $\sin \alpha$ -ро ёбед.
9. Ифодаро содда кунед: 1) $\frac{\cos \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha}$; 2) $\operatorname{ctg}^2 \alpha (2 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 1)$.



23. ҲИСОБ НАМУДАНИ СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС ВА КОТАНГЕНСИ КУНЧҲОИ 30°, 45°, 60°.

1. Ҳисоб намудани синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷҳои 30°.

Секунҷаи баробартарафи ABC -ро мегирем (расми 1). Агар дар он баландии BD гузаронем, он биссектриса ва баландӣ мешавад. Аз хамин сабаб кунҷи назди куллаи B -и секунҷаи кунҷи тезаш ба 30° баробар будаи росткунҷаи ABD ($\angle D=90^\circ$) аст. Тарафи секунҷаи баробартараф ба a баробар бошад. Дар он ҳолат $AD = \frac{a}{2}$ мешавад. Аз рӯи теоремаи Пифагор



$$BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Мувофиқи таъриф:

$$\sin 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{1}{2};$$

$$\cos 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{AD}{BD} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$\operatorname{ctg} 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a}{2}} = \sqrt{3}.$$


Бо ёрии формулаҳои функсияҳои тригонометрии кунҷҳои пуркунанда қиматҳои функсияҳои тригонометрии 60° -ро меёбем.

$$\sin 60^\circ = \sin(90^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \operatorname{tg} 60^\circ = \operatorname{tg}(90^\circ - 30^\circ) = \operatorname{ctg} 30^\circ = \sqrt{3};$$

$$\cos 60^\circ = \cos(90^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}; \quad \operatorname{ctg} 60^\circ = \operatorname{ctg}(90^\circ - 30^\circ) = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

2. Ҳисоб намудани синус, косинус тангенс ва котангенс кунҷҳои 45°.

Барои ҳисоб намудани кунҷи (45°) функсияи тригонометрии синус, косинус, тангенс ва котангенс секунҷаи баробарпахлӯи ABC -ро дида мебароем (расми 2). Бигзор дар ин секунҷа ABC . Мувофиқи теоремаи Пифагор гипотенузаи $AC=BC=a$, $\angle A = \angle B = 45^\circ$, $AB = a\sqrt{2}$ баробар бошад. Мувофиқи таърифи функсияи тригонометрии кунҷи тез:



$$\sin 45^\circ = \sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\cos 45^\circ = \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\operatorname{tg}45^\circ = \operatorname{tg}A = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{a} = 1;$$

$$\operatorname{ctg}45^\circ = \operatorname{ctg}A = \frac{AC}{BC} = \frac{a}{a} = 1.$$

Чадвали киматҳои синус, косинус, тангенс ва котангенс 30° , 45° ва 60° -ро тартиб медиҳем. Бо ёрии калкулятор ва чадвал киматҳои функсияҳои тригонометрии кунчи тез, квадрати ададҳо, ва кимати решаҳои квадратӣ ҳисоб карда мешавад.

Масъала. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷаи ABC (AB) ба $4\sqrt{3}$ см ва $\angle A = 60^\circ$ аст (расми 3). Катетҳои ҳамин секунҷаро ёбед.


Ҳал. Ба мо маълум аст, ки катети муқобили кунҷи α ба ҳосили зарби гипотенуза ва синуси кунҷи α баробар аст. Мувофиқи он:

$$BC = AB \sin A = 4\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \text{ (см)}.$$

Ба мо маълум аст, ки катети ба кунҷи α часпида ба ҳосили зарби гипотенуза ва косинуси кунҷи α баробар аст. Мувофиқи он:

$$AC = AB \cos A = 4\sqrt{3} \cdot \cos 60^\circ = 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

| α | 30° | 45° | 60° |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin \alpha$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $\operatorname{tg} \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ |
| $\operatorname{ctg} \alpha$ | $\sqrt{3}$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |



Ҷавоб: $BC = 6$ см, $AC = 2\sqrt{3}$ см.



Савол, масъала ва суноришҳо

- Ҳисоб намоед: 1) $\sin 30^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ$; 2) $\cos 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ$; 3) $\sqrt{2} \sin 45^\circ - \cos 60^\circ$.
- Секунҷаи баробартараф созад ва ба он баландӣ гузаронед. Ченкуниҳои заруриро иҷро намуда, функсияи тригонометрии кунҷҳои 30° ва 60° -ро ҳисоб кунед. Натиҷаро бо чадвал муқоиса кунед.
- ДиAGONАЛИ BD – и параллелограмми $ABCD$ ба тарафи AB перпендикуляр ва ба 16 см баробар аст. Агар кунҷи BDA ба 30° баробар бошад, тарафҳои параллелограммро ёбед.
- Як катети секунҷаи росткунҷа ба $6\sqrt{3}$ кунҷи муқобили ин катет ба 60° баробар аст. Гипотенуза ва катети 2 – юмро ёбед.
- Ифодаро содда намоед:
 - $\operatorname{tg}^2 \alpha (2 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - 1)$; 2) $\operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha$.
- Як катети росткунҷа ба 2, катети муқобили ин кунҷ ба 60° баробар аст. Гипотенуза ва катети дуюмро ёбед.
- Ифодаро содда кунед: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2$.
- Ҳисоб кунед: 1) $\cos 45^\circ \cdot \sin 45^\circ$;
 - $\sin 60^\circ \cdot \operatorname{tg} 30^\circ$;
 - $\sqrt{3} \cos 30^\circ - \cos 60^\circ$.

24. ҶАДВАЛИ ҚИМАТҲОИ ФУНКСИЯҲОИ ТРИГОНОМЕТРӢ

Дар охири китоби дарсӣ ҷадвали функсияҳои тригонометрии ченаки градусиаш аз 1° то 89° доир ба ададҳои бутун (то саҳеҳии даҳҳазорякӣ) дода шудааст. Ин ҷадвал чунин сохта шудааст. Аз тарафи чап сутуни якум (дар болаш градусҳо навишта шудааст). Шумораи градусҳо аз 1° , 2° , 3° , 45° – ҷойгир карда шудааст. Дар сутуни дуюм дар болаш синусҳо навишта шуда, дар сутуни якум ба кунҷҳои додашуда қиматҳои мувофиқи онҳо нишон дода шудааст. Дар сутуни 3-юм тангенсҳо, баъд котангенсҳо ва баъди он қиматҳои косинусҳо ҷойгир шудааст. Дар сутуни охирини 6-ум боз градусҳо; яъне 45° , 46° , 47° , ва ҳоказо дода шудааст то 89° (барои нигоҳ доштани) ин ҷой: барои функсияҳои тригонометрии пуркунанда мувофиқи формулаҳо: $\sin\alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$, $\cos\alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$ ва ҳоказо. Пас, $\sin 1^\circ = \cos 89^\circ$, $\sin 2^\circ = \cos 88^\circ$ ва ҳоказо. Бинобар ин дар таги сутуни «синусҳо», «косинусҳо» ва дар таги сутуни «тангенсҳо» (аз чап – 3) котангенсҳо навишта шудааст ва ба он монанд.

Ҳаминтавр, барои градуси кунҷҳои аз 1 то 45° дар тарафи чапи сутуни якум ва номҳои функсияҳои тригонометриро аз боло хондан мумкин. Барои градуси кунҷҳои аз 45 то 89 аз тарафи рост сутуни охири ва номҳои функсияҳои тригонометриро аз таги он хонда мешавад. Масалан, аз ҷадвал қимати тангенсҳо мехонем: $\text{tg}35^\circ = 0,7002$.

1. Аз рӯи кунҷи додашуда ёфтани функсияи тригонометрии он.

Масъалаи 1. $\sin 20^\circ$ -ро ёбед.

Ҳал. $1^\circ \leq 20^\circ \leq 45^\circ$ Барои буданаш аз устуни тарафи чап «градусҳо» навиштаи 20-ро мегирем ва сатри мувофиқи он (« $\sin\alpha$ »)–ро меёбем. Ана ҳамин адад қимати $\sin 20^\circ$. Пас, $\sin 20^\circ \approx 0,3420$.

Масъалаи 2. $\sin 75^\circ$ -ро ёбед.

Ҳал. Аз $45^\circ \leq 75^\circ \leq 89^\circ$ буданаш сутуни тарафи градусҳо навишта шуда, ҳонаи «градусҳо» навишта шуда 75° -ро мегирем аз сатри ба он мувофиқ аз стун (*пастии* « $\sin\alpha$ ») чорум қимати 0,9659-ро меёбем. Ана ҳамин адад, қимати адади 75° аст. Пас, $\sin 75^\circ \approx 0,9659$.

Масъалаи 3. $\cos 33^\circ$ -ро ёбед.

Ҳал. Аз байни $1^\circ \leq 33^\circ \leq 45^\circ$. Аз сутуни тарафи чап (ҳонаи градусҳо) адади 33-ро мегирем ва аз сатри мувофиқи сутуни чоруми (« $\cos\alpha$ ») қимати 0,8387-ро меёбем. Ана ҳамин адад қимати $\cos 33^\circ$ аст.

Пас, $\cos 33^\circ \approx 0,8387$.

Қимати тангенс ва котангенсҳо низ чун қиматҳои синус ва косинусҳо аз ҷадвал ёфта мешавад.

2. Ёфтани кунҷ аз рӯи функцияи тригонометрии он.

Масъалаи 4. Агар $\sin x = 0,9848$ бошад, кунҷи тези x -ро ёбед.

Ҳал. Барои ёфтани кунҷи синусаш $0,9848$ қимати функцияи тригонометриро аз сутуни якум ва чорум ин қиматро меёбем. Ин қимат дар сутуни чорум ($\sin \alpha$) аз 45° калон ва аз 89° хурд. Ба ин сатрҳо мувофиқ аз тарафи рост аз сутуни градусҳо 80 -ро меёбем. Пас, кунҷи мо ҳақиқатан ба 80° баробар мебошад.

Ҷавоб: $x \approx 80^\circ$.

Масъалаи 5. Агар $\operatorname{tg} x = 0,7002$ бошад, кунҷи тези x -ро ёбед.

Ҳал. Барои ёфтани кунҷи тези $0,7002$ сутуни дуюм ва сеюм дар тарафи чап будаи ин қиматро меёбем. Ин қимат дар сутуни дуюм ($\operatorname{tg} \alpha$) аст, яъне кунҷи мо ҳақиқатан аз 45° хурд. Ба ин сатр мувофиқ аз сутуни чапи «градусҳо» адади 35 -ро меёбем. Пас, кунҷи мо ҳақиқатан тақрибан ба 35° баробар аст.

Ҷавоб: $x \approx 35^\circ$.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. Аз ҷадвал истифода бурда ёбед:

- | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| а) 1) $\sin 3^\circ$; | 2) $\sin 21^\circ$; | 3) $\sin 50^\circ$; | 4) $\sin 82^\circ$; | 5) $\sin 40^\circ$; |
| б) 1) $\cos 9^\circ$; | 2) $\cos 12^\circ$; | 3) $\cos 41^\circ$; | 4) $\cos 67^\circ$; | 5) $\cos 4^\circ$; |
| в) 1) $\operatorname{tg} 5^\circ$; | 2) $\operatorname{tg} 89^\circ$; | 3) $\operatorname{tg} 15^\circ$; | 4) $\operatorname{tg} 60^\circ$; | 5) $\operatorname{tg} 50^\circ$; |
| г) 1) $\operatorname{ctg} 10^\circ$; | 2) $\operatorname{ctg} 30^\circ$; | 3) $\operatorname{ctg} 75^\circ$; | 4) $\operatorname{ctg} 52^\circ$; | 5) $\operatorname{ctg} 5^\circ$. |

2. Кунҷи тези x – ро аз ҷадвал истифода бурда ёбед

- | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| а) 1) $\sin x \approx 0,1392$; | 2) $\sin x \approx 0,8590$; | 3) $\sin x \approx 0,5150$; |
| б) 1) $\cos x \approx 0,7431$; | 2) $\cos x \approx 0,6428$; | 3) $\cos x \approx 0,0523$; |
| в) 1) $\operatorname{tg} x \approx 0,4663$; | 2) $\operatorname{tg} x \approx 11,430$; | 3) $\operatorname{tg} x \approx 0,1763$; |
| г) 1) $\operatorname{ctg} x \approx 0,9004$; | 2) $\operatorname{ctg} x \approx 1,192$; | 3) $\operatorname{ctg} x \approx 0,3640$. |

3. (*Кори амалӣ*). Бо ёрии транспортир секунҷаи росткунҷаи кунҷи тези 40° -ро ёбед. Тарафҳои онро чен кунед, инчунин синус, косинус, тангенс ва котангенс ҳамаи кунҷро ёбед.

4. Қимати ифодаро ёбед: $\operatorname{tg} 15^\circ \cdot \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{tg} 75^\circ$.

Ҳал. Аз формулаи $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$ ва $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$ истифода бурда қимати ифодаро меёбем (ба ҷойҳои ҳоли ҷавобҳои мувофиқро нависед).

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 15^\circ \cdot \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{tg} 75^\circ &= \operatorname{tg} 15^\circ \cdot \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - 30^\circ) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - 15^\circ) = \\ &= (\operatorname{tg} 15^\circ \cdot \operatorname{ctg} 15^\circ) \cdot (\operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ) = \dots \cdot \dots = \dots \end{aligned}$$

5. Исбот кунед: $\operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 2^\circ \cdot \dots \cdot \operatorname{tg} 88^\circ \cdot \operatorname{tg} 89^\circ = 1$.

6. Ифодаро содда кунед: 1) $\cos^2 \alpha + \cos^2(90^\circ - \alpha)$; 2) $\sin^2 \alpha - \cos^2(90^\circ - \alpha)$.


7. Аз ҷадвал истифода бурда, ёбед:

- 1) $\sin 70^\circ$; 2) $\cos 55^\circ$; 3) $\operatorname{tg} 10^\circ$; 4) $\operatorname{ctg} 18^\circ$.

8. Аз ҷадвал истифода бурда, кунҷи тези x -ро ёбед: $\sin x \approx 0,1392$.

25. ҲАЛЛИ СЕКУНЧАҶОИ РОСТКУНҶА

Ҳалли секунҷаҳо аз рӯи тарафҳои маълум ва кунҷҳои маълуми он ёфтани тарафҳои номаълум ва кунҷҳои номаълуми он мебошад. Секунҷаи росткунҷаро аз рӯи тараф ва кунҷи тезаш ё ки ду тарафаш ҳал кардан мумкин. Барои ҳалли секунҷаҳои росткунҷа аз ишораҳои (расми 1) истифода мебарем мувофиқи моҳияти масъала, қиматҳои функсияҳои тригонометриро аз ҳонаи даҳ ҳазорякӣ то ҳонаи воҳидҳо (илова охири китоби дарсӣ бошад) ё ки зарур бошад, аз ҳонаи ҳазорихо то ҳонаи воҳидҳо, дарозии тарафҳоро аз сад то воҳидҳо, ченаки градусии кунҷҳоро то воҳидҳо яклухт мекунем.



Аз рӯи ду элементи маълуми секунҷаи росткунҷа 4-то ҳолати онро дида мебароем.

Аз рӯи ду элементи маълуми секунҷаи росткунҷа 4-то ҳолати онро дида мебароем.

Ҳолати 1. Ҳалли секунҷа аз рӯи гипотенуза ва кунҷи тези он.

Масъалаи 1.

Суммаи кунҷҳои секунҷаи росткунҷа $c = 10$ см ва кунҷи тези $\alpha = 50^\circ$ дода шудааст. Катетҳои a ва b ва кунҷи тези β -ро ёбед.

Ҳал. 1) Суммаи кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа ба 90° баробар аст. Онгоҳ $\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.

Усули 1. 2) Катети муқобили кунҷи α ба ҳосили зарби гипотенуза ва синуси кунҷи α баробар аст, яъне $a = c \sin \alpha$.

Пас, $a = 10 \sin 50^\circ = 10 \cdot 0,7660 \approx 7,66$ (см).

3) Катети ба кунҷи α – часпида ба ҳосили зарби гипотенуза ва косинуси кунҷи α баробар аст, пас, $b = c \cos \alpha$.

Яъне, $b = 10 \cos 50^\circ = 10 \cdot 0,6428 \approx 6,43$ (см).

Усули 2. 2) $a = c \cos \beta$; $a = 10 \cos 40^\circ = 10 \cdot 0,7660 \approx 7,66$ (см).

3) $b = c \sin \beta$; $b = 10 \sin 40^\circ = 10 \cdot 0,6428 \approx 6,43$ (см).

Ҷавоб: $a \approx 7,66$ см; $b \approx 6,43$ см; $\beta = 40^\circ$.

Ҳолати 2. Ҳалли секунҷа аз рӯи катет ва кунҷи тези он.

Масъалаи 2. Агар дар секунҷаи росткунҷа катеташ $a = 6$ см ва кунҷи тезаш $\beta = 22^\circ$ бошад. Катети b -и гипотенузаи c ва кунҷи тези α -ро ёбед.

Ҳал. 1) Суммаи кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа ба 90° баробар бошад, онгоҳ $\alpha = 90^\circ - \beta = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$.

Усули 1. 2) Нисбати катети ба кунҷи тези β часпида, ба косинуси кунҷи β ба гипотенуза баробар аст, яъне $c = \frac{a}{\cos \beta}$.

Пас, $c = \frac{a}{\cos \beta} = \frac{6}{\cos 22^\circ} = \frac{6}{0,9272} \approx 6,47$ (см).

3) Мувофиқи таъриф $\operatorname{tg}\beta = \frac{b}{a}$. Аз ин $b = a \operatorname{tg}\beta$, яъне

$$b = 6 \operatorname{tg}22^\circ = 6 \cdot 0,4040 \approx 2,42 \text{ (см)}.$$

Усули 2. 2) Гипотенуза ба нисбати катети муқобили кунчи тез α ба синуси кунчи α баробар аст, яъне $c = \frac{a}{\sin\alpha}$.

Пас, $c = \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{6}{\sin 68^\circ} = \frac{6}{0,9272} \approx 6,47 \text{ (см)}.$

3) Мувофиқи тариф: $\operatorname{tg}\beta = \frac{b}{a}$. аз ин чо $b = a \operatorname{tg}\beta$, яъне

$$b = 6 \operatorname{tg}22^\circ = 6 \cdot 0,4040 \approx 2,42 \text{ (см)}.$$

Ҷавоб: $c \approx 6,47 \text{ см}$, $b \approx 2,42 \text{ см}$, $\alpha = 68^\circ$.



Савол масъала ва супоришҳо

1. Дарозии катети секунҷаи росткунҷа 7 см – a ба кунчи 60° часпида аст. Гипотенузаи ин секунҷаро ёбед.
2. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа ба 12 см яке аз катетҳояш бошад, ба $6\sqrt{2}$ см баробар аст. Кунчи тези ин секунҷаро ёбед.
3. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа $c=10$ см ва кунчи тезаш $\alpha=42^\circ$ дода шудааст. Катетҳои a ва b ва кунчи тези β -ро ёбед. Масъаларо бо ду усул (ба матни машки 1 ниг.) ҳал кунед.
4. Катети секунҷаи росткунҷа $b=4$ см ва кунчи тезаш $\beta=18^\circ$ дода шудааст. Катети b , гипотенузаи c ва кунчи тези α -ро ёбед. Бо ду усул ҳал кунед (ба масъалаи 2 ниг.)

5. Ифодаро содда кунед: $\frac{\cos^2\alpha}{(1+\sin\alpha)(1-\sin\alpha)} - \sin\alpha \cos(90^\circ - \alpha)$.

6. Кунчи назди асосҳои трапетсияи баробарпахлӯ ба 60° , тарафи пахлӯи ба асоси хурд баробар буда, ба $2\sqrt{2}$ см баробар аст. Асоси калони ин трапетсияро ёбед. Ба ҷойҳои холи ҷавоби мувофиқро гузоред.


Ҳал. $ABCD$ трапетсияи баробарпахлӯ,

$$\angle A = \angle D = 60^\circ, AB = DC = BC = 2\sqrt{2} \text{ см}.$$

$CP \parallel BA$ -ро мегузаронем (расми 2). Онгоҳ $\angle A = \angle CPD = 60^\circ$ ($CP \parallel BA$) инчунин кунчи бурандаи AD ҳосил карда ... аз кунҷҳои ... секунҷаи CPD , пас. ... тарафҳо. Ҳаминтавр, $CP = PD = \dots = 2\sqrt{2}$ см. Онгоҳ $AD = 2 \cdot 2\sqrt{2} = \dots$ (см).

Ҷавоб: $4\sqrt{2}$ см.


7. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа $c = 8$ см ва кунчи тезаш $\alpha = 30^\circ$ аст. Катетҳои a , b ва кунчи тези β -ро ёбед. Масъаларо бо ду усул (ба масъалаи 1 нигаред) ҳал кунед.



26. ҲАЛЛИ СЕКУНЧАИ РОСТКУНЧА (ДАВОМАШ)

Ҳолати 3. Ҳалли секунча аз рӯи гипотенуза ва катет.

Масъалаи 1. Дар секунчаи росткунча гипотенузаи $c=13$ см ва катети $a=5$ см дода шудааст. Катети b ва кунҷи тези α ва β -ро ёбед.



Ҳал. 1) Мувофиқи теоремаи Пифагор:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}.$$

Усули 1. 2) Мувофиқи таърифи синуси кунҷи тези

$$\alpha: \sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{5}{13} \approx 0,3846.$$

Аз инҳо $\alpha \approx 23^\circ$.

3) Суммаи кунҷҳои тези секунчаи росткунча ба 90° баробар аст. Дар ин ҳол:

$$\beta = 90^\circ - \alpha \approx 90^\circ - 23^\circ = 67^\circ.$$

Ҷавоб: $b=12$ см, $\alpha \approx 23^\circ$, $\beta \approx 67^\circ$.

Усули 2. 2) Мувофиқи таърифи синуси

кунҷи тези β :

$$\sin \beta = \frac{b}{c} = \frac{12}{13} \approx 0,9231.$$

Аз инҳо $\beta \approx 67^\circ$.

3) Суммаи кунҷҳои тези секунчаи росткунча ба 90° баробар аст, онгоҳ:

$$\alpha = 90^\circ - \beta \approx 90^\circ - 67^\circ = 23^\circ.$$

Ҷавоб: $b=12$ см, $\alpha \approx 23^\circ$, $\beta \approx 67^\circ$.

Ҳолати 4. Ҳалли секунча аз рӯи ду катет.

Масъалаи 2. Катетҳои секунчаи росткунча $a=8$ ва $b=15$ дода шудааст. Гипотенузаи c ва кунҷҳои тези α ва β -ро ёбед.

Ҳал. 1) Мувофиқи теоремаи Пифагор:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17 \text{ (см)}.$$

Усули 1. 2) Мувофиқи таърифи тангенс кунҷи тези α :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} = \frac{8}{15} \approx 0,5333.$$

Аз инҳо $\alpha \approx 28^\circ$.

3) Суммаи кунҷҳои тези секунчаи росткунча ба 90° баробар аст. Онгоҳ:

$$\beta = 90^\circ - \alpha \approx 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ.$$

Ҷавоб: $c=17$ см, $\alpha \approx 28^\circ$, $\beta \approx 62^\circ$.

Усули 2. 2) Мувофиқи таърифи тангенси кунчи тези β :

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{b}{a} = \frac{15}{8} = 1,875.$$

Аз инҳо $\beta \approx 62^\circ$.

3) Сумма кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа ба 90° баробар аст. Дар ин ҳол

$$\alpha = 90^\circ - \beta \approx 90^\circ - 62^\circ = 28^\circ.$$

Ҷавоб: $c=17$ см, $\alpha \approx 28^\circ$, $\beta \approx 62^\circ$.

Усули 3. 1) Мувофиқи таърифи котангенси кунчи тези α :

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{b}{a} = \frac{15}{8} = 1,875.$$

Аз инҳо $\alpha \approx 28^\circ$.

2) Суммаи кунҷҳои тези секунҷаи росткунҷа ба 90° баробар аст. Дар ин ҳол

$$\beta = 90^\circ - \alpha \approx 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ.$$

3) Мувофиқи теоремаи Пифагор:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17 \text{ (см)}.$$




Ҷавоб: $c=17$ см, $\alpha \approx 28^\circ$, $\beta \approx 62^\circ$.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C=90^\circ$, гипотенуза $c=9\sqrt{2}$ см, катет $a=9$ см. Катети b ва кунҷҳои тези α ва β – и секунҷаи дода шударо бо ду усул ёбед.
2. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C=90^\circ$, катетҳо $a=6\sqrt{3}$ см ва $b=6$ см. Гипотенузаи c ва кунҷҳои тези α ва β – и ин секунҷаро ёбед. Бо ду усул ҳал кунед.
3. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C=90^\circ$, катетҳояш $a=\sqrt{11}$ см ва $b=5$ см. Гипотенузаи c ва кунҷҳои тези α ва β – и ин секунҷаро ёбед. Бо ду усул ҳал кунед.
4. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C=90^\circ$) баландии CD –и ба гипотенуза фароварда шударо итбот кунед:
 - 1) $\frac{CD}{\sin A} = AB \cos A$; 2) $AD \operatorname{tg} A = BD \operatorname{tg} B$.
5. Ҳисоб кунед: $2\sin 60^\circ + 4\cos 60^\circ - \operatorname{ctg} 30^\circ - 2\operatorname{tg} 45^\circ$.
6. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C=90^\circ$ гипотенуза $c=25$ см, катет $b=24$ см. Катети a ва кунҷҳои тези α ва β – и секунҷаи росткунҷа ёфта шавад. Бо ду усул ҳал кунед.
7. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C=90^\circ$ катетҳояш $a=10$ см ва $b=24$ см. Гипотенузаи c ва кунҷҳои тези α ва β -и ин секунҷаро ёбед. Бо ду усул ҳал кунед.

27. СОХТАНИ СЕКУНЧАИ РОСТКУНҶА



Масъалаи 1. Синуси кунчи $\frac{4}{5}$ -ро созад. Барои он кунчи C -ро месозем. Ба яке аз тарафҳои аз қуллаи секунҷа сар карда порчаи CB -и ба 4-то масшоби ба як дигар баробарро мегузaronем (расми 1). Камони марказии дар нуктаи B ва радиусаш ба 5-то масштаб баробарро то буридани тарафи дуум месозем. Буриши онҳоро бо нуктаи A ишорат мекунем. Нуктаҳои A ва B -ро пайваст намуда, секунҷаи росткунҷаи ABC -ро ҳосил мекунем. A кунчи ба мо даркорӣ синуси он ба $\frac{4}{5}$ баробар аст, яъне $\sin A = \frac{4}{5}$ аст.

Масъалаи 2. Косинуси кунчи $\frac{5}{6}$ -ро созад. Барои он кунчи рости C -ро месозем ва ба яке аз тарафҳои он аз қуллаи кунҷ порчаи AC – и аз 5-то масшоби ба якдигар баробар мегузaronем (расми 2). Камони марказаш дар нуктаи A ва радиусаш ба 6 масштаб баробарро то буридани тарафи дуум давом медиҳем (месозем). Кунчи буриши онҳоро бо нуктаи B ишорат мекунем. Нуктаҳои A ва B – ро пайваст намуда, секунҷаи росткунҷаи ABC – ро ҳосил мекунем. A – кунчи ба мо даркорӣ косинуси он ба $\frac{5}{6}$ баробар аст, яъне $\cos A = \frac{5}{6}$.

Масъалаи 3. Тангенси кунчи $\frac{4}{5}$ -ро созад.

Барои он кунчи рости C -ро месозем ва дар яке аз тарафҳояш аз қуллаи кунҷ саркарда порчаи CA -и ба 5-то масшоби ба якдигар баробарро мегузaronем, ба дуумаш порчаи CB -и аз 4-масшоби ба якдигар баробар мегузaronем (расми 3). Нуктаи A ва B -ро пайваст намуда, секунҷаи росткунҷаи ABC ҳосил мекунем.

A – кунчи мо чувстучӯ карда, тангенси он ба $\frac{4}{5}$ баробар мешавад, яъне $\operatorname{tg} A = \frac{4}{5}$.

Сохтани кунҷ ба котангенси додашуда низ ҳаминтавр сохта мешавад. Фақат дар ин ҳолат барои кунҷи даркорӣ катети ба AC – часпидаро гирифтаи лозим аст.

Катети секунҷаи росткунҷа ҳам вақт аз гипотенуза хурд аст. Бинобар ин синус ва косинуси кунҷи тез доимо аз 1 хурд мешавад.

Муқоисаи дарозии катет ҳаминро нишон медиҳад, ки онҳо байни ҳам баробар, яке аз дигаре калон ё баробар шуданаш мумкин. Ҳаминтавр кунҷҳои тези тангенс ва котангенс, адади дилхоҳи мусбат шуданаш мумкин. Пас, ҳар яки онҳо ба катетҳо вобаста буда, ба 1 баробар аз 1 хурд ва аз 1 калон шуда метавонад.




Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Ба $\operatorname{tg}A = \frac{3}{5}$; 2) $\sin A = \frac{2}{3}$ баробар дода шудааст. Секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C = 90^\circ$)-ро созад.

2. Секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C = 90^\circ$)-и ба 1) $\sin A = \frac{5}{8}$; 2) $\cos A = \frac{3}{4}$ баробарро созад.

3. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC $\angle C = 90^\circ$, гипотенуза $c = 7\sqrt{2}$ см ва катети $b = 7$ см аст. Катети a ва кунҷи тези α ва β -и ин секунҷаро ёбед (расми 4).

4. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , $\angle C = 90^\circ$, гипотенуза $c = 12$ см, $\alpha = 60^\circ$. Катетҳои a ва b ва кунҷи тези β -ро ёбед (расми 4). Масъаларо бо ду роҳ ҳал кунед.





5. Дарозии номаълумро ёбед (расмҳои 5 – 6).

6. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC $\angle C = 90^\circ$, гипотенуза $c = 74$ см, $\sin \alpha = \frac{12}{37}$.

Периметри ҳамин секунҷаро ёбед (расми 4).

7. 1) $\sin A = \frac{4}{7}$ 2) $\cos A = \frac{3}{5}$ 3) $\operatorname{tg}A = \frac{2}{5}$ дода шудааст. Секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C = 90^\circ$)-ро созад.



28. МАШҚИ АМАЛҲИ ВА ТАТБИҚ

1. Масъалаҳо доир ба татбиқи амалии теоремаи Пифагор.

Масъалаи 1. Гули нилуфар аз сатҳи об 10 см дар боло намоён мешавад. Агар гулро аз ҳолати аввалаш 1 м ғечонем ба сатҳи об мерасад. Чуқурии кӯлро дар ҳамин нуқта ёбед.

Ҳал. Чуқурии CD -и кӯлро бо x – ишорат мекунем (расми 1), онгоҳ ба $BD = AD = AC + CD = 0,1 + CD = 0,1 + x$ (м) баробар мешавад. Дар он мувофиқи теоремаи Пифагор ба секунҷаи BCD соҳиб мешавем:

$$BD^2 - CD^2 = BC^2, \quad (0,1 + x)^2 - x^2 = 1,$$




аз ин ҷо:

$$0,01 + 0,2x + x^2 - x^2 = 1;$$

$$0,2x = 0,99; \quad x = 0,99 : 0,2;$$

$$x = 9,9 : 2; \quad x = 4,95 \text{ (м)}.$$

Ҷавоб: чуқурии кӯл 4,95 м.




Масъалаи 2. Баландии як дарахт 20 м, дуюмаш бошад, 9 м. Масофаи байни ин дарахтҳо 60 м-ро ташкил медиҳад. Масофаи байни қуллаҳои ин ду дарахтро ёбед (расми 2) мустақил ҳал кунед.

Масъалаи 3. Баландии ду дарахти сафедор мувофиқан 21 м ва 28 м, масофаи байни ин дарахтҳо бошад, 24 м-ро ташкил мекунад. Масофаи байни қуллаҳои ду дарахтро ёбед (ба расми 2 ниг.). Мустақил ҳал кунед.

2. Масъала доир ба татбиқи амалии синуси кунҷи тез.

Бо ёрии кунҷҳои нисбат ба горизонт роҳҳои ҳамворро бо роҳҳои баланд (моил) тадбир додан мумкин (расми 3). Дар бисёр мавридҳои нисбат аз баланд бардоштани кунҷи бардошташуда баланд бардоштани нуқтаи баланди кунҷи роҳи тайшуда қулай аст. Масалан, ҳангоми 100 м масофаро тай намудан 2 м ба баландӣ бардошта шуда бошад, дар ин ҳолат рост бардошта шудани ҷой нисбати баландӣ ба роҳи тайшуда



муайян карда мешавад. Бардошташавии баландӣ ба $\frac{2\text{ м}}{100\text{ м}}$ 0,02 баробар аст. Ин нисбат ба роҳи тай шуда вобаста нест. Барои фаромадан аз роҳи нишеб ҳаминтавр мулоҳиза кардан мумкин.

Масъалаи 4. Машинаи сабукрав аз роҳи нишеб таҳти кунҷи 15° рӯ ба боло бардошта шуда истодааст (ниг. ба расми 3). Он аз нуқтаи бардошта шуда 300 м роҳ тай намуда, нисбат ба горизонтӣ чанд метр ба баландӣ мешавад?

Нишондод. Таърифи синуси кунҷи тезро татбиқ намуда, нуқтаи бардошташавиро ёбед.

2. Масъала доир ба татбиқи амалии тангенсӣ кунҷи тез.

Масъалаи 5. Самолёт аз роҳрави мепаридааш аз нуқтаи ба ҳаво бардошташавӣ 700 м дар ҷангалзор воқеъ буда, баландии дарахтҳо тахминан ба 24 м баробар. Барои ба ин дарахтҳо самолёт нарасида парвоз намуданаш дар кадом таҳти кунҷ бардошта шуданаш лозим.

Ҳал. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C=90^\circ$) дар секунҷа $AC=700$ м, $BC=24$ м (расми 4). Аз таърифи тангенсӣ кунҷи тез меёбем:


$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{24}{700} \approx 0,0343 \Rightarrow \alpha \approx 2^\circ$$



Ҷавоб: Самолёт барои ба дарахтҳо нарасида парвоз намудан нуқтаи бардошташавии он аз 2° кам нашуданаш лозим.

Масъалаи 6. Масофаи аз нуқтаи A дарё ва дар паси он нуқтаи B ки дар он рафтани имконпазир аст ёбед (расми 5).

Ҳал. Устурлоб (астролабия; асбобест, ки барои чен кардани кунҷҳои дар ҳамвори горизонтал буда истифода мешавад, яъне ченкунандаи кунҷҳо) ё ки бо ёрии эккер дар нуқтаи A кунҷи рости BAC -ро месозем. Дар хати рости AC , нуқтаи ихтиёрии D гирифта, бо ёрии устурлоб кунҷи ADB -ро чен мекунем. Гӯем, он ба 44° баробар бошад. Баъд масофаи AD -ро чен мекунем, он 120 м бошад масофаи AB -ро аз кунҷи тези тангенсҳо меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{AB}{120} &= \operatorname{tg}44^\circ \Rightarrow AB = 120 \cdot \operatorname{tg}44^\circ \approx \\ &\approx 120 \cdot 0,9657 \approx 116 \text{ (м)}. \end{aligned} \quad \text{Ҷавоб: } \approx 116 \text{ м.}$$





Масъалаи 7. Масофаи ҷазираи аз нуктаи A то нуктаи B -и рафтаниш мушкил бударо ёбед (расми 6).

Нишондод. Бо масалаи 5 монанд муҳокима намуда, $\angle ADB = 48^\circ$ ва $AD = 200$ м гуфта, масъаларо ҳал кунед.

Масъалаи 8. Объекти ба асосаш рафтан мушкил масалан чен кардани баландии электргузаронанда талаб карда бошад (расми 7).

Ҳал. Секунҷаи росткунҷаи ACD -ро дида мебароем. Қуллаи A -и ин секунҷаро бо ёрии устурлоб чен мекунем он ба 42° баробар бошад.

Дар секунҷаи рости BCA кунҷи DBC -ро чен мекунем, он ба 47° баробар бошад.

Мувофиқи таърифи тангенс кунҷи тез аз ACD меёбем:

$$\frac{CD}{AC} = \operatorname{tg}42^\circ \Rightarrow AC = \frac{CD}{\operatorname{tg}42^\circ}. \quad (1)$$

Мувофиқи таърифи тангенс кунҷи тез аз BCD меёбем:

$$\frac{CD}{BC} = \operatorname{tg}47^\circ \Rightarrow BC = \frac{CD}{\operatorname{tg}47^\circ}. \quad (2)$$

Нуктаҳои A, B ва C дар як хати рост мебошад. Аз (1) (2)-ро тарҳ мекунем:

$$\begin{aligned} AC - BC &= \frac{CD}{\operatorname{tg}42^\circ} - \frac{CD}{\operatorname{tg}47^\circ} \Rightarrow AC - BC = CD \left(\frac{1}{\operatorname{tg}42^\circ} - \frac{1}{\operatorname{tg}47^\circ} \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow AC - BC &= CD \left(\frac{1}{0,9004} - \frac{1}{1,0724} \right) \Rightarrow AC - BC = CD(1,1106 - 0,9325) \Rightarrow \\ \Rightarrow AC - BC &= CD \cdot 0,1781 \Rightarrow CD = \frac{AC - BC}{0,1781}. \end{aligned}$$

$AC - BC$ яъне, масофаи AB -ро бевосита чен карданамон мумкин, гӯем, он ба 12 м баробар бошад.

$$\text{Онгоҳ } CD = \frac{AC - BC}{0,1781} = \frac{AB}{0,1781} = \frac{12}{0,1781} \approx 67,4 \text{ (м)}.$$

Ҷавоб: $\approx 67,4$ м.

Масъалаҳои ба масъалаҳои ҳозираи дар агрофамон мавҷуд будаи ба он монандро гирифта ҳал намоед.

1. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа ба 20 см синуси яке аз кунҷҳои тезаш ба 0,5 баробар. Катетҳои секунҷаро ёбед.
2. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа ба 13 см яке аз косинуси кунҷи тезаш ба $\frac{5}{13}$ баробар. Катетҳои секунҷаро ёбед.
3. Ифодаро содда кунед: $(\sin^2\alpha - \cos^2\alpha)^2 + 2 \sin\alpha \cos\alpha$.
4. Секунҷаи баландии тарафҳояш 1) $a = c = 17$ см, $b = 16$ см; 2) $a = 30$ см, $b = 34$ см, $c = 16$ см бударо ёбед.

ТЕСТИ 2

Худро санҷида бинед!

1. Яке аз катетҳои секунҷаи росткунҷаи 12 см, гипотенузааш бошад, аз катети дуюм 6 см дароз. Дарозии гипотенузаро ёбед.
А) 15 см; В) 25 см; Д) 26 см; Е) 18 см.
2. Яке аз катетҳои секунҷаи росткунҷа 12 см, дуомаш аз гипотенуза 8 см кӯтоҳ. Гипотенузаи ҳамин секунҷаро ёбед.
А) 15 см; В) 16 см; Д) 13 см; Е) 25 см.
3. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа 25 см, катетҳояш байни худ ба нисбати 3 : 4. Катети хурди ин секунҷаро ёбед.
А) 10 см; В) 15 см; Д) 9 см; Е) 20 см.
4. Аз ҳама баландии хурди секунҷаи тарафҳояш 13 см, 14 см ва 15 см буда чанд сантиметр аст.
А) 11,5 см; В) 11,1 см; Д) 11 см; Е) 11,2 см.
5. Диагоналҳои ромб ба 14 см ва 48 см баробар. Периметри ҳамин ромбро ёбед.
А) 60 см; В) 100 см; Д) 80 см; Е) 120 см.
6. Периметри ромб 68 см, яке аз диагоналҳояш ба 30 см баробар. Диагонали дуюми ромбро ёбед.
А) 12 см; В) 8 см; Д) 16 см; Е) 20 см.
7. Яке аз катетҳои секунҷаи росткунҷа ба $5\sqrt{3}$ баробар. Кунҷи муқобили он бошад, ба 60° баробар. Гипотенузаи секунҷаро ёбед.
А) $5\sqrt{3}$ см; В) $2\sqrt{15}$ см; Д) 5 см; Е) 10 см.
8. Яке аз катетҳои секунҷаи росткунҷа $5\sqrt{3}$ см, кунҷи ба он часпида бошад, ба 30° баробар. Катети дуюми ҳамин секунҷаро ёбед.
А) $5\sqrt{3}$ см; В) $2\sqrt{15}$ см; Д) 5 см; Е) 10 см.
9. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа ABC ($\angle C = 90^\circ$) ба 17 см, катетҳояш бошад, ба 15 см ва 8 см баробар аст. Синуси кунҷи А – ро ёбед.
А) $\frac{8}{15}$; В) $\frac{8}{17}$; Д) $\frac{17}{15}$; Е) $\frac{15}{17}$.

10. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа ABC ($\angle C=90^\circ$) ба 37 см, катетҳояш ба 12 см ва 35 см баробар аст. Косинуси кунҷи B -ро ёбед.

- A) $\frac{12}{37}$; B) $\frac{35}{37}$; D) $\frac{12}{35}$; E) $\frac{35}{12}$.



Забони англисиро меомӯзем!

Теоремаи Пифагор – Pythagorean theorem
Теоремаи чаппа – inverse function theorem
Тригонометрия – trigonometry
Гипотенуза – hypotenuse

Синус – sine
Косинус – cosine
Тангенс – tangent
Котангенс – cotangent




Маълумотҳои таърихӣ




Пифагор
 (пеш аз милод, солҳои 570–500 у.).

Математик ва файласуфи юнони қадим **Пифагор** дар нимаи дуҷуми асри VI пеш аз милод (солҳои 570 – 500 пеш аз милод) дар ҷазираи самоси баҳра Эгей таваллуд шудааст ва дар Тарейт вафот кардааст. Пифагор тахминан дар (соли 530 пеш аз милод) ба ҷануби Италия шаҳри Кротон, ки мустамликаи Юнониҳо буд, кӯчида меояд ва дар ҳаминҷо бо мактаби худ асос мегузорад. Мо доир ба геометрия ба натиҷаҳои санҷиши корҳои геометрии Пифагор дар асарҳои математикони баъд гузаштаи юнониҳо мебинем. Корҳои дар соҳаи геометрия кардаи Пифагор то ба мо омада нарасидааст.

Пифагор бори аввал ададҳоро бо чуфт ва тоқ, сода ва мураккаб ҷудо кардааст. Дар мактаби он «Ададҳои Пифагор» ададҳои сегонаи натуралии Пифагор пурра омӯхта шудааст. Асоси бисёр ҳисобкуниҳои геометрӣ теоремаи Пифагор ташкил медиҳад. Дар рӯзҳои ҳозира аз сад зиёд исботи теоремаҳои Пифагор мавҷуд аст. Баъзеи онҳо квадратро ба қисмҳои ҷудо намудан асоснок карда шуда аз он қисмҳои квадрат, ин ба катетҳои сохта шудааст, бо гипотенуза квадрат сохта шудааст – бо шаклҳои баробар асоснок намудаанд; сеюмаш бошад, аз баландии аз қуллаи кунҷи рост гузаронида шуда секунҷаро ба ду секунҷаи монанд тақсим намудан асос гузоштааст. Дар Бобули қадим тараф ва асоси секунҷаи баробарпахлӯ аз рӯи дарозӣ баландии онро ёфтаанд. Аз рӯи баъзе манбаҳо, дар мактаби Пифагор шаклҳои ҳати ростро ба шаклҳои баробар ҷудо намуданро аз усулҳои геометрӣ теоремаҳоро исбот намудан ва ҳалли масъалаҳои истифода бурдаанд. Чунки геометрикӣ иваз кардани масалаи шаклҳои ҳати рост аз корҳои амалӣ омада баромадааст.



БОБИ III УСУЛИ КООРДИНАТАҲО. ВЕКТОРҲО



§ 7.

СИСТЕМАИ КООРДИНАТАҲО ДАР ҲАМВОРӢ

31. КООРДИНАТҲОИ НУҚТА ДАР ҲАМВОРӢ. КООРДИНАТҲОИ МИЁНАҶОИ ПОРЧА



1. Координатҳои нукта дар ҳамворӣ. Дар ҳамворӣ хатҳои ростии бо ҳам перпендикулярӣ ба x ва y мегузаронем, нуқтаи буриши онҳоро бо ҳарфи O ишорат мекунем. Равиши тири Ox «аз чап ба рост», равиши тири Oy аз «паст ба боло» мешавад (расми 1). Дар ин ҳолат дар ҳамвории xOy системаи координатии росткунҷаро муайян карда шудааст мегӯянд. Ин системаро дар фан олими Франсуз **Рене Декарт** дохил кардааст бинобарин онро **системаи координатии Декартӣ** ҳам меноманд. Тири Ox тири **абсиссаҳо** (ё ки тири x), тири Oy бошад, **тири ординатаҳо** (ё ки тири y) мегӯянд. Тири абсиссаҳо горизонталӣ ординатаҳо бошад, вертикалинад.

Ҳамворие, ки дар системаи Декартӣ воқеъ аст **ҳамвории координатӣ** меноманд.

Бигзор A нуқтаи дилхоҳи ҳамворӣ бошад. Аз нуқтаи A ба тирҳои Ox ва Oy параллел хатҳои рост мегузаронем. Онҳо мувофиқан ба тирҳои Ox ва Oy дар нуқтаҳои дарозии порчаи A_x ва A_y мебуранд, гӯем (ниг ба расми 1). AA_x ва дарозии порчаи AA_y бошад, x **абсиссаи** нуқтаи A адади y **ординатаи** нуқтаи A гӯем.

Ҷуфти ададҳои x ва y **координатаи** нуқтаи A номида мешавад ва бо $A(x; y)$ ишорат карда мешавад. Барои ифода кардани координатаҳо аввал абсисса, баъд ординатаҳо навишта мешавад.

Ҳаминтавр: 1) дар ҳамвории координатӣ ба ҳар як нуқтаи A ҷуфти ададҳои $(x; y)$ мувофиқ меояд. 2) ҷуфти дилхоҳи $(x; y)$ – ро дар ҳамвории координатӣ, координатаи ягон нуқтаи A гуфтан мумкин. 3) агар $x \neq y$ бошад, онгоҳ ҷуфти $(x; y)$ ва $(y; x)$ дар ҳамворӣ нуқтаҳои гуногунро ифода мекунанд. Сари координатаҳо – нуқтаи координатаи O аз $O(0;0)$ иборат аст.




Координаташ нуқтаи B -и ихтиёри дар тири Ox буда $B(x; 0)$, координатаи нуқтаи C -и ихтиёри дар тири Oy буда дар координатаи $C(0; y)$ мешавад.

Тирҳои Ox ва Oy ҳамвориро ба чор тақсим мекунад, онҳоро **чорякҳои координатаҳо** ё ки **кунҷҳои координатаҳо** меноманд. Чорякҳои координатаҳо бо рақамҳои римӣ ифода карда мешавад. Ҳамчунин бо самти ақрабаки соат муқобил номеронида мешавад. Аломатҳои ишора намудани координатаҳои нуқтаро дар ҳамворӣ дар расми 2 нишон дода шудааст. Шаклҳои геометрӣ ва хосиятҳои онҳоро дар координатаҳо татбиқ намуда, онро дида мебароем.

2. Координатаҳои миёнаҳои порча.

Теорема.

Координатаҳои миёнаҳои порчаҳо ро бо формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ дар ин ҷо $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ қуллаҳои порча, $C(x; y)$ миёнаҳои порча.



Исбот: Координатаҳои x ва y -и нуқтаи C -ро меёбем. Бигзор порчаи AB тири Ox -ро набурад, яъне $x_1 < x_2$ -ро дида мебароем (расми 3). Дар тири Ox перпендикулярҳои AA_1 , BB_1 ва CC_1 -ро мегузаронем. $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$ – асоси перпендикулярҳо нуқтаи $A_1(x_1; 0)$, $B_1(x_2; 0)$ ва $C_1(x; 0)$. Нуқтаҳои ба координатаҳо соҳиб аст. Азбаски нуқтаи C миёнаҳои порчаи AB мебошад. Мувофиқи теоремаи Фалес нуқтаи C_1 , миёнаҳои порчаи A_1B_1 мебошад ва $A_1C_1 = C_1B_1$, яъне $x_2 - x = x - x_1$, аз ин ҷо чунин

формуларо меёбем: $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$.

$x_1 = x_2$, агар порчаи AB ба тири Oy параллел бошад сенуқта A_1 , B_1 ва C_1 ба як хел абсиса соҳиб мешавад, пас, формула дар ин ҳолат ҳам ҷой дорад.

Дар ҳолати $x_1 > x_2$ низ ҳам ба натиҷаи болоӣ соҳиб мешавем (инро мустақилона санҷед). Ординатаи нуқтаи C ҳам мисли болоӣ ёфта мешавад. Бо воистаи нуқтаҳои A , B ва C ба тири Oy хатҳои ростии перпендикуляр гузаронида мешавад. Формулаи зерин ҳосил

мешавад: $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$.

Масъала. Параллелограмм будани чоркунҷаи қуллааш дар нуқтаҳои $A(-2; 1)$, $B(0; 4)$, $C(4; 1)$ ва $D(2; -2)$ бударо исбот кунед.

Ҳал: Мувофиқи аломати параллелограмм диагоналҳои чоркунҷа дар нуқтаи буриш ба ду қисми баробар тақсим шаванд параллелограмм будани ин чоркунҷа маълум. Координатаҳои диагоналҳои

миёнаҳои AC ва BD -и чоркунҷаи $ABCD$ дода шударо меёбем. Миёнаҳои порчаи AC ба координатаҳои зерин соҳиб аст:

$$x = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad y = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Миёнаҳои порчаи BD ба координатаҳои зерин соҳиб аст:

$$x = \frac{0+2}{2} = 1, \quad y = \frac{4+(-2)}{2} = 1.$$

Ҳаминтавр координатаҳои нуқтаи диагоналҳои AC ва BD (1;1) будааст. Пас, мувофиқи аломатҳои параллелограмм чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм аст. Ибтидои ин талаб карда нашуда буд.

Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Тири координатаҳо ва нуқтаи буриши онҳо чӣ ном дорад?
- 2) Ҳамвории координатӣ чист? Координатаҳои нуқта дар ҳамворӣ гуфта чиро мефаҳмед?
2. Аз нуқтаи A (4; -5) ба тири координатаҳо перпендикуляр гузаронида шудааст. Координатаҳои асосии ин перпендикулярро ёбед.
3. 1) $x = -4, y = -6$; 2) $x = -3, y = 5$; 3) $x > 0, y < 0$; 4) $x > 0, y > 0$ бошад, нуқтаи A (x, y) дар кадом чоряк меҳобад. Муайян кунед.
4. Агар, 1) $A(-12; -3), B(-8; 1)$; 2) $A(4; -11), B(-4; 0)$ бошад, координатаҳои миёнаҳои порчаи AB – ро ёбед.
5. Нуқтаи C – миёнаҳои порчаи AB . Агар: 1) $A(2; -3), C(0,5; 1)$ бошад, координатаҳои нуқтаи B – ро ёбед.
6. Нуқтаи $A(-4; 0), B(-2; -2), C(0; -6)$ ва $D(-2; -4)$ дода шудааст. Ибтидои кунед, ки $ABCD$ параллелограмм аст.
7. Агар 1) $A(-6; 2), B(4; 4)$; 2) $A(-8; -4), B(-1; 3)$ бошад, координатаҳои миёнаҳои порчаи AB -ро ёбед.
8. Нуқтаи C – миёнаҳои порчаи AB , нуқтаи D бошад, миёнаҳои порчаи BC . Агар 1) 1) $A(-3; 3), B(5; -1)$; 2) $A(-2; -1), C(2; 3)$ бошад, координатаҳои нуқтаи D -ро ёбед.

Доништан Ҷоиданок аст!

Дарозӣ ва васеъгии нуқтаи географиро **координатаҳои географӣ** меноманд. Ҳар як нуқтаи сатҳи замин ду микдор – дарозии географӣ ва васеъгии он мувофиқ гузошта мешавад ва баръакс, ду микдор – барои дарозӣ ва васеъгии географӣ нуқтаи муайян ёфт мешавад. Дар он меридиан ва паралел вазифаи ордината ва абсисаи системаи координатаи росткунҷаро иҷро мекунад.



Масалан, Шаҳри Тошканд ($\approx 69^\circ$) бо дарозии шарқӣ 069,20 ва ($\approx 41^\circ$) бо васеъгии шимолӣ 041,26 шаҳри Самарқанд бошад, 066,93 бо дарозии шарқӣ ($\approx 67^\circ$) ва 039,65 бо васеъгии шимолӣ ($\approx 40^\circ$) ҷой гирифтааст.


32–33. МАСОФАИ БАЙНИ ДУ НУҚТА. МУОДИЛАИ ДАВРА

1. Масофаи байни ду нуқта.

Теорема.

Масофаи байни нуқтаҳои $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



Исбот. Аввал ҳолати $x_1 \neq x_2$ ва $y_1 \neq y_2$ – ро дида мебароем. Бо воситаи нуқтаҳои A ва B ба тире координатаҳо перпендикуляр мегузаронем ва нуқтаи буриши онҳоро бо C ишорат мекунем (расми 1). Масофаи байни нуқтаҳои A ва C ба $|x_2 - x_1|$ ва масофаи байни нуқтаҳои B ва C бошад ба баробар аст. Ба секунҷаи росткунҷаи ABC теоремаи Пифагорро татбиқ намуда меёбем:

$$AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \quad \text{ё ки} \quad AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (1)$$

Формулаи масофаи байни нуқтаҳои $x_1 \neq x_2$ ва $y_1 \neq y_2$ барои ҳолат дида, бароем, он барои дигар ҳолат низ қувваи худро нигоҳ медорад. Дар ҳақиқат, $x_2 = x_1$ ва $y_1 \neq y_2$ бошад, формулаи $AB = |y_2 - y_1|$ (1) низ ҳамин натиҷаро медиҳад. Ҳолати $x_1 \neq x_2$ ва $y_1 = y_2$ ҳам ба ҳамин монанд дида мешавад. Дар ҳолати A ва B нуқтаҳои A ва B болои ҳам мехобад ва формулаи (1) нуқтаи $AB = 0$ медиҳад.

Масъала-1. Агар куллаҳои чоркунҷаи $ABCD$ дар нуқтаи $A(-2; 1)$, $B(0; 4)$, $C(4; 1)$ ва $D(2; -2)$ бошад, параллелограмм будани онро исбот кунед.

Ҳал. Мувофиқи аломати 2-юми параллелограмм, агар тарафҳои муқобилхобидаи чоркунҷа байни худ баробар бошад, ин чоркунҷа параллелограмм буданаш маълум. Дарозии тарафҳои чоркунҷаи $ABCD$ -ро меёбем:

$$AB = \sqrt{(0 - (-2))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{13}; \quad BC = \sqrt{(4 - 0)^2 + (1 - 4)^2} = \sqrt{25} = 5;$$

$$CD = \sqrt{(2 - 4)^2 + (-2 - 1)^2} = \sqrt{13}; \quad AD = \sqrt{(2 - (-2))^2 + (-2 - 1)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Ҳаминтавр, $AB = CD$ ва $BC = AD$, яъне аз рӯи аломати параллелограмм чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм аст.

2. Муодилаи шакл дар ҳамворӣ. Муодилаи шакл дар системаи координатии Декартӣ гуфта, муодилаи ду номаълуми x , y -ро меноманд, ки он ҳар гуна координатаҳои нуқтаҳои шаклро қаноат мекунад. Баръакс, ду адади дилхоҳи муодиларо қаноат кунонида, координатаҳои дуҷум нуқтаи шакл шуда метавонад.

3. Муодилаи давра.

Теорема.

Дар системаи координатии росткунҷа муодилаи давраи марказаш дар нуқтаи $C(a; b)$ радиусаш R ба намуди зерин соҳиб аст:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Исбот: Бигзор дар системаи координатии росткунҷа марказаш дар нуқтаи $C(a; b)$ дода шуда бошад R ($R > 0$) (расми 2). Ба давра нуқтаи дилхоҳи $A(x; y)$ мегирем. Мувофиқи таърифи давра, масофа аз маркази давра то нуқтаи дилхоҳи он ба R баробар, яъне $CA = R$ пас $CA^2 = R^2$ аст. Ин муодиларо ба намуди координатаҳо навишта муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \quad (2)$$

Дар ин ҷо A – нуқтаи дилхоҳи давра. Бинобар ин муодилаи (2) – ро координатаҳои нуқтаҳои дилхоҳи давра қаноат мекунонад.

Баръакс, ҳар гуна нуқтаҳои A , ки координатаҳояш муодилаи (2) – ро қаноат мекунонад ба давра тааллуқ дорад, чунки аз он масофа то нуқтаи C ба R баробар аст. Аз ин ҷо баробарии (2) муодилаи давраи марказаш нуқтаи C ва радиусаш R буданаш бармеояд. Ҳаминтавр ду шарти таърифи шакл иҷро гардид. Теорема исбот шуд.

Натиҷа. Муодилаи давраи марказаш дар ибтидои координатаҳо ва радиусаш R ба намуди зерин соҳиб аст:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$


Масъала 2. Радиус ва координатаҳои маркази муодилаи $x^2 - 4x + y^2 + 2y - 11 = 0$ – ро муайян кунед.

Ҳал. Муодилаи дода шударо ба намуди $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ меоварем. $x^2 - 4x$ – ро ба намуди $(x - 2)^2 - 4$ бошад? $y^2 + 2y$ – ро ба намуди $(y + 1)^2 - 1$ ифода мекунем. Ин ифодаҳоро ба муодилаи додашуда гузошта? ҳосил мекунем.

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 - 11 = 0 \quad \text{ё ки} \quad (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4^2.$$

Ин муодила, муодилаи марказаш дар нуқтаи $C(2; -1)$ ва радиусаш 4-ро медиҳад.

Ҷавоб: $(2; -1)$, $R = 4$.






Савол, масъала ва супоришҳо.

1. 1) Масофаи байни нуқтаҳо бо ёрии координатаҳо чӣ ҳел ифода карда мешавад?
2) Муодилаи шакл дар системаи координатии Декартӣ чист? Муодилаи давра дар ҳамвори координатаҳо дар кадом намуд дода мешавад?
2. Агар: 1) $A(-3; 8)$, $B(5; 2)$; 2) $A(8; -1)$, $B(-7; 7)$; 3) $A(5; 0)$, $B(0; -12)$ бошад, дарозии порчаи AB -ро ёбед.
3. Агар масофаи байни нуқтаҳои: 1) $A(2; 1)$ ва $B(x; -2)$ ба 5; 2) $A(x; 0)$ ва $B(2; -1)$ ба 1 баробар бошад, x -ро ёбед.
4. Агар: $A(-1; 2)$, $B(2; 6)$ ва $C(5; 2)$ бошад, периметри секунҷаи ABC -ро ёбед.
5. Агар: 1) $C(7; 11)$, $R=5$; 2) $C(-2; 3)$, $R=1$ бошад, муодилаи давраи марказаш дар нуқтаи C ва радиусаш R -ро тартиб диҳед.
6. Радиус ва координатаҳои маркази муодилаҳои давраи зеринро муайян кунед. 1) $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 7^2$; 2) $(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 4$.
7. Радиус ва координатаҳои маркази муодилаи 1) $x^2 - 6x + y^2 + 2y - 6 = 0$; 2) $x^2 + y^2 + 10y + 24 = 0$ -ро ёбед.
8. Агар қуллаҳои секунҷа: 1) $A(0; 0)$, $B(0; 2)$ ва $C(2; 0)$; 2) $(1; 0)$, $B(2; \sqrt{3})$ ва $C(8; 0)$, намуди секунҷаи ABC -ро муайян кунед.
9. Агар: 1) $C(9; 4)$, $R=7$; 2) $C(-3; -4)$, $R=2$ бошад, муодилаи давраи марказаш дар нуқтаи C ва радиусаш R -ро тартиб диҳед.
10. Радиус ва координатаҳои маркази муодилаи давраро ёбед:
1) $(x - 7)^2 + (y + 2)^2 = 25$; 2) $(x - 4)^2 + y^2 = 1$.
11. Дар давраи ба муодилаи $x^2 + y^2 = 100$ 1) абсисааш ба 8, 2) ординатааш бо -6 баробар буда, нуқтаҳоро ёбед.

Доништан Ҷонданок аст!

Шахмат (ба забони форсӣ шоҳмот – шоҳ мағлуб шуд) намуди варзиш (спорт) буда, мақсади бозӣ мот намудани шоҳи рақиб мебошад. Бо ду ранг (сафед ва сиёҳ) бо тахтаи 64-то катакҷадор бо 16 донаи духел рангдор (яктоаш шоҳ ва фарзин, 2-тоаш рух, фил ва асп, 8 тоаш пиёда) бозӣ мекунанд.

Дар қайдномаи партияи шахмат шумо гашти донаҳои шахмат аз тарафи бозингаронро дар давоми бозӣ бевосита дида метавонед. Масалан, навишти асп в1 – с3 ҳаракати аспро аз катаки в1 ба с3 мефаҳмонад. Ҳамаи инҳо системаи координатии тахтаи шахмат мебошад.



34. МУОДИЛАИ ХАТИ РОСТ: УСУЛИ КООРДИНАТАҲОИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРИ

1. Муодилаи хати рост.


Теорема.

Муодилаи хати рост дар системаи координатаҳои росткунҷа ба намуди зерин соҳиб аст:

$$ax + by + c = 0, \quad (1)$$

дар ин ҷо a , b , c – ададҳои дилхоҳ, яке аз ададҳои a ва b ғайринулист.

Исбот: Бигзор хати рости l дар системаи координатии росткунҷа хати рости дилхоҳ бошад. Ягон перпендикуляр ба хати рости l мегузаронем ва аз нуқтаи буриши онҳо C сар карда, порчаҳои баробари CA ва CB -ро мегузаронем (расми 1). Бигзор x_1 , y_1 – координатаи нуқтаи A ва x_2 , y_2 – координатаи нуқтаи B бошад. Перпендикуляри миёнаи l дар нуқтаи хати рости хобидан $D(x; y)$, ки аз нуқтаи A ва B баробар дур шуда, яъне $DA = DB$, аз ин ҷо $DA^2 = DB^2$.



Ин баробариро бо координатаҳо навишта, ба муодилаи зерин соҳиб мешавем: $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2$. (2)

Баъд аз ба квадрат бардоштани ифодаҳои дохили қавс ва ислоҳ намудани аъзоҳои монанд муодилаи (2) ба намуди зерин меояд:

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y + (x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2) = 0. \quad (3)$$

x_1 , y_1 , x_2 , y_2 – ададҳои дилхоҳ, аз ҳамин $2(x_2 - x_1) = a$, $2(y_2 - y_1) = b$ ва $x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2 = c$ ишорат намуда, онҳоро ба муодилаи (3) гузошта: муодилаи $ax + by + c = 0$ -ро ҳосил мекунем, дар ин a , b ва c – ягон ададҳо аст.

D – l нуқтаи дилхоҳи хати рост, барои ҳамин координатаи нуқтаи дилхлҳи хати рост муодилаи додашуда (1) қаноат мекунонад. Бигзор ягон координатаҳои D_0 нуқтаи x_0 ва y_0 муодилаи (1)-ро қаноат кунонад, онгоҳ $D_0A = D_0B$, яъне нуқтаи D_0 аз нуқтаҳои A ва B дар як хел масофа дур мешавад, пас перпендикуляри миёнаи порчаи AB ба хати рости l тааллуқ дорад. Барои ду нуқтаи гуногун будани A ва B яке аз фарқҳои $(x_2 - x_1)$ ё ки $(y_2 - y_1)$, яъне ғайринулӣ будани ададҳои a ва b -ро таъкид менамоем.

Масъалаи 1. Муодилаи хати рости аз нуқтаҳои $A(1; -1)$ ва $B(-3; 2)$ гузарандаро тартиб диҳед.

Ҳал. Дар муодилаи $ax + by + c = 0$ нуқтаҳои A ва B ба хати рос-

ти AB меҳобад, пас, координатаҳои онро ба муодилаи хати рост гузошта, муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$a \cdot 1 + b \cdot (-1) + c = 0, \quad a \cdot (-3) + b \cdot 2 + c = 0 \quad \text{ё ки} \\ a - b + c = 0, \quad -3a + 2b + c = 0.$$


Коэффициентҳои a ва b – и ин муодилаҳоро бо ёрии c ифода мекунем: $a = 3c$, $b = 4c$. Ин қиматҳои a ва b -ро ба муодилаи хати рост гузошта меёбем $3cx + 4cy + c = 0$, ин ҷо $c \neq 0$.

Ин муодала, муодилаи хати рости AB мебошад. Муодилаи болоиро бо c ихтисор намуда, ба намуди зерин меоварем $3x + 4y + 1 = 0$.

Ин муодилаи хати рост мебошад.

2. Ҷойгиршавии хати рост нисбат ба системаи координатаҳо.

Акнун се ҳолати хусусии муодилаҳои хати рости $ax + by + c = 0$ – ро дида мебароем. Дар ҳар як ҳолат тарзи ҷойгиршавии хати рост нисбат ба тири координатаҳоро дида мебароем.



Ҳолати 1. Агар $a = 0$, $b \neq 0$ бошад, онгоҳ муодилаи хати ростро дар намуди $by + c = 0$ ё ки $y = y_0$ навиштан мумкин, дар ин ҷо $y_0 = -\frac{c}{b}$ ягон адад, ҳамаи нуқтаҳои хати рости $y = y_0$ ба як хел ордината соҳиб аст, пас, он ба тири абсциса параллел (расми 2, а). Агар $c = 0$ бошад, бо он болои ҳам меафтад $y = 0$ – муодилаи тири абсциса.


Ҳолати 2. Агар $a \neq 0$, $b = 0$ бошад, дар ин ҳолат муодилаи хати рост ба намуди $ax + c = 0$ ё ки $x = x_0$ навишта шуда, аз инҷо $x_0 = -\frac{c}{a}$ – ягон адад $x = x_0$ ҳамаи нуқтаҳои ба якхел абсциса соҳиб аст, пас он ба тири ординатҳо (расми 2, б). Агар $c = 0$ бошад, болои ҳам мефарояд $x = 0$ – муодилаи тири ординатаҳо мебошад.

Ҳолати 3. Агар $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c = 0$ бошад, дар ин ҳолат муодилаи хати ростро ба намуди $ax + by = 0$ ё ки ба намуда $y = kx$ навиштан мумкин, дар инҷо ягон адад $k = -\frac{a}{b}$ Хати рости $y = kx$ аз ибтидои координатаҳо мегузаронад (расми 2, в).

3. Усули координати масъалаҳои геометрӣ. Бисёр масъалаҳои геометрӣ бо ёрии формулаҳои миёнаҳои координатҳои порча ва масофаи байни нуқтаҳо ҳал кардан мумкин. Бо ҳамин мақсад системаи координатаҳои росткунҷаро дохил намудан ва шартҳои масъалаҳоро ба координатҳо навишта гирифтани лозим. Баъд аз он масъала бо ёрии ҳисобкуниҳои алгебра ҳал карда мишавад.

Масъалаи 2. Иббот кунед, ки миёнаҳои гипотенуза дар секунҷаи росткунҷа аз ҳамаи қуллаҳо бо якхел масофа ҷойгир шудааст.

Ҳал. Секунҷаи росткунҷаи ABC ($\angle C = 90^\circ$)-ро дида мебароем. Миёнаҳои порчаи AB -ро бо ҳарфи A ишорат мекунем. Чун расми 3, системаи координатҳои росткунҷаро дохил мекунем. Агар $BC = a$, $AC = b$ бошад, онгоҳ қуллаҳои секунҷа ба координатҳои $C(0; 0)$, $B(a; 0)$ ва $A(0; b)$ соҳиб мешавад. Мувофиқи формулаи координатҳои миёнаҳои порча координатҳои нуқтаи D – ро меёбем: $D(0,5a; 0,5b)$.



Аз формулаи ёфтани масофаи байни нуқтаҳо истифода бурда, дарозии порчаҳои DC ва DA – ро меёбем:

$$DC = \sqrt{(0,5a)^2 + (0,5b)^2} = \sqrt{0,25(a^2 + b^2)} = 0,5\sqrt{a^2 + b^2};$$

$$DA = \sqrt{(0,5a)^2 + (0,5b - b)^2} = \sqrt{0,25a^2 + 0,25b^2} = \sqrt{0,25(a^2 + b^2)} = 0,5\sqrt{a^2 + b^2}.$$

Ҳаминтавр, $DA = DB = DC$ будааст. Ибботи ин талаб қарда шудабуд.

? Савол, масъала ва суноришҳо

- 1) Иббот кунед, ки хати рост дар системаи координатаҳои росткунҷа ба муодилаи зерин соҳиб аст: $ax + by + c = 0$.
- 2) Агар дар муодилаи хати рост $ax + by + c = 0$ $a = 0$ ($b = 0$; $c = 0$) бошад хати рост чӣ хел воқеъ мешавад?
2. Кадоме аз нуқтаҳои $A(3; -1)$, $B(-3; 0)$, $C(12; 5)$, $D(3; 0)$ ва $E(-9; -2)$ ба муодилаи хати рости додашуда $x - 3y + 3 = 0$ тааллуқ дорад, кадоме тааллуқ надорад?
3. Муодилаи хати рости аз нуқтаҳои 1) $A(1; 7)$ ва $B(-3; -1)$; 2) $A(2; 5)$ ва $B(5; 2)$; 3) $A(0; 1)$ ва $B(-4; -5)$ гузарандаро нависед.
4. Хати рости $x + y + c = 0$ аз нуқтаи $(1; 2)$ гузарад, коэффисиенти c – и муодилаи он ба чӣ баробар аст.
5. Агар гузаштани хати рости $ax + by - 1 = 0$ аз нуқтаҳои $(1; 2)$ ва $(2; 1)$ маълум бошад, a ва b -и дар муодилаи он буда, ба чӣ баробар аст?
6. Нуқтаи буриши тирҳои координата ва хати рост бо муодилаи 1) $x + 2y + 3 = 0$; 2) $3x + 4y = 12$; 3) $4x - 2y - 10 = 0$ – ро ёбед.
7. Агар: 1) $A(3; -1)$, $B(5; 5)$; 2) $A(3; 6)$, $B(-5; -2)$ бошад, миёнаҳои порчаи AB будан ё набудани нуқтаи $C(4; 2)$ – ро санҷед.
8. Кадоме аз нуқтаҳои $A(0; -2)$, $B(4; 2)$, $C(-4; -5)$ ба муодилаи $8x - 4y - 8 = 0$ ва хати рост кадомаш тааллуқ надорад?
9. Агар $A(-1; -1)$, $B(-1; 3)$ ва $C(2; 2)$ бошад. муодилаи хати рости тарафҳои секунҷаи ABC -и дарбаргирандаро тартиб диҳед.

35. МАҲҶУМИ ВЕКТОР. ДАРОЗИИ ВЕКТОР ВА САМТИ ОН

1. Бузургии вектор. Вектор. Бузургиҳои ба шумо маълум дорои ду намуд мебошанд. Чунин бузургиҳои маълуманд, ки бо қимати ададии худ (бо воҳиди ченаки додасуда) пурра муайян карда мешаванд. Масалан, дарозӣ, масоҳат, вазн аз ҷумлаи онҳоянд.

Таърифи 1. Бузургиҳои, ки танҳо бо қимати ададии худ муайян карда мешаванд, бузургиҳои скалярӣ ном доранд.

Боз чунин бузургиҳои вучуд доранд, ки барои пурра фаҳмидани онҳо ғайр аз қимати ададии ин бузургиҳоро ифодакунанда самти онҳоро низ доништан зарур аст. Масалан, суръат, қувва ва фишор аз ҷумлаи онҳост.



Вектор – яке аз мафҳумҳои асосии геометрия буда, он бо адад (дарозӣ) ва самт пурра муайян карда мешавад. Барои хубтар дарк кардан, онро дар шакли порчаи самтноқ тасаввур кардан мумкин аст. Дар асл ҳангоми дар бораи векторҳо сухан рондан, дарозии якхелаи байни худ параллел ва як синфи пурраи порчаҳои самтноқи дорои самти якхела дар назар дошта мешавад.

Таърифи 2. Қимати ададӣ ва бузургиҳои бо самти худ муайянишаванда (тавсифшаванда) бузургиҳои векторӣ ва ё векторҳо ном доранд.

Масъалаҳои гуногуни санҷиши миқдор, ки физика, механика ва математикаро на бо адад, балки аз рӯи самташ муайян мекунад, ба мафҳуми вектор меорад. Масалан, қувва, суръат – векторҳоянд.

Бузургиҳои векториро мо дар ҳолатҳои гуногун вомехӯрем. Масалан: ҳангоми дар нақлиёт ҳаракат кардан бузургиҳои вектории бо суръати ҳаракат, гардиш ё ист вобастаро дида метавонед. Дар фанҳои табиатро омӯзанда – суръат, қувваи инерсия, қувваи марказгурез ва бо номҳои ба ин монанд номбар мекунад. Мо маънии табиии бузургиҳои векториро ба ҳисоб нагирифта, маънии табиати математикии онро меомӯзем. Албатта, хосиятҳои математикии бузургиҳои векторӣ дорои маъноии табиии худ аст.

Миқдори ададии бузургии векториро бо ёрии порча ифода мекунем.



Маълум аст, ки ҳар гуна порча ду нўг дорад. Яке аз онҳоро **аввали** вектор гуфта, нўги дуюмро дар самти бузургии вектор мувофиқан идома медиҳем ва бо стрелка (акрабак) ишора мекунем. Онро **қуллаи** вектор мегўем.

Таърифи 3. Вектор (бузургии вектор) гуфта, порчаи дорои самтдоштаро меноманд.

Порчае, ки самти бузургии векториро баҳо медиҳад, чун порча тавсиф карда мешавад. Агар қуллаҳои ифодакунандаи вектор нуқтаҳои A ва B бошад, вектори аз нуқтаи \overline{AB} самтдошта чунин ишора мешавад. Ҳамчунин, векторҳоро дар шакли (ҳарфҳои хурди алифбои лотинӣ) \vec{a} , \vec{b} низ ишора кардан мумкин аст (расми 1).

Хонда мешавад: Вектори \vec{a} ё вектори \overline{AB} .

1) Самти вектор бо нишон додани аввал ва охири он муайян карда мешавад. Дар ин ҷо аввали вектор дар мавқеи аввал гузошта мешавад (расми 2, а).

Самти нури AB -ро муайянкунанда **самти векторӣ** \overline{AB} ном дорад. Вектори аввал ва охираш болоиҳам хобида, **вектори сифрӣ** ном дорад $\overline{AB} = \vec{0}$, баробар ин болоиҳам афтидани нуқтаҳои A ва B -ро ифода мекунанд (расми 2, б).

2) Бузургии мутлақ **модул** ё **дарозии вектор** дарозии порчаест, ки векторро тасвир менамояд.

Модули вектор чун $|\overline{AB}|$ ё $|\vec{a}|$ ишора карда мешавад (расми 3).




Модули вектори $\vec{a} = \overline{AB}$ дарозии порчаи AB ба ҳисоб меравад: $|\vec{a}| = |\overline{AB}|$. Бинобар ин дар геометрия модул ё қимати мутлақи вектор дарозии он аст мегўянд. Модули вектори сифрӣ ба сифр баробар аст: $|\vec{0}| = 0$.

2. Векторҳои баробар.

Таърифи 4. Векторҳое, ки дар як хати рост ё ки дар хатҳои рости параллел меҳобанд, **векторҳои коллинеарӣ** номида мешавад.

Векторҳои коллинеарии \vec{a} ва \vec{b} ба намуди $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ишорат карда мешавад.

Агар ду вектори дар хатҳои рости параллел хобида, аз хати рости аз аввали он гузашта дар як тараф хобанд, онҳо векторҳои ҳамсамт ном доранд (расми 4); нисбат ба хати рост дар тарафҳои гуногун хобанд, онҳо **векторҳои муқобилсамт** ном доранд (расми 5).



Векторҳои \overline{AB} ва \overline{CD} : 1) **ҳамсамт** бошанд, онҳо ба мисли $\overline{AB} \uparrow\uparrow \overline{CD}$;

2) **муқобилсамт** бошанд, чун $\overline{AB} \uparrow\downarrow \overline{CD}$ ишора карда мешаванд. Вектори сифр дар вектори дилхоҳ коллинеарӣ ҳисоб меёбад.




Таърифи 5. Агар дарозиҳои векторҳои \vec{a} ва \vec{b} баробар ва ҳамсамт бошанд, векторҳои баробар номида мешаванд.

Ҳаминтавр, агар $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ва $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$ бошад, векторҳои \vec{a} ва \vec{b} баробар мешаванд. Векторҳои баробар чун $\vec{a} = \vec{b}$ навишта мешаванд.

Векторҳои баробар нишон медиҳад, ки аввали он дар нуқтаи ихтиёрии ҳамворӣ буда метавонад (расми 6), яъне модули векторро тағйир надода, самташро нигоҳ дошта, аввали онро ба нуқтаи дилхоҳи ҳамворӣ кўчонидан мумкин аст. Инро *хосияти параллелкўчони* вектор меноманд.

? Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Вектор чист? Вектор чӣ гуна ишора карда мешавад?
- 2) Чӣ гуна векторҳоро, векторҳои ҳамсамт (муқобилсамт) меноманд? Модули вектор чист?
2. Дар параллелограмми $ABCD$ (расми 7): 1) бо вектори \overline{DC} ҳамсамт 2) бо вектори \overline{AO} ҳамсамт 3) бо вектори \overline{AD} муқобилсамт 4) бо вектори \overline{BD} муқобилсамт 5) бо вектори \overline{AB} баробар 6) бо вектори \overline{OC} баробар 7) бо вектори \overline{OB} баробар векторҳоро нависед.
3. Диагоналҳои параллелограмми $ABCD$ дар нуқтаи O бурида мешавад. Векторҳои бо нуқтаи буриши қулла ва диагоналҳои он ишорашударо нависед. Кадоме аз векторҳои зерин: \overline{AB} , \overline{BC} ва \overline{BO} коллинеарианд?
4. Агар: 1) $\overline{AD} = \overline{BC}$ ва $|\overline{AD}| = |\overline{DC}|$; 2) $\overline{AD} \uparrow\uparrow \overline{BC}$, \overline{AB} ва \overline{DC} векторҳо ноколлениар бошад, шакли чоркунҳои $ABCD$ -ро муайян намоед.
5. Маълум ки, $\overline{AB} = \overline{CD}$ аст. Оё тасдиқи зерин дуруст аст: 1) $AB \parallel CD$; 2) $|AB| = |CD|$?
6. $ABCD$ параллелограмм аст. Аз байни векторҳои дар расми 8 тасвиршуда ҷуфти векторҳои: 1) коллинеарӣ; 2) ҳамсамт; 3) муқобилсамт; 4) дарозиашон баробарро нишон диҳед.
7. Дар бораи самти векторҳои \overline{AB} ва \overline{BA} чӣ гуфтан мумкин аст?



36-37. ЧАМЪ ВА ТАРҶИ ВЕКТОРҶО

1. Чамъи векторҳо. Бигзор векторҳои \vec{a} ва \vec{b} додасуда бошад (расми 1, а). Нуктаи дилхоҳи A -ро ишора мекунем ва аз ин нукта вектори \vec{a} -ба вектори \overline{AB} баробарро мегузaronем. Баъд аз нуктаи B ба вектори \overline{BC} -и ба вектори \vec{b} баробаро мегузaronем. Акнун аввали вектори \vec{a} дар нуктаи A ва қуллаи вектори \vec{b} -ро ба нуктаи C мегузorem (расми – 1, б). Вектори \overline{AC} *суммаи векторҳои* \vec{a} ва \vec{b} номида мешавад. Ин қоидаи чамъи векторҳо *қоидаи «секунча» (сенуқта)* меноманд. Суммаи векторҳои \vec{a} ва \vec{b} бо $\vec{a} + \vec{b}$ ишора карда мешавад.

Қоидаи секунчаро чунин ифода кардан ҳам мумкин аст:

агар A, B ва C – нуктаҳои дилхоҳ бошанд, онгоҳ баробарии зерин дуруст аст.

$$\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$$

Қоидаи секунча барои нуктаҳои дилхоҳи A, B ва C дар ҳолати болоӣ ҳам афтидан, бомавқеъ аст (расми 1, в).

2. Қонунҳои чамъи векторҳо. Ба мо маълум аст, ки тарафҳои муқобилхобидаи параллелограмм байни худ баробар ва параллеланд. Агар равишаш як хела бошад, тарафҳои муқобили параллелограмм векторҳои баробарро ифода мекунад.

Бигзор векторҳои \vec{a} ва \vec{b} коллинеар набошад ба нуктаи дилхоҳи A векторҳои $\overline{AB} = \vec{a}$ ва $\overline{AD} = \vec{b}$ -ро гузошта параллелограмми $ABCD$ -и тарафҳояш аз ин векторҳо табдил ёфтaro месозем (расми 2). Аз рӯи қоидаи секунча:

$$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = \vec{a} + \vec{b} \text{ ва } \overline{AC} = \overline{AD} + \overline{DC} = \vec{b} + \vec{a}.$$



Аз инҳо $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ бармеояд.

Пас, суммаи векторҳо бо тартиби пайдарпай ҷойгиршавии онҳо вобастагӣ надорад. Яъне, *барои векторҳои дилхоҳи a ва b баробарии зерин ҷой дорад:*

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$

Инро қонуни *ҷойивазкунии чамъ* меноманд.

Параллелограмми $ABCD$ – и аз векторҳои \vec{a} ва \vec{b} табдилёфта, суммаи вектори \overline{AC} аз диагонали векторҳои ҷамъшаванда, ки аз аввали ин



векторҳо баромада аст. Одатан чунин ҷаъми векторҳоро «қоидаи (усули) параллелограмм» мегӯянд (расми 2).

Акнун суммаи се то векторҳои \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} -ро дида мебароем. Аз нуқтаи дилхоҳи A вектори $\vec{AB} = \vec{a}$, аз нуқтаи B вектори $\vec{BC} = \vec{b}$ ва аз нуқтаи C бошад, вектори $\vec{CD} = \vec{c}$ мегузаронем (расми 3). Қоидаи секунҷаро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = (\vec{AB} + \vec{BC}) + \vec{CD} = \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{AD};$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{AB} + (\vec{BC} + \vec{CD}) = \vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}.$$

Аз ин, барои векторҳои дилхоҳи \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} баробарии зерин ҷой доштаниш бармеояд.

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}).$$

Ин векторҳоро қонуни гурӯҳбандии (хосияти) чамъ меноманд.




Агар ҳар як вектор аз сифр фарқ кунад, суммаи онҳо вектори сифрӣ шуданаш мумкин.

Масалан, секунҷаи ABC -ро (расми 4) дида мебароем. Дар он суммаи векторҳои \vec{AB} , \vec{BC} ва \vec{CA} мешавад, яъне $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$. Чунки агар аввали вектори якум ва қуллаи (нӯги тири охири) вектори 3 болоиҳам афтад, суммаи вектор, вектори сифрӣ мешавад.

Таърифи 1. Агар суммаи ду вектор вектори сифрӣ бошад, онҳоро **векторҳои муқобил** меноманд.

Пас, агар $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ бошад, онгоҳ $\vec{b} = \vec{BA}$, $\vec{a} = \vec{AB}$ ва баракс векторҳои муқобил меноманд. $\vec{b} = -\vec{a}$, $\vec{a} = -\vec{b}$ (расми 5). Агар векторҳои муқобилро аз рӯи қоидаи секунҷа ҷаъм кунем, онгоҳ вектори сифрӣ ҳосил мешавад, дар он $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, \vec{a} ва \vec{b} векторҳои a ва b параллел шуда, ба тарафҳои гуногун равона мешавад. Пас, ба ҳар як вектори \vec{a} вектори ба он муқобили $-\vec{a}$ мавҷуд аст (яъне $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$) аз мулоҳизаҳои болоӣ ба чунин хулоса меоем.

Агар ду вектори аз сифр фарқкунанда дарозии баробар ва самти муқобил дошта бошад, **векторҳои муқобил** ном дорад. Вектори сифрӣ ҳудаиш ба ҳудаиш вектори муқобил ҳисоб мешавад.



3. Ғарҳи векторҳо. Фарқи векторҳо ба мисли тарҳи ададҳо амали ба чамъ чаппа аст.

Таърифи 2. Фарқи вектори \vec{a} ва \vec{b} ғуфта, чунин вектори \vec{c} -ро меноманд, ки суммаи он ба вектори \vec{b} вектори \vec{a} -ро медиҳад:
 $\vec{c} + \vec{b} = \vec{a}$.

Фарқи векторҳои \vec{a} ва \vec{b} чун фарқи ададҳо ишора карда мешавад. $\vec{a} - \vec{b}$ фарқи (тарҳи) вектор ҳангоми ба вектори яқум вектори ба вектори дуҷум муқобилро чамъ намудан, муайян мегардад ва он ба $\vec{a} + (-\vec{b})$ баробар мешавад (расми 6, б).

Бигзор ба мо векторҳои \vec{a} ва \vec{b} додасида бошад (расми 6, а).

Ба вектори \vec{a} ва \vec{b} суммаи вектори муқобили $-\vec{b}$ -ро дида мебароем.

Барои векторҳои дилхоҳи \vec{a} ва \vec{b} баробари $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ ҷой дорад.

Дарҳақиқат, $(\vec{a} + (-\vec{b})) + \vec{b} = \vec{a} + ((-\vec{b}) + \vec{b}) = \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$

Агар барои векторҳои \vec{a} ва \vec{b} танҳо як нуқтаи O гузошта шуда бошад, онгоҳ барои ёфтани фарқи $\vec{a} - \vec{b}$ аз қоидаи зерин истифода бурдан лозим аст (расми 6, в).

$$\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}.$$

Аз боло маълум аст, ки *охири* вектори тарҳкунанда ҳосили тарҳ, *иبتидои* вектор *охири* вектори тарҳшаванда бошад, вазифаи *охири* вектори ҳосили тарҳро иҷро мекардааст. Бо мақсади таъмин намудани қуллай будани ба ёд овардани қоида, он ба тарзи схематикӣ нишон дода шуд.

Ҳангоми чамъ кардани векторҳо аз усули параллелограмм истифода мебарем (расми 7). Фарқи вектор аз диагонали дуҷуми параллелограмм иборат мебошад.



Масъала. Секунҷаи ABC дода шудааст. Векторҳои 1) \vec{BA} ; 2) \vec{CB} ; 3) $\vec{CB} + \vec{BA}$ -ро бо векторҳои $\vec{a} = \vec{AB}$ ва $\vec{b} = \vec{AC}$ ифода кунед.



Ҳал. 1) \vec{BA} ва \vec{AB} – векторҳои муқобил, барои ҳамин

$\vec{BA} = -\vec{AB}$ ё ки $\vec{BA} = -\vec{a}$.

2) Аз рӯи қоидаи секунҷа: $\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB}$. Барои ҳамин $\vec{CA} = -\vec{AC}$, ҳаминтавр



$$\vec{CB} = \vec{AB} + (-\vec{AC}) = \vec{AB} - \vec{AC} = \vec{a} - \vec{b}.$$





? Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Аз рӯи қоидаи секунҷа ва параллелограмм суммаи векторҳо чӣ гуна ёфта мешавад?
- 2) Вектори муқобил ба вектори додашуда гуфта чиро мегӯянд? Фарқи ду вектор чист?
2. Дар расми 8, векторҳои \vec{a} ва \vec{b} тасвир ёфтаанд. Вектори $\vec{a} + \vec{b}$ -ро бо ду усул созед.
3. Дар расми 9, векторҳои \vec{m} , \vec{n} ва \vec{k} , инчунин \vec{d} ва \vec{e} тасвир ёфтааст. Векторҳоро созед: 1) $\vec{m} + \vec{n} + \vec{k}$; 2) $\vec{d} + \vec{e}$.
4. Дар расми 10, векторҳои \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} , инчунин \vec{d} ва \vec{e} тасвир ёфтаанд. Векторҳоро созед: 1) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$; 2) $\vec{e} - \vec{d}$.
5. Параллелограмми $ABCD$ дода шудааст. Баробарии $(\overline{AB} - \overline{AD}) + \overline{BC} = \overline{AB}$ оё иҷро мешавад? Санҷида бинед.
6. Дар ромби $ABCD$: $AD = 20$ см, $BD = 24$ см, O – нуқтаи буриши диагоналҳо аст. $|\overline{AD} + \overline{AB} - \overline{BC} - \overline{OB}|$ -ро ёбед.
7. $ABCD$ – чоркунҷаи дилхоҳ аст. Иббот кунед, ки $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AD} + \overline{DC}$ аст.
8. $ABCD$ – параллелограмм. Баробарии векторҳои $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{AC}$ -ро исбот кунед. (Ҷамъи векторҳо «қоидаи параллелограмм»).
9. Дар параллелограмми $ABCD$ векторҳои: $\overline{CA} = \vec{a}$, $\overline{CD} = \vec{b}$. \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{DA} -ро бо ёрии векторҳои \vec{a} ва \vec{b} ифода кунед.
10. E ва F – миёнаҳои тарафҳои AB ва AC -и секунҷаи ABC мебошад. Векторҳои, \overline{BF} , \overline{EC} , \overline{EF} ва \overline{BC} -ро бо ёрии векторҳои $\vec{a} = \overline{AE}$ ва $\vec{b} = \overline{AF}$ ифода кунед.
11. Дар расми 11, векторҳои \vec{m} ва \vec{n} тасвир ёфтаанд. Вектори $\vec{m} + \vec{n}$ -ро бо ду усул созед.



38-39. ЗАРБИ ВЕКТОР БА АДАД. КООРДИНАТАҲОИ ВЕКТОР

1. Зарби вектор ба адад. Ягон вектори \vec{a} -ро гирифта, суммаи $\vec{a} + \vec{a} + \vec{a}$ -ро меёбем (расми 1). Ин суммаро чун $3 \cdot \vec{a}$ ишора карда, табиист, ки вектори \vec{a} -ро ба 3 зарб мекунем

Таърифи 1. Ҳосили зарби вектори \vec{a} гайрисифрии ба адади k гуфта, ба ҳамон вектори $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$ номида мешавад, ки дар он k ба модули вектори $|k| \cdot |\vec{a}|$ баробар буда, Ҳангоми самташ $k > 0$ будан, бо самти вектори \vec{a} ва \vec{b} як хел, Ҳангоми $k < 0$ будан, ба самти вектори муқобил мешавад. Ҳосили зарби вектори сифр ба адади ихтиёрӣ, вектори сифр ҳисоб меёбад.

Ҳосили зарби вектори \vec{a} ба адади k чун $k\vec{a}$ ишора мешавад (зарбкунандаи адад дар тарафи чап навишта мешавад). Аз рӯи таъриф:

$$|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|.$$

Аз таърифи зарби вектор ба адад бармеояд, ки: 1) ҳосили зарби вектори ихтиёрӣ ба сифр вектори сифр мебошад; 2) барои адади ихтиёрӣ ва вектори ихтиёрӣ \vec{a} векторҳои \vec{a} ва $k\vec{a}$ коллинеарианд.

Акнун хосиятҳои асосии зарби векторро ба адад номбар мекунем.

Барои векторҳои дилхоҳи \vec{a} , \vec{b} ва ададҳои дилхоҳи k , l баробарҳои зерин мавқеъ доранд:

1°. $(k \cdot l)\vec{a} = k \cdot (l\vec{a})$ – қонуни гуруҳбандӣ.



2°. $(k + l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$ – қонуни якуми тақсимот.

3°. $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$ – қонуни дуҷуми тақсимот.

4°. $k \cdot \vec{0} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$.

Векторҳои ба як хати рост параллел, **векторҳои коллинеарӣ** ном доранд.

Бигзор хати рости l ва векторҳои ба он параллели \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} додашуда бошад (расми 2). Мувофиқи таъриф, векторҳои \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} векторҳои коллинеарӣ мебошанд. Дар ин ҳолат векторҳои \vec{a} ва \vec{b} самти якхела доранд, вектори \vec{c} бошад, нисбат ба векторҳои \vec{a} ва \vec{b} муқобил равона карда шудаанд.



Маълум аст, ки ҳангоми ба адад зарб кардани вектор самти вектори ҳосили зарб ба вектори додашуда параллел мебошад. Аз инҷо хулосаи маълуми зеринро ҳосил мекунем:

ҳосили зарби вектор ба адад ба ҳамин вектор коллинеарӣ аст.

Теорема.

Агар вектор худро ба адади ба модулаш баробар тақсим кунад, ба ҳамин вектор воҳиди коллинеарии вектор ҳосил мешавад.

Исбот. Бигзор модули вектори \vec{a} чунин бошад: $k = \frac{1}{|\vec{a}|}$. Ба адади ҳосили зарби вектори:

$$|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}| = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot |\vec{a}| = 1.$$

Пас, модули вектори зарб ба як ба воҳид баробар аст.

Вектори модулаш ба як баробарро *вектори воҳидӣ* меномем. Агар бо самти вектори \vec{a} вектори воҳидиро ба \vec{e} ишора кунем, аз рӯи теорема ба баробарии $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ меоем, ин баробариро ба $|\vec{a}|$ зарб кунем: $\vec{a} = |\vec{a}| \cdot \vec{e}$ ҳосил мешавад.

Дар чараёни омӯзиши векторҳо баробарии дорои аҳамияти калонро ҳосил кардем. Яъне, *ҳар гуна вектор – бо модули ҳамин вектор ба ҳосили зарби воҳиди вектори коллинеарӣ баробар аст.*

Масалаи 1. Барои кадом қиматҳои k мулоҳизаҳои зерин дурустанд:

1) $|k\vec{a}| < |\vec{a}|$; 2) $|k\vec{a}| > |\vec{a}|$; 3) $|k\vec{a}| = |\vec{a}|$, аз инҷо $\vec{a} \neq \vec{0}$?

Ҳал. 1) дар $\vec{a} \neq \vec{0}$ $|k\vec{a}| < |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| \cdot |\vec{a}| < |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| < 1 \Leftrightarrow -1 < k < 1$;

2) дар $\vec{a} \neq \vec{0}$ $|k\vec{a}| > |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| \cdot |\vec{a}| > |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| > 1 \Leftrightarrow k < -1$ ё ки $k > 1$;

3) дар $\vec{a} \neq \vec{0}$ $|k\vec{a}| = |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| \cdot |\vec{a}| = |\vec{a}| \Leftrightarrow |k| = 1 \Leftrightarrow k = -1$ ё ки $k = 1$.

Ба $\vec{a} \neq \vec{0}$, $|\vec{a}| > 0$. Ба мо маълум аст, ки агар муодила ва нобаробариро ба ягон адади мусбат тақсим кунем, қиммати он тағйир намеёбад.

Ҷавоб: ба 1) $-1 < k < 1$; 2) $k < -1$ ё ки $k > 1$; 3) $k = -1$ ё ки $k = 1$ мулоҳизаҳо дуруст аст.

2. Координатаҳои вектор. Дар ҳамворӣ системаи координатаҳои Декарт xOy дода шудааст, яъне аввали координатаҳо нуқтаи O , самти тирҳои координата ва воҳиди масштаб – порчаи воҳидӣ аст (расми 3).

Дар ин нуқтаи ихтиёрии A , абсиссаи худ x ва ординатааш y соҳиб мешавад: $A(x; y)$. Воҳиди вектори самташ ба тири Ox равона шудаи модулаш дорои як воҳид бударо бо \vec{i} ҳаминтавр, воҳиди вектори бо тири Oy равонашударо бо \vec{j} ишора мекунем (расми 3, а).

Бигзор дар ҳамворӣ нуқтаи A -и координатаҳояш $(x; y)$ додашуда бошад. Секунҷаи OA_xA_y -ро аз назар мегузаронем. Дар ин секунҷа $\overline{OA} = \overline{OA_x} + \overline{A_xA}$. Аммо $OA_x = x$, $A_xA = OA_y = y$ буданаш $\overline{OA_x} = x \cdot \vec{i}$, $A_xA = y \cdot \vec{j}$ мешавад. Аз ин муодилаи

$$\vec{a} = \overline{OA} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} \quad (1)$$

-ро ҳосил мекунем. Ин нобаробарӣ (1) *ифодаи координатаи* вектор номида мешавад.

Пас, вектори аввалаш дар аввали координата, қуллааш дар нуқтаи $A(x; y)$ бударо бо ёрии векторҳои самташон ба сӯи тирҳои координатии \vec{i} ва \vec{j} (1) равонашуда навиштан мумкин аст.



Дар ин ҷо ҷуфти векторҳои (\vec{i}, \vec{j}) векторҳои базис, ададҳои x ва y бошад, координатаҳои векторӣ \vec{a} ном дорад. Агар ифода бо координатаи (1) вектор маълум бошад, вектор бо координатаҳояш дода шудааст мегӯянд ва кӯтоҳ дар шакли $\vec{a}(x; y)$ менависанд:

$$\vec{a}(x; y) = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}. \quad (2)$$

Таъриф. Агар $A_1(x_1; y_1)$ ва $A_2(x_2; y_2)$ бошад, ададҳои $x_2 - x_1$ ва $y_2 - y_1$ координатаи векторҳои $\overline{A_1A_2}$ меноманд (расми 4).

Координатаҳои векторро бо ҳарфҳо ишорат намуда, ба дохили қавс навишта мешавад: $\overline{A_1A_2}(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$ дар баъзе координатаҳои векторҳо бо $(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$ низ ифода карда мешавад. Координатаҳои вектори сифри ба сифр баробар аст: $\vec{0}(0; 0)$. Мувофиқи формулаи ёфтани масофаи нуқтаҳо, дарозии вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ бо формулаи $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ҳисоб карда мешавад.

Қоида. Барои ёфтани координатаҳои вектор кифоя аст, ки аз координатаҳои охири он мувофиқан координатаҳои аввали он тарҳ карда шавад.



Масалан, координатаҳои вектори \overline{OA} бо координатаҳои охири вектор A пурра муайян карда мешавад. Яъне охири вектор ба координатаҳо баробар мешавад.

Агар $A(x; y)$ бошад, $\overline{OA}(x; y) = \overline{(x; y)}$ мешавад.

Хосият ва аломатҳои векторҳои координатаҳояшон баробарро беисбот меоварем.

Теорема.

Векторҳои баробар мувофиқан координатаҳои баробар доранд ва баракс агар координатаҳои мувофиқи векторҳо баробар бошанд, векторҳо баробар мешаванд.

Хулосаи 1. Агар координатаҳои охири вектор бо координатаҳои вектор баробар бошад, дар он ҳолат аввали вектори додашуда дар аввали координатаҳо мешавад (расми 3, б).

Хулосаи 2. Агар якҷоя бо вектор $\vec{a}(a_1; a_2)$ координатаи нуқтаи охири он $B(x_2; y_2)$ додашуда бошад, дар он ҳолат барои ёфтани нуқтаи аввали вектор $A(x_1; y_1)$ аз координатаҳои нуқтаи B $\vec{a}(a_1; a_2)$ тарҳ кардани координатаҳои вектори a кифоя аст:

$$x_1 = x_2 - a_1; \quad y_1 = y_2 - a_2. \quad (1)$$

Хулосаи 3. Агар бо вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ координатаҳои нуқтаи аввали он $A(x_1; y_1)$ дода шуда бошад, дар он ҳолат барои ёфтани координатаи нуқтаи аввал-охири вектор $B(x_2; y_2)$ кифоя аст, ки ба координатаҳои нуқтаи A мувофиқан координатаҳои вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ -ро чамъ кунем:

$$x_2 = x_1 + a_1; \quad y_2 = y_1 + a_2. \quad (2)$$

Масъалаи 2. Агар $A(-2; 1)$ ва $B(0; 4)$ ва $C(4; 1)$ бошад координати куллаи чоруми параллелограмми $ABCD$ -ро ёбед.

Ҳал. Агар чоркунҷаи $ABCD$ параллелограмм бошад, онгоҳ $\overline{AB} = \overline{DC}$ мешавад. Бигзор $(x; y)$ координатаи нуқтаи D бошад. Координатаҳои векторҳои \overline{AB} ва \overline{DC} -ро меёбем.

$$\overline{AB} = \overline{(0 - (-2); 4 - 1)} = \overline{(2; 3)}, \quad \overline{DC} = \overline{(4 - x; 1 - y)}.$$

Ҳаминтавр $4 - x = 2$ ва $1 - y = 3$, аз ин ҷо $x = 2$ ва $y = -2$.

Ҷавоб: $D(2; -2)$.

Масъалаи 3. Агар нуқтаи $A(-1; 5)$ аввали вектори $\vec{a}(2; -3)$ бошад, координатаҳои B -и охири векторро ёбед.

Ҳал. Маълумотҳои додашударо ба таносуби охири (2) гузошта, координатаҳои заруриро меёбем:

$$x_2 = -1 + 2 = 1, \quad y_2 = 5 + (-3) = 2.$$

Ҷавоб: $B(1; 2)$.

Масъалаи 4. Нуқтаҳои $A(-3; 0)$ ва $B(5; -4)$ дода шудааст. Координатаҳои вектори \overline{AB} ва \overline{BA} -ро ёбед.

Ҳал. 1) $\overline{AB} = \overline{AB}(5 - (-3); -4 - 0) = \overline{AB}(8; -4) = \overline{(8; -4)}$;

2) $\overline{BA} = -\overline{AB} = \overline{-(8; -4)} = \overline{(-8; -(-4))} = \overline{(-8; 4)}$. Ҷавоб: $(8; -4)$; $(-8; 4)$.

Дар хотир доред! Агар координатаҳои ягон вектор маълум бошад, онгоҳ вектори ба он муқобилро ҳисоб накарда, аломати вектори додашударо ба муқобилаш иваз намудан кифоя аст.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Чаро зарби адад ба вектори додашуда меноманд?
- 2) Хосияти зарби ададро ба вектор гӯед.
- 3) Вектори воҳидӣ чист?
2. Вектори \vec{a} -ро кашед, ки дарозиаш ба 2 см баробар аст. Векторҳои $4\vec{a}$, $-2\vec{a}$, $3\vec{a}$, $1,5\vec{a}$, $-1,5\vec{a}$ -ро ёбед.
3. Дар кадом қимати k вектори \vec{a} ($\vec{a} \neq \vec{0}$) ва $k\vec{a}$ аз сифр фарқ мекунад: 1) ҳамсамт; 2) муқобилсамт; 3) баробар?
4. Дар параллелограмми $ABCD$ O – нуқтаи буриши диагонал, K – миёнаҳои тарафи CD мебошад. Векторҳои \overline{OA} ва \overline{AK} -ро бо ёрии векторҳои $\overline{AB} = \vec{a}$ ва $\overline{AD} = \vec{b}$ ифода кунед.
5. Нуқтаи C – миёнаҳои тарафи AB :
1) Вектори \overline{AC} -ро бо вектори \overline{CB} -ро; 2) вектори \overline{AB} -ро бо вектори \overline{CB} ; 3) вектори \overline{AC} -ро бо вектори \overline{BA} ифода кунед.
6. Ифодаҳоро сода кунед:
1) $(\overline{AB} + \overline{AC}) + (\overline{BA} + \overline{CB})$; 2) $\overline{AB} - \overline{DB} - \overline{CA} + \overline{DA}$.
7. Нуқтаҳои 1) $A(-1; 4)$ ва $B(3; 9)$; 2) $A(2; -5)$ ва $B(1; -1)$; 3) $A(3; 2)$ ва $B(3; 2)$ дода шудааст. Координатаи вектори \overline{AB} -ро ёбед.
8. Агар: 1) $\overline{AB}(7; 24)$; 2) $A(0; -1)$ ва $B(3; -5)$; 3) $A(2; -4)$ ва $B(2; -1)$ бошад. Дарозии вектори \overline{AB} -ро ёбед.
9. Агар: 1) $A(-2; -3)$, $B(-3; -1)$; 2) $A(m; n)$, $B(-m; -n)$ бошад, координатаҳои вектори \overline{BA} ба чӣ баробар мешавад?
10. Нуқтаҳои $A(-1; -3)$, $B(2; -4)$, $C(-3; -1)$ ва $D(5; 2)$ дода шудааст, векторҳои \overline{AC} ва \overline{DB} оё баробаранд?
11. Дарозии вектори $\vec{a}(m; 24)$ ба 25 баробар. M -ро ёбед.
12. Агар нуқтаи $A(5; -3)$ аввали вектори $\vec{a}(-7; -8)$ бошад, координатаҳои охири ин вектор (B)-ро ёбед.
13. Агар: $A(-3; 1)$ ва $B(5; -5)$; 2) $A(12; 0)$ ва $B(0; -5)$ бошад, дарозии вектори \overline{AB} -ро ёбед.

40. АМАЛҲО ОИДИ ВЕКТОРҲОИ БО КООРДИНАТАҲО ДОДАШУДА

Бо амалҳои ҷамъ, тарҳ ва зарб векторҳои бо координатаҳо додашударо дида мебароем.

1. Ҷамъи вектор бо координатаҳои додашуда.

Таъриф. Суммаи векторҳои $\vec{a}(a_1; a_2)$ ва $\vec{b}(b_1; b_2)$ гуфта, чунин вектори $c_1 = a_1 + b_1$, $c_2 = a_2 + b_2$ -ро меноманд, ки координатаҳои $\vec{c}(c_1; c_2)$ мебошад.

Ҳаминтавр,

$$\vec{a}(a_1; a_2) + \vec{b}(b_1; b_2) = \vec{c}(a_1 + b_1; a_2 + b_2) \text{ ё ки } \overline{(a_1; a_2)} + \overline{(b_1; b_2)} = \overline{(a_1 + b_1; a_2 + b_2)}.$$

Барои ҳар гуна векторҳои $\vec{a}(x_1; y_1)$, $\vec{b}(x_2; y_2)$ баробарии зерин ҷой дорад $\vec{c}(c_1; c_2)$.


$$1) \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}; \quad 2) (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}); \quad 3) \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$

Барои исбот муқоисаи координатаҳои мувофиқи векторҳои қисми чап ва ростии баробарӣ кифоя аст.

Теорема.

Нуктаҳои A, B, C чӣ хеле, ки набошад, баробарии векторҳои $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$ ҷой дорад.

Исбот. $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$ – нуктаҳои додашуда (расми 1) векторҳои ҷамъшавандаро бо координатаҳои ифода карда меёбем:



$$\overline{AB}(x_2 - x_1; y_2 - y_1), \quad \overline{BC}(x_3 - x_2; y_3 - y_2).$$

Мувофиқи таъриф, барои муайяни кардани координатаҳои векторҳои ҷамъшаванда координатаҳои мувофиқи векторҳои \overline{AB} ва \overline{BC} -ро ҷамъ мекунем:

$$x_2 - x_1 + x_3 - x_2 = x_3 - x_1, \quad y_2 - y_1 + y_3 - y_2 = y_3 - y_1.$$

Ин координатаҳои вектори \overline{AC} мебошад:

$$\overline{AC}(x_3 - x_1; y_3 - y_1).$$

Мувофиқи теоремаи векторҳои баробар: $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$.

Теорема исбот шуд.

Аз расми 2 истифода бурда исботи дурусти баробарии болоиро ба худатон ҳавола менамоем.

Ҳаминтавр, барои ҷамъи векторҳо координатаҳои мувофиқи онҳоро ҷамъ кардан кифоя аст.

2. Тарҳи векторҳои бо координатаҳо додашуда.

Таъриф. Тарҳи вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ ва $\vec{b}(b_1; b_2)$ гуфта чунин вектори $\vec{c}(c_1; c_2)$ -ро меноманд, ки суммаи он бо вектори \vec{b} ба вектори \vec{a} баробар аст:
 $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$.

Аз ин ҷо координатаҳои вектори $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ -ро меёбем

$$c_1 = a_1 - b_1, c_2 = a_2 - b_2.$$

Барои тарҳи векторҳои бо координатаҳои додашуда координатаҳои мувофиқи онҳоро тарҳ кардан қимоя,

яъне $\vec{a}(a_1; a_2) - \vec{b}(b_1; b_2) = \vec{c}(a_1 - b_1; a_2 - b_2)$ ё ки

$$\overline{(a_1; a_2)} - \overline{(b_1; b_2)} = \overline{(a_1 - b_1; a_2 - b_2)}.$$

3. Зарби векторҳои бо координатаҳо додашуда ба адад.

Таъриф. Зарби вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ ба адади k гуфта вектори $\overline{(ka_1; ka_2)}$ -ро меноманд, яъне $k\vec{a} = \overline{(ka_1; ka_2)}$.

Мувофиқи таъриф, $\overline{(a_1; a_2)} \cdot k = \overline{k(a_1; a_2)}$.



Пас, барои зарб намудани вектор ба адад (ё ки адади k -ро ба вектор \vec{a} зарб намудан) координатаҳои онро ба адад зарб кардан қимоя аст.

Аз расми 3 истифода бурда таърифи зарби вектор ба ададро санчида бинед. Хосиятҳои он ба координатаҳо ҳам ҷой дорад.

Масъалаи 1. Суммаи векторҳои $\vec{a}(3; 5)$ ва $\vec{b}(2; 7)$ -ро ёбед.

Ҳал. $\vec{a}(3; 5) + \vec{b}(2; 7) = \overline{(3; 5)} + \overline{(2; 7)} = \overline{(3+2; 5+7)} = \overline{(5; 12)}$.

Пас, координатаҳои $\vec{a} + \vec{b}$ ба $(5; 12)$ баробар аст.



Масъалаи 2. Фарқи векторҳои $\vec{a}(-3; 5)$ ва $\vec{b}(3; -3)$ -ро ёбед.

Ҳал: $\vec{a}(-3; 5) - \vec{b}(3; -3) = \overline{(-3; 5)} - \overline{(3; -3)} = \overline{(-3-3; 5-(-3))} = \overline{(-6; 8)}$.

Ҷавоб: $\overline{(-6; 8)}$.

Масъалаи 3. Вектори ба вектори $\vec{a}(-3; 5)$ муқобил \vec{b} -ро ёбед.

Ҳал. \vec{a} Вектори ба вектори муқобил \vec{b} мешавад.

$$\vec{b} = -\vec{a} = -1 \cdot \vec{a} = -1 \cdot \overline{(3; 5)} = \overline{(-3; -5)}.$$

Ҷавоб: $\vec{b}(-3; -5)$ ё ки $\overline{(-3; -5)}$.

Масъалаи 4. Агар $\vec{a}(-3; 4)$, $\vec{b} = 4\vec{a}$ бошад, координатаҳои вектори 4-ро ёбед.

Ҳал. $\vec{b} = 4\vec{a} = 4 \cdot \overline{(-3; 4)} = \overline{(4 \cdot (-3); 4 \cdot 4)} = \overline{(-12; 16)}$.

Ҷавоб: $\vec{b}(-12; 16)$ ё ки $\overline{(-12; 16)}$.



Савол, масъала ва супоришҳо

- 1) Координатаҳои ду вектор чӣ хел ҳам карда мешавад?
- ?** 2) Координатаҳои ду вектор чӣ хел тарҳ карда мешавад?
- 3) Ду вектори координатаҳояш додасуда чӣ хел зарб карда мешавад?
- 2.** Агар $\vec{a}(-4; 8)$ ва $\vec{b}(1; -4)$ бошад: 1) сумма; 2) фарқи координатаҳои векторҳоро ёбед.
3. Векторҳои $\vec{a}(-2; 6)$ ва $\vec{b}(-2; 4)$ дода шудааст. Координатаи векторҳои 1) $\vec{a} + \vec{b}$; 2) $\vec{a} - \vec{b}$; 3) $\vec{b} - \vec{a}$; 4) $-\vec{a} - \vec{b}$ -ро ёбед.
4. Векторҳои $\vec{a}(2; 3)$ ва $\vec{b}(-1; 0)$ дода шудааст. Координатаи векторҳои 1) $2\vec{a} + \vec{b}$; 2) $\vec{a} - 3\vec{b}$; 3) $2\vec{b} - \vec{a}$ -ро ёбед.
- 5.** Векторҳои $\vec{a}(2; -3)$ ва $\vec{b}(-2; -3)$ дода шудааст. Координатаи векторҳои зеринро: 1) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$; 2) $\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$; 3) $\vec{c} = -3\vec{a} - 2\vec{b}$ -ро ёбед.
- 6.** Векторҳои $\vec{a} = -2\vec{i} - 3\vec{j}$ ва $\vec{b} = -2\vec{j}$ дода шудааст. Координатаи векторҳои 1) $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$; 2) $\vec{c} = -4\vec{a} + 3\vec{b}$; 3) $\vec{c} = -3\vec{a} + 4\vec{b}$ -ро ёбед.
7. Векторҳои $\vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ ва $\vec{b} = 3\vec{i}$ дода шудааст. Координатаи векторҳои: 1) $\vec{c} = -3\vec{a} - 2\vec{b}$; 2) $\vec{c} = 4\vec{a} - \vec{b}$ -ро ёбед.
8. Векторҳои $\vec{a} = -2\vec{i} - 3\vec{j}$ ва $\vec{b} = 2\vec{j}$ дода шудааст. Координатаи векторҳои: 1) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$; 2) $\vec{c} = \vec{a} - 5\vec{b}$ -ро ёбед.
9. Векторҳои $\vec{a} = -3\vec{i}$ ва $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ дода шудааст координатаҳои векторҳои: 1) $\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$; 2) $\vec{c} = -\vec{a} - \vec{b}$ -ро ёбед.

41. ТАЛҚИНИ ФИЗИКӢ ВА ГЕОМЕТРИИ ВЕКТОР, ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ БО УСУЛИ ВЕКТОР

1. Талқини физикӣ ва геометрии вектор.

1. Қувваи ба ҷисм таъсиркунанда бо векторе тасвир мешавад, ки самти он бо самти қувваи ҳаракат, модулаш ба бузургии мутлақи қувва баробар аст. Аз таҷриба маълум аст, ки амали ду ва ё якчанд қувваҳои ба ҷисм гузошташударо, чун амали қувваи баробар таъсири ба суммаи ҳамаи қувваҳои ба ҷисм таъсиркунанда баробар тасаввур кардан мумкин аст. Дар расми 1 ду қувваи дар нуқтаи A бо векторҳои \vec{a} ва \vec{b} ба ҷисм таъсиркунанда тасвир ёфтааст. Таъсиркунандаи баробарии ин қувваҳо бо вектори

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} \quad \text{тасвир меёбад.}$$



Тасвир кардани қувва дар шакли суммаи қувваҳои дар ду самти додашуда таъсиркунанда, *пахн кардани қувва аз рӯи самтҳо* номида мешавад.

2. Дар физика *ҳаракати пешхаттаи* ҷисм гуфта ҳаракатеро меноманд, ки дар он ҳамаи нуқтаҳои ҷисм дар фосилаи вақти якхела дар самти якхела ба як масофа меғечад. Ҳамин тавр, *вектори геҷиш* дар физика ба маънои вектори ба китоби дарсии мо қабул карда будааст. Фарқ ҳамин, ки дар дарсҳои геометрия фақат дар бораи векторҳои ҳамворӣ сухан меравад, физикҳо бошанд аз ибтидо оид ба векторҳои фазовӣ ҳам мулоҳиза меронанд.

3. Дар физика калимаи «вектор» дар маънои васеъ истифода мешавад. Масалан, суръатро вектор мегӯянд. Аммо, дарозии вектори геометрӣ бо метр, қимати мутлақи суръат бошад, бо м/с (метр тақсими сония) чен карда мешавад, ки аз ин ҷо вектор набудани қимати дар геометрия қабул шудаи суръат бармеояд. Дар геометрия мо суръатро на вектор, балки бузургии векторӣ меномем.

Дар ин ҷо, ба чамъ кардани бузургиҳои вектор, векторҳои геометрии онҳоро тасвиркунандаро чамъ, зарби бузургиҳои вектор ба адад бошад, векторҳои геометрии онҳоро тасвиркунандаро зарб бояд кард.

Як мисол меорем. Дар расми 2 вектори \vec{v} суръати ҳаракати даврзании вектори \vec{a} бошад, мумкин суръатнокиро ифода кунад. Аммо, ин векторҳоро аз нуқтаи назари физикӣ чамъ



кардан маъно надорад. Бо вучуди ҳамин, дар физика суръат ё суръатнокиро вектор меноманд. Агар гап дар бораи чӣ буданаш дақиқ тасаввур карда шавад, чунин озодии сухан ба умумият зарар намерасонад. Ба монанди ҳамин, мо ҳам дарозии тарафи секунҷаро барои мухтасарӣ, ба таври оддӣ тарафи он номидем ва ҳоказо.

2. Ҳалли масъалаҳои геометрӣ бо усули вектор.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои геометрӣ ва исботи теоремаҳо аз векторҳо васеъ истифода бурда мешавад.

Масъалаи 1. Нуктаи C миёнаҳои порчаи AB нукта O – бошад, нуктаи дилхоҳи ҳамворист, исбот кунед, ки $\overline{OC} = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB})$ аст (расми 3, а).

Ҳал. Усули 1. Мувофиқи қоидаи секунҷа:

$$\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{AC} \quad \text{ва} \quad \overline{OC} = \overline{OB} + \overline{BC}.$$

ин ду баробариро ҷамъ намуда, ҳосил мекунем:

$$2\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{OB} + (\overline{AC} + \overline{BC}).$$

Аз барои нуктаи C миёнаҳои порчаи AB буданаш, $\overline{AC} + \overline{BC} = \vec{0}$ чунки суммаи векторҳои муқобил ба нул сифр баробар аст.

Ҳаминтавр ба инҳо соҳиб мешавем:

$$2\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{OB} \quad \text{ё} \quad \overline{OC} = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB}).$$


Усули 2. Секунҷаи OAB -ро то параллелограмм пур мекунем (расми 3, б). $\overline{OA} + \overline{OB} = \overline{OD}$ (мувофиқи қоидаи параллелограмм диагонали параллелограмм дар нуктаи буриш ба ду қисми баробар тақсим мешавад, бинобар $\overline{OC} = \overline{CD}$ ва $\overline{OD} = 2\overline{OC}$).

Пас, $\overline{OA} + \overline{OB} = 2\overline{OC}$, аз ин ҷо:

$$\overline{OC} = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB}).$$

Масъалаи 2. Исбот кунед, ки миёнаҳои тарафҳои чоркунҷаи ихтиёрии $ABCD$ қуллаҳои параллелограмм мебошад.

Ҳал. E, F, G, H – мувофиқи миёнаҳои тарафҳои AB, BC, CD ва DA бошад (расми 4). Мувофиқи аломати 3-юми параллелограмм, масъалаи исботи параллелӣ, баробарӣ ва дарозии парчаҳои EF ва HG кифоя аст. Дар забони векторӣ, ин \overline{EF} ва \overline{HG} аз исбот намудани баробарии векторҳо иборат аст.



Дар ҳақиқат,

$$\overline{EF} = \overline{EB} + \overline{BF} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{BC}), \quad \overline{HG} = \overline{HD} + \overline{DG} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{DC}).$$

Ба ғайр аз ин, $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AD} + \overline{DC}$ буданаш маълум. Бинобар ин, $\overline{EF} = \overline{HG}$. Аз ин ҷо, EF ва HG доир ба дарозӣ параллел ва баробарии парчаҳо бармеояд.

Пас, миёнаҳои тарафҳои чоркунҷаи дилхоҳи $ABCD$ қуллаҳои параллелограмм мебошад. Исботи ҳамин талаб карда шуда буд.

Аз исботи болоӣ маълум мешавад, ки ҳалли масъала ва теоремаҳо бо усули вектор ба ҳалли масъалаҳои алгебравӣ монанд мебошад. Ин як намуди ҳалли масъала буд, ки он аз се зина иборат аст.

Зинаи 1. Шарти масъаларо ба намуди вектор навиштан ва векторҳои кулайро (монанди – номаълумро дохил намуда, муодилаи алгебравӣ тартиб додан).

Зинаи 2. Бо ёрии воситаҳои алгебравии вектор, шарти масъала чунон иваз карда мешавад, ки масъаларо бо намуди вектор ҳал намудан имкон шавад (монанди – ҳалли муодилаи алгебравӣ).

Зинаи 3. Муносибатҳои гирифта шудан вектор аввал бо амалҳои талқин гардид (монандӣ – ҷавобро баъд аз ҳалли муодилаи алгебравӣ нависед).




Савол, масъала ва супоришҳо

1. Дарозии медианаи CC_1 – и секунҷаи қуллааш дар нуқтаҳои $A(3;1)$, $B(1;3)$ ва $C(0;2)$ воқеъ бударо ёбед.
2. Нуқтаи K миёнаҳои тарафи AD параллелограмми $ABCD$. Вектори \overline{KC} -ро бо ёрии векторҳои \overline{AB} ва \overline{AD} ифода кунед.
3. Нуқтаҳои $A(2; 4)$, $B(3; 6)$ ва $C(6; 14)$ дода шудааст. Координатаи векторҳои $\overline{AB} + \overline{AC}$ -ро ёбед.
4. Координатаҳои ду қуллаи муқобили квадрати $ABCD$ дода шудааст $A(0;4)$ ва $C(6;0)$. Координатаи ду қуллаи боқимондаи онро ёбед.
5. Агар нуқтаи $A(-2; 3)$ аввали вектори $\vec{a}(-3; 8)$ бошад, координатаи $(B(x; y))$ охири векторро ёбед.
6. Исбот кунед, ки хати миёнаи трапетсия ба асосҳои он параллел буда, ба нисфи дарозии онҳо баробар аст.
7. Векторҳои $\vec{a}(1; 3)$, $\vec{b}(-2; 4)$, $\vec{c}(-1; -3)$, $\vec{d}(-4; 4)$, $\vec{p}(3; 9)$, $\vec{q}(-1; 2)$ дода шудааст. Аз байни онҳо: 1) векторҳои ҳамсамт; 2) якҷуфт векторҳои муқобилсамтро ёбед.
8. $ABCD$ ромб нуқтаи N миёнаҳои тарафи CD . Вектори \overline{AN} -ро бо воситаи векторҳои \overline{AB} ва \overline{AD} ифода кунед.
9. Параллелограмми $ABCD$ ва нуқтаи O -и дар он воқеъ набуда дода шудааст. Вектори \overline{OD} -ро бо векторҳои \overline{OA} , \overline{OB} ва \overline{OC} ифода кунед.

42. МАШҚИ АМАЛӢ ВА ТАТБИҚ

МАТЕРИАЛҲОИ ИЛОВАГИИ КОМПЕТЕНСИЯИ АМАЛИИ РИВОҶДИҲАНДА

1. Масъалаҳо доир ба татбиқи амалии векторҳо.



Масъалаи 1. Парашютчӣ ба замин бо суръати 3 м/с фаромада истодааст. Шамол онро бо суръати $3\sqrt{3}$ м/с тела медиҳад. Дар ин ҳолат парашютчӣ ба замин дар таҳти кадом кунҷ мефарояд (расми 1).

Ҳал. Бигзор парашютчӣ дар нуқтаи B бошад ба ӯ қувваи вазинии \overline{BA} ва қувваи шамоли \overline{BC} баробар таъсиркунанда \overline{BD} мебошад ва $ABCD$ – росткунча, AB –

вертикал, пас, қимати кунҷи $\angle ADB$ – ро ёфтан лозим.

$\overline{BC} = \overline{AD}$ ва $BC = AD$ ($ABCD$ – росткунча $\angle A = 90^\circ$). Мувофиқи теоремаи Пифагор: $BD^2 = AD^2 + AB^2$, Пас:

$$BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6 \text{ (см)}.$$


Ҳаминтавр, дар секунҷаи ABD 3 см-а гипотенузаи BD аз катети AB ду маротиба калон будааст, пас, $AB = 0,5BD$ мувофиқи хосияти катети муқобили кунҷи бузургии $\angle AOB$ 30° ё ки $\sin \angle ADB = 30^\circ$ аз ин ҷо $\sin \angle ADB = \frac{AB}{BD} = 0,5$, аз ин $\angle ADB = 30^\circ$ ҳосил мешавад.

Ҷавоб: $\angle ADB = 30^\circ$.

Масъалаи 2. Парашютчӣ ба замин бо суръати 4 м/с фаромада истодааст, шамол бошад, онро бо суръати $4\sqrt{3}$ м/с тела дода истодааст. Дар ин ҳолат парашютчӣ ба замин дар таҳти кадом кунҷ мефарояд (ба расми 1 ниг.). Масъаларо мустақил ҳал кунед.

Масъалаи 3. Бори вазнаш P аз нишебӣ барои ба пасти наафтиданаши онро бо кадом қувваи F нигоҳ дошта истоданаши лозим (расми 2).

Ҳал. Ба маркази вазинӣ бар нуқтаи O ба қувваи \overline{P} гузашта шудааст. Вектори \overline{P} – ро байни ҳам перпендикуляр бо ду равиш



чун дар расми 2 нишондодашуда мегузаронем. Қувваи \overline{OA} , ки ба нишебии моил перпендикуляр аст, аз ғечидани бор роҳ намедиҳад. Қувваи \overline{F} – и борро нигоҳ доранда ба қувваи ба он муқобил равона шудаи \overline{OB} аз ҷиҳати миқдор баробар буданаши мумкин. Аз он ба чунин ҳулоса меоём: $F = P \sin \alpha$.

Масъалаи 4. $P=50\text{ N}$ бори ба ҳамворӣ моил хобидааст. Агар кунчи моили ҳамворӣ нисбат ба горизонт ба 30° баробар бошад, қувваи фишор ва гечишро ёбед.

Дода шудааст: $P=50\text{ N}$, $\angle A=30^\circ$.

Ёфтани лозим: $F_{\text{гечиш}}$, $F_{\text{фишор}}$.

Ҳал. 1) Қувваи \vec{P} -ро ба дуто: бо равиши қувваи гечиш параллел инчунин қувваи фишори ба ҳамворӣ моил паҳн мекунем.

2) Параллелограмм месозем \vec{OP} вектор диагонали он $\vec{OM} \parallel \vec{AB}$, $\vec{OK} \perp \vec{AB}$, $\vec{PK} \parallel \vec{AB}$, $\vec{PM} \perp \vec{AB}$, $\vec{OM} = \vec{F}_{\text{гечиш}}$, $\vec{OK} = \vec{F}_{\text{фишор}}$ -ро мегузаронем (расми 3).

3) $\angle OPM = \angle A = 30^\circ$ ($OP \perp AC$, $PM \perp AB$).

4) Аз секунҷаи росткунҷаи OPM :


$$OM = 0,5OP = 0,5 \cdot 50 = 25; \quad F_{\text{гечиш}} = 25\text{ N}.$$

5) Аз секунҷаи росткунҷаи OPK мувофиқи теоремаи Пифагор он

$$OK = \sqrt{OP^2 - PK^2} = \sqrt{OP^2 - OM^2} = \sqrt{50^2 - 25^2} = \sqrt{25^2 \cdot (4 - 1)} = 25\sqrt{3} \approx 43,$$

яъне $F_{\text{гечиш}} \approx 43\text{ N}$.

Ҷавоб: $F_{\text{гечиш}} = 25\text{ N}$, $F_{\text{фишор}} \approx 43\text{ N}$.



Масъалаи 5. Таҷриба нишон медиҳад, ки агар ба ҷисми A дуто қувва a ва b таъсир расонида истода бошад, онгоҳ таъсири онҳо ба якто c таъсири қувва баробар шуда, ки c – қувва ба диагоналҳои параллелограмм, ки аз порчаҳои a ва b сохта шудааст, тасвир карда мешавад: қувваҳои баробар таъсир кунанда мувофиқи „қоидаи параллелограмм“ ёфта мешавад.


Масъалаи ба кишти шино карда истода (расми 4) ё ки ба воситаи қайиқ бурида гузаштан (расми 5) ба адади буриши кўндаланг ва ба равиши чараёни дарё равона шуда ду қувва таъсир мекунад. Ҳамон қувваро дар расм ишора кунед.



Масъалаи ба ҳамин масъала монанд тартиб диҳед ва бо расмҳои мувофиқ ифода кунед.

2. Ёфтани координатҳои системаи маркази вазнинӣ.

Масъалаи 6. Ба нисбати додашуда тақсим кардани порча.

Агар $\vec{AC} = \lambda \vec{CB}$ бошад, нуқтаи C порчаи AB -ро ба нисбати λ тақсим мекунад (расми 6). Агар координатаҳои охири порча $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ маълум бошад, координатаҳои нуқтаи C x , y -ро ёбед.





Ҳал. Векторҳои \overline{OA} , \overline{OC} ва \overline{OB} -ро месозем. $\overline{OA}(x_1; y_1)$, $\overline{OC}(x; y)$, $\overline{OB}(x_2; y_2)$, $\overline{AC}(x - x_1; y - y_1)$, $\overline{CB}(x_2 - x; y_2 - y)$ ва векторро ба адади λ зарб намудан ва координатаҳои онро ба адади λ зарб намуда, ба баробариҳои зерин соҳиб мешавем:

$$\begin{aligned} \overline{AC} = \lambda \overline{CB} &\Leftrightarrow \overline{AC}(x - x_1; y - y_1) = \\ &= \lambda \overline{CB}(x_2 - x; y_2 - y) \Leftrightarrow \begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x); \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y). \end{cases} \end{aligned}$$

Пас, $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$, $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$.

Масъалаи 7. Ба нуқтаҳои $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ мувофиқан борҳои ба m_1 ва m_2 баробар гузоштаанд. Координатаҳои маркази системаи вазнинии ин массаҳо (нуқтаи C)-ро ёбед.

Ҳал. Маркази вазнинии C – дар порчаи M_1M_2 инчунин ба нуқтаҳои M_1 ва M_2 гузашта аз массаҳои m_1 ва m_2 дар масофаи таносуби муқобил меҳабд, яъне дар нуқтаи маркази система ду нуқтаи моддии C порчаи M_1M_2 -ро ба нисбати $\lambda = \frac{m_2}{m_1}$ ҷудо мекунад.

Қимати λ -ро ба формулаҳои масъалаи 5 гузошта баъд аз табдилдиҳиҳо координатаи нуқтаи C-ро меёбем:

$$x_C = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2}{m_1 + m_2}, \quad y_C = \frac{y_1 m_1 + y_2 m_2}{m_1 + m_2}.$$

3. Доир ба исботи муносибатҳои векторӣ.

Масъалаи 8. Параллелограмми ABCD ва нуқтаи буриши диагоналҳо – O дода шудааст. Исбот кунед, ки $\overline{OA} + \overline{OC} = \overline{OB} + \overline{OD}$ аст.

Дода шудааст: ABCD – параллелограмм, O – AC ва BD нуқтаи буриши диагоналҳои, $AO = OC$, $BO = OD$ (расми 7).

Исбот кардан лозим: $\overline{OA} + \overline{OC} = \overline{OB} + \overline{OD}$.

Исбот: Якҷанд усули исботи ин баробарии векториро меоварем.

Ба вектори сифрӣ баробар будани фарқро дида мебароем:

$$1) (\overline{OA} + \overline{OC}) - (\overline{OB} + \overline{OD}) = (\overline{OA} - \overline{OB}) + (\overline{OC} - \overline{OD}) = \overline{BA} + \overline{DC} = \overline{BA} + \overline{AB} = \overline{BB} = \vec{0}.$$

Ҳангоми иваз кардани шаклҳо аз қоидаҳои аз сумма тарҳ кардани сумма, қонуни гурӯҳбандӣ, қоидаи секунҷа $\overline{DC} = \overline{AB}$. Мувофиқи таърифи вектори сифрӣ (тарафҳои муқобил ва ҳамсамти параллелограмм) истифода мешавад.

$$2) (\overline{OA} + \overline{OC}) - (\overline{OB} + \overline{OD}) = (\overline{OA} - \overline{OD}) + (\overline{OC} - \overline{OB}) = \overline{DA} + \overline{BC} = \overline{DA} + \overline{AD} = \overline{DD} = \vec{0}.$$

Тарафҳои муқобилҳобидан параллелограмм ва векторҳои ҳамсамт ва қонуни гурӯҳбандӣ: $\overline{DC} = \overline{AB}$ аз таърифи векторҳои сифрӣ истифода шуд.

1. Муодилаи аз нуктаҳои $A(-2; 3)$ ва $B(4; 0)$ гузарандаро тартиб диҳед.
2. Агар: $C(4; 9)$ ва $R=5$ бошад, муодилаи давраи марказаш нуктаи C ва радиусаш R -ро созад.
3. Векторҳои $\vec{a}(1; 0)$, $\vec{b}(1; 2)$ ва $\vec{c}(1; 3)$ дода шудааст. Координатаҳои векторҳои $\vec{a} - \vec{b}$ ва $\vec{b} + \vec{c}$ -ро ёбед.
4. Векторҳои $\vec{c}(-1; 0)$ ва $\vec{d}(1; 2)$ дода шудааст. Координатаҳои векторҳои $2\vec{c} + 3\vec{d}$ -ро ёбед.

ТЕСТИ 3

Худро санчида бинед!

1. Хати рости аз нуктаҳои $A(0; -1)$, $B(1; 0)$ гузаронда ба кадом тараф воқеъ аст?
А) III, IV, I; В) I, II, III; Д) II, III, IV; Е) II, IV.
2. Хати рости аз нуктаҳои $A(-2; 0)$, $B(-2; 2)$ гузаронда, ба кадом чоряк воқеъ аст.
А) I, II, III; В) II, III; Д) II, IV; Е) III, IV, I.
3. Координатҳои миёнаҷои порчаи AB -ро ёбед, ки нӯғҳояш дар нуктаҳои $A(-4; 0)$, $B(-4; 4)$ воқеъ аст.
А) $(-2; 0)$; В) $(0; 2)$; Д) $(2; -4)$; Е) $(-4; 2)$.
4. Координатаҳои миёнаҷои тарафи AC -и секунҷа, ки нӯғҳояш дар нуктаҳои $A(-2; 0)$, $B(0; 2)$, ва $C(2; 0)$ воқеъ аст, ёбед.
А) $(-1; 1)$; В) $(1; 0)$; Д) $(0; 0)$; Е) $(0; 1)$.
5. Векторҳои $\vec{a}(-3; 1)$ ва $\vec{b}(5; -6)$ дода шудааст. Координатаҳои вектори $\vec{c} = \vec{b} - 3\vec{a}$ -ро ёбед.
А) $(14; -9)$; В) $(4; -3)$; Д) $(14; -3)$; Е) $(9; 3)$.
6. Нуктаҳои $A(-3; 0)$ ва $B(-5; 4)$ дода шудааст. Координатаҳои вектори \vec{BA} -ро ёбед.
А) $(-8; -4)$; В) $(-8; 4)$; Д) $(2; -4)$; Е) $(8; -4)$.

Забони англисиро меомӯзем!



Муодилаи давра – circle equation

Муодилаи хати рост – straight-line equation

Векторҳои коллинеарӣ – collinear vectors

Дарозии вектор – vector length

Векторҳои баробар – equal vectors

Скаляр – scalar

Векторҳои муқобил – opposite vectors

Вектори воҳидӣ – unit vector

Ҳамсамт – equivalent



Маълумотҳои таърихӣ



Рене Декарт
(1596–1650)

1. Системаи координатаҳои росткунҷаро олими франсуз Рене Декарт ба фан дохил кардааст. Системаи координатии росткунҷаро баъзан системаи координатии Декартӣ низ мегӯянд.

Рене Декарт (1596–1650) – файласуф, математик, физик ва физиологӣ франсуз дар коллеҷи La-Flesh иеруит таълим гирифта, забонҳои юнонӣ ва лотинро омӯхтааст. Философияи Декарт бо математика, космогония ва физика вобаста аст. Математика, асосҳои геометрияи аналитикӣ, намудҳои системаи координатии росткунҷа бо номи y гуфта мешавад.

Декарт дар тараққиёти фалсафа ва фани асри XVII–XVIII саҳми босазое гузоштааст.

Дар асри XVII бо шарафи қори Декарт дар соҳаи математика инчунин дар соҳаи геометрии давраи такмилсозии координатаҳо, яъне методи координатаҳо ба вучуд омад. Номаълумҳо бо x , y , z . То имрӯз барои ишорати кунҷҳо ва коэффисиентҳо, дараҷаҳо ҳарфи лотинии a , b , c ва дараҷаҳои x^2 , y^2 , z^2 хизмати Декарт калон аст.

Ба математика, аз он ҷумла ба геометрия низ мафҳуми вектор ба қарибӣ дохил гардидааст. 2. Дар миёнаҳои асри XIX дар як вақт дар як қатор асарҳои математикҳо мафҳуми вектор дучор меояд. Истифодаи векторҳо дар ҳамворӣ бори аввал соли 1835 олими италиягӣ **Белливитис** (1803–1880) оғоз кардааст. Ғайр аз ин, **К. Гаусс** (1777–1855) соли 1831 дар асари «Назарияи муқоисаи биквадратӣ», **Ю. Арган** (1768–1822) ва **К. Вессел** (1745–1818) доир ба тасвири геометрии ададҳои комплексӣ мафҳуми векторро истифода кардааст. Ниҳоят, **В. Гамильтон** (1805–1865) ва **Р. Грассман** (1854–1901) амалҳои бо векторҳо иҷро кардаи худро дар асарҳои овардаанд. Бори аввал, Гамильтон фарқи бузургҳои векторӣ ва скаляро баён кардааст. Дар ҳамон қори Гамильтон мафҳумҳои «скаляр» ва «вектор» ба вучуд оварда шудааст. Мафҳуми «вектор»-ро Гамильтон аз калимаи *vehere* – «партофтан», «гузаронидан» гирифтааст (1845), вектор – «самт» аст.

Бори аввал Арган соли 1806 векторҳо бо ҳарфҳои дар болаш ақрабақдор ишора кардааст. Барои аввал ва охири векторро нишон додан онро дар шакли AB **А. Муобилис** (1790–1868) ишора кардааст. Грассман векторҳо «порча» ном дода, онро векторҳои воҳидии e_1 , e_2 нишон дода, дар шакли $x_1e_1 + x_2e_2$ тасвир кардани векторҳо тавсия кардааст.



БОБИ IV МАСОҲАТ



§ 9.

МАСОҲАТИ БИСЁРКУНЧА

45. МАФҲУМ ДАР БАРОИ МАСОҲАТ

1. Мафҳум дар барои масоҳат.

Масъалаи муайян кардани масоҳати шаклҳо таърихӣ дерина до-рад. Ин масъаларо фаъолияти амалии инсонҳо тақозо кардааст. Хар яки мо дар зиндагии рӯзмарра дар бораи масоҳат андаке тасаввурот дорем. Акнун ба муайян кардани мафҳум дар бораи сатҳ шакл ва ёфтани усулҳои ченкунии он машғул мешавем.

Агар шакли геометрии ба секунҷаҳои ҳамвори шумораашон охи-рок чудо кардан мумкин бошад, ин шаклро, *шакли содда* меноманд.


Мо секунҷаи ҳамвор гуфта, қисми бо секунҷа ихоташудаи ҳамво-риво меномем. Бисёркунҷаи барҷаста мисоли ин гуна фигураҳо ме-бошад. Бо ёрии ҳамаи диагоналҳои аз қуллаи дилхоҳи он баромада, онро ба секунҷаҳои бешумор тақсим кардан мумкин аст (расми 1, *а*).

Масоҳат – миқдори мусбат (бузургӣ) буда, қимати ададии он до-рои чунин хосиятҳост (аксиомаҳост):

Хосияти 1. Секунҷаҳои баробар дорои масоҳати баробаранд.

Хосияти 2. Агар бисёркунҷаи содда аз якчанд бисёркунҷаҳо ташкил ёфта бошад, он гоҳ масоҳати он ба суммаи масоҳатҳои ин бисёркунҷаҳо баробар мешавад.

Бисёркунҷаи F ҳамдигарро аз бисёркунҷаҳои ихотанашаванда таш-кил додааст гуфтан аст: 1) F ин аз суммаи бисёркунҷаҳо иборат аст ва 2) аз ин бисёркунҷаҳо ҳеҷ кадом дутоаш ба нуқтаҳои умумии до-хили соҳиб нест. Масалан, дар расми 1, *б* ва *в* бисёркунҷаҳои аз бисёркунҷаҳои ҳамдигарро ихотанакунанда сохта шуда тасвир ёфтааст.



Хосиятҳои 1 ва 2 масоҳати *асосии хосиятҳо* ном дорад.

2. Чен кардани масоҳат.

Чен кардани масоҳат ҳамчун мисли чен кардани порчаҳо барои воҳиди ченкунӣ қабул шуда ба муқоиса ва масоҳати шакл асоснок гардидааст. Қимати *ададии масоҳати* шакли дода шударо мегирем.

Масоҳат – яке аз миқдорҳои асосии математикии тавсифи шаклҳои ҳамвор мебошад. Дар ҳолати оддӣ масоҳат пуркунандаи шаклҳои ҳамвор воҳиди квадратҳо бо тарафҳо ба воҳиди дарозӣ баробар буда, шумораи квадратҳо чен карда мешавад.

Хосияти 3. *Масоҳати квадрате, ки тарафааш ба воҳиди ченаки як дарозӣ баробар аст, ба як баробар аст. Ҳаминтавр теоремаи зерин ҷой дорад.*

Теорема.

Масоҳати квадрати дарозии тарафааш a ба a^2 баробар аст.

Одатан, масоҳат бо ҳарфи латинии S ифода карда мешавад.

Пас барои квадрати

$S = a^2$ буда, воҳиди ченаки дарозӣ дар квадрат номида мешавад.

3. Шаклҳои баробарандоза.



Таъриф. *Агар яке аз ду бисёркунҷаҳо аз фигураҳои мутаносибан ба он, ки бисёркунҷаи дигар таркиб ёфтааст, монанд сохта шуда бошад, пас ин бисёркунҷаҳо **баробартаркиб** ном доранд.*

Агар ду бисёркунҷа масоҳати баробар дошта бошанд, онҳо **баробарандоза** ном доранд. Бисёркунҷаҳои дар расми 2 тасвирёфта баробарандозаанд.

Бисёркунҷаҳои баробар, баробарандозаанд (хосияти 1), аммо тасдиқи чаппаи он, дуруст нест: агар ду шакл баробарандоза бошанд, аз ин баробарии онҳо омада намебарояд.

Масъала. Дар давоми DC -и росткунҷаи $ABCD$ ба қуллаи C нисбат ба нуқтаи D нуқтаи симметрии E -ро интиҳоб мекунем (расми 3). Баробарии масоҳати секунҷаи ADE ва росткунҷаи $ABCD$ -ро исбот кунед.

Исбот. Бигзор F нуқтаи буриши тарафҳои AE ва BC бошад, секунҷаҳои ABF ва ECF баробаранд (аз рӯи катет ва кунҷи тез: $AB = EC$, $\angle BAF = \angle E$).



Дар натиҷа секунҷаи ADE ва трапетсияи $AFCD$ аз секунҷаи ECF , сохта шудааст росткунҷаи $ABCD$ бошад, бо ҳамон трапетсияи $AFCD$ бо ECF баробар буда, аз ABF сохта шудааст. Пас, секунҷаи ADE ва росткунҷаи $ABCD$ баробар сохта шудааст (яъне баробарандоза аст). Иббот кардани ин талаб карда шуда буд.

Аз сабаби бузургӣ буданаш, ба ҳам хосиятҳои бузургӣ соҳиб мешавад. онҳоро мисли бузургҳои якнамуда чамъ ва ба адади мусбӣ зарб задан мумкин. Барои дуто масоҳатро чамъ кардан ва ба адад зарб задан масоҳат ҳосил мешавад.

Дар амалиёт масоҳат ҳар гуна шакли мавҷуд бударо чен кардан ё ки ҳисоб намудан мумкин. Бештар барои муайян кардани масоҳатҳои гуногун аз формулаҳои истифода мебаранд. Масоҳати баъзе шаклҳоро барои баровардани формулаҳои масоҳатҳои баъзе шаклҳоро дар мавзӯҳои оянда машғул мешавад.




Савол, масъала ва супоришҳо



1. 1) Шакли содда чист?
- 2) Масоҳати шакл гуфта чиро мефаҳмед?
- 3) Хосиятҳои масоҳатро ифода кунед.
- 4) Чӣ гуна ду бисёркунчаро баробарсохт мегӯянд?
- 5) Шаклҳои баробарандоза чист?
2. Тарафҳои квадрат: 1) 1,3 см; 2) 0,15 дм; 3) 2,5 см; 4) 18 дм; 5) 2,5 дм. Масоҳати квадратро ёбед.
3. Масоҳати квадрат: 1) 16 дм²; 2) 144 см²; 3) 121 см²; 4) 49 мм²; 5) 196 см²; 6) 0,64 дм²; 7) 6,25 м². Тарафҳои квадратро ёбед.
4. Масоҳати квадратро ёбед, ки ба периметри росткунҷаи тарафҳояш 54 см ва 42 см баробар бошад.
5. Секунҷаҳои Q_1 ва Q_2 дар расми 4 буда, баробарандоза аст онро иббот кунед.
6. Масоҳати квадрат 36 см². Агар ҳамаи тарафҳои онро: 1) ду баробар дароз; 2) се маротиба кам; 3) 2 см дароз кунем, масоҳати он чӣ хел тағйир меёбад?

Намуна. Тарафи квадрати масоҳаташ 81 см² ба 1 см кӯтоҳ карда шавад, масоҳати он чӣ хел тағйир меёбад?

Ҳал. Тарафи квадрат $a = 9$ см. Тарафи квадрати нав $a_1 = a - 1 = 9 - 1 = 8$ (см). Онгоҳ $S_y = 8^2 = 64$ (см²). Тарафи квадрати додашуда 1 см кӯтоҳ карда шавад, масоҳати он $S - S_{ya} = 81 - 64 = 17$ (см²) кам мешавад.

Ҷавоб: 17 см² кам мешавад.





7. Аз ду росткунҷаи баробаргаркиб оё: 1) баробарии ин росткунҷаҳо; 2) баробарандозагии онҳо бармеояд?
8. 1) Агар ҳамаи тарафҳои квадрати n маротиба дароз кунем, масоҳати он чӣ гуна тағйир меёбад? 2) Ҳама тарафҳояшро k маротиба кӯтоҳ кунем-чӣ?
9. (Кори амалӣ) Ягон квадрат созад. Квадрати дуҷуми тарафаш аз он 2 маротиба калон бударо созад. Масоҳати квадрати дуҷум аз якумаш чанд маротиба калон аст.
10. Бигзор AD – асоси калони трапетсияи $ABCD$ бошад. Аз миёнаҳои тарафи CD нуқтаи P ва аз қуллаи B хати рости нури AD -ро дар нуқтаи F буранда гузаронида шудааст (расми 5). Иҷбот кунед, ки $S_{ABCD} = S_{ABF}$ аст.
Исбот. 1) $\triangle BCP = \triangle FDP$ – тарафҳо ва ду кунҷи ба он часпида ($CP = \dots - \dots$, $\angle BCP = \angle \dots - \dots$ ва ... тарафҳо ва ду кунҷи ба он часпида $\angle BPC = \angle \dots - \dots$ ва хатҳои рости параллелро буридани буранда ҳосилшуда кунҷҳо шуданаш) баробар, яъне $S_{BCP} = \dots$
 2) $S_{ABCD} = S_{ABPD} + \dots$, $S_{ADP} = S_{ABPD} + \dots$, бинобар ин $S_{ABCD} = \dots$
 Ба ҷои нуқтаҳо ҷавобҳои мувофиқро нависед.
11. Периметри квадрати ёбед, ки масоҳаташ ба: 1) $2,25 \text{ см}^2$; 2) $0,81 \text{ дм}^2$; 3) 289 мм^2 ; 4) $5,76 \text{ м}^2$; 5) 400 дм^2 баробар бошад.
12. Аз байни бисёркунҷаҳои дар расми 6 тасвирёфта баробарандозаашонро ёбед.
13. Майдони Ўзбекистон $448,9$ ҳазор км^2 . Тақрибаи 80% онро ҳамворӣ ташкил медиҳад. Қисми ҳамворӣ аз чанд ҳазор километри квадратӣ иборат аст?

Доништан Ҷойданок аст!



- S – аз калимаи латини «*super-facies*» гирифта шуда, маънои он «*самт*» мебошад.
- Қитъаҳо ҳудудҳои давлатҳо бо квадрат километри квадратӣ, масоҳати майдонҳо бо гектарҳо, масоҳати майдонҳои хурди замин ба (сотих) чен карда мешавад.



46 – 47. МАСОҲАТИ РОСТКУНЧА ВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

1. Масоҳати росткунча.

Шумо дар бораи баробар будани масоҳати росткунча ба ҳосили зарби дарозии тарафҳои он масъалаҳо ҳал кардед.

Акнун аз ҷиҳати назариявӣ дуруст будани ин амали иҷрошударо дида мебароем.

Теорема.

Масоҳати росткунҷаи тарафҳои a ва b бо формулаи

$$S = a \cdot b$$

ҳисоб карда мешавад.

Исбот. Росткунҷаи тарафҳои a ва b -ро мегирем, ки дар он a ва b – ададҳои ихтиёрии мусбат мебошанд. Исбот мекунем, ки $S = a \cdot b$ аст.

Барои исботи теорема квадрати тарафҳои $(a + b)$ месозем. Ин квадратро чун дар расми 1, a ба ҳиссаҳо ҷудо мекунем. Дар он дидан мумкин аст, ки масоҳати квадрат аз ду квадрати тарафҳои a ва b , ҳамчунин ду росткунҷаи тарафҳои a ва b ташкил ёфтааст.

Пас, масоҳати квадрати тарафҳои $(a + b)$ ба $S_1 + 2S + S_2$ баробар аст. Аз тарафи дигар аз рӯи аксиома дар бораи масоҳат ин масоҳат ба $(a + b)^2$ баробар аст,

$$S_1 + 2S + S_2 = (a + b)^2, \text{ яъне}$$

$$S_1 + 2S + S_2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Бармояд, ки $S_1 = a^2$, $S_2 = b^2$ аст.

$$S = a \cdot b$$


Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Нисбати тарафҳои росткунча ба нисбати 3:2 баробар буда, масоҳати он ба 150 см^2 аст. Периметри ин росткунчаро ёбед.

Ҳал. Тарафи хурди росткунча $b = 2x$ см бошад. Онгоҳ дарозии тарафи калони он ба $a = 3x$ см баробар мешавад. Аз формулаи ҳисоб кардани масоҳати секунҷа истифода бурда, муодила тартиб дода, онро ҳал мекунем: $S = 3x \cdot 2x$, яъне $S = 6x^2$.

Аз ин ҷо $x^2 = S : 6$, $x^2 = 150 : 6$, $x^2 = 25$, $x = 5$ (см).

Ва пас, тарафи хурди росткунча ба $b = 2 \cdot 5 = 10$ (см) ва тарафи калони он ба $a = 3 \cdot 5 = 15$ (см) баробар аст.




Акнун периметрро ҳисоб мекунем.

$$P = 2 \cdot (a+b) = 2 \cdot (15+10) = 2 \cdot 25 = 50 \text{ (см).}$$

Ҷавоб: $P = 50$ см.

Масъалаи 2. Катетҳои секунҷаи росткунҷа ба 12 см ва 24 см



баробар аст. Аз миёнаҳои гипотенуза ба катетҳои секунҷа перпендикуляр гузаронида шудааст. Масоҳати росткунҷаи ҳосил шударо ёбед.

Дода шудааст: Дар секунҷаи росткунҷаи $\triangle ABC$: $AO = OB$, $OE \perp AC$, $OF \perp CB$, $AC = 24$ см, $BC = 12$ см (расми 2).

Ёфтани лозим: S_{CEOF} .

Ҳал. Ба мо маълум аст, ки ду перпендикуляр ба як хати рост гузаронида шуда байни худ параллел мешавад.

Мувофиқи теоремаи Фалес:

$$AE = EC = 0,5AC = 0,5 \cdot 24 = 12 \text{ (см),}$$

$$CF = FB = 0,5BC = 0,5 \cdot 12 = 6 \text{ (см).}$$

Пас, $S_{CEOF} = CE \cdot CF = 12 \cdot 6 = 72 \text{ (см}^2\text{)}$. Ҷавоб: 72 см^2 .


2. Масоҳати параллелограмм. Тарафи дилхоҳи параллелограммро ҳамчун асоси он гирифтани мумкин аст, дар он ҳолат масофа аз ҳамин тараф то тарафи муқобил баландии он мешавад. Баландӣ ба тараф ё ки давоми тараф фароварда мешавад. Дар расми 3-юм BP ва CF – баландии параллелограмми $ABCD$ аст.

Теорема.

Масоҳати параллелограмм ба ҳосили зарби асос ва баландӣ баробар аст:

$$S = a \cdot h_a$$



Параллелограмми $ABCD$ -ро дида мебароем. Барои асоси ин параллелограмм тарафи $AD = a$ -ро мегирем, баландӣ ба h_a баробар аст (расми 3).



Исботи. $S = a \cdot h_a$ талаб карда мешавад. Исбот. Росткунҷаи $PBCF$ месозем, ки асоси параллелограмми он дар асоси BC ва баландиаш аз h_a иборат бошад.

ABP ва DCF (аз рӯи гипотенуза ва кунҷи тез: $AB=DC$ -гипотенуза, $\angle 1 = \angle 2$ - кучҳои мувофиқ).

Параллелограмми $ABCD$ аз трапетсияи $PBCD$ ва секунҷаи ABP ва росткунҷаи $PBCD$ бошад, аз секунҷаи DCF -и ба ҳамон трапетсияи $PBCD$ ва ABP баробар таркиб ёфтааст. Пас, параллелограмми $ABCD$ ва росткунҷаи $PBCF$ баробар андозаанд. Аз ин чунин натиҷа мебарояд. Масоҳати параллелограмми $ABCD$ ба масоҳати росткунҷаи $PBCF$, яъне ah_a баробар аст.



Ҳаминтавр, масоҳати S -и параллелограмми асосаш a ва баландии h_a ба он фароварда шуда, аз рӯи формулаи:

$$S = a \cdot h_a.$$

ҳисоб карда мешавад. Исбот ҳаминро талаб карда буд.

Натиҷаи 1. Агар ду параллелограмм дорои як асос ва баландиҳои баробар бошад, онҳо баробартаркибанд.

Дода шудааст: Параллелограммҳои $ABCD$, $AEFD$ ва $APQD$ ба як асоси $AD = a$ ва баландии (h_a) баробар (расми 4).

Исбот намудан лозим: параллелограммҳои $ABCD$, $AEFD$ ва $APQD$ баробар сохта шудаанд.

Исбот: Баробар таркиб ёфтани параллелограммҳои $ABCD$ ва $AEFD$ -ро исбот менамоем. Секунҷаҳои BAE ва CDF баробар чунки $BA = CD$ ва $AE = DF$ инчунин $\angle BAE = \angle CDF$ (тарафҳои мувофиқаш барои кунҷҳои параллел буданаш). Пас, параллелограмми $ABCD$ бо трапетсияи $AECD$ аз секунҷаи BAE , параллелограмми $AEFD$ бошад, бо трапетсияи $AECD$ ба секунҷаи BAE баробар буда, аз секунҷаи CDF сохта шудааст. Пас, $ABCD$ ва $AEFD$ параллелограммҳо баробар сохта шудааст. Ба ҳамин монанд, баробар таркиб ёфтани параллелограммҳо исбот карда мешавад.

Масъалаи 3: Тарафҳои параллелограмм ба 25 см ва 20 см, баландии ба тарафи яқум фароварда шуда 8 см аст. Баландии ба тарафи дуҷуми ин параллелограмм фароварда шударо ёбед.

Дода шудааст: Параллелограммҳои $ABCD$

$$AD = a = 25 \text{ см}, DC = b = 20 \text{ см}, h_a = 8 \text{ см (расм 5)}.$$

Ёфтани лозим: h_b .



Ҳал. Дар параллелограмми 1) $S = ah_a = 25 \cdot 8 = 200$ (см²).

2) $S = bh_b$, яъне $200 = 20 \cdot h_b$. Аз ин ҷо $h_b = 200 : 20 = 10$ (см).

Ҷавоб: 10 см.

Натиҷаи 2. Масоҳати параллелограмм ба ҳосили зарби ду тараф ва синуси кунҷи байни онҳо баробар аст. Инро исбот кунед.

Ҳал. Дар параллелограмми $ABCD$, $AD = a$, $AB = b$ ва $\angle BAD = \alpha$ бошад. Онгоҳ масоҳати параллелограмм бо формулаи $S = ab \sin \alpha$ ҳисоб карда мешавад. Ҳаминро исбот мекунем. Дар параллелограмми



$ABCD$ баландии BP мегузаронем ва онро бо $BP = h_a = h$ ишорат мекунем (расми 6), онгоҳ баландии h кунчи рости ABP секунҷаи дар муқобили кунчи тези α хобида катет мешавад. h -ро бо ҳосили зарби тарафи b ва синуси кунчи α ифода мекунем:

$$h = b \sin \alpha.$$

Дар формулаи ҳисоб кардани масоҳати параллелограмм $S = ah$ қимати h -ро гузашта ҳосил мекунем:

$$S = ab \sin \alpha.$$

Масъалаи 4. Дода шудааст: $ABCD$ параллелограмми $AD = 20$ см, $BD = 16$ см, $\angle BDA = 30^\circ$.

Ёфтаи лозим: S_{ABCD} .

Ҳал. Усули 1. 1) Дар параллелограмми додашуда баландии BP -ро мегузаронем ва секунҷаи BDP -ро дида мебароем (расми 7). Он росткунҷа аст, чунки $BP \perp AD$. Баландии BP -ро меёбем. Катети муқобили кунчи 30° буда, ба нисфи гипотенуза баробар аст. Бинобар ин $BP = 0,5BD = 0,5 \cdot 16 = 8$ (см).

2) Ҳаминтавр, масоҳати параллелограмми $ABCD$ ба

$$S = AD \cdot BP = 20 \cdot 8 = 160 \text{ (см}^2\text{)}$$

Усули 2. Аз секунҷи росткунҷаи BDP BP -ро BD (гипотенуза) ва $\angle BDP = 30^\circ$ ифода мекунем ва бо формулаи параллелограмм гузошта тарафи мо чустаро меёбем:



$$S = AD \cdot BP = AD \cdot BD \cdot \sin \angle BDP = 20 \cdot 16 \cdot \sin 30^\circ = 20 \cdot 16 \cdot 0,5 = 160 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ҷавоб: $S = 160 \text{ см}^2$.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Масоҳати росткунҷа ба чӣ баробар аст?
- 2) Асос ва баландии параллелограмм гуфта чиро мефаҳмед?
- 3) Масоҳати параллелограмм ду тарафи ҳамсояи он ва оиди кунчи байни онҳо чӣ хел ёфта мешавад?
- 2 Ду тарафи росткунҷа: 1) 30 см ва 2,9 см; 2) 34 дм ва 0,6 дм; 3) 2,5 дм ва 12 см. Масоҳати онро ёбед.
3. Як тарафи росткунҷа 15 дм, тарафи дуомаш бошад, аз он 5 маротиба калон. Периметр ва масоҳати ҳамин росткунҷаро ёбед.



4. Майдони баскетбол, ки масоҳаташ 240 м^2 мебошад. 15% -и майдони спортро ташкил медиҳад. Майдони спорт 32% ҳамаи майдони мактабро ташкил медиҳад. Масоҳати майдони мактабро ёбед.
5. Як тарафи росткунча 23 см . Тарафи дуюмаш аз он 17 см дароз аст. Масоҳат ва периметри росткунчаро ёбед.
6. Агар масоҳати росткунча 20 см^2 ва 1) дарозиаш ба 5 см , 2) дарозиаш 125% – и бараш, 3) яке аз тарафҳояш ба x баробар бошад, периметри он ба чӣ баробар мешавад?
7. Агар дар росткунҷаи $ABCD$: 1) $AB=9 \text{ см}$, $BC=4 \text{ см}$; 2) $AB:BC=5:7$, $P_{ABCD}=48 \text{ см}$ бошад, масоҳати онро ёбед.
8. Тарафи параллелограмм ба 16 см , баландии он ба фаровардашуда ба 9 см баробар. Тарафи квадрати ба ҳамин параллелограмм баробарандозаро ёбед.
9. a – асоси параллелограмм, h – баландӣ, S – масоҳат. Агар:
 - 1) $a=10 \text{ см}$, $h_a=0,5 \text{ м}$ бошад, S -ро;
 - 2) $h_a=4 \text{ см}$, $S=48 \text{ см}^2$ бошад, a -ро
 - 3) $a=24 \text{ см}$, $S=120 \text{ см}^2$ бошад, h_a -ро ёбед.
10. Параллелограмми баробарандозаи (расми 8)-ро ёбед.
11. Агар дар росткунча 1) асосаш 5 маротиба кам карда, баландиаш 8 маротиба дароз карда; 2) Асос ва баландиаш $2,5$ маротиба кам карда шавад, масоҳати он чӣ хел тағйир меёбад.
12. Масоҳати шакли дар расми 9 буда, S кадом қисми масоҳати параллелограммро ташкил медиҳад.
13. Ду тарафи росткунча: 1) 24 см ва 20 см ; 2) $3,5 \text{ дм}$ ва 8 см ; 3) 8 м ва $4,5 \text{ м}$; 4) $3,2 \text{ дм}$ ва $1,5 \text{ дм}$. Масоҳати онро ёбед.
14. 1) Масоҳати параллелограмм 36 см^2 , баландии он 3 см ва 4 см . Периметри параллелограммро ёбед.
15. Тарафҳои параллелограмм 20 см ва 28 см , кунҷи байни онҳо ба 30° баробар. Масоҳати параллелограммро бо ду усул ёбед.

48. МАСОҲАТИ СЕКУНЧА


Барои ёфтани формулаи ҳисоб кардани масоҳати секунча аз усули ба шакли параллелограмоварӣ истифода мебарем.

Теорема.

Масоҳати секунча ба нисфи ҳосили зарби асос ва баландии он баробар аст, яъне:

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a,$$

дар ин ҷо a – асоси секунча, h_a – баландии ба асос фаровардашуда.



Исбот. ABC -секунчаи дода шуда бошад (расми 1). Ин секунчаи $\triangle ABC$ -и дар расм бударо мо ба параллелограмм $ABCD$ (асосаш BC) табдил медиҳем. Секунчаҳои $\triangle BAC$ ва $\triangle DCA$ баробаранд, чунки диагоналҳои параллелограмм онҳоро ба ду секунчаи баробар ҷудо мекунад. Ва пас, масоҳатҳои ин секунчаҳо баробаранд. Бинобар ин масоҳати параллелограмми $ABCD$ ба масоҳати дучандаи секунчаи ABC баробар аст, яъне $2S = a \cdot h_a$.




Аз ин, $S = \frac{ah_a}{2}$ теорема исбот шуд.




Формулаи ҷен кардани масоҳати секунчаро бо тарзи дигар низ хондан мумкин аст: **масоҳати секунча ба ҳосили зарби хати миёна ва баландии он баробар аст** (расми 2):

$$S = \frac{a}{2} \cdot h_a$$

Натиҷаи 1. *Масоҳати секунчаи росткунҷа ба нисфи ҳосили зарби катетҳо баробар аст.* Чунки як катетро асос ва дуюмашро баландӣ карда гирифтани мумкин (расми 3).

Натиҷаи 2. *Нисбати масоҳати ду секунча ба нисбати асос ва баландии онҳо баробар аст* (расми 4).





Исбот. $\frac{S_{ABC}}{S_{A_1B_1C_1}} = \frac{0,5AC \cdot BD}{0,5A_1C_1 \cdot B_1D_1} = \frac{AC \cdot BD}{A_1C_1 \cdot B_1D_1}$.

Натиҷаи 3. Нисбати масоҳати ду секунҷаи асосҳои баробар ба нисбати баландии онҳо монанд аст (расми 5).

Исбот. $\frac{S_{ABC}}{S_{DBC}} = \frac{0,5a \cdot h_1}{0,5a \cdot h_2} = \frac{h_1}{h_2}$.

Натиҷаи 4. Нисбати масоҳати ду секунҷаи баландиҳои баробар ба нисбати асосҳои онҳо монанд аст (расми 6).

Исбот. $\frac{S_{ABC}}{S_{A_1BE}} = \frac{0,5 \cdot BC \cdot h}{0,5 \cdot BE \cdot h} = \frac{BC}{BE} = \frac{a}{a_1}$, аз ин $BC = a$, $BE = a_1$.

Натиҷаи 5. Секунҷаҳои асосҳо ва баландиҳои баробар, баробарандоза мебошанд (расми 7).

Исбот. $S_{BAC} = S_{BDC} = S_{BEC} = 0,5ah_a$.

Натиҷаи 6. Масоҳати секунҷа ба ҳосили зарби ду тараф ва синуси кунҷи байни онҳо баробар аст (расми 8).

Исбот. Бигзор ABC тарафи секунҷаҳо бошад, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ бошад, онгоҳ $S = \frac{1}{2}bc\sin A$ -ро исбот мекунем. Барои он ба секунҷаи ABC баландии $BD = h_b$ мегузаронем (расми 8). h_b -ро бо тарафи c ва синуси кунҷи A ифода мекунем: $h_b = c \sin A$. Ба формулаи масоҳати секунҷа $S = \frac{1}{2}bh_b$ қимати h_b -ро гузошта ҳосил мекунем:


$$S = \frac{1}{2}bc\sin A.$$

Формулаҳои масоҳати секунҷаро аз тарафҳои a ва b ва синуси кунҷи C , тарафҳои a , c ва синуси кунҷи B низ ба ҳамин монанд ҳосил мекунанд.

Ҳаминтавр, масоҳати секунҷа аз рӯй ду тараф ва синуси кунҷи байни онҳо бо ёрии формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$S = \frac{1}{2}absinC = \frac{1}{2}acsinB = \frac{1}{2}bcsinA.$$

Формулаи масоҳати секунҷаро бо воситаи тарафҳо аз тарафи олимпиадон Герон, ки дар асри I зиндагӣ кардааст, дохил карда шуда, он формулаи **Герон** ном дорад.



Ҳангоми маълум будани сетафаи секунча аз формулаи Герон истифода бурда, масоҳати секунча ёфта мешавад. Масоҳати секунча ба нисфи ҳосили зарби асос ва баландӣ баробар аст.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c.$$


Ба ҷои баландӣ бо воситаи тарафҳои секунчаи он ифодаи:

$$h_a = \frac{2}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \beta=90^\circ, \quad h_b = \frac{2}{b} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{ва}$$

$$h_c = \frac{2}{c} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

гузошта, онро содда карда формулаи зерини Геронро ҳосил мекунем:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad \text{аз ин } p = \frac{a+b+c}{2}.$$



Масъалаи 1. Медианаи секунча ба дуто секунчаи барбарандоза ҷудо кардани онро исбот кунед.

Исбот. BD -медианаи секунчаи ABC бошад (расми 9). Секунчаҳои ABD ва CBD баробар буда, ба тарафҳои AD ва DC , инчунин ба баландии умумии BP соҳиб аст, яъне секунчаҳо аз рӯи натиҷаи 5 баробарандозанд:

$$S_{ABD} = S_{CBD}.$$


Масъалаи 2. Дода шудааст секунчаи $ABCD$, $AC=20$ см, $BP=12$ см, $BP \perp AC$ (расми 10).

Ёфтан лозим: S_{ABCD} .

Ҳал. 1) $S_{ABC} = 0,5AC \cdot BP = 0,5 \cdot 20 \cdot 12 = 120$ (см²).

2) $S_{ABCD} = 2 \cdot S_{ABC} = 2 \cdot 120 = 240$ (см²).

Ҷавоб: $S_{ABCD} = 240$ см².



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Масоҳати секунча ба чӣ баробар аст?
 - 2) Масоҳати секунчаи росткунча чӣ хел ҳисоб карда мешавад?
 - 3) Вобаста ба тарафҳо масоҳати секунча чӣ хел ҳисоб карда мешавад.
2. Катетҳои секунчаи росткунча: 1) 4 см ва 7 см; 2) 1,2 дм ва 25 см. Масоҳати секунчаи росткунчаро ёбед.
 3. Асоси як секунча 20 см, баландиаш 8 см. Асоси секунчаи дуюм 40 см. Барои баробар шудани секунчаҳо, баландии секунчаҳо чӣ гуна бояд бошад?

4. Дар секунҷаи ABC $AB = 5AC$. Нисбати баландии аз қуллаҳои B ва C гузаронидашуда ба чанд баробар?
5. a – асоси секунҷа, h – баландии ба асос гузаронидашуда, S – масоҳати секунҷа. Миқдори номаълумро ёбед.


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------|-------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|
| a | 69 см | 0,8 дм | ? | 0,25 м | ? | 0,9 м |
| h_a | 0,5 м | ? | 20 дм | 100 см | 4,8 см | ? |
| S | ? | 4 см ² | 2000 см ² | ? | 9,6 мм ² | 36 дм ² |

6. Ҳосили зарби катетҳо (a ва b) бо гипотенуза (c) ба ҳосили зарби баландии (h_c) аз қуллаи кунҷи рост ба гипотенуза фароварда шуда баробар аст (расми 11).



Ҳал. Агар яке аз катетҳоро ҳамчун асос қабул кунем, онгоҳ дуҷуми баландӣ мешавад ҳаминтавр, масоҳати секунҷаи росткунҷа ба нисфи ҳосили зарб баробар аст:

$$S = \frac{1}{2}ab, \text{ аз ин } ab = 2S; S = \frac{1}{2}ch_c, \text{ аз ин } ch_c = 2S.$$

Пас, $ab = ch_c$ аст, исботи он талаб карда шуда буд. Катетҳои секунҷа: 1) 12 см ва 16 см; 2) 5 см ва 12 см баробар аст (мувофиқи теоремаи Пифагор) c ва h_c ($ab = ch_c$)-ро ёбед.



7. Секунҷаҳои баробарандозаро аз расми 12 нишон диҳед ҷавобашро асоснок кунед.
8. Масоҳати секунҷаи тарафҳояш баробарро ёбед: 1) 39 см, 42 см, 45 см; 2) 35 см, 29 см, 8 см; 3) 20 см, 20 см, 32 см.
9. Масоҳати шакли дар расми 13 буда S , кадом қисми масоҳати параллелограмро ташкил медиҳад.
10. Масоҳати секунҷа ба 150 см^2 баробар аст. Баландии секунҷаҳо ба 15 см, 12 см ва 20 см баробар бошад, периметри онро ёбед.
11. Ду тарафи секунҷа 5 дм ва 6 дм, кунҷи байни онҳо 30° . Масоҳати секунҷаро ёбед. Масъаларо бо ду усул ҳал кунед.



49–50. МАСОҲАТИ РОМБ ВА ТРАПЕТСИЯ

1. Масоҳати ромб. Ромб – параллелограмми тарафҳояш баробар мебошад. Масоҳати ромби тарафаш a ва баландиаш h_a бо формулаи

$$S = ah_a$$

ҳисоб карда мешавад.

Ба мо малум аст, ки ҳамаи баландиҳои ромб байни худ баробаранд. Ба ғайр аз ин масоҳати ромбро бо ёрии диагоналҳо низ ҳисоб кардан мумкин.

Теорема.

Масоҳати ромб ба нисфи ҳосили зарби диагоналҳо баробар аст:

$$S = \frac{1}{2}d_1 \cdot d_2,$$

дар ин d_1 ва d_2 — диагонали ромб аст.



Исбот. Ба мо маълум аст, ки диагонали AC -и ромб онро ба ду секунҷаи баробарпахлӯи баробар ҷудо мекунад (расми 1). Диагонали дуҷум бошад, ба диагонали яқум перпендикуляр буда, ба суммаи баландиҳои секунҷаҳои ҳосилшуда баробар мешавад. Барои ҳамин ҳам масоҳати ромб:

$$\begin{aligned} S &= S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{ADC} = \frac{1}{2}AC \cdot BO + \frac{1}{2}AC \cdot DO = \frac{1}{2}AC \cdot (BO + DO) = \\ &= \frac{1}{2}AC \cdot \underline{BD} = \frac{1}{2}\underline{d_1} \cdot \underline{d_2}. \end{aligned}$$

Яъне, $S = \frac{1}{2}d_1 \cdot d_2$. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Тарафи ромби $ABCD$ ба a баробар аст, кунҷи тезаш ба α . Масоҳати ҳамин ромбро ёбед. Ҳангоми $\alpha=30^\circ$ масоҳати онро ёбед.

Ҳал. 1) Дар ромби $ABCD$ $AB=BC=CD=AD=a$, $\angle A=\alpha$ бошад. $BP \perp AD$ -ро (расми 2) мегузаронем. Онгоҳ баландии h_a катети муқобили кунҷи тези секунҷаи ABP мебошад. h_a -ро бо синуси кунҷи α ифода мекунем $h_a = a \sin \alpha$. Ба формулаи ҳисоб кардани масоҳати ромб ба $S = ah_a$ ин ифодаи h_a α -ро гузошта ин формуларо ҳосил мекунем $S = a^2 \sin \alpha$.



2) Масоҳати ромбро аз формулаи $S = a^2 \sin \alpha$ истифода бурда меёбем:

$$S = a^2 \sin 30^\circ = a^2 \cdot 0,5 = 0,5a^2 \text{ (воҳ кв)}. \text{ Ҷавоб: } S = 0,5a^2 \text{ (кв)}.$$

Масъалаи 2. Яке аз диагоналҳои ромб аз дуюмаш 1,5 маротиба калон, масоҳати ромб ба 27 см^2 баробар аст. Диагоналҳои ин ромбро ёбед.

Дода шудааст: $ABCD$ – ромб; $S_{ABCD} = 27 \text{ см}^2$; $AC = 1,5BD$ (ба расми 1 ниг.). *Ёфтан лозим:* AC , BD .

Ҳал. Бигзор $BD = x$ см бошад, онгоҳ $AC = 1,5x$ мешавад.

$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD$, ба ин аломатхоро мегузорем: $27 = \frac{1}{2} \cdot 1,5x \cdot x$. Дар он ҳолат $x^2 = 36$ см мешавад., аз ин $x = 6$ (см). Ҳаминтавр $BD = 6$ см ва $AC = 1,5 \cdot 6 = 9$ (см) баробар аст. *Ҷавоб:* 9 см, 6 см.

2. Масоҳати трапетсия. Маълум аст, ки бо роҳи гузаронидани диагоналҳо ҳар гуна бисёркунҷоро ба секунҷаҳо ҷудо кардан мумкин аст. Барои ҳисоб кардани масоҳати бисёркунҷаи ихтиёрӣ онро аввал ба секунҷаҳо ҷудо мекунем. Сипас, масоҳати секунҷаҳо ҳисоб карда мешавад. Масоҳати секунҷаҳо ба суммаи масоҳати секунҷаҳои онро ташкил додан ҳамдигарро напӯшонанда баробар мешавад. Дар ҳисоб кардани масоҳати параллелограмм ва трапетсия аз ҳамин усулҳо истифода мебарем.

Теорема.


Масоҳати трапетсия ба нисфи суммаи асосҳои он ва ҳосили зарби баландӣ баробар аст, яъне:

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h,$$

дар ин a ва b – асосҳои трапетсия, h – баландии трапетсия.

Исбот. Асосаш $AD = a$, $BC = b$ ва баландиаш $CE = h$ ($CE \perp AD$) буда, трапетсияи $ABCD$ -ро дида мебароем (расми 3). Дар трапетсия диагонали AC -ро мегузаронем. Трапетсияи $ABCD$ ба секунҷаҳои ABC ва ACD ҷудо мешавад. Масоҳати трапетсия ба суммаи масоҳати ин секунҷаҳо баробар аст.

Аз он сабаб, ки масофаи байни хатҳои ростии параллел тағйирнаёбанда аст, баландии секунҷаҳои ABC ва ACD баробаранд.



$$\text{Аз ин, } S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot CE = \frac{1}{2} b \cdot h \quad \text{ва} \quad S_{ACD} = \frac{1}{2} AD \cdot CE = \frac{1}{2} a \cdot h.$$

Масоҳати трапетсия $S = S_{ABC} + S_{ACD}$, яъне

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h + \frac{1}{2} b \cdot h \quad \text{ё ки} \quad S = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

Теорема исбот шуд.

Натиҷа: Масоҳати трапетсия ба ҳосили зарби хати миёна ва баландии он баробар аст.

Ин натиҷа аз баробарии хати миёнаи секунҷа аз ним суммаи асосҳои трапетсия бармеояд.

Масъалаи-3. Асосҳои трапетсия ба 15 см ва 30 см баробар аст, масоҳаташ бошад, ба 225 см² баробар аст. Баландии ин трапетсияро ёбед.

Ҳал. Хати миёнаи трапетсия ба:

$$\frac{a+b}{2} = \frac{15+30}{2} = \frac{45}{2} = 22,5 \text{ (см).}$$

баробар аст. Пас, баландии трапетсия ба:

$$h = S_{mp.} : \frac{a+b}{2} = 225 : 22,5 = 10 \text{ (см).}$$

баробар аст. Ҷавоб: $h=10$ см.

Масъалаи 4. Исбот кунед, ки хати ростии аз миёнаҳои миёнаи хати миёнаи трапетсия гузашта асосҳои онро бурида ин трапетсияро ба дуто ҳиссаи баробарандоза ҷудо мекунад.

Исбот. $ABCD$ -трапетсияи додашуда ($AD \parallel BC$). EF -хати миёна MN -хати ростии аз миёнаҳои нуқтаи O -и хати миёна гузашта асосҳоро дар нуқтаи M ва N мебурад (расми 4).

Трапетсияҳои $ABMN$ ва $MNDC$ байни худ баробар буда, ба хати миёнаи EO ва OF инчунин ба баландии ба трапетсияи додашудаи баландӣ баробар аст. Пас, масоҳати ин трапетсияҳо баробар, яъне онҳо баробарандозаанд: $S_{ABMN} = S_{MNDC}$. Ҳаминро исбот кардан талаб карда шуда буд.

Масъалаи 5. Агар диагоналҳои трапетсияи баробарпахлӯ байни худ перпендикуляр бошад, онгоҳ баландии трапетсия ба хати миёнаи он, масоҳаташ бошад, ба квадрати баландӣ баробар мешавад. Инро исбот кунед.

Дода шудааст: $ABCD$ -трапетсияи баробарпахлӯ ($AB = DC$), $AC \perp BD$, $AD = a$, $BC = b$ бошад (расми 5).



Исбот кардан лозим:

$$1) h = \frac{a+b}{2}; \quad 2) S_{mp.} = h^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

Ҳал. 1) $\triangle AOD$ – баробарпахлӯ ва секунҷаи росткунҷаи, инро $\angle ADO = 45^\circ$.

2) Аз қуллаи B $BP \perp AD$ -ро мегузаронем. Секунҷаи ҳосилшудаи BPD ҳам баробарпахлӯ ва росткунҷа аст. Чунки $\angle ADO = 45^\circ$ ва пас $\angle PBD = 45^\circ$.

Аз ин ҷо: $DP = BP$. Ба мо маълумки аз рӯи хосияти баландии аз қуллаи асоси хурди трапетсияи баробарпахлӯ гузаронида шуда:



$$BP = DP = \frac{a+b}{2}$$

$$3) S_{mp.} = \frac{a+b}{2} \cdot h = h \cdot h = h^2 \text{ ё ки } S_{mp.} = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{a+b}{2} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

Ҳаминтавр диагоналҳои трапетсия байни ҳам перпендикуляр бошад, баландии он ба хати миёна масоҳаташ ба квадрати баланандӣ баробар аст: Пурра исбот шуд.

Савол, масъала ва суноришҳо

1. 1) Масоҳати ромб аз рӯи тараф ва баландиаш чӣ хел ёфта мешавад?
- 2) Масоҳати ромб бо ёрии диагоналҳо чӣ хел ёфта мешавад. Онро ифода кунед.
- 3) Масоҳати трапетсия чист?

2. Масоҳати ромб 40 см², баландиаш бошад, ба 5 см баробар аст.

Периметри ин ромбро ёбед.

3. Агар баландии ромб: 1) 16 см, кунҷи тезаш бошад, ба 30°; 2) тарафаш 1,8 дм, кунҷи тезаш ба 30° баробар бошад, масоҳати онро ёбед.

4. Масоҳати ромб 60 см², яке аз диагоналҳояш ба 10 см баробар аст. Диагонали ҳамин ромбро ёбед.

5. Масоҳати ромб 30 см², периметраш бошад, ба 24 см баробар аст. Баландии ин ромбро ёбед.

6. Дода шудааст: $ABCD$ – ромб $\angle BAD = 60^\circ$, $BP \perp AD$, $BP = 12$ см (расми 6).

Ёфтани лозим: S .

Ҳал. Секунҷаи росткунҷаи BPA -ро дида мебароем. Мувофиқи таърифи синуси кунҷи тез: $\sin A = \frac{BP}{AB}$ дар он


дода шудахоро гузошта, AB -ро меёбем:

$$\sin A = \frac{BP}{AB} \Rightarrow AB = \frac{BP}{\sin A} = \frac{12}{\sin 60^\circ} = 12 : \frac{\sqrt{3}}{2} = 12 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{24}{\sqrt{3}} \text{ (см)}.$$

Мувофиқи формулаи ёфтани масоҳати ромб аз рӯи тараф ва кунҷи тезаш $AB = a = \frac{24}{\sqrt{3}}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ қимматҳояшро гузошта, ҳосил мекунем:


$$S = a^2 \cdot \sin 60^\circ = \left(\frac{24}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{576}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 96\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}. \quad \text{Ҷавоб: } 96\sqrt{3} \text{ см}^2.$$

7. Масоҳати ромби диагоналҳояш ба: 1) 1,5 дм ва 1,8 дм; 2) 24 см ва 15 см; 3) 3,2 см ва 0,5 дм баробарро ёбед.



8. 1) Асосҳои трапетсия ба 11 ва 18 см баробар, баландиаш ба 6 см. Масоҳати ин трапетсияро ёбед.
 2) Асоси трапетсия 26 см, баландиаш 10 см, масоҳаташ бошад, 200 см^2 . Асоси дуими ҳамин трапетсияро ёбед.




9. Дар трапетсияи росткунҷаи $ABCD$ $AB=BC=18 \text{ см}$, $\angle D=45^\circ$ (расми 7). Масоҳати трапетсияро ёбед. Ба ҷойҳои холи ҷавобҳои мувофиқро нависед.
 Ҳал. $CF \perp AD$ -ро мегузаронем. 1) $ABCF$ -квадрат, чунки $ABCF$ тарафҳои ҳамсоияи чоркунҷа AB ба ... , барои ҳамин $AF=CF=...$ (см).



- 2) $\angle CFD$ – росткунҷа, аз рӯи сохт $\angle F=90^\circ$ ва аз рӯи шарт $\angle D=45^\circ$, барои ҳамин $\angle DCF = ...^\circ$ ва пас, $\angle CFD = ...$ ва $DF=...=...$ (см).
 3) $AD=AF+...=...+...=...$ (см) ва $S_{ABCD}=... \cdot ...=... \cdot ...=...$ (см²).

Ҷавоб: ... см².

10. Нисбати кунҷҳои ромб ба 1:5, аст, тарафаш бошад, ба a баробар аст. Масоҳати ин ромбро ёбед.
 11. Дар трапетсияи $ABCD$: $AD = 20\sqrt{2}$ см, $BC = 10\sqrt{2}$ см, $AC=24$ см, $\angle CAD=45^\circ$ (расми 8). Масоҳати трапетсияро ёбед.
 12. Ромби диагоналҳояш ба: 1) 3,5 дм ва 1,4 дм; 2) 28 см ва 17 см; 3) 4,2 см ва 1,5 дм баробар аст. Масоҳати ин ромбро ёбед.
 13. Диагоналҳои трапетсияи баробарпахлӯ байни худ перпендикуляр ва баландиаш ба 5 см баробар. Масоҳати трапетсияро ёбед.
 14. Чуқурии шакли трапетсияи баробарпахлӯ дода шудааст. Масоҳати буриши кӯндалангии чуқуриро ёбед (расми 9).
 15. Асосҳои трапетсия 16 см ва 12 см. Масофаи аз буриши нуқтаҳои диагонал то асосаш буда, 6 см ва 4 см баробар аст (расми 10). Масоҳати ҳамин трапетсияро ёбед.



51. МАСОҲАТИ БИСЁРКУНҶА

Барои ҳисоб кардани масоҳати бисёркунҷа онҳоро ба секунҷаҳои байни худ бурида-нашаванда, яъне дорoi нуқтаҳои умумии дохилӣ набуда тақсим кардан ва суммаи масоҳати онҳоро ёфтан мумкин аст. Барои ба секунҷаҳо чудо кардани бисёркунҷаҳои барҷаста, масалан аз як қуллаи он диагоналҳо гузаронидан мумкин аст (расми 1, *a*). Баъзан аз ҷудокуниҳои дигар низ истифода кардан қулай аст (расми 1, *б*).

Масъалаи 1. Дар бисёркунҷаи $ABCDE$ маълум аст, ки $BD \parallel AE$, $CP \perp AE$ (расми 2). Исбот кунед, ки $S_{ABCDE} = 0,5(BD \cdot CP + AE \cdot OP)$ аст.

Исбот. Аз трапетсия ва секунҷаҳо ташкил ёфтани шакли додасударо муайян кардан мумкин нест. Аз хосияти масоҳат бармеояд, ки:

$$\begin{aligned} S_{ABCDE} &= S_{BCD} + S_{ABDE} = 0,5BD \cdot CO + 0,5(AE + BD) \cdot OP = \\ &= 0,5(\underline{BD} \cdot \underline{CO} + AE \cdot OP + \underline{BD} \cdot \underline{OP}) = 0,5(BD \cdot (CO + P) + \\ &\quad + AE \cdot OP) = 0,5(BD \cdot CP + AE \cdot OP). \end{aligned}$$




$$S_{ABCDE} = 0,5(BD \cdot CP + AE \cdot OP).$$



Масъалаи 2. AC ва BD диагоналҳои чоркунҷаи $ABCD$, O – нуқтаи буриши диагоналҳо (расми 3). Агар $S_{AOB} = S_1$, $S_{BOC} = S_2$, $S_{COD} = S_3$ ва $S_{AOD} = S_4$ бошад, $S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$ буданаширо исбот кунед.

Исбот. 1) $AE \perp BD$ ва $CF \perp BD$ -ро мегузаронем.

$$2) \frac{S_1}{S_4} = \frac{0,5OB \cdot AE}{0,5OD \cdot AE} = \frac{OB}{OD} \quad (1) \quad \text{ва} \quad \frac{S_2}{S_3} = \frac{0,5OB \cdot CF}{0,5OD \cdot CF} = \frac{OB}{OD} \quad (2).$$

$$3) (1) \text{ ва } (2) \text{ аз меёбем: } \frac{S_1}{S_4} = \frac{S_2}{S_3} \Rightarrow S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4.$$





Масъалаи 3. BC ва AD – $ABCD$ асосҳои трапетсияи, O – AC ва BD нуқтаи буриши диагоналҳои (расми 4). $AD = a$, $BC = b$ зеринро исбот кунед.

$S_{AOB} = S_1$, $S_{BOC} = S_2$, $S_{COD} = S_3$ ва $S_{AOD} = S_4$ бошад, баробариҳои зеринро исбот кунед:

$$1) S_1 = S_3 = \sqrt{S_2 \cdot S_4}; \quad 2) S_{тр.} = (\sqrt{S_2} + \sqrt{S_4})^2.$$

Исбот. 1) $S_{ABC} = S_{DBC} = \frac{1}{2}bh \Rightarrow S_1 + S_2 = S_3 + S_2 \Rightarrow S_1 = S_3$.

2) Ба мо $S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$ маълум. $S_1 = S_3$ -ро ба назар гирем, $S_1 = S_3 = \sqrt{S_2 \cdot S_4}$ ҳосил мешавад. Қисим якуми масъала исбот шуд.

3) Масоҳати трапетсия ба ҳосили ҷамъи чорто масоҳати натиҷаҳои баландро ба эътибор гирифта ба ин соҳиб мешавем.

$$S_{тр.} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = S_2 + 2S_1 + S_4 = (\sqrt{S_2})^2 + 2\sqrt{S_2 \cdot S_4} + (\sqrt{S_4})^2 = (\sqrt{S_2} + \sqrt{S_4})^2.$$

Пас, $S_{тр.} = (\sqrt{S_2} + \sqrt{S_4})^2$. Қисми дууми масъала низ исбот шуд.

Масъалаи 4. Масоҳати секунҷаи бо параллелограмм бо асос ва баландии умумӣ соҳиб буда ба нисфи масоҳати параллелограмм баробар аст.

Исбот. AD асос ва h баландӣ $ABCD$ параллелограмм бо секунҷаи APD низ умумӣ (расми 5). $S_{APD} = 0,5S_{ABCD}$ буданаширо исбот мекунем.

$S_{ABCD} = ah$ (1) ва $S_{APD} = 0,5ah$ (2) буданаши маълум (2) ба ҷойи баробарии (1) ah S_{ABCD} -ро гузошта меёбем: $S_{APD} = 0,5ah = 0,5S_{ABCD}$.


Дар хотир доред! Масъалаи болоиро чунин низ хондан мумкин: масоҳати параллелограмм бо секунҷа асос ва баландии умумӣ дошта, аз масоҳати параллелограмм ва масоҳати секунҷа ду маротиба калон аст.

Масъалаи 5. Бо воситаи қуллаҳои чоркунҷаи барҷаста ба диагоналҳои он хатҳои ростии параллел гузаронанд, онгоҳ масоҳати параллелограмми ҳосилшуда ва масоҳати чоркунҷа ду маротиба калон мешавад. Онро исбот кунед.

Исбот. $ABCD$ – чоркунҷаи барҷаста, O – нуқтаи буриши диагоналҳои AC ва BD , h_1 ва h_2 бошад аз қуллаҳои B ва D – и чоркунҷа ба қуллаи AC – диагонали гузаронида шуда, мебошад.

$EFPQ$ ба воситаи параллелограмми дар натиҷаи буриши хати рост ва диагоналҳои аз қуллаҳои параллелограми ҳосилшуда (расми 6). $S_{EFPQ} = 2S_{ABCD}$ буданастро исбот мекунем. Мувофиқи сохтани тарафҳои, параллелограмм тарафҳои EF ва QP ба диагонали AC параллел ва баробар аст. Бинобар ин, диагонали AC параллелограмми ҳосил шудаи $EFPQ$ -ро ба дуто – $AEFC$ ва $ACPQ$ ҷудо мекунад. Аз хулосаҳои болои истифода бурда, баробарии $S_{EFPQ} = 2S_{ABCD}$ -ро исбот мекунем:

$$S_{EFPQ} = S_{AEFC} + S_{ACPQ} = 2S_{ABC} + 2S_{ADC} = 2(S_{ABC} + S_{ADC}) = 2S_{ABCD}, \text{ яъне } S_{EFPQ} = 2S_{AB-}$$



Савол, масъала ва супоришҳо

1. Масоҳати шакли дар расми 7 бударо ёбед.

Ҳал: Масоҳати шакли дар расм тасвир шударо бо нуктаҳои A ва B пайваст намуда, онро то квадрат пурра намуда ёфтан қулай аст. Масоҳати шакли ҳосилшуда ба фарқи масоҳатҳои квадрати ҳосилшуда ва секунҷаи ABC баробар аст:

$$S = S_{\text{кв.}} - S_{ABC} = \dots^2 - 0,5 \cdot (50 - 2 \cdot 10) \cdot \dots = \dots - 375 = \dots \text{ (воҳ. кв.)}$$

Ба ҷои нуктаҳо ҷавобҳои мувофиқро гузоред.




Ҷавоб: ... (воҳ.кв).

2. Барои ҳисоб кардани масоҳати шакли дар расми 8 тасвирёфта формула оред. Дар ин $AE \parallel BC \parallel PD$, $AE = BC$, $AP = PB$, $PD \perp AB$.
3. Дода шудааст: Дар росткунҷаи $ABCD$, $AB = 12$ см, $AD = 16$ см; E , F , P ва Q нуктаҳои миёнаи тарафҳои мувофиқ. Ёфтан лозим:

S_{EFCPQA} -ро ёбед.

4. Дода шудааст: параллелограмми $ABCD$, $P \in BD$, $KL \parallel BC$, $MN \parallel AB$ (расми 9). Бояд исбот кард, ки: $S_{AKPN} = S_{PMCL}$.
5. AC ва BD диагоналҳои чоркунҷаи $ABCD$. O – нуктаи буриши онҳо. $S_{AOD} = 12$, $S_{BOC} = 8$, $S_{AOB} = 6$. S_{COD} -ро ёбед.

6. Масоҳати майдони замини росткунҷашакл 400 га. Агар: 1) қадим майдон 10 км бошад; 2) майдон дар шакли квадрат бошад, периметри он чӣ хел мешавад?



52. ТАТБИҚ ВА МАШҚИ АМАЛӢ

I. Масъалаҳо барои тадқиқот.

Масъалаи 1. Масъалаи росткунҷаи тарафҳояш адади натуралӣ ва периметраш ба 4 қаратиро дида мебароем. Масоҳати аз ҷама калондоштаи, периметраш ба 72 см баробар ва тарафҳояш ба адади натуралӣ баробар бударо ёбед. Он чӣ хел шакл аст? Хулоса бароред.

Ҳал. Дар росткунҷа: $P=2 \cdot (a+b)=72$ см – периметр, $p=a+b=36$ см ним – периметр, яъне суммаи тарафҳои ҳамсоя. Баъди маълум гардидани қиматҳои a ва b пас аз маълум шудан $S=a \cdot b$ -ро ҳисоб мекунем. Барои ба шартҳои масъала ҷавоб додан тарафҳои ҳамсояи росткунҷаро меёбем.

Барои он 36 – ро ба намуни ҳосили ҷамъи ду адади натуралӣ ифода менамоем:

$$a+b=36=1+35=2+34=3+33=\dots=33+3=34+2=35+1.$$

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки 35-то росткунҷаи суммаи тарафҳояш ба 36 см баробар буда мавҷуд аст. Маълумотҳоро ба ҷадвал гузошта, онро таҳлил намуда, хулоса менамоем: Аз ҷадвал маълум аст, ки ба масоҳати аз ҷама хурд:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| a см | 1 | 2 | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | 34 | 35 |
| b см | 35 | 34 | ... | 19 | 18 | 17 | 16 | ... | 2 | 1 |
| $(a+b)$ см | 36 | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 | ... | 36 | 36 |
| $S=a \cdot b$ см ² | 35 | 68 | ... | 323 | 324 | 323 | 320 | ... | 68 | 35 |

$a=1$ см ва $b=35$ см ё ки $a=35$ см ё ки $b=1$ см бошад, масоҳати аз ҷама калон $a=b=18$ см квадрати тарафаш 18 см буда мувофиқ аст периметри росткунҷаҳои боқимонда 72 см бошад, аммо масоҳаташ аз $18 \cdot 18=324$ (см²) хурд аст аз рӯи таҳлили ҷадвал ба хулосаи зерин меоем.


Хулосаи 1. Агар тарафҳои росткунҷаи ададҳои натуралӣ ва периметраш ба 4 қаратӣ бошад, масоҳати аз ҷама калон аз рӯи формулаи зерин ёфта мешавад:

$$S_{\max} = \left(\frac{P}{4}\right)^2 \text{ воҳ. кв.}$$

Хулосаи 2. Агар тарафҳои росткунҷа, ададҳои натуралӣ ва периметраш ба 2 қаратӣ бошад, онгоҳ аз байни ҷамаи росткунҷаҳои периметрҳояшон баробар яке аз тарафҳояш ба 1 тарафи дуҷумлаш бошад, дар ҳолати 1 – ро ба ним периметр пуркунанда адад буданаш ба қимати аз ҷама хурди масоҳат соҳиб мешавад.

Хулосаи 3. Дарозии тарафҳои ҳамсояи росткунҷа ба якдигар чӣ қадар наздик шавад, масоҳати он зиёд мешавад.

Масъалаи 2. Дар бозии «тангам»- и хитойӣ квадрат (ниг. ба расми 1) ба секунҷа ва чоркунҷаҳо ҷудо карда шудаанд аз онҳо ҳар гуна шаклҳо сохтан мумкин. Агар тарафи квадрат ба 8 см баробар бошад, масоҳати шаклҳои ҷудо карда шударо ёбед.



Ҳал. $a = 8$ см – тарафи квадрат. $S = a^2 = 8^2 = 64$ (см²) – масоҳати квадрати додашуда. Акнун масоҳати қисмҳои дар шакл бударо меёбем.

1) S_1 ва S_7 – ба аз чор як қисми масоҳати квадрат баробар аст, пас,

$$S_1 = S_7 = S : 4 = 64 : 4 = 16 \text{ (см}^2\text{)}.$$

2) Масоҳати секунҷаи росткунҷаи баробарпахлӯ ба аз чор як ҳиссаи квадрати гипотенуза баробар аст, пас,

$$S_2 = S_5 = 0,25 \cdot (a : 2)^2 = 0,25 \cdot 4^2 = 0,25 \cdot 16 = 4 \text{ (см}^2\text{)}.$$

3) S_3 масоҳати квадрати S_2 ба ҳосили чамъи ду секунҷа баробар аст. Пас, $S_3 = 2S_2 = 2 \cdot 4 = 8$ (см²).

4) S_4 Катети секунҷаи $a : 2 = 8 : 2 = 4$ (см). ба нисфи тарафи квадрати додашуда баробар. Масоҳати секунҷаи баробарпахлӯ ба нисфи квадрати катети он баробар аст, яъне $S_4 = 0,5 \cdot 4^2 = 0,5 \cdot 16 = 8$ (см²).

5) Асосҳо ва баландии квадрат ва параллелограмм баробар бошад, он баробарандоза аст, бинобар ин $S_6 = S_3 = 2 \cdot 4 = 8$ (см²) мешавад.

Ҷавоб: $S_1 = S_7 = 16$ см²; $S_2 = S_5 = 4$ см²; $S_3 = S_4 = S_6 = 8$ см².

Масъалаи 3. Усто қадаш 2,25 м ва бараш 1,8 м деворро кафел кардаанист. Девор шакли росткунҷаро дорад. Барои ин кафели квадратшакли тарафаш 15 см-а чандто лозим мешавад (расми 2)?

Ҳал. 1) Масоҳати девори кафел мекардари меёбем ва онро бо сантиметри квадрати ифода мекунем?

$$2,25 \cdot 1,8 = 4,05 \text{ (м}^2\text{)} = 4,05 \cdot 10000 \text{ см}^2 = 40500 \text{ см}^2.$$

2) Масоҳати 1 дона кафелро меёбем: $a^2 = 15^2 = 225$ (см²).

3) Девори росткунҷаро барои бо кафел пӯшонидан чанто кафел лозим аст, меёбем:

$$40500 : 225 = 180 \text{ (то)}.$$

Ҷавоб: 180 та кафел.

Ҳалли масъалаи зеринро ба худатон ҳавола мекунем.

Масъалаи 4. Роҳрави квадратшакли тарафаш ба 4 м баробар бударо барои бо кафел пӯшонидан чандто кафели тарафаш 20 см – а лозим мешавад?

МАТЕРИАЛИ ИЛОВАГИИ КОМПЕТЕНСИЯИ
АМАЛИРО РИВОЧДИҲАНДА
ҲИСОБ КАРДАНИ МАСОҲАТ БО ҚОҒАЗИ КАТАКДОР

Дар қоғазии катакдор барои ҳисоб кардани бисёркунҷаи барҷаста ва ғайри-барҷаста «формулаи Пик» ном формуларо ҳосил мекунем. Дарозии тарафи ҳар як катак 1 см бошад, нуктаҳои буриши хатҳои ростии қоғазии катакдор – нуқтаҳои квадратҳои воҳидиро, нуктаҳои гирех меномем, онҳо масоҳати бисёркунҷа аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$S = \frac{M}{2} + N - 1.$$

Дар ин формула M – шумораи нуктаҳои гирехи дар ҳудуди бисёркунҷа буда N – шумораи нуктаҳои гирехи дар дохили бисёркунҷа буда. Ин формуларо барои қуллаҳои бисёркунҷаи дар нуктаҳои гирех буда татбиқ карда мешавад.

Масъалаи 1. Масоҳати шакли дар расми 1 бударо ёбед.

Ҳал. Усули. 1) Ҳамаи шумораи квадратҳои пурра 59-то буда масоҳати он 59 см², шумораи секунҷаҳои ба нисфи квадрат баробар буда 16-то буда, масоҳати он $16 : 2 = 8$ (см²); якто асосаш 2 см, секунҷаи баландиаш ба 3 см баробар ҳаст масоҳати он ба 3 см² баробар.

Ҳаминтавр, масоҳати бисёркунҷаи додашуда:

$$S = 59 + 8 + 3 = 71 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Усули 2. Ҳамин ҷавобро бо ёрии формулаи Пик чӣ хел ёфтан мумкин дида мебароем. Нуктаҳои гирехро ишорат менамоем.

1) Нуктаҳои гирехи дар дохили шакл хобидаро (бо ранги сиёҳ ишорат карда шудааст) мешуморем: онҳо 50-то, яъне $N = 50$.



2) Гирехҳои дар тарафи шакл хобидаро (бо ранги сурх ишора менамоем) мешуморем: онҳо 44-то, яъне $M = 44$. ба формулаи Пик мегузорем:

$$S = \frac{44}{2} + 50 - 1 = 22 + 49 = 71 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Пас, бо ду усул ҳам натиҷаи якхела ҳосил мешавад. *Ҷавоб:* 71 см².

Масъалаи 2. Масоҳати бисёркунҷаи дар расми 2 бударо ёбед.

Ҳал. 1) Нуктаҳои гирехи дар тарафҳои бисёркунҷа хобидаро бо (ранги сурх ишора мекунем) мешуморем: онҳо 40-то, яъне $M = 40$.



2) Нуктаҳои гиреҳи дар доҳили бисёркунча бударо бо (ранги сиёҳ ишора мекунем) мешуморем: онҳо ба 37-то, яъне мувофиқи формулаи Пик $N=37$.

$$S = \frac{40}{2} + 37 - 1 = 20 + 36 = 56 \text{ (см}^2\text{)}.$$


Ҷавоб: 56 см².

Масъалаи 3. Масоҳати бисёркунчаи (расми 3) – ро ҳисоб кунед.

Ҳал. *Усули 1)* нуктаҳои гиреҳи дар тарафҳои бисёркунча хобидаро (бо ранги сурх ишора кардаанд) мешуморем: онҳо 39-то, яъне $M=39$.

2) Нуктаҳои гиреҳи дар доҳили бисёркунча хобидаро (бо ранги сиёҳ ишода шудаанд) мешуморем: онҳо 17-то, яъне мувофиқи формулаи Пик $N=17$.

$$S = \frac{39}{2} + 17 - 1 = 19,5 + 16 = 35,5 \text{ (см}^2\text{)}.$$





Усули 2. Агар бо ҷавобҳои гирифта шуда боварӣ ҳосил кардани бошад, аввал бисёркунчаи додашударо бо усулҳои гуногун ба бисёркунчаҳои омӯхташудаи барҷаста тақсим намоед баъд масоҳати шаклҳои ҳосилшударо ба формулаҳои алоқананд ҳисоб кунед. Натиҷаи ҳосилшударо ҷамъ намуда, бо натиҷаи усули 1 муқоиса кунед. Агар ҳисобкуниҳо иҷро карда шуда бошад, ҳарду натиҷа як хел хоҳад дуруст шуд. Бисёркунчаи додашуда дар натиҷа ба қисмҳои гуногун ҷудо карда нишон надихад ҳам мешавад. Ҳисобкуниҳоро даҳонӣ ҳам иҷро кунад мешавад, он ба худатойи вобаста аст. Ҳамаи шумораи квадратҳо 26-то, масоҳати онҳо 26 см²; миқдори секунҷаҳои ба нисфи квадрат баробар 17-то, масоҳати онҳо $17:2=8,5$ (см²); Як асосаш 2 см баландиаш ба 1 см баробар секунҷа ҳаст, масоҳати он ба 1 см² баробар аст. Ҳаминтавр, масоҳати бисёркунчаи додашуда: $26+8,5+1=35,5$ (см²).


Пас ҳарду натиҷа як хел.

Ҷавоб: 35,5 см².

Масъалаи 4. Бо ёрии формулаи Пик масоҳати бисёркунчаҳои дар расми 4 ва 5 бударо ҳисоб кунед.



1. Масоҳати квадрати ба перимети росткунҷаи тарафҳояш 27 см ва 21 см – баробарро ёбед.
2. Масоҳати росткунҷа 540 см^2 , нисбати ду тараф чун 3:5 масоҳати ин квадратро ёбед.
3. Масоҳати параллелограмм 24 см^2 . Агар баландии онҳо 3 см ва 4 см бошад, периметри онро ёбед.
4. Масоҳати шаклҳои дар расми 1 тасвиршударо бо қисмҳои ҷудо карда инчунин аз формулаи Пик истифода бурда ёбед.



ТЕСТИ 4

Худро санҷида бинед!

1. Агар тарафҳои росткунҷа 4 маротиба зиёд карда шавад, масоҳати он чанд маротиба зиёд мешавад?
 А) 4; В) 8; Д) 16; Е) 32.
2. Масоҳати секунҷа $400 h_a$ нисбати тарафҳо ба 4:1 баробар аст. Периметри росткунҷаро ёбед.
 А) 10 км; В) 5 км; Д) 2 км; Е) 8 км.
3. Дарозии росткунҷа 25% зиёд карда шуд, барои тағйир наёфтани масоҳати он бари онро чӣ қадар фоиз, кам намудан лозим?
 А) 20%; В) 16%; Д) 25%; Е) 18%.
4. Агар тарафи квадрат чанд маротиба кам карда шавад масоҳаташ 4 маротиба кам мешавад?
 А) 1,5 маротиба; В) 2 маротиба; Д) 3 маротиба; Е) 3,5 маротиба.
5. Периметри параллелограмми масоҳаташ 144 см^2 , баландиаш 8 см ва 12 см бударо ёбед.
 А) 40 см; В) 30 см; Д) 80 см; Е) 60 см.
6. Ба диагонали AC -и параллелограмми $ABCD$ перпендикуляр BO фароварда шудааст. Агар $AO=8 \text{ см}$, $OC=6 \text{ см}$ ва $BO=4 \text{ см}$ бошад масоҳати параллелограммро ёбед.
 А) 50 см^2 ; В) 28 см^2 ; Д) 52 см^2 ; Е) 56 см^2 .
7. Масоҳати ромб ба 40 см^2 , периметри он ба 20 см баробар аст. Баландии ҳамин ромбро ёбед.
 А) 2 см; В) 8 см; Д) 4 см; Е) 16 см.
8. Масоҳати трапетсияи асосҳояш ба 5 см ва 9 см баробар буда, ба 35 см^2 баробар аст. Баландии ҳамин трапетсияро ёбед.
 А) 9 см; В) 8 см; Д) 5 см; Е) 10 см.

9. Диагоналҳои трапетсияи асосҳояш ба 8 ва 12 см баробар байни худ перпендикуляранд. Масоҳати трапетсияро ёбед.
 А) 100; В) 64; Д) 144; Е) 76.
10. Агар масоҳати трапетсия ба 30 см^2 баландиаш ба 6 см баробар бошад, хати миёнаи он ба чанд баробар мешавад?
 А) 2,5 см; В) 5 см; Д) 7,5 см; Е) 4,5 см.



Забони англисиро меомӯзем!

Решаи квадратӣ – square root
 Хати миёна – midline
 Масоҳат – area

Секунча – triangle
 Формулаи Герон – formula of Heron



Маълумотҳои таърихӣ

Боби панҷуми асари «Донишнома»-и Ибни Сино ба «Масъалаҳои асосии геометрии доир ба чоркунҷаҳо, секунҷаҳои дар он ҷойгиршуда ва муносибатҳои онҳо» бахшида шудааст.




Теоремаи 1. Шаклҳои ба ҳам параллел ва байни ду хат ҷойгиршуда, дорони асоси умумӣ ва тарафҳои муқобилаш параллел ва баробарандозаанд (яъне масоҳаташон баробар). Масалан: шаклҳои ҳамвори $ABCD$ ва $EGCD$ -и асосҳояшон CD ба ҳам баробарандоза мебошанд (расми 1).



Абӯалӣ Ибни Сино
(980–1037)

Теоремаи 2. Секунҷаҳои дар байни хатҳои умумӣ параллел ҷойгиршуда ва дорони асоси умумӣ баробарандозаанд. Масалан, секунҷаҳои ACD ва GCD -и дорони асоси CD баробарандоза мебошанд (расми 2).

Теоремаи 3. Чоркунҷаҳои дар байни хатҳои ба ҳам параллел ҷойгиршуда ва асосҳояшон баробар баробарандозаанд. Масалан, чоркунҷаҳои $ABCD$ ва $GEHF$ баробарандозаанд (расми 3).





БОБИ V ДАВРА



§ 10.


КУНҶҲОИ ДАВРА

55. ВАЗЪИЯТИ БАЙНИҲАМ ҶОЙГИРШАВИИ ДАВРА ВА ХАТИ РОСТ. РАСАНДА БА ДАВРА ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

1. Маълумоти ибтидоӣ доир ба давра.


Таъриф. Ҷои геометрии нуқтаҳои ҳамворӣ, ки аз нуқтаи додашудаи ҳамин ҳамворӣ дар як хел масофа воқеъанд, **давра** номида мешавад.

1



Давраи O марказнок, R радиуснок, яъне (O, R)

a



CD – хорда, OE – радиус,
 AB – диаметр

b

Нуқтаи O **маркази давра** ном дорад.

Порчаи нуқтаи ихтиёрии давраро бо марказаш пайваस्तкунанда **радиуси давра** ном дорад. Ҳар гуна порчаи нуқтаи давраро бо маркази он пайваस्तкунанда ҳам **радиус** мебошад. Ҳаминтавр, нуқтаи марказаш O ва давраи радиусаш R буда аз нуқтаи додашудаи O дар масофаи ба R баробар ҷойгиршудаи шакли геометрии аз ҳама нуқтаҳои ҳамворӣ сохташуда мебошад. Одатан, давраи марказаш O ва радиусаш R чунин ишора мешавад: (O, R) (расми 1, *a*).

Порчаи ду нуқтаи ихтиёрии давраро пайваस्तкунанда **хорда** ном дорад. Хордаи аз маркази давра гузаранда **диаметр** аст. Дар расми 1, *b* радиус ва ду хордаи давра тасвир карда шудааст, яъне яке аз хордаҳо диаметри давра аст: OE – радиус, CD – хорда, AB – диаметр. Диаметр бо ҳарфи d ишорат карда шуда, он ба ду радиус баробар аст. Яъне, $d=2R$ аст.

2. Байниҳам ҷойгиршавии давра ва хати рост.

Дар ин банд ҷойгиршавии хати рост ва давраро дар ҳамворӣ дида мебароем. Агар хати рост аз маркази давра гузарад, дар он ҳолат он давраро дар ду нуқта, яъне дар куллаҳои диаметри дар ҳамин хати рост хобида мебурад.

Хати рости додашудаи l ва давраи (O, R) дорои чанд нуқтаи умумӣ аст? Барои ҷавоб ёфтани ба ин савол масофаи d -ро аз маркази O -и давра O то хати рости l бо радиуси R -и ҳамин давра муқоиса бояд кард.

Перпендикулярни аз маркази давра ба хати рост гузаронидашуда, масофаи аз маркази давра то хати рост номида мешавад.

Се ҳолат вучуд доштаниш мумкин: 1) $d > R$; 2) $d = R$; 3) $d < R$. Акнун ин ҳолатҳоро дида мебароем

Ҳолати 1. Агар масофа аз маркази давра то хати рост аз радиуси давра калон бошад, давра ва хати рост дорои нуқтаи умумӣ нест, яъне намебурад.

Дарҳақиқат, агар $d > R$ бошад, (ниг. ба расми 2, а), нуқтаи наздиктарини хати рости l ба маркази O (пас, нуқтаи дилхоҳи ин хати рост низ) ба давраи (O, R) тааллуқ надорад, чунки он аз марказ аз радиуси давра дар масофаи калон мешавад.

Ҳолати 2. Агар аз маркази давра то хати рост масофа ба радиуси давра баробар бошад, дар он ҳолат хати рост ба давра якта ва фақат ба якта нуқтаи умумӣ соҳиб мешавад.

Дарҳақиқат, агар $d = R$ бошад, (ниг. ба расми 2, б) нуқтаи наздиктарин ба нуқтаи O -и хати рости l радиуси давра дар масофаи баробар мешавад. Пас, ин нуқта ба давра низ тааллуқ дорад. Ҳамаи нуқтаҳои боқимондаи хати рости l аз маркази O ва радиуси давра дар масофаи калон мешавад. Пас, ба давра тааллуқ надорад.


Ҳолати 3. Агар масофа аз маркази давра то хати рост аз радиуси давра хурд бошад ($d < R$), дар он ҳолат давра ва хати рост дорои ду нуқтаи умумӣ мебошад.

Қисми дар дохили давра будаи хати рост хорда аст (расми 2, в). Дар ин ҳолат хати рост нисбат ба давра буранда ном дорад.

Радиуси давраи AB -и дарозии хорда ва масофаро аз марказ то хати рост ба воситаи d ифода кардан мумкин аст: $AB = 2\sqrt{R^2 - d^2}$.

Ин баробариро худатон исбот кунед.

Ҳулоса. Давра ва хати рост метавонад дорои нуқтаи умумӣ набошад, як ва ё ду нуқтаи умумӣ дошта бошад.



2. Расанда ба давра.

Таъриф. Хати рости бо давра дорои танҳо якто нуқтаи умумӣ, расанда ба давра номида мешавад. Нуқтаи умумии онҳо **нуқтаи расанда** аст.

Дар расми 2, l хати рост – расанда ба давраи марказаш O , A – нуқтаи расиш. Давра ба хати рости l мерасад ҳам гуфтан мумкин аст.

Теоремаро дар бораи хосияти расанда исбот мекунем.

Теоремаи 1.

Расанда ба давра ба радиуси ба нуқтаи расиши ҳамин давра гузаронидашуда перпендикуляр аст.

Исбот. Бигзор хати рости l ба давра расандаи ба нуқтаи A гузаронидашуда бошад (расми 3). Исбот мекунем, ки $R = OA$ ба l перпендикуляр аст. Мувофиқи шарт ғайр аз нуқтаи l -и хати рост дигар ҳамаи нуқтаҳо берун аз давра меҳобанд. Бинобар ин, ғайр аз A барои ҳар гуна нуқтаи A_1 , $OA_1 > OA$ аст. Пас, масофаи OA аз масофаҳои нуқтаи O то нуқтаҳои хати рости l кӯтоҳтарин аст. Масофаи кӯтоҳтарин аз нуқта то хати рост бошад, перпендикуляри ба ҳамин хати рост фаровардашуда мебошад. Аз ин ҷо $OA \perp l$ бармеояд. Теорема исбот шуд.


Акнун теоремаи ба хосияти расандаҳо чаппаро исбот мекунем (аломати расанда).

Теоремаи 2.

Хати рости ба радиус перпендикуляр ва аз нӯги (қуллаи) ба давра хобидаи он гузаронда, расанда ба ин давра номида мешавад.

Исбот. Агар масофа аз маркази давра то хати рост ба радиуси давра баробар ($d = R$) бошад (ниг. ба расми 2, б), нуқтаи наздиктарин ба маркази O -и хати рости l ба радиуси давра баробар мешавад. Дигар ҳамаи нуқтаҳои хати рости l аз маркази O радиуси давра дар масофаи калонтар мешавад, пас ба давра тааллуқ надорад. Аз рӯи таърифи хати рост l ба ҳамин давра расанда аст. Теорема исбот шуд.

Масъала. Катетҳои $AC=3$ см ва $BC=4$ см. секунҷаи росткунҷаи ACB ($\angle C=90^\circ$). Давраи марказаш дар нуқтаи C ва радиусаш ба 2,4 см баробар буда гузаронида шудааст. Давра ва хати рости AB байни худ чӣ хел ҷойгир шудааст?



Ҳал. Дар $\angle ACB$ ($\angle C=90^\circ$): $AC=3$ см, $BC=4$ см мувофиқи теоремаи Пифагор:




$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ (см)}.$$

$CD \perp AB$ -ро мегузаронем (расми 4) Масоҳати секунҷаро ду хел ҳисоб кардан мумкин, яъне баробарии $CA \cdot CB = AB \cdot CD$ бамавқеъ аст. Аз ин C

$D = CA \cdot CB : AB = 3 \cdot 4 : 5 = 2,4$ (см). Пас, аз нуқтаи C -то хати рости AB масофаи буда, барои ба дарозии радиус баробар буданаш хати рости AB ба давра бармехӯрад *Ҷавоб*: AB – расанда.

 **Савол, масъала ва супоришҳо**

1. 1) Давра чист? Радиус, маркази он чист? Хордаи давра чист? Чӣ гуна хати рост ба давра расанда номида мешавад?
 2) Кадом ҳосият ва аломати расандаро медонед?
2. $d - R$ масофа аз маркази давраи радиусаш то хати рости l . Агар: 1) $R = 8$ см, $d = 6$ см; 2) $R = 10$ см, $d = 8,4$ см; 3) $R = 14,4$ дм, $d = 7,4$ дм; 4) $R = 1,6$ дм, $d = 24$ см; 5) $R = 4$ см, $d = 40$ мм бошад, хати рости l ва давра нисбат ба ҳамдигар чӣ гуна ҷойгир мешаванд?
3. Тарафҳои квадрати $ABCD$ ба 8 см ва радиуси давраи марказаш дар нуқтаи A буда, ба 7 см баробар аст. Кадоме аз хатҳои рости AB , BC , CD ва BD нисбат ба ҳамин давра буранда мешавад?
4. Хати рости AB ба нуқтаи A -и давраи марказаш O расанда мебошад. Агар $AB = 24$ см, радиуси давра ба 7 см баробар бошад. Дарозии порчаи OB – ро ёбед (расми 5).
5. Росткунҷаи ACB ба секунҷаи ($\angle C = 90^\circ$) $AB = 10$ см, $\angle ABC = 30^\circ$. Давраи марказаш нуқтаи A гузаронида шудааст. Дар кадом ҳолати радиуси ин давра: 1) давра ба хати рости BC расанда аст; 2) бо хати рости BC дорои нуқтаи умумӣ нест; 3) бо хати рости BC ба ду нуқтаи умумӣ доро аст?
6. Агар аз нуқтаи беруни давра ба он ду расанда гузашта шуда бошад, масофаи аз он нуқта то нуқтаи расиш баробар аст. Инро исбот кунед (расми 6).
7. Агар радиуси давра ба 5 см баробар. Масофа аз маркази давра то хати рост: 1) 6 см, 2) 5 см, 3) 4 см бошад, хати рост бо давра бо чӣ хел хати рост ба давра байни ҳам чӣ гуна ҷойгир мешавад?
8. Росткунҷаи $ABCD$ дода шудааст, дар он $AB = 16$ см, $AD = 12$ см (расми 7). Радиуси кадоме аз хатҳои рости AC , BC , CD ва BD ба давраи 12 см марказаш A расанда аст?





56. Вазъияти байниҳам ҷойгиршавии ду давра. Кунҷи марказӣ ва ченаки градусии камон

1. Вазъияти байниҳам ҷойгиршавии ду давра.

Ҳолатҳои байниҳам ҷойгиршавии ду давраро дида мебароем.

1) Ду давра ба нуқтаи умумӣ соҳиб нест. Дар ин ҳолат аз давра берун (расми 1, *а*) ё ки якумаш ба дохили дуюмаш мебошад (расми 1, *б*).



2) Ду давра ба як нуқтаи умумӣ соҳиб аст (расми 2). Дар ин ҳолат, давраҳо ба як дигар *расанда* меғунд. Аммо ин ҳолат давраҳо аз тарафи беруни (расми 2, *а*) ё ки аз тарафи дохили расанда шуданаш мумкин (расми 2, *б*).




3) Ду давра бо ду нуқтаи умумӣ соҳиб шуданаш мумкин (расми 3). Дар ин ҳолат давраҳо якдигарро *мебуранд* меғунд.

Давраҳо, ки ба маркази умумӣ соҳиб аст, *давраи консентрикӣ* номида мешавад (расми 4) Вазъияти ҷойгиршавии ду давра ба радиус ва масофаи байни марказҳои онҳо вобаста аст.

Теорема.

Агар масофаи байни ду марказҳои давра аз суммаи радиусҳои онҳо калон ё ки аз фарқи онҳо хурд бошад, ин давраҳо ба нуқтаи умумӣ соҳиб намешавад.

Исбот. Бигзор ду давраи марказҳояш R_1, R_2 ($d = R_1 + R_2 < O_1O_2$) ва радиусҳояш мувофиқан O_1, O_2 додашуда бошад (расми 5). Нуқтаи A – и давраро дида мебароем: $O_1A = R_1$, онгоҳ $O_2A \geq O_1O_2 - O_1A > R_1 + R_2 - R_1 = R_2$ ва пас нуқтаи A ба давраи дуюм тааллуқ надорад. Пас, ин давраҳо ба нуқтаи умумӣ соҳиб нестанд.



Ҳолатҳои ду давра дорои якто нуқтаи умумӣ доштан ва надоштан, инчунин ду давра дорои ду нуқтаи умумӣ буданро мустақилона дида бароед.

2. Кунчи марказӣ.

Таъриф. Кунчи қуллаиш дар маркази давра буда, кунчи марказӣ ном дорад.




Ду нури OA ва OB , ки қуллаи умумиашон дар маркази O аст, ду кунчи марказиро ишора мекунад. Ду нуқтаи давраи A ва B дар он ду паҳлӯро ишора мекунад. Барои ин камонҳоро аз ҳамдигар фарқ карда, дар ҳар яки он яктогӣ нуқтаи фосилавӣ гузошта мешавад (аз қуллаҳои камон фарқкунанда) ва ё бо ҳарфи хурди лотинӣ ишора шуда, ҳамчунин дар бораи камонҳои ACB (ва ё AnB) ва ADB (ва ё ApB) сухан меравад (расми 6). Чунин ишора кардани камонҳо қабул шудааст: $\cup ACB$ (ва ё $\cup AnB$) ва $\cup ADB$ (ва ё $\cup ApB$). Дар баъзе ҳолатҳо камонро бидуни нуқтаи фосилавӣ ишорат меку-
нанд: $\cup AB$ (дар бораи кадоме аз ду камон сухан рафтаниш маълум бошад).

Агар порчаи қуллаҳои камонро пайвастанда диаметри давра бошад, камон нимдавра ном дорад. Дар расми 7, б ду нимдавра тасвир ёфта, яке аз онҳо алоҳида нишон дода шудааст.

3. Ченаки градусии камон.

Таъриф. Бузургии кунҷии камони давра гуфта, бузургии кунҷи марказии ба ҳамин камон мувофиқро мегӯянд.

Камони давраро бо градусҳо чен кардан мумкин аст. Агар камони ACB -и марказаш O аз нимдавра хурд ё ба нимдавра баробар бошад, дар он ҳолат ченаки градусии он ба ченаки градусии кунҷи марказии AOB баробар ҳисобида мешавад (расмҳои 7, а, б). Агар камони ACB аз нимдавра калон бошад, дар он ҳолат ченаки градусии он ба $360^\circ - \angle AOB$ баробар ҳисобида мешавад (расми 7, в).



Аз ин ҷо, суммаи ченаки дараҷагии ду камони давраи нўғҳояш умумӣ ба 360° баробар буданаш бармеояд. Маълум аст, ки дар ҳолати баробар будани бузургии ду камони давра ва (яъне ба онҳо кунҷҳои марказии мувофиқ) танҳо дар ин ҳолат ин камонҳо баробаранд.

Масъала. Нуқтаи O маркази давра, $\angle AOB = 115^\circ$, $\cup BC = \cup AB$ (расми 8). Кунҷи AOC -ро ёбед.

Ҳал. Бигзор кунҷи AOB маркази доира буда, камони AB аз нимдавра хурд, барои ҳамин $\cup AB = \angle AOB = 115^\circ$. Мувофиқи шарти масъала, $\cup BC = \cup AB$, яъне, аз ин ҷо камони BC ба 115° баробар аст.

$\cup ABC = \cup AB + \cup BC = 230^\circ > 180^\circ$, яъне камони ABC аз нимдоира калон аст, бинобар ин $\angle AOC = 360^\circ - \angle ABC = 360^\circ - 230^\circ = 130^\circ$. *Ҷавоб:* $\angle AOC = 130^\circ$.



Савол, масъала ва супоришҳо

1. 1) Расанда ба нуқтаи додашуда гуфта, чиро мефаҳмед? 2) Давраи концентрикӣ чист? 3) Кунҷи марказӣ чист? Камони давра чӣ хел ишорат карда мешавад? 4) Бузургии кунҷии камони давра чист?
2. Агар масофаи байни ду марказҳои давра 2 см радиусҳояш мувофиқи 1) 3 см ва 5 см, 2) 2 см ва 5 см бошад, онҳо нисбат ба якдигар чӣ хел ҷойгир шудаанд?
3. Агар давраҳои радиусаш ба 4 см ва 6 см баробар: 1) аз тарафи берунӣ расанда бошад, 2) аз тарафи дохилӣ расад, масофаи байни марказҳои онҳо ба чӣ баробар аст?
4. Ду хаги рости аз маркази давраи додашуда гузаранда, дар ин давра чанд камон ва чанд кунҷҳои марказиро муайян мекунанд?
5. Аз нуқтаи давраи додашуда бо радиус баробар дуто карда гузаронида шудааст. Кунҷи байни онҳоро ёбед.
6. Чисмҳои калони давраи ба кунҷи марказӣ мувофиқоянда ба қисми: 1) $\frac{2}{5}$; 2) $\frac{4}{15}$; 3) $\frac{7}{12}$; 4) $\frac{5}{9}$; 5) $\frac{13}{18}$; 6) $\frac{17}{20}$; 7) $\frac{23}{30}$ баробар аст. Ҳамин кунҷи марказиро ёбед.
7. Давра бо ду нуқта ба ду камон чудо мешавад. Агар: 1) бузургии кунҷии яке аз онҳо аз бузургии кунҷии дигараш 40° зиёд бошад, ҳар яке аз бузургиҳои кунҷӣ чӣ гуна мешаванд? 2) Агар бузургии кунҷии ин камонҳо ба ададҳои $2 : 7$ мутаносиб бошанд-чӣ.
8. Нуқтаҳои A , B , C дар давраи марказаш нуқтаи O меҳобад. Агар $\cup ABC = 70^\circ$ бошад, кунҷи AOC -ро ёбед.
9. Кунҷҳои марказии: 1) $\frac{1}{5}$; 2) $\frac{1}{6}$; 3) $\frac{1}{9}$; 4) $\frac{1}{10}$; 5) $\frac{1}{12}$ қисми давраро ташкилкунанда ва ба камони AB мувофиқоянда чанд дараҷагӣ мешаванд? Дар ҳар якеи ҳолатҳо бузургии кунҷии камони AB -ро бо ёрии аломатҳои нависед.
10. Радиуси давра: 1) 7,8 см; 2) 10,5 см; 3) 0,8 дм аст, диаметри давраро ёбед.

57. КУНЧИ БА ДАВРА ДАРУНКАШИДАШУДА

Таъриф. Кунче, ки қўллаши ба давра меҳобад ва тарафҳояш онро мебурад, кунчи ба давра дарункашидашуда ном дорад.

Дар расми 1 кунчи ABC ба давра дарункашидашуда аст, камони AnC дар дохили ҳамин кунч ҷойгир аст. Дар ин гуна ҳолат, кунчи ABC -и дарункашидашуда дар камони AnC тақя мекунад низ мегӯянд.

Теорема.

Кунчи ба давра дарункашидашуда бо нисфи камоне, ки ба он тақя мекунад, чен карда мешавад:

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AC.$$

Исбот. Бигузур $\angle ABC$ – давраи маркази O кунчи дарункашидашудаи ба камони AC тақякунанда бошад (расми 2). Се ҳолати нисбат ба ҳамин кунч ҷойгиршавии маркази давраро дида мебароем.

Ҳолати 1. Яке аз тарафҳои кунчи марказии дарункашидашудаи давра, масалан дар тарафи BC меҳобад (расми 2, *а*). Радиуси OA мегузаронем ва ба кунчи марказии AOC назар меафканем. Он кунчи берунаи секунҷаи BOA мебошад. Аз рӯи хосияти кунчи берунаи секунҷа: $\angle AOC = \angle OBA + \angle OAB$. Аммо $\angle OBA = \angle OAB$, чунки секунҷаи AOB баробарпахлӯ аст ($OA = OB = R$). Пас, $\angle AOC = 2\angle ABC$ (1). Шумо медонед, ки бузургии кунчи марказӣ ба бузургии кунчи камон мувофиқан баробар аст (мавзӯи 56). Дар ин ҳолат камони AC аз нимдоира хурд аст, бинобар ин аз рӯи хосияти кунчи марказӣ:



$$\angle AOC = \cup AC \text{ (2).}$$

Аз баробарии (1) ва (2): $2\angle ABC = \cup AC$, яъне $\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AC$.

Теорема барои ҳолати 1 исбот шуд.

Ҳолати 2. Маркази давраи O дар байни тарафҳои кунчи дарункашидашуда меҳобад. Нури BO -ро мегузаронем, ки камони AC -ро дар ягон нуқтаи D мебурад (расми 2, *б*).

Нуқтаи D камони AC -ро ба ду камон $\cup AD$ ва $\cup DC$ мебурад. Пас, аз рӯи



исбот (ҳолати 1): $\angle ABD = \frac{1}{2} \cup AD$ ва $\angle DBC = \frac{1}{2} \cup DC$. Ин баробариҳоро чамъ карда, ҳосил мекунем:

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = \frac{1}{2} \cup AD + \frac{1}{2} \cup DC = \frac{1}{2} (\cup AD + \cup DC) = \frac{1}{2} \cup AC.$$

Ҳолати 3. Маркази давра O аз кунчи дарункашидашуда берун меҳобад. Исботи ин ҳолро аз расми 2, *в* истифода бурда, худатон мустақилона иҷро кунед.

Натиҷаи 1. Ҳамаи кунҷҳои дарункашидашудаи ба як камон таъяқунанда баробаранд (расми 3, *а*):

$$\angle B = \angle B_1 = \angle B_2 = \dots = \frac{1}{2} \cup AC.$$

Натиҷаи 2. Ҳамаи кунҷҳои ба диаметр (нимдоира) пайвастшуда кунҷҳои ростанд (расми 3, *б*):

$$\angle B = \angle B_1 = \angle B_2 = \dots = 90^\circ.$$

Масъала. Хордаи бо радиуси давра баробар гузаронида шудааст. Ин хорда: 1) аз маркази давра; 2) аз нуқтаи дилхоҳи давра аз куллаҳои хордаи додашуда фарқ карда дар таҳти кадом кунҷ намоён мешавад?

Ҳал: Бигзор AB хордаи ба радиуси давраи марказаш O баробар бошад (расми 4). Онгоҳ AOB секунҷаи баробартараф ва пас кунҷи марказӣ (кунҷе, ки аз маркази давра хордаи AB намоён мешавад) ба 60° баробар аст.



Ғайр аз нуқтаҳои A ва B нуқтаи дилхоҳи C секунҷаи дарункашидашудаи ACB кунҷе, ки аз нуқтаи C хордаи AB намоён мешавад. Ба нисфи кунҷи марказӣ баробар аст, яъне ба 30° баробар аст.

Ҷавоб: 1) 60° , 2) 30°






Савол, масъала ва супоришҳо

- 1) 1) Чӣ гуна кунҷ ба давра дарункашидашуда ном дорад?
- 2) Кунҷи дарункашидашуда чӣ гуна чен карда мешавад?
- 3) Кунҷи ба нимдоира пайвастшудаи кунҷи дарункашидашуда ба чӣ баробар аст?



2. (Даҳонӣ) Кунчи дарункашидашуда ба 25° баробар. Бузургии камони ба кунчи дарунӣ така карда шударо ёбед.
3. AB ва BC – хордаҳои марказаш нуқтаи O мебошад, $\angle ABC = 30^\circ$. Агар радиуси давра ба 10 см баробар бошад, дарозии хордаи AC -ро ёбед.
4. 1) Дар расми 5 нуқтаи O – маркази давра, $\angle AOB = 88^\circ$. $\angle ACB$ -ро ёбед.
Ҳал. Кунчи AOB кунчи давраи додашуда ... мебошад. Пас, $\sphericalangle ADB = \dots^\circ$.
 Кунчи ACB ... кунчи ... кашидашуда аст ва ба камони ... пайваस्त аст, чунки $\angle ACB = \frac{1}{2} \sphericalangle \dots = \dots^\circ$. *Ҷавоб.* $\angle ACB = \dots^\circ$.
- 2) Дар расми 6 $\sphericalangle CAB = 130^\circ$. $\sphericalangle CAB$ -ро ёбед. Қойҳои холиро пур кунед.
Ҳал. SAB ба давра дарункашидашуда ва ба камони $\sphericalangle CDB$ васл шудааст.
 $\sphericalangle CDB = 360^\circ - \sphericalangle CAB = 360^\circ - 130^\circ = 230^\circ$, $\angle CAB = \frac{1}{2} \sphericalangle CDB = \frac{1}{2} \cdot 230^\circ = 115^\circ$. *Ҷавоб.* $\angle CAB = 115^\circ$.
- 3) Дар расми 7 $\angle APE = 46^\circ$, $\angle BCE = 34^\circ$. $\angle AEP$ -ро ёбед.
Ҳал. Кунҷҳои дарункашидашудаи PAB ва BCP якто BP ..., пас, $\angle PAB = \angle \dots = \dots$. Аз секунҷаи AEP доро мешавем $\angle AEP = 180^\circ - (\angle \dots + \angle \dots) = 180^\circ - (\dots + \dots) = \dots$. *Ҷавоб.* $\angle AEP = \dots$.
5. Нуқтаҳои A , B , C -и давра онро ба се камон тақсим намуда нисбати ченаки градусии онҳо чуи $3 : 5 : 7$. Кунҷҳои секунҷаи ABC -ро ёбед.
6. Хорда давраро ба ду камон чудо мекунад. Агар нисбати кунҷҳои ин камонҳо 1) $5 : 4$; 2) $7 : 3$ бошад, хорда аз нуқтаҳои давра дар тахти кадом кунҷ менамояд?
7. Ба давра диаметри AB ва хордаи AC гузаронида шудааст. Агар нисбати ченаки градусии $7 : 2$ камонҳои AC ва CB бошад, кунчи BAC -ро ёбед.
8. AB ва AC – хордаҳои давра, $\angle BAC = 70^\circ$, $\sphericalangle AB = 120^\circ$. Миқдори дараҷагии камони AC -ро ёбед.



58. КУНЧҶОЕ, КИ БУРАНДАИ ДАВРА ҲОСИЛ КАРДААСТ

1. Кунчи аз хорда ва расанда сохташуда.

Теоремаи 1.

Кунчи аз расанда ва хорда ҳосил шуда. ба нисфи камони ба он таъқунанда баробар аст.

Исбот. Бигзор AB расанда ва BC хорда бошад, исбот мекунем, ки $\angle ABC = \frac{1}{2} \cup BmC$ аст (расми 1). Барои ин аз қуллаи C , $CD \parallel AB$ гузаронем, $\angle ABC = \angle BCD$, чунки онҳо кунчи дарунии ивазшаванда мебошанд. Аммо $\angle C = \frac{1}{2} \cup BnD$ ва $CD \parallel AB \cup BnD = \cup BmC$ ва $\angle B = \angle C = \frac{1}{2} \cup BnD = \frac{1}{2} \cup BmC$.

Теорема исбот шуд.

Масалаи 1. Хордаи AB камони 56° -ро кашида меистад. Бо расандаҳои аз нӯғҳои хордан ба давра гузаронида шуда ва хорда кунҷҳои ҳосил шударо ёбед.




Дода шудааст: (O, R) , AB – хорда, $\angle AOB = 56^\circ$ – AB кунҷи марказии хордаро кашида истода, $AC \perp OA$, $BC \perp OB$ (расми 2).

Ёфтани лозим: $\angle CAB$, $\angle CBA$, $\angle BAD$, $\angle ABE$.

Ҳал. Камони байни хорда ва расанда $\cup AB = 56^\circ$ (ҳолати 1), ё ки $\cup AnB = 360^\circ - 56^\circ = 304^\circ$ (ҳолати 2) мешавад.

Ҳаминтавр дар ҳолати 1 $\angle CAD = \frac{1}{2} \cup AB = \frac{1}{2} \cdot 56^\circ = 28^\circ$, дар ҳолати 2 бошад, бо $\angle BAD = \frac{1}{2} \cup AnB = \frac{1}{2} \cdot 304^\circ = 152^\circ$ соҳиб мешавем. Бо мо маълум аст, ки аз нуқтаи берунии давра расанда ба давра гузаронида шуда ва то нуқтаи расми порчаҳо баробар мешавад. Бинобар ин $\triangle ACB$ баробарпахлӯ. Пас, $\angle CAB = \angle CBA = 28^\circ$ ва $\angle BAD = \angle ABE = 152^\circ$.

Ҷавоб: $\angle CAB = \angle CBA = 28^\circ$, $\angle BAD = \angle ABE = 152^\circ$.



2. Кунҷҳои дар натиҷаи буриши ду хорда ҳосилшуда.

Теоремаи 2.

Ҳар гуна кунҷи вертикалие, ки дар натиҷаи буриши ду хордаи диллоҳ ҳосил шудааст, ба нисфи суммаи қамонҳои тарафҳои васлшуда баробар аст.

Исбот. Бигзор $\angle ABC$ – яке аз кунҷҳои дар натиҷаи буриши хордаҳои CD ва AE ҳосилшуда бошад (расми 3). Исбот мекунем, ки $\angle ABC = \frac{1}{2}(\cup AC + \cup DE)$ аст. Барои ин нуқтаҳои A ва D -ро пайваст мекунем, дар он ҳолат $\angle ABC \triangle ABD$ – нисбат ба $\frac{1}{2}ABD$ кунҷи беруна мешавад. Пас, $\angle ABC = \angle ADC + \angle DAE$. Аммо $\angle ADC = \cup AC$ ва $\angle DAE = \frac{1}{2} \cup DE$ ва $\angle ADC = \frac{1}{2} \cup AC$. Бинобар ин, $\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AC + \frac{1}{2} \cup DE = \frac{1}{2}(\cup AC + \cup DE)$. Ба таври болоӣ исбот мешавад.

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AC + \frac{1}{2} \cup DE = \frac{1}{2}(\cup AC + \cup DE)$$

Мустақилона исбот кунед.

Масъалаи 2. AB ва CD – хордаҳои як давра. P – нуқтаи буриши онҳо. Агар кунҷи BPD аз кунҷи BPC , 4 маротиба калон, кунҷи CDA бошад, аз BPC 26° калон бошад, кунҷи CBP -ро ёбед.

Дода шудааст:

$$\angle BPD = 4\angle BPC, \angle CDA = \angle BPC + 26^\circ \text{ (расми 4).}$$

Ёфтани лозим: $\angle CBP$.

Ҳал. $\angle BPD + \angle BPC = 180^\circ$, аз инчо $4\angle BPC + \angle BPC = 180^\circ$, аз ин, $5\angle BPC = 180^\circ$ ва ниҳоят, $\angle BPC = 36^\circ$. $\angle CDA = \angle BPC + 26^\circ = 36^\circ + 26^\circ = 62^\circ$. $\angle CBA = \angle CDA = 62^\circ$ чунки онҳо якто ба қамони $\cup AC$ васл (тақя) шудааст кунҷҳои дарункашидашуда мебошад. Аз ин $\angle CBP = \angle CBA = 62^\circ$.



Ҷавоб: $\angle CBP = 62^\circ$.

3. Кунҷи байни ду бурандае, ки аз як нуқтаи берун аз давра ба он гузаронида шудааст.

Теоремаи 3.

Кунҷи байни ду бурандаи аз як нуқтаи берун аз давра ба он гузаронидашуда, ба нисфи фарқи қамонҳои (AC ва DE)-и байни бурандаҳои (ABC) баробар аст.

Исбот. B – нуқтаи берун аз давра, BA ва BC – бурандаҳои он. Исбот мекунем, ки $\angle B = \frac{1}{2}(\cup AC - \cup DE)$ аст. Барои ин, нуқтаҳои A ва E -ро пайваст мекунем (расми 5).



$\angle AEC = \angle AEB$ кунчи берунй аст. Пас, $\angle AEC = \angle B + \angle DAE$, инчунин $\angle B = \angle AEC - \angle DAE$ аст. Аммо $\angle AEC = 0,5 \cup AC$ ва $\angle DAE = 0,5 \cup DE$. Агар ба ҷои он гузорем:

$$\angle B = \frac{1}{2} \cup AC - \frac{1}{2} \cup DE = \frac{1}{2} (\cup AC - \cup DE).$$

Пас, $\angle B = \frac{1}{2} (\cup AC - \cup DE)$. Теорема исбот шуд.

4. Кунчи байни ду расандаи аз як нуқтаи берунии аз давра ба он гузаронида шудааст.

Теоремаи 4.

Кунчи байни ду расандаи аз як нуқтаи берун аз давра ба он гузаронида шуда ба фарқи ин кунҷ бо 180° ва камони расандаҳо васлшуда (тақя шуда) баробар аст.

Исбот. Хатҳои рости BC ва BA расандаҳои аз нуқтаҳои C ва A гузарандаи давра, BD бошад, биссектрисаи секунҷаи ABC бошад. Нишон медиҳем, ки $AB = CB$ ва маркази O ба BD меҳабд, инчунин $\angle B = 180^\circ - \cup AC$ (расми 6) аст.

Барои радиусҳои OA ва OC $OA \perp BA$ ва $OC \perp BC$ буданаш: $\triangle AOB$ ва $\triangle COB$ – росткунҷа $\triangle AOB = \triangle COB$, чунки гипотенуза BO умумӣ $OA = OC = R$ аз баробарии секунҷаҳо: $AB = BC$ акнун $OC = OA = R$ ва $OA \perp BA$, $AB = BC$ ва $OC \perp BC$ буданаш маркази O ба биссектрисаи BD меҳабд. Мувофиқи теоремаи кунчи байни ду расандаи аз як нуқтаи берун аз давра ба он гузаронида шуда:

$$\begin{aligned} \angle B &= 0,5(\cup ADC - \cup AC) = \\ &= 0,5(360^\circ - \cup AC - \cup CA) = 180^\circ - \cup AC. \end{aligned}$$

Пас, $\angle B = 180^\circ - \cup AC$ мешавад.



Теорема исбот шуд

Масъалаи 3. Нуқтаҳои A, B, C -и давраи онро ба камонҳои нисбати $11:3:4$ ҷудо мекунад. Аз нуқтаҳои A, B ва C расандаҳо гузаронида то буридани якдигар давом додаанд. Кунҷҳои секунҷаи ҳосил шударо ёбед.

Ҳал. 1) $\cup BnC : \cup CD : \cup DB = 11 : 3 : 4$, секунҷаи AKL ҳангоми гузаронидани расандаҳои дар нуқтаи расиш ҳосилшуда бошад (расми 7). Кунҷҳои A, AKL ва ALK -ро меёбем:

$$\cup BnC = \frac{360^\circ}{11+3+4} \cdot 11 = 220^\circ; \quad \cup CD = \frac{360^\circ}{11+3+4} \cdot 3 = 60^\circ;$$

$$\cup DB = \frac{360^\circ}{11+3+4} \cdot 4 = 80^\circ;$$




$$\begin{aligned} \cup CDB &= \cup CD + \cup DB = 60^\circ + 80^\circ = 140^\circ; \\ \angle A &= 180^\circ - \cup CDB = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ, \\ \angle BKD &= 180^\circ - \cup DB = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ, \\ \angle AKL &= 180^\circ - \angle BKD = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ, \\ \angle ALK &= 180^\circ - (\angle A + \angle AKL) = 180^\circ - (40^\circ + 80^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ. \end{aligned}$$

Ҷавоб: $\angle A = 40^\circ$, $\angle AKL = 80^\circ$, $\angle ALK = 60^\circ$.



Савол, масъала ва суноришҳо


- 1) Кунчи аз расанда ва хорда сохташуда чӣ гуна чен карда мешавад? Кунҷҳои аз буридашавии ду хорда ҳосилшуда-чӣ?
- 2) Кунчи байни ду буранда ҳосилшуда ба чӣ баробар аст?
- 3) Ду расандаи аз як нуқта гузаронидашуда ба чӣ хел хосият соҳиб аст?
2. Хордаи AB -и ба радиуси давра баробар бо расандаи аз нуқтаи A гузаронидашуда чӣ гуна кунҷҳо ҳосил мекунад?
3. Яке аз кунҷҳои давраро бурандаи байни ду хорда ба 70° баробар аст. Суммаи кунҷҳои ба ҳамин кунҷ ҳамсояро ёбед.
4. Кунчи тағйирёбанда x -и дар расми 8 тасвирёфтaro ёбед.
5. Кунчи байни ду радиус ба 150° баробар, кунчи байни расандаҳои аз охириҳои радиус ба давра гузаронида шударо ёбед.
6. Расандаҳои BA ва BC , ки аз нуқтаи B ба давра гузаронида шудаанд давраро, дар нуқтаҳои расиш дар нисбати: 1) $5 : 4$; 2) $12 : 6$; 3) $9 : 6$; 4) $13 : 7$; 5) $2 : 3$ ба ду камон тақсим мекунанд. Кунчи ABC чанд аст?
7. Аз қуллаҳои хордаҳои давраро дар нисбати: 1) $2 : 7$; 2) $4 : 5$ тақсимкунанда ду расанда гузаронида шудааст. Кунҷҳои секунҷаи ҳосилшударо ёбед.
8. Нуқтаҳои расиши ду расандаи аз нуқтаи берунаи давра гузаронидашуда давраро ба ду камони нисбатан: 1) $1 : 9$; 2) $3 : 15$; 3) $7 : 11$; 4) $3 : 7$ чудо мекунад. Кунҷҳои байни расандаҳоро ёбед.
9. Кунчи байни расандаҳои ба ду қуллаи радиусҳо гузаронидашудаи кунчи марказии аз: 1) 52° ; 2) 74° ; 3) 104° ташкилёфтaro ёбед.
10. Радиуси давра аз диаметри он 40 мм кӯтоҳ. Диаметри давраро ёбед.



59. ХОРДАИ ДАВРА ВА ХОСИЯТИ ДИАМЕТР

Теоремаи 1.

Диаметри ба хорда перпендикуляр ин хорда ва камони ба он таъяқунандаро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мекунад.



Исбот. Давраи марказаш дар нуктаи O ва радиусаш R дода шудааст. Бигзор AB – хордаи давра ва CD – диаметр нуктаи буриши CD ва AB , P дода шуда бошад (расми 1). Исбот мекунем, ки $AP = PB$ ва $\cup AD = \cup DB$ аст. Агар AB диаметри хорда бошад, нуктаи P бо нуктаи O болоиҳои афтида, дар ҳамин нуктаи AB хорда инчунин камони ADB -и нимдавраи онро кашида истида ба ду қисми баробар ҷудо мешавад. Хордаи AB диаметр набошад. Барои ин радиусҳои OA ва OB -ро мегузаронем. AOB -и ҳосилшуда – секунҷаи баробарпахлӯ аст, чунки $OA = OB = R$. Пас, OP – баландии аз қуллаи секунҷаи баробарпахлӯ ба асоси AB фаровардашуда мебошад. Ҳаминтавр, он медиана ва биссектрисаи кунҷи қуллаи O мебошад. Диаметри аз байни хорда гузашта хордаи AB -ро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад, яъне $AP = PB$. OP – AOB аз биссектриса будани он $\angle AOP = \angle BOP$ ҳосил мекунем. Ин кунҷҳо аз барои камонҳои таъяқунанда буданашон $\cup AD = \cup DB$ аст. Теорема исбот шуд.

Теоремаи 2.

Хордаи давра аз диаметри он калон намешавад.

Исбот. Секунҷаи OPB – росткунҷа аст (ба расми 1 ниг.). Дар ин секунҷа OB – гипотенуза, PB – катет. Маълум аст, ки катет аз гипотенуза калон нест, яъне $PB \leq OB$. Аз ин ҷо $2PB \leq 2 \cdot OB$ ва аз $2PB = AB$ ва $2OB = 2R = d$ буданаш $AB \leq d$ бармеояд.

Натиҷаи 1. Диаметри аз миёнаҷои хорда гузаранда, ба ҳамин хорда перпендикуляр аст.

Натиҷаи 2. Перпендикуляри миёнаи хорда диаметри давра аст.




Исботи ин натиҷаҳоро ба худатон ҳавола мекунем.

Масъалаи 1. Хордаи калон будани диаметро исбот кунед.

Ҳал. Бигзор давраи марказаш O ва радиусаш R инчунин хордаи дилхоҳи AB – и аз диаметр фарқкунанда додашуда бошад (расми 2). Парчаҳои OA ва OB мегузаронем. Порчаи AB дар секунҷаи AOB аз ду суммаи тарафи боқимода хурд аст, яъне $AB < OA + OB = R + R = 2R$. Пас, AB хорда аз диаметри хурд мешавад.

Масъалаи 2. Нуктаи A аз давраи радиусаш R берун гирифта шуда он аз маркази давра O дар масофаи d воқеъ аст. Масофаи аз ҳама хурди аз нуктаи A то нуктаи давра ба чӣ баробар аст?

Ҳал. Бигзор B – нуктаи буриши давра бо порчаи OA бошад (расми 3). Масофаи AB аз масофаҳои нуктаи A то давра аз ҳама



хурд буданастро нишон медиҳем. Дарҳақиқат барои нуқтаи дилхохи C -и давра нобаробарии $AB < AC$ -ро $AB + BO < AC + CO$ иҷро шавандааст $BO = CO = R$ -ро ба эътибор гирифта, аз набаробарии охирин набаробарии $AB < AC$ -ро ҳосил мекунем. $AO = d$ ва $BO = R$ -ро ба ҳисоб гирем масофаи аз ҳама хурд ба дарозии порчаи AB , яъне ба $d - R$ баробар аст.


Савол, масъала ва супоришҳо

- 1) 1) Диаметри ба хорда перпендикуляр чӣ гуна хосиятҳо дорад?
- 2) Исбот кунед, ки хордаи давра аз диаметраш калон нест.
- 3) Оё перпендикуляри миёнаҷои хорда диаметр намешавад?
2. Давра кашед ва дар он ду диаметри ба як дигар перпендикуляри AB ва CD гузаронед. Ченаки градусии камони давраи нуқтаҳои A, B, C ва D чудо кардaro ёбед.
3. Хордаи 8 см буда, аз давра камони 90° чудо мекунад. Масофаи аз маркази давра то хордарo ёбед.
4. Аз нуқтаҳои додашудаи давра ду хордаи ба радиус баробар гузаронида шудааст. Кунҷи байни онҳоро ёбед.
5. Аз нуқтаҳои додашудаи давра хордаи ба диаметр ва радиус баробар гузаронида шудааст. Кунҷи байни диаметр ва хордарo ёбед (расми 4).
6. Дар давра ду хордаи параллели аз он кунҷи 90° чудокунанда гузаронида шудааст. Дарозии яке аз онҳо 8 см. Масофаи байни хордахоро ёбед.
7. Исбот кунед, ки ба ғайр аз маркази давра дар нуқтаҳои дигар хордаҳои якдигарро бурранда дар нуқтаи буриш ба ду хиссаи баробар чудо намешавад.
8. Аз нуқтаи A -и давра ду хордаи AB ва AC -и ба радиуси давра баробар гузаронида шудааст. Нуқтаҳои B ва C бо хати рост пайваस्त шудаанд. Радиуси давра 12 см. Масофаи аз маркази давра то хордаи BC -ро ёбед.
9. Дар давра ду хордаи параллел гузаронида шудааст, ки аз он камони дорои 90° чудо мекунад. Дарозии яке аз онҳо 10 см. Масофаи байни хордахоро ёбед.
10. Радиуси давра ба 13 см баробар. Ба ин давра хордаи ба 10 см баробар гузаронида шудааст. Масофаи аз хорда то маркази даврaro ёбед.
11. Порчаи AB – диаметри давраи марказаш дар нуқтаи O – буда мешавад. AC ва CB – хордаҳои баробари хордаи давра, кунҷи COB -ро ёбед.

60. ТАТБИҚ ВА МАШҚИ АМАЛӢ

МАТЕРИАЛҲОИ ИЛОВАГИИ КОМПЕТЕНСИЯИ АМАЛИРО РИВОҶДИҲАНДА МАСОФАИ ГОРИЗОНТ

Масъалаи 1. Квадрати расанда ба ҳосили зарби буранда ва қисми беруни он баробар аст. Инро исбот кунед.



Ҳал. Бигзор дар давраи марказаш O нуқтаи беруни B буранда BE ва BC ва BD расандаҳо гузаронида шуда бошад (расми 1).

$BC^2 = BE \cdot BA$ -ро исбот мекунем. Барои он секунҷаи росткунҷаи BOC ($\angle C = 90^\circ$) дида мебароем. Аз рӯи теоремаи Пифагор:

$$BC^2 = BO^2 - OC^2.$$

Ба ин баробариҳо $BO = BA + AO = BA + R$ ва $OC = R$ -ро гузошта ҳосил мекунем.

$$\begin{aligned} BC^2 &= (BA + R)^2 - R^2 \Rightarrow BC^2 = BA^2 + 2BA \cdot R + R^2 - R^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow BC^2 = BA^2 + 2BA \cdot R \Rightarrow BC^2 = BA \cdot (BA + 2R) \Rightarrow \\ &\Rightarrow BC^2 = BA \cdot BE \end{aligned}$$

Исботи ҳамин талаб карда шуда буд.

1. Мафҳум дар бораи горизонт.

Барои дидани масофаҳои дуртарин дар ҷойи кушод нишаста ба сӯи дуриҳо нигоҳ кунед шумо худро дар сатҳи замин (сатҳи баҳр) гӯё ки осмон хеле наздику ғайр аз он ҳеч чиз нест ва худро дар маркази давра истодагӣ барин ҳис мекунед. Ин горизонт аст. Шумо чӣ хел ба он наздик шавед, вай ҳамон қадар аз шумо дур мешавад. Ба он рафтани намешавад, аммо он дар ҳақиқат мавҷуд. Барои фаҳмидани вобастагии нисбатҳои геометрӣ бо горизонт қисми маълуми кураи заминро тасвиркунанда дар (расми 1) ё ки дар (расми 2) муроҷиат мекунем. Аз ҳамин дар баландии BA нуқтаи B чашми мушоҳидакунанда гузашта шудааст. Ҳамон мушоҳидакунанда аз ҷойи худ гирду атрофро то чӣ қадар дурӣ мушоҳида карда метавонад. Нури биниш ба сатҳи замин то нуқтаҳои C ва D (расми 1) ё ки C (расми 2) мебошад. Аз ин нуқтаҳо дуртар аз нури биниши замин пастар мебошад ин нуқтаҳо (аз нуқтаҳои камони DAC) дигар нуқтаҳо ҳам горизонтро ҳосил мекунад. Ба мушоҳидакунанда ҳамин нуқта, ҳамин ҷое, ки осмон ба замин наздик шуда барин менамояд, чунки мушоҳида кунанда дар ин нуқтаҳо дар як вақт чизҳои ба осмон ва замин бударо мебинад.

2. Дурии (масофаи) горизонт.

Хати горизонт аз мушоҳидакунанда ба қадом масофа меистад ба таври дигар гӯем дар ҷои ҳамвор дарозии радиуси доирае, ки мо худро дар маркази он мебинем чӣ қадар аст?

Агар баландии аз сатҳи замин бардоштаи мушоҳидачӣ маълум бошад, дурии горизонт чӣ хел ҳисоб карда мешавад. Масъала аз ҷаҳми мушоҳидакунанда расандан ба сатҳи замин гузаронида шуда (расми 2) ҳисоб кардани дарозии порчаи BC бармеояд. Аз масъалаи 1 маълум, ки квадрати расанда ба ҳосили зарби порчаи беруни буранда, $BA=h$ дарозии ҳамаи бурандаҳо, яъне $BE=h+2R$ баробар аст: $d^2 = (h + 2R) \cdot h$, Дар инҷо R – радиуси замин, $BC=d$ – масофаи аз мушоҳидакунанда то нуқтаи аз ҳама дур. Аз замин бардоштани бошед мушоҳидакор ба диаметри кураи замин (ба $2R$) нисбатан чудо хурд, масалан нуқтаи аз ҳама болои бардошташавии самолёт аз замин 0,001 ҳиссаи диаметри кураи заминро ташкил медиҳад, онгоҳ $2R+h \approx 2R$ аз ин ҷо: $d^2 \approx 2Rh$.

Пас, дурии горизонтро бо формулаи хеле оддӣ низ ҳисоб кардан мумкин:

$$d \approx \sqrt{2Rh},$$

дар ин ҷо: R – радиуси замин (тахминан 6400 км ё ки аниқтараш 6371 км) h – аз сатҳи замин баландии мушоҳида бардошта, $\sqrt{6400} = 80$ онгоҳ формула намуди зеринро мегирад.

$$d \approx 80\sqrt{2h} \approx 113\sqrt{h}$$

h -ро бо қисмҳои километр ифода кардан мумкин.

Масъалаи 2. Аз самолёти аз замин дар масофаи 10 км ба баланди парίδα истода, чӣ қадар масофаи дуриро дидан мумкин? (радиуси замин тахминан 6370 км).

Ҳал. $OA=R \approx 6370$ км, $AB=h=10$ км. $BC=d$ -ро меёбем (расми 2). Мо медонем, ки квадрати расанда ба ҳосили зарби буранда ва қисми берунии он ба ҳосили зарби буранда ва қисми берунии он $d^2 = (h + 2R) \cdot h$ ё ки

$$d^2 = (10 + 2 \cdot 6370) \cdot 10 = 127500,$$

аз ин ҷо:


$$d = \sqrt{127500} = \sqrt{51 \cdot 2500} = 50\sqrt{51} \approx 50 \cdot 7,141 = 357,05 \approx 360 \text{ (км)}.$$

Ҷавоб: ≈ 360 км.

Масъалаи 3. Аз замин 4 км ба боло баромадан аз ҳаво чӣ қадар масофа маълум мешавад? Радиуси замин тахминан 6370 км.
Ҷавоб: $\approx 225,8$ км.

Масъалаи 4. Куллаи Элбурси кавказ аз сатҳи баҳр ≈ 5600 м (аниқаш 5642 м) ба баландӣ ҷойгир шудааст аз ҳамон баландӣ чӣ қадар дуриро дидан мумкин? Радиуси замин тахминан 6370 км. *Ҷавоб:* ≈ 270 км.

Дар хотир доред! Дар масъалаҳои дар боло ҳақиқатда омилҳои физикиро ба ҳисоб нагирифтаем. Дурии горизонт дар бисёр омилҳо вобаста буда, каме зиёдтар ё ки камтар шудани мумкин.




НУҚТАҲОИ АҶОИБИ СЕКУНЧА

Чорто нуқтаҳои аҷоибӣ секунҷаро дида мебароем.

1. Нуқтаи буриши баландиҳои секунҷа.

Теоремаи 1.

Баландиҳои секунҷа (ё ки давоми онҳо) дар як нуқта бурида мешавад.



Исбот. AD , BF ва CE – ABC баландиҳои секунҷаи (расми 1, *a*). Аз қуллаи секунҷа ба тарафҳои муқобилаш хатҳои ростӣ параллел мегузаронем. Дар натиҷа тарафҳояш ба баландии секунҷаи ABC перпендикуляр секунҷаи $A_1B_1C_1$ – ро ҳосил мекунем. Аз рӯи сохт, C , B_1C_1 ва $B_2A_1C_1$ чоркунҷаҳо – параллелограмм, аз ин $C_1A_1=BC$ ва $BC=AB_1$ буданаш бармеояд. Пас, нуқтаи A миёнаҳои порчаи, B_1C_1 . Ҳаминтавр нуқтаи B миёнаи A_1C_1 ва C бошад, миёнаҳои A_1B_1 буданаш исбот карда мешавад.

Ҳаминтавр баландиҳои, AD , BF ва CE ба перпендикулярӣ миёнаи секунҷаи $A_1B_1C_1$ меҳобад. Пас, онҳо дар як нуқта бурида мешавад. Қайд мекунем, ки баландиҳои секунҷа якдигарро намебурад. Баландии кунҷи кунди секунҷаҳо фақат дар як нуқта мебурад аммо ҳуди баландиҳо намебурад (расми 1, *b*).

Баландиҳои секунҷа (ё ки давоми онҳо)-ро ортомарказ меноманд.

Масъала. Қадоме аз тарафҳои секунҷа ба ортомарказ наздик ҷойгир шудааст?

Ҳал. ABC дар секунҷаи $AC > BC$ бошад (расми 2). Барои баландии CD – секунҷа аз нобаробариҳои истифода мебарем $AD > BD$ нобаробарӣ ва пас, $\angle ACD > \angle BCD$ аз иҷрои нобаробарӣ истифода мебарем. Ин нуқтаҳои баландӣ наздик будан ба

тарафи хурди аз ин қулла тарафҳои барояндаро мефаҳмонад. Пас, ортомаркази секунҷа ба тарафи хурд наздик воқеъ аст.

2. Нуқтаҳои буриши медианаҳои секунҷа.

Теоремаи 2.

Медианаҳои секунҷа дар як нуқта бурида мешавад ва дар ин нуқта аз қулла саркарда ҳисобкунаки ба нисбати $2:1$ тақсим мешавад.

Исбот. Бигзор дар секунҷаи ABC медианаҳои AA_1 , BB_1 ва CC_1 гузаронида шуда бошад (расми 3) дар ягон нуқтаи O буридашавӣ ва ба $AO:OA_1=BO:OB_1=CO:OC_1=2:1$ тақсимшавиашро исбот мекунем.

O – AA_1 ва CC_1 нуқтаҳои буриши медианаҳо, D ва E мувофиқан миёнаҳои порчаҳои AO ва CO бошад. C_1A_1 хати миёнаи секунҷаи ABC ва мувофиқи хосияти хати миёнаи секунҷа: $C_1A_1 \parallel AC$, $C_1A_1 = 0,5AC$. Ғайр аз он DE – хати миёнаи DE -и AOC ва мувофиқи ҳамин хосият: $DE \parallel AC$, $DE = 0,5AC$. Пас, чоркунҷаи DC_1A_1E ду тарафаш параллел ва баробар. Ҳаминтавр DC_1A_1E – параллелограмм, диагоналҳои DA_1 ва C_1E -и он онро ба ду ҳиссаи баробар тақсим мекунад. Пас, $AD=DO=OA_1$, $CE=EO=OC_1$, яъне AA_1 ва CC_1 ва медианаҳо дар нуқтаи O ба $2:1$ нисбат тақсим мешавад.

Ба мисли ҳамин BB_1 медианаи сеюм AA_1 ба медианаҳои CC_1 дар нуқтаи буриш ба $2:1$ нисбат чудо мешавад. Барои ҳар як медиана ин тақсимшавӣ ягона ва пас, се медиана он дар як нуқта бурида мешавад.

Нуқтаҳои буриши медианаҳои секунҷаро *сентроид* ё ки *маркази вазнинӣ* ҳам меноманд. Ин хел номгузориро дар таҷрибаи зерин санҷед: аз қоғази картон секунҷаи дилхоҳ бурида гиред ва медианаҳои онро гузаронед баъд бо сӯзан ё ки қалами нӯгтез ба болои нуқтаи буриши медианаҳо гузоред бо мувозинат доштан ҳаракат кунед (расми 4).



3. Нуқтаҳои буриши биссектрисаҳои секунҷа.

Теоремаи 3.

Се биссектрисаҳои секунҷа дар як нуқта бурида мешаванд.

Исбот. AA_1 ва BB_1 биссектрисаҳои секунҷаи ABC -ро бо O – ишорат мекунем. Аз он нуқта мувофиқаи ба хатҳои рости AB , BC ва CA перпендикулярҳои OK , OL ва OM -ро мегузаронем (расми 5). Ба мо маълум аст, ки масофаи нуқтаи дилхоҳи биссектрисаи кунҷ то масофаи тарафҳои он баробар аст $OK=OK$ ва $OK=OL$. Барои ҳамин $ON=OL$, яъне нуқтаи O аз кунҷи ACB дар тарафҳои якхел дурӣ баробар меҳобад ва пас дар биссектрисаи CC_1 меҳобад. Аз ин ҷо се биссектрисаи ABC -и буриш бармеояд.

Теорема исбот шуд.




4. Нуқтаи буриши перпендикулярӣ миёнаи секунча.

Теоремаи 4.

Перпендикулярӣ миёнаи тарафҳои секунча дар як нуқта бурида мешавад.

Исбот. Бигзор секунчаи $\triangle ABC$ дода шуда бошад (расми 6). Ба тарафҳои m ва n -и он перпендикулярӣ AB ва BC мегузaronем. Онҳо дар ягон нуқтаи O – бурида мешавад. Буриши хатҳои ростӣ ба хатҳои ростӣ бурида перпендикуляр. Ба мо маълум аст, ки масофа аз нуқтаи дилхоҳи перпендикулярӣ миёнаи порча то нӯғҳои




он баробар аст. Мувофиқи он $OA=OB$ (1) ва $OB=OC$ (2) мешавад. Аз баробарии (1) ва (2) меёбем: $OA=OC$. Пас, перпендикулярӣ миёнаи AC – p ҳам аз нуқтаи O мегузарад. Ҳаминтавр нуқтаи O – аз қуллаи секунчаи $\triangle ABC$ дар як хел дури воқеъ аст: $OA=OB=OC$. Аз ин ҷо се перпендикулярӣ $\triangle ABC$ ва m, n ва p -и ба тарафҳои секунчаи $\triangle ABC$ гузаронида шуда, дар нуқтаи O якдигарро мебурад. Теорема исбот шуд.



Савол, масъала ва супошиҳо

- 1) Оё ҳамеша баландиҳои секунча якдигарро мебуранд?
- 2) Шумо чанд нуқтаи аҷоибӣ секунчаро медонед? Онҳоро гӯед.
3. Нуктаҳои аҷоибӣ секунчаи баробар тараф чӣ хел ҷойгиранд?
3. Агар ба секунча 2 – то медиана баробар бошад, онгоҳ он баробарпахлӯ мешавад. Инро исбот кунед.



Ҳал. Дар секунчаи ABC медианаҳои AD ва CE баробар ва дар нуқтаи O бурида мешаванд (расми 7). Секунчаҳои AOE ва COD -ро дида мебароем нуқтаи O медианаҳои AD ва CE -ро ба нисбати $2:1$ тақсим мекунад. Бинобарии $AO=CO$, $EO=DO$ мешавад. Ғайр аз ин барои кунҷи вертикал буданаш $\angle AOE=\angle COD$. Пас, мувофиқи аломати 1-уми баробарии секунчаҳо $\triangle AOE=\triangle COD$. Аз ин ҷо $AE=CD$ бармеояд, мувофиқи таърифи медиана ин порчаҳо ба нисфи тарафи AB ва CB баробар. Пас, ин порчаҳо аз рӯи таърифи медиана $AB=CB$, яъне секунчаи

ABC баробарпахлӯ будааст, инро исбот кардан лозим буд.

4. Исбот кунед, ки чорто нуқтаи аҷоибӣ секунчаи баробарпахлӯ дар як хати рост мебошад. Он кадом хати рост мебошад?
5. Нуқтаи буриши медианаҳои секунча бо ортомарказ болои ҳам меафтад. Баробар тараф будани секунчаи дода шударо исбот кунед.
6. Оё қуллаи секунчаи нуқтаи буриш, баландиҳо шуда метавонанд?
7. Нуқтаи буриши медианаҳо фарқи яке аз медианаҳо 3 см ба қисмҳои баробар чудо мекунад. Дарозии ин медианаҳо ёбед.

61–62. 5- КОРИ НАЗОРАТӢ. ИСЛОҲ НАМУДАНИ ХАТОГИҲО

1. AB – диаметри давраи марказаш – O . Агар $OA=OC=AC$ бошад, кунчи BCO -ро ёбед
2. 1) Масофаи аз ҳама калон ва аз ҳама хурди аз нуқтаи берунии давраро то нуқтаи давра мувофиқан 50 см ва 20 см мебошад. Радиуси давраи дода шударо ёбед. 2) Аз маркази давра то нуқтаи B масофа ба 3 см, радиус ба 10 см баробар аст. Масофаи аз ҳама калон ва аз ҳама хурди то нуқтаи B -ро ёбед.
3. Хатҳои ростии AB ва AC дар давраи марказаш – O дар нуқтаҳои B ва C мерасад. Агар $\angle OAB = 30^\circ$ ва $AB = 5$ см бошад, BC -ро ёбед.
4. Давра ба нисбати $11:16 : 9$ ба се камон ҷудо шудааст ва нуқтаҳои, ҷудошавӣ пайваस्त карда шудааст. Бузургии кунчи ҷудокунии секунҷаи ҳосил шударо ёбед.

ТЕСТИ 5

Худро санҷида бинед!

1. Масофа аз маркази давра то нуқтаи B ба 5 см, радиус ба 12 см баробар аст. Масофаи аз ҳама хурд ва калони то нуқтаи B – бударо ёбед.
 А) 7 см, 17 см; В) 7 см, 12 см; Д) 5 см, 7 см; Е) 7 см, 24 см.
2. Масофаи аз ҳама калон ва аз ҳама хурди нуқтаи берунии давра то нуқтаи он мувофиқан ба 30 см ва 10 см баробар, радиуси давраи додашударо ёбед.
 А) 20 см; В) 10 см; Д) 15 см; Е) 5 см.
3. AB – диаметри давраи марказаш – O . Агар $OA=OC=BC$ бошад, кунчи CAO – ро ёбед,
 А) 60° ; В) 30° ; Д) 90° ; Е) 120° .
4. Аз нуқтаи давраи радиусаш R ду хордаи дарозиаш ба R баробар гузаронида шуд. Кунчи байни хордаҳоро ёбед.
 А) 120° ; В) 110° ; Д) 135° ; Е) 40° .
5. Яке аз кунҷҳои байни ду хордаи давраро буранда ба 80° баробар аст. Суммаи кунҷҳои ба ин кунҷ ҳамсояро ёбед.
 А) 200° ; В) 90° ; Д) 100° ; Е) 160° .
6. Аз нуқтаи берунии давра ба он ду расанда гузаронида шудааст. Агар кунчи байни онҳо 72° бошад, камони калони нуқтаҳои байни расиши давраро ёбед.
 А) 248° ; В) 240° ; Д) 252° ; Е) 236° .

Забони англисиро меомӯзем!



Давра – circle

Хорда – chord

Радиус – radius

Камон – arc

Диаметр – diameter

Кунчи марказӣ – central angle

Расанда ба давра – tangent to the circle

Перпендикуляр – perpendicular



Малумотҳои таърихӣ



Абулвафо Бузҷонӣ
(940–998)

Абулвафо Бузҷонӣ соли 940 дар шаҳри Бузҷони байни шаҳрҳои Ҳирот ва Нишопури вилояти Хуросон (шаҳри Кушкаи Туркменистони имрӯза) таваллуд ёфтааст. Ӯ дар Бағдод таҳсил гирифта, эҷод кардааст.


Бобҳои якум ва дуҷуми китоби «Ҳунармандон аз сохтаниҳои геометрӣ чихоро бояд донанд?» Ба сохтаниҳо бо ёрии хаткашак ва паргор (сиркул) бахшида шудааст. Мо ба шумоён масъаларо дар бораи ёфтани маркази давра, ки ба Абулвафо мансуб аст, меорем.

«Агар «маркази давра чӣ гуна ёфта мешавад?» гӯён нурсанд, дар давра нуқтаҳои A ва B -ро ишора карда, дар масофаи AB нуқтаҳои A ва B -ро марказ интиҳоб карда, ду давраи баробар мекашем, онҳо дар нуқтаҳои C ва D бурида мешаванд (расми 1). Хати ростии CD мегузаронем ва онро ба давра то буриши дар нуқтаҳои E ва F давом медиҳем, сонӣ хати ростии EF -ро дар нуқтаи O ба ду ҷисса ҷудо мекунем. Дар он ҳол нуқтаи O маркази давра мешавад».


Ин усул ба он асос ёфтааст, ки камонҳои аз марказҳои A ва B сохташуда, дар нуқтаҳои CD бурида мешаванд ва ба хордаи AB перпендикуляр буда, аз маркази давра мегузарад. Ҳоло ин масъала чунин ҳал мешавад: фараз мекунем, ба мо давраи марказаш ишоранагашта дода шудааст ва талаб карда мешавад, ки маркази он муайян карда шавад (расми 2). Аз нуқтаи A ба ин давра расандаҳои AB ва AC -ро гузаронида биссектрисаи кунҷи BAC -ро месозем. Биссектриса кунҷро дар нуқтаҳои D ва E мебурад. Агар DE ба ду ҷиссаи баробар ҷудо карда шавад, нуқтаи тақсим O маркази давра мешавад. Чаро? Ва ё агар дар нуқтаи B ба расандаи AB перпендикуляр гузаронем, он биссектрисаро дар нуқтаи O мебурад. Нуқтаи O маркази давра мешавад. Чаро?

Дар баробари ин, Абулвафо масъалаҳоро, аз қабилӣ барқарор намудани давра аз рӯи камони додашуда, дар бораи сохтани расанда ба давра аз нуқтаи додашуда ва берун аз он, дар бораи сохтани расанда дар нуқтаи додашудаи давра ҳал мекунад.

1




2





БОБИ VI ТАКРОРӢ



Машқҳо барои такрори маводҳои омӯхташудаи синфи 8

1. Сето кунчи берунии чоркунча ба таври мувофиқ ба 142° , 22° ва 136° баробар аст. Кунҷҳои ҳамин чоркунчаро ёбед.
2. Тарафи хурди чоркунча ба 7 см баробар, ҳар яки тарафҳои боқимонда аз пешина 4 см-и калон аст. Периметри ин чоркунчаро ёбед.
3. Кунчи тези трапетсияи росткунча ба 45° баробар. Тарафи хурди паҳлӯ, инчунин асоси хурдаш ба 24 см баробар аст. Асоси калони трапетсияро ёбед.
4. Тарафҳои секунҷаи баробарпаҳлӯ: 1) 6 см, 5 см ва 5 см, 2) 24 см, 15 см ва 5 см, 3) 3,2 дм, 20 см ва 20 см, 4) 22 см, 60 см ва 60 см. Масоҳати ин секунҷа ва баландии ба тарафи паҳлӯи гузаронида шударо ёбед.
5. $ABCD$ дар чоркунҷаи $AB=CD$, $AD=BC$, аз кунҷи A аз кунҷи B 3 маротиба калон. Кунҷҳои чоркунчаро ёбед.
6. $ABCD$ агар дар трапетсияи баробарпаҳлӯ $BC=20$ см, $AB=24$ см ва $\angle D=60^\circ$ бошад, асоси AD -ро ёбед.
7. Дар секунҷаи $\triangle ABC$ AE ва BD – баландиҳо. $AC=20$ см, $BD=16$ см ва $BC=32$ см. AE -ро ёбед.
8. Масоҳати секунҷаи росткунча ба 168 см² баробар аст. Агар яке аз катетҳо ба $\frac{7}{12}$ қисми дуюмаш баробар бошад, катетҳои секунҷаро ёбед.
9. Масоҳати секунҷа 24 см². Баландии ба тарафи 16 см баробари секунҷа гузаронида шударо ёбед.
10. Ромби $ABCD$ дода шудааст. Диагоналҳои AC ва BD мувофиқаи ба 30 см ва 12 см баробар. Масоҳати ромбро ёбед.
11. Масоҳати секунҷаро аз рӯи се тарафаш ёбед:
1) 15, 15, 18; 2) 39, 42, 45; 3) 4, 13, 15; 4) 29, 25, 6.
12. Дар секунҷаи ABC $BC=34$ см. EF перпендикуляри аз миёнаи порчаи BC ба хати ростии AC гузаронида, тарафи AC , $AF=25$ см ва $FC=15$ см ба порчаҳо чудо мекунад. Масоҳати секунҷаи ABC -ро ёбед.
13. Диагоналҳои ромб 18 дм ва 24 дм. Периметр ва масофаи байни тарафҳои параллелро ёбед.
14. Баландии трапетсияи баробарпаҳлӯ аз тарафи паҳлӯи ду маротиба хурд. Кунҷҳои трапетсияро ёбед.

15. Масофаи нуктаи дилхоҳи секунҷаи баробартараф то тарафҳои он тағирнаёбанда яхкел ва ба баландии ин секунҷа баробар. Инро исбот кунед.
16. Нуктаҳои A , B , C -и, – давра онро ба нисбати: 1) $14:6:4$; 2) $13:12:5$; 3) $17:10:9$ ба камонҳо чудо мекунад. Аз нуктаҳои A , B ва C расандаҳо гузаронида то буридани якдигар давом дода шудааст. Кунҷҳои секунҷаи ҳосил шударо ёбед.
17. Агар қади росткунҷа 30% зиёд карда шавад ва бараш 30 % кам карда шавад, масоҳати он чӣ қадар тағйир меёбад?
18. Агар асоси секунҷа 20% дароз карда шавад, баландии он 20 % кӯтоҳ карда шавад, масоҳати он чӣ хел тағйир меёбад?
19. Масоҳати росткунҷа ба 540 см^2 баробар. Нисбати ду тарафаш ба $3:5$ периметри ин росткунҷаро ёбед.
20. Масоҳати параллелограмм ба 24 см^2 баробар. Агар баландиҳояш ба 3 см ва 4 см баробар бошад. Периметри онро ёбед:
1) $\overline{AB} + \overline{BC}$; 2) $\overline{AD} + \overline{DC}$; 3) $\overline{AB} - \overline{AD}$; 4) $\overline{DB} - \overline{DA}$.
21. Ягон параллелограмми $ABCD$ -ро созед. Векторҳояшро созед.
22. Агар: 1) $A(0; 1)$, $B(1; 0)$; 2) $A(-2; 1)$, $B(-4; 3)$, \overline{AB} бошад, координатҳои вектори AB ба чӣ баробар аст?
23. Дар секунҷаи ABC AA_1 – медиана, O – AA_1 – ро миёнаҷояш. \overline{BO} вектор бо векторҳои $\vec{a} = \overline{BA}$ ва $\vec{b} = \overline{BC}$ ифода кунед.
24. Диагонали параллелограмми $ABCD$ дар нуктаи O бурида мешавад. Нуктаи P миёнаи OB аст. \overline{AP} -ро бо ёрии векторҳои $\overline{AB} = \vec{a}$ ва $\overline{AC} = \vec{b}$ ифода кунед.
25. Расандаҳои аз нӯғҳои камони 240° -нок то буридани якдигарӣ давом дода шудаанд. Кунҷи байни онҳоро ёбед.
26. Яке аз кунҷҳои параллелограмм аз дигараш 4 маротиба калон. Кунҷи калони ҳамин параллелограммро ёбед.
27. Масоҳати росткунҷа 288 см^2 . Нисбати ду тарафаш ба $1:2$ баробар аст. Масоҳати ин росткунҷаро ёбед.
28. Баландии ба яке аз тарафҳои параллелограмм гузаронида шуда аз ҳамон тараф се баробар хурд. Масоҳати параллелограмм 48 см^2 . Баландӣ ва ҳамин тарафро ёбед.
29. Масоҳати квадрат 16 см^2 . Агар 1) ҳамаи тарафашро ду маротиба кӯтоҳ кунем; 2) ҳамаи тарафи онро 3 маротиба дароз кунем, масоҳати квадрат чӣ хел тағйир меёбад?
30. Агар: 1) 1) $A(7; -5)$, $B(-9; -3)$; 2) $A(-8; 2)$, $B(-12; -4)$; 2) $A(8; -1)$, $B(-16; -11)$ бошад, миёнаи порчаи AB – координатаҳои нуктаи C -ро ёбед.

1. Тарафи хурди росткунча ба 10 см баробар, диагоналҳояш бошад, дар таҳти кунчи 60° мебурад. Диагоналҳои росткунчаро ёбед.
2. Тарафҳои секунча ба 11 см, 7 см ва 10 см баробар аст. Периметри секунча ва хатҳои миёнаи секунчаи ҳосилшударо ёбед.
3. Тарафҳои секунча ба 21 см, 72 см ва 75 см баробар аст. Масоҳати ин секунчаро ёбед.
4. Кунчи байни ду расандаи аз берун ба давра гузаронида шуда ба 75° баробар аст. Камонҳои тарафҳои расандаро дар доҳили худ гирифтаре ёбед.
5. $\vec{a}(2; -3)$ ва $\vec{b}(-2; -3)$ векторҳо дода шудааст. Координатҳои вектори $\vec{m} = \vec{a} - 2\vec{b}$ -ро ёбед.

ТЕСТИ 6

Худатонро санчида бинед!

1. Кунҷҳои чоркунча байни худ ба нисбати 3:5:4:6 дода шудааст. Кунҷи хурди росткунчаро ёбед.
А) 80° ; В) 30° ; Д) 60° ; Е) 40° .
2. Диагоналҳои чоркунчаи барҷаста онро ба чанд секунча ҷудо мекунад?
А) 4; В) 5; Д) 6; Е) 8.
3. Бари росткунча ба 5 см баробар, дарозии он аз 7 см зиёд. Периметри росткунчаро ёбед.
А) 32 см; В) 34 см; Д) 24 см; Е) 26 см.
4. Ҳар як кунҷи дарунии чоркунчаи барҷаста ба 162 баробар бошад, он чанд тараф дорад?
А) 18-то; В) 20-то; Д) 15-то; Е) 12 -то.
5. Нисбати ду тарафи параллелограмм ба 3:7 периметраш бошад, ба 18 см баробар аст. Тарафи хурди ҳамин параллелограммро ёбед.
А) 2,7 см; В) 3,4 см; Д) 5,4 см; Е) 4,5 см.
6. Бари майдони росткунчашакл 32 м. Агар масоҳати майдон 2 гектар бошад, дарозии он чанд метр мешавад?
А) 610 м; В) 615 м; Д) 625 м; Е) 630 м.
7. Баландии ромб ба 5 см, ҳосили зарби диагоналҳо ба 80 см^2 баробар аст. Периметри онро ёбед.
А) 32 см; В) 16 см; Д) 24 см; Е) 28 см.
8. Векторҳои $\vec{a}(2; -3)$ ва $\vec{b}(-2; -3)$ дода шудааст. Координатаҳои вектори $\vec{m} = -\vec{a} + 2\vec{b}$ -ро ёбед.
А) (-6; -3); В) (-3; 6); Д) (-2; -9); Е) (2; -3).
9. Вектори $\vec{a}(3; 2)$ ва $\vec{b}(0; -1)$ дода шудааст. Модули вектори $2\vec{a} - 4\vec{b}$ -ро ёбед.
А) 10; В) 6; С) 8; Д) 3.

Ҷадвали қимматҳои функсияҳои тригонометрии кунҷи тез. Илова.

| Градусҳо | $\sin\alpha$ $1^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ | $\operatorname{tg}\alpha$ $1^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ | $\operatorname{ctg}\alpha$ $1^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ | $\cos\alpha$ $1^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ | Градусҳо |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 1 | ≈ 0,0175 | ≈ 0,0175 | ≈ 57,290 | ≈ 0,9998 | 89 |
| 2 | ≈ 0,0349 | ≈ 0,0349 | ≈ 28,636 | ≈ 0,9994 | 88 |
| 3 | ≈ 0,0523 | ≈ 0,0524 | ≈ 19,081 | ≈ 0,9986 | 87 |
| 4 | ≈ 0,0698 | ≈ 0,0699 | ≈ 14,301 | ≈ 0,9976 | 86 |
| 5 | ≈ 0,0872 | ≈ 0,0875 | ≈ 11,430 | ≈ 0,9962 | 85 |
| 6 | ≈ 0,1045 | ≈ 0,1051 | ≈ 9,514 | ≈ 0,9945 | 84 |
| 7 | ≈ 0,1219 | ≈ 0,1228 | ≈ 8,144 | ≈ 0,9925 | 83 |
| 8 | ≈ 0,1392 | ≈ 0,1405 | ≈ 7,115 | ≈ 0,9903 | 82 |
| 9 | ≈ 0,1564 | ≈ 0,1584 | ≈ 6,314 | ≈ 0,9877 | 81 |
| 10 | ≈ 0,1736 | ≈ 0,1763 | ≈ 5,671 | ≈ 0,9848 | 80 |
| 11 | ≈ 0,1908 | ≈ 0,1944 | ≈ 5,145 | ≈ 0,9816 | 79 |
| 12 | ≈ 0,2079 | ≈ 0,2126 | ≈ 4,705 | ≈ 0,9781 | 78 |
| 13 | ≈ 0,2250 | ≈ 0,2309 | ≈ 4,331 | ≈ 0,9744 | 77 |
| 14 | ≈ 0,2419 | ≈ 0,2493 | ≈ 4,011 | ≈ 0,9703 | 76 |
| 15 | ≈ 0,2588 | ≈ 0,2679 | ≈ 3,732 | ≈ 0,9659 | 75 |
| 16 | ≈ 0,2756 | ≈ 0,2867 | ≈ 3,487 | ≈ 0,9613 | 74 |
| 17 | ≈ 0,2924 | ≈ 0,3057 | ≈ 3,271 | ≈ 0,9563 | 73 |
| 18 | ≈ 0,3090 | ≈ 0,3249 | ≈ 3,078 | ≈ 0,9511 | 72 |
| 19 | ≈ 0,3256 | ≈ 0,3443 | ≈ 2,904 | ≈ 0,9455 | 71 |
| 20 | ≈ 0,3420 | ≈ 0,3640 | ≈ 2,747 | ≈ 0,9397 | 70 |
| 21 | ≈ 0,3584 | ≈ 0,3839 | ≈ 2,605 | ≈ 0,9336 | 69 |
| 22 | ≈ 0,3746 | ≈ 0,4040 | ≈ 2,475 | ≈ 0,9272 | 68 |
| 23 | ≈ 0,3907 | ≈ 0,4245 | ≈ 2,356 | ≈ 0,9205 | 67 |
| 24 | ≈ 0,4067 | ≈ 0,4452 | ≈ 2,246 | ≈ 0,9135 | 66 |
| 25 | ≈ 0,4226 | ≈ 0,4663 | ≈ 2,145 | ≈ 0,9063 | 65 |
| 26 | ≈ 0,4384 | ≈ 0,4877 | ≈ 2,050 | ≈ 0,8988 | 64 |
| 27 | ≈ 0,4540 | ≈ 0,5095 | ≈ 1,963 | ≈ 0,8910 | 63 |
| 28 | ≈ 0,4695 | ≈ 0,5317 | ≈ 1,881 | ≈ 0,8829 | 62 |
| 29 | ≈ 0,4848 | ≈ 0,5543 | ≈ 1,804 | ≈ 0,8746 | 61 |
| 30 | 0,5000 | ≈ 0,5774 | ≈ 1,732 | ≈ 0,8660 | 60 |
| 31 | ≈ 0,5150 | ≈ 0,6009 | ≈ 1,664 | ≈ 0,8572 | 59 |
| 32 | ≈ 0,5299 | ≈ 0,6249 | ≈ 1,600 | ≈ 0,8480 | 58 |
| 33 | ≈ 0,5446 | ≈ 0,6494 | ≈ 1,540 | ≈ 0,8387 | 57 |
| 34 | ≈ 0,5592 | ≈ 0,6745 | ≈ 1,483 | ≈ 0,8290 | 56 |
| 35 | ≈ 0,5736 | ≈ 0,7002 | ≈ 1,428 | ≈ 0,8192 | 55 |
| 36 | ≈ 0,5878 | ≈ 0,7265 | ≈ 1,376 | ≈ 0,8090 | 54 |
| 37 | ≈ 0,6018 | ≈ 0,7536 | ≈ 1,327 | ≈ 0,7986 | 53 |
| 38 | ≈ 0,6157 | ≈ 0,7813 | ≈ 1,280 | ≈ 0,7880 | 52 |
| 39 | ≈ 0,6293 | ≈ 0,8098 | ≈ 1,235 | ≈ 0,7771 | 51 |
| 40 | ≈ 0,6428 | ≈ 0,8391 | ≈ 1,192 | ≈ 0,7660 | 50 |
| 41 | ≈ 0,6561 | ≈ 0,8693 | ≈ 1,150 | ≈ 0,7547 | 49 |
| 42 | ≈ 0,6691 | ≈ 0,9004 | ≈ 1,111 | ≈ 0,7431 | 48 |
| 43 | ≈ 0,6820 | ≈ 0,9325 | ≈ 1,072 | ≈ 0,7314 | 47 |
| 44 | ≈ 0,6947 | ≈ 0,9657 | ≈ 1,036 | ≈ 0,7193 | 46 |
| 45 | ≈ 0,7071 | 1,0000 | 1,000 | ≈ 0,7071 | 45 |
| Градусҳо | $\cos\alpha$ $45^\circ \leq \alpha \leq 89^\circ$ | $\operatorname{ctg}\alpha$ $45^\circ \leq \alpha \leq 89^\circ$ | $\operatorname{tg}\alpha$ $45^\circ \leq \alpha \leq 89^\circ$ | $\sin\alpha$ $45^\circ \leq \alpha \leq 89^\circ$ | Градусҳо |

Чавобҳо

Тақрари маводҳои синфи 7-ум. **5.** 9 дм. **7.** 3 см. **9.** Ҳа, баробар. **10.** $52^\circ, 63^\circ, 65^\circ$. **11.** 60° . **13.** $24^\circ, 72^\circ, 84^\circ$. **14.** Не, намешавад. **18.** 58° .

Боби-I. Мавзӯи 1. 2. 1) $n=8$; 2) $n=11$; 3) $n=24$. **4.** 60° . **5.** 1) $n=12$; 2) $n=36$; 3) $n=40$. **6.** $n=8$ та. **7.** 1) $n=20$ то; 2) $n=15$ -то; 3) $n=6$ та. **9.** 1) $n=24$ -то; 2) $n=8$ -то; 3) $n=5$ та. **10.** $36^\circ, 72^\circ, 108^\circ, 144^\circ$. **Мавзӯи 2. 2.** 25,5 см, 50,5 см. **3.** 1) $35^\circ, 145^\circ, 35^\circ, 145^\circ$; 3) $85^\circ, 105^\circ, 85^\circ, 105^\circ$. **4.** $P_{ABO}=20$ см; $P_{BOC}=24$ см. **5.** $AB=DC=16$ см, $AD=BC=4$ см. **Мавзӯи 3. 2.** 1) Ҳа, дуруст. **3.** 32 см. **7.** 26 см ё ки 28 см. **8.** $45^\circ, 135^\circ, 135^\circ, 45^\circ$. **9.** 26 см. **Мавзӯи 4. 2.** 1) 9 см; 2) 7 см. **3.** 12 см. **4.** $AB=DC=4$ см, $BC=AD=8$ см. **6.** 1) $4+7 < 12$ – на бо секунча иҷро нашуд; не шуданиш мумкин нест. **7.** 7 см, 14 см, 7 см, 14 см. **Мавзӯҳои 5–6. 2.** 10 см. **3.** $BP=12$ см. **5.** 7 см. **6.** $40^\circ, 140^\circ, 40^\circ, 140^\circ$. **9.** 12 см, 24 см, 30 см, 42 см. **10.** 64 см. **12.** 30 см. **13.** 32 см. **Мавзӯҳои 7–8. 3.** 150° . **4.** 23 см. **6.** 27 см, 11 см. **7.** 20 см, 14 см. **10.** $90^\circ, 90^\circ, 100^\circ, 80^\circ$. **12.** 70 см. **Мавзӯи 9. 3.** $AC=5$ см. **4.** $OB_1=3,2$ см, $OB_2=4,8$ см, $OB_3=6,4$ см. **6.** 2) 19 см. **8.** $x=4$. **9.** $OB_1=9$ см, $OB_2=13,5$ см, $OB_3=18$ см. **Мавзӯҳои 10–11. 2.** 2,5 см, 3,5 см, 5,5 см. **4.** 22 см, 10 см. **6.** 2) 15 см. **9.** 24 см, 12 см. **10.** 3 см. **11.** 30 см, 10 см. **12.** 12 см.

Боби-II. Мавзӯи 15. 2. а) $\cos\alpha$; б) $\operatorname{tg}\alpha$; в) $\sin\alpha$; г) $\operatorname{ctg}\alpha$. **4.** а) Ҳа, чунки $0,98 < 1$; б) не, чунки $\sqrt{2} > 1$; в) ҳа, чунки $\sqrt{5} - 2 < 1$. **5.** $ML=24$, $MN=25$. **6.** $\sin M = \frac{5}{13}$, $\cos M = \frac{12}{13}$, $\operatorname{tg} M = \frac{5}{12}$, $\operatorname{ctg} M = \frac{12}{5}$. **Мавзӯи 16. 2.** а) Дуруст, чунки $a=c\sin\alpha$; в) нодуруст, чунки $a=C\sin\alpha$; г) $c = \frac{a}{\sin\alpha}$. **3.** Ҳа, чунки кимати муодила адади дилхоҳи мусбат мешавад. **4.** 1) 16 см; 2) 50 см. **6.** 16 см. **7.** 5 см. **8.** 50 см. **Мавзӯи 17. 2.** 1) 13; 2) 9; 3) 2,5. **3.** 1) 40 см; 2) 100 см. **4.** $x = \sqrt{3}$; $y = \sqrt{2}$. **5.** 1) 0,5; 2) $4\sqrt{2}$; 3) 0,8; 4) 1,5. **Мавзӯи 18. 2.** 1) Не, чунки $121+49 \neq 289$; 2) ҳа, чунки $3^2+1,6^2=3,4^2$, $11,56=11,56$. **5.** Ба 2-то ҳал соҳиб аст. **6.** 1) Ҳа, чунки $12^2+35^2=37^2$; 2) не чунки $11^2+20^2 \neq 25^2$. **Мавзӯи 19.**

1. 1) 9,6 см, 9,6 см, 8 см. **2.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}h$. **3.** 1) $h_b = \frac{12}{7}\sqrt{6}$ см; 2) $h_c = 11,2$ дм; 3) $h_b = 6,72$ см. **4.** $h = 6\sqrt{3}$ см. **5.** $h_a = \frac{15}{4}\sqrt{7}$ см; $h_c = \frac{5}{2}\sqrt{7}$ см. **7.** $h_a = \frac{3}{2}\sqrt{15}$ см. **Мавзӯҳои 20–21. 2.** 1) $\frac{5}{13}$; 2,4; $\frac{5}{12}$. **4.** 1) 2; 2) 1; 3) 1. **5.** 1) $\operatorname{ctg}^2\alpha$; 2) $\operatorname{tg}\alpha$. **7.** 1) $\frac{2}{\sqrt{5}}$; $\frac{1}{\sqrt{5}}$; $\frac{1}{2}$. **9.** 1) $\cos\alpha = \frac{15}{17}$; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{15}$; $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{15}{8}$. **12.** 1) $\sin^2\alpha$; 2) $\cos^2\alpha$. **14.** 1) $\sin^2\alpha$; 2) $\sin^2\alpha$. **Мавзӯи 22. 2.** 1) $x \approx 50^\circ$; 2) $x \approx 14^\circ$; 3) $x \approx 34^\circ$; 4) $x \approx 74^\circ$. **3.** 1) $\sin B = 0,6$; $\cos B = 0,8$. **5.** $\cos A = 0,5$. $\operatorname{tg} A = \sqrt{3}$. **7.** 1) $\sin\alpha = 0,6$; $\cos\alpha = 0,8$. **8.** 1) $\sin\alpha$; 2) $\cos^2\alpha$. **Мавзӯи 23. 1.** 1) 1,5; 3) 0,5. **3.** $\frac{32\sqrt{3}}{3}$; $\frac{16\sqrt{3}}{3}$. **4.** 12; 6. **5.** 1) $\sin^2\alpha$; 2) $\sin^2\alpha$. **7. 2. 8.** 1) 0,5; 2) 0,5; 3) 1. **Мавзӯи 24. 1.** а) 1) $\approx 0,0523$; 2) $\approx 0,3584$; 3) $\approx 0,7660$; 4) $\approx 0,6428$; в) 1) $\approx 5,671$; 2) $\approx 1,732$; 3) $\approx 0,2679$; 4) $\approx 11,430$. **2.** б) 1) $\approx 42^\circ$; 2) $\approx 50^\circ$; 3) $\approx 87^\circ$; д) 1) $\approx 25^\circ$; 2) $\approx 85^\circ$; 3) $\approx 10^\circ$. **4. 1. 6.** 1) 1; 2) 0. **7.** 1) $\approx 0,9397$; 4) $\approx 23,078$. **8.** $x \approx 8^\circ$. **Мавзӯи 25. 1.** 14 см. **2.** $45^\circ, 45^\circ$. **3.** $a \approx 6,691$; $b \approx 7,431$; $\beta \approx 48^\circ$. **5.** $\cos^2\alpha$. **7.** $a=4$ см; $b=4\sqrt{3}$ см, $\beta=60^\circ$. **Мавзӯи 26. 1.** $b=9$ см, $\alpha=\beta=45^\circ$. **2.** $c=12$ см, $\alpha=60^\circ$, $\beta=30^\circ$. **5.** 0. **7.** $c=26$ см. **Мавзӯи 27. 3.** $a=7$ см, $\alpha=\beta=45^\circ$. **4.** $a=6\sqrt{3}$ см, $b=6$ см, $\beta=30^\circ$. **5.** $a=5$ см (расми 5); $AC=2\sqrt{13}$ см, $BC=3\sqrt{13}$ см (расми 6). **6.** 168 см.

Боби III. Мавзӯи 31. 3. 1) Чаряки-III; 2) Чаряки-II; 3) Чаряки-IV; 4) Чаряки-I. **4.** 1) $(-10; -1)$; 2) $(0; -5,5)$; 3) $(-2; 1)$. **5.** 1) $B(-1; 5)$. **8.** 1) $D(3; 0)$; 2) $D(4; 5)$. **Мавзӯҳои 32–33. 2.** 1) 10; 2) 17; 3) 13. **3.** 1) $x_1 = -2$; $x_2 = 6$. **4.** $P=16$. **5.** 1) $(x-7)^2+(y-11)^2=25$; 2) $(x+2)^2+(y-3)^2=1$. **6.** 1) $(2; 5)$, $R=7$; 2) $(-1; 5)$, $R=2$. **7.** 1) $C(3; -1)$, $R=4$; 2) $C(0; -5)$, $R=1$. **8.** 1) Баробарпахлӯ. **9.** 1) $(x-9)^2+(y-4)^2=49$; 2) $(x+3)^2+(y+4)^2=4$. **10.** 1) $C(7; -2)$, $R=5$; 2) $C(4; 0)$, $R=1$. **11.** 1) $(5; -12)$ ва $(5; 12)$; 2) $(-5; -12)$ ва $(5; -12)$. **Мавзӯи 34.**

3. 1) $2x - y + 5 = 0$; 2) $x + y - 7 = 0$; 3) $3x - 2y + 2 = 0$. 4. $c = -3$. 5. $a = b = \frac{1}{3}$. 6. 1) $(0; -1,5)$ ва $(-3; 0)$; 2) $(0; 3)$ ва $(4; 0)$; 3) $(0; -5)$ ва $(2,5; 0)$. 9. $x + 1 = 0, x - 3y - 8 = 0, x - y = 0$. **Мавзўи 35. 2. 1) $\overline{DC} \uparrow \overline{AB}$; 2) $\overline{AO} \uparrow \overline{OC}$; 3) $\overline{CB} \uparrow \overline{AD}$ ва $\overline{DA} \uparrow \overline{AD}$; 5) $\overline{DC} = \overline{AB}$; 6) $\overline{AO} = \overline{OC}$; 7) $\overline{DO} = \overline{OB}$. **Мавзўҳои 36–37. 5.** Ҳа, иро шуд. 6. $|\overline{AO}| = 16$ см. 7. $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AD} + \overline{DC} \Rightarrow \overline{AC} = \overline{AC}$. 9. $\overline{AB} = -\vec{b}$; $\overline{BC} = -\vec{a} + \vec{b}$; $\overline{DA} = \vec{a} - \vec{b}$. 10. $\overline{BF} = -2\vec{a} + \vec{b}$; $\overline{EC} = -\vec{a} + 2\vec{b}$; $\overline{EF} = -\vec{a} + \vec{b}$; $\overline{BC} = -2\vec{a} + 2\vec{b}$. **Мавзўҳои 38–39.****

4. $\overline{OA} = -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$; $\overline{AK} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$. 5. 1) $\overline{AC} = \overline{CB}$; 2) $\overline{AB} = 2\overline{CB}$; 3) $\overline{AC} = -\frac{1}{2}\overline{BA}$. 7. 1) $(4; 5)$; 2) $(-1; 4)$; 3) $(0; 0)$. 8. 1) 25; 2) 5; 3) 3. 9. 1) $(1; -2)$; 2) $(2m; 2n)$. 11. $m = 7$. 12. $B(-2; -11)$. **Мавзўи 40. 2.** 1) $(-3; 4)$; 2) $(-5; 12)$. 3. 1) $(-4; 10)$; 2) $(0; 2)$; 4) $(4; -10)$. 4. 1) $(3; 6)$; 2) $(5; 3)$; 3) $(-4; -3)$. 5. 1) $(6; 3)$; 2) $(-6; 3)$; 3) $(-2; 15)$. 6. 1) $\vec{c}(-4; -4)$; 2) $\vec{c}(8; 6)$. 7. 1) $\vec{c}(-12; 6)$; 2) $\vec{c}(-11; 8)$. 8. 1) $\vec{c}(-2; -1)$; 2) $\vec{c}(2; -13)$. **Мавзўи 41. 1.** $CC_1 = 2$. 2. $\overline{KC} = \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{AD}$. 3. $(5; 12)$. 4. $B(5; 5)$, $D(1; -1)$. 5. $B(-5; 11)$. 8. $\overline{AN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \overline{AD}$.

Боби IV. Мавзўи 45. 2. 2) 0,0225 дм²; 5) 6,25 м². 6. 1) 4 баробар зиёд мешавад; 2) 9 баробар кам мешавад; 3) 28 см² зиёд мешавад. 11. 2) 3,6 дм; 3) 68 мм; 5) 80 дм. 13. 359,12 ҳазор км². **Мавзўҳои 46–47. 2. 1)** $P = 65,8$ см, $S = 87$ см²; 3) $P = 7,4$ дм, $S = 3$ дм². 4. $S = 5000$ м². 5. 1) $P = 126$ см, $S = 920$ см². 8. 12 см. 9. 1) $S = 500$ см²; 2) $a = 12$ см; 3) $h_a = 5$ см. 11. 1) 1,6 баробар зиёд мешавад; 2) 6,25 баробар кам мешавад. 13. 2) 280 см²; 4) 4,8 дм². 14. $P = 42$ см. 15. $S = 280$ см². **Мавзўи 48. 2. 1)** 14 см²; 2) 150 см². 3. 4 см. 4. 5 : 1. 8. 1) 756 см²; 2) 84 см²; 3) 192 см². 10. 60 см. 11. 7,5 дм². **Мавзўҳои 49–50. 2. 1)** 32 см. 3. 1) 512 см²; 2) 1,62 дм². 4. 12 см. 5. 5 см. 7. 1) 1,35 дм²; 2) 180 см²; 3) 8 см². 8. 1) 87 см²; 2) 14 см. 10. 1) $0,5a^2$ воҳ. кв. 11. 360 см². 12. 1) 2,45 дм²; 2) 238 см²; 3) 31,5 см². 14. 1) 1,44 м². 15. 1) 140 см². **Мавзўи 51. 1.** 2125 воҳ. кв. 2. $(a+b) \cdot c$. 3. 144 см². 5. 16 воҳ. кв. 6. 1) 20,8 км; 2) 8 км.

Боби V. Мавзўи 55. 3. AB ва BD буранда. 4. 25 см. 5. 1) $R = 5$ см; 2) $R < 5$ см; 3) $R > 5$ см. 8. CD . **Мавзўи 56. 2. 1)** Давроҳо аз тарафи дарун ба якдигар мерасад; 2) Ба нуқтаи умумӣ соҳиб нест яке ба даруни дигаре меҳобад. 3. 1) 10 см; 2) 2 см. 6. 1) 144°; 2) 96°; 3) 210°; 4) 200°; 5) 260°; 6) 306°; 7) 276°. 7. 1) 160°, 200°; 2) 80°, 280°. 8. 70°. 9. 1) 72°; 2) 60°; 3) 40°; 4) 36°; 5) 30°. 10. 1) 15,6 см; 2) 21 см; 3) 1,6 дм. **Мавзўи 57. 3.** $AC = 10$ см. 4. 1) $\angle ACB = 44^\circ$; 3) $\angle AEP = 100^\circ$. 5. 36°, 60°, 84°. 6. 1) 100° ё ки 80°; 2) 126° ё ки 54°. 7. $\angle BAC = 20^\circ$. 8. 100°. **Мавзўи 58. 3.** 220°. 4. а) $x = 45^\circ$; б) $x = 30^\circ$; д) $x = 90^\circ$. 5. 30°. 6. 1) $\angle ABC = 20^\circ$; 2) $\angle ABC = 60^\circ$; 3) $\angle ABC = 36^\circ$; 4) $\angle ABC = 54^\circ$; 5) $\angle ABC = 36^\circ$. 7. 1) 100°, 40°, 40°. 8. 1) 144°; 2) 120°; 3) 40°; 4) 72°. 9. 1) 128°; 3) 76°. **Мавзўи 59. 3.** 4 см. 6. 8 см. 9. 10 см. 11. 90°.

Боби VI. 1. 38°, 158°, 44°, 120°. 2. 52 см. 3. 48 см. 4. 1) 12 см²; 4,8 см; 2) 108 см²; 14,4 см. 6. 44 см. 7. 10 см. 9. 3 см. 10. 180 см². 13. 60 дм, 14,4 мм. 14. 30°, 150°, 30°. 17. 9% кам мешавад. 19. 96 см. 20. 28 см. 22. 1) $(1; -1)$; 2) $(-2; 2)$. 23. $\overline{BO} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$. 25. 60°. 26. 144°. 27. 72 см. 28. 12 см, 4 см. 29. 1) 4 см² кам меавад; 2) 128 см² зиёд меавад.

Мундаририча

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Такрори маводҳои дар синфи 7-ум омӯхташуда | 3 |
| Боби 1. Чоркунҷаҳо | 5 |
| §1. Чоркунҷаҳои асосӣ ва хосиятҳои онҳо | |
| Мавзӯи 1. Хосияти кунҷҳои дохилӣ ва берунии бисёркунҷа | 5 |
| Мавзӯи 2. Параллелограмм ва хосиятҳои онҳо | 8 |
| Мавзӯи 3. Аломатҳои параллелограмм | 11 |
| Мавзӯи 4. Росткунҷа ва хосиятҳои онҳо | 14 |
| Мавзӯҳои 5–6. Хосиятҳои ромб ва квадрат | 16 |
| Мавзӯҳои 7–8. Трапетсия ва хосиятҳои он | 19 |
| §2. Теоремаи Фалес ва татбиқҳои он | 23 |
| Мавзӯи 9. Теоремаи Фалес | 23 |
| Мавзӯҳои 10–11. Хосияти хати миёнаи секунҷа. Хосияти хати миёнаи трапетсия | 26 |
| Мавзӯи 12. Татбиқ ва машқи амалӣ | 29 |
| Мавзӯҳои 13–14. Кори назоратии 1. Ислоҳ намудани хатогихо | 33 |
| Тести 1 | 33 |
| Малумотҳои таърихӣ | 34 |
| Боби II. Муносибатҳои байни тарафҳо ва кунҷҳои секунҷаи росткунҷа | 35 |
| § 3. Функсияҳои тригонометрии кунҷи тез | 35 |
| Мавзӯи 15. Синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷи тез | 35 |
| Мавзӯи 16. Синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷи тез (давомаш) | 38 |
| § 4. Теоремаи Пифагор ва татбиқҳои он | 41 |
| Мавзӯи 17. Теоремаи Пифагор ва исботҳои гуногуни он | 41 |
| Мавзӯи 18. Теоремаи ба теоремаи Пифагор чаппа | 44 |
| Мавзӯи 19. Баъзе татбиқҳои теоремаи Пифагор | 47 |
| § 5. Айниятҳои тригонометрӣ | 49 |
| Мавзӯҳои 20–21. Айниятҳои асосии тригонометрӣ ва натиҷаҳои он | 49 |
| Мавзӯи 22. Формулаҳои барои функсияҳои тригонометрии кунҷи пуркунҷа | 52 |
| Мавзӯи 23. Ҳисоб намудани синус, косинус, тангенс ва котангенс кунҷҳои 30° , 45° , 60° | 54 |
| § 6. Ҳалли секунҷаҳои росткунҷа | 56 |
| Мавзӯи 24. Ҷадвали киматҳои функсияҳои тригонометрӣ | 56 |
| Мавзӯи 25. Ҳалли секунҷаҳои росткунҷа | 58 |
| Мавзӯи 26. Ҳалли секунҷаҳои росткунҷа (давомаш) | 60 |
| Мавзӯи 27. Сохтани секунҷаҳои росткунҷа | 62 |
| Мавзӯи 28. Машқи амалӣ ва татбиқ | 64 |
| Мавзӯҳои 29–30. Кори назоратии 2. Ислоҳ намудани хатогихо | 67 |
| Тести 2 | 67 |
| Маълумотҳои таърихӣ | 68 |
| Боби 3. Усули координатаҳо. Векторҳо | 69 |
| § 7. Системи координатаҳо дар ҳамворӣ | 69 |
| Мавзӯи 31. Координатаҳои нуқта дар ҳамворӣ. Координатаҳои миёнаҳои порча | 69 |
| Мавзӯҳои 32–33. Масофаи байни ду нуқта. Муодилаи давра | 72 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Мавзӯи 34. Муодилаи хати рост. Ҳалла масъалаҳои геометрии бо усули координатаҳо | 75 |
| § 8. Векторҳо дар ҳамворӣ | 78 |
| Мавзӯи 35. Мафҳуми вектор. Дарозии вектор ва самти он | 78 |
| Мавзӯҳои 36–37. Ҷамъ ва тарҳи векторҳо | 81 |
| Мавзӯҳои 38–39. Зарби вектор ба адад. Координатаҳои вектор | 85 |
| Мавзӯи 40. Амалҳои бо векторҳои бо координатаҳо дода шуда | 90 |
| Мавзӯи 41. Талқинҳои физикӣ ва геометрии векторҳо. Ҳалли масъалаҳои геометрии бо усули вектор | 93 |
| Мавзӯи 42. Машқи амалӣ ва татбиқ | 96 |
| Мавзӯҳои 43–44. Кори (назоратии) 3. Ислоҳи хатогоҳ | 99 |
| Тести 3 | 99 |
| Малумотҳои таърихӣ | 100 |
| Боби IV. Масоҳат | 101 |
| § 9. Масоҳати бисёркунча | 101 |
| Мавзӯи 45. Мафҳум дар бораи масоҳат | 101 |
| Мавзӯҳои 46–47. Масоҳати росткунча ва параллелограмм | 105 |
| Мавзӯи 48. Масоҳати секунча | 110 |
| Мавзӯҳои 49–50. Масоҳати ромб ва трапетсия | 114 |
| Мавзӯи 51. Масоҳати бисёркунча | 119 |
| Мавзӯи 52. Машқи амалӣ ва татбиқ | 122 |
| Мавзӯҳои 53–54. Кори (назоратии) 4. Ислоҳи хатогоҳ | 126 |
| Тести 4 | 126 |
| Маълумоти таърихӣ | 127 |
| Боби V. Давра | 128 |
| § 10. Кунҷҳои давра | 128 |
| Мавзӯи 55. Вазъияти ҷойгиршавии давра ва хати рост Расонда ба давра ва ҳосиятҳои онҳо | 128 |
| Мавзӯи 56. Вазъияти ҷойгиршавии ду давра. Кунҷи маркази ва ченаки градусии камон | 132 |
| Мавзӯи 57. Кунҷи ба давра дарун кашида шуда | 135 |
| Мавзӯи 58. Кунҷҳои бурандаҳои давра ҳосил карда | 138 |
| Мавзӯи 59. Хордаи давра ва ҳосияти диаметр | 142 |
| Мавзӯи 60. Машқи амалӣ ва татбиқ | 144 |
| Нуқтаҳои аҷоибӣ секунча | 146 |
| Мавзӯҳои 61–62. Кори (назоратии) 5. Ислоҳи хатогоҳ | 149 |
| Тести 5 | 149 |
| Маълумоти таърихӣ | 150 |
| Боби VI. Такрорӣ | 151 |
| Машқҳо барои такрори материалҳои синфи 8 | 151 |
| Кори назорати ҷамъбасти. Ислоҳи хатогоҳ | 153 |
| Тести 6 | 153 |
| Илова ҷавобҳо. | 154 |

Рахимқориев А.Р. Геометрия 8: Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 8-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ /А.Р. Рахимқориев, М.А.Тухтаходжаева, нашри 4-ум .
-Т.: ХЭТН «O‘zbekiston», 2019. — 160 с.

I. 1,2. Ҳаммуаллиф.

ISBN 978–9943–25–816–7

УЎК: 154-222.8(075)
КВК 22.151.(5Тожд)я721

*ABDUVANOV ABDURAHMONOVICH RAHIMQORIYEV,
TOXTAXODJAYEVA MUYASSAR ABDUVANOVONA*

GEOMETRIYA

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik
(tojik tilida)

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 4-nashr

ТОШКЕНТ — «MITTI YULDUZ» — 2019

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Мутарчим | А.Эшонқулов |
| Муҳаррир | Қ.Эшонқулов |
| Мусаввир-дизайнер | Ш.Рахимқориев, Х.Абдуллаев |
| Муҳаррири техникӣ | У. Ким |
| Саҳифабанд | Ҳ.Ходжаева |

Литсензия нашриёт АИ №185 от 10.05.2011.
Ба чопаш 23.08.2019 ичозат дода шуд. Андозаи 70x90^{1/16} Кегли 11.
Гарнитурани “Times New Roman”. Бо усули офсетӣ чоп шудааст.
Қузи чопии шартӣ 11,5. Қузи нашрию ҳисобӣ 10.0.
Адади нашр 6 431 нусха.
Супориши № 19-130.

Макети оригинали китоби дарсӣ дар ҚММ «Mitti Yulduz» тайёр карда шудааст.
Тошканд, кўчаи Навоӣ 30.

Дар хонаи эҷодии таъбу нашри «O‘zbekiston»-и Оҷонсии иттилоот ва комуникатсияҳои оммавии назди Маъмурияти Президенти Республикаи Ўзбекистон чоп карда шуд.
100011, Тошканд, кўчаи Навоӣ 30.

Чадвали нишондихандаи ҳолати китоби ба ичора дода шуда

| Р/Т | Ному насаби донишмӯз | Соли хониш | Ҳолати китоб ҳангоми гирифтани | Имзои раҳбари синф | Ҳолати китоб ҳангоми супоридан | Имзои раҳбари синф |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

Китоби дарсии ба ичора додашуда, дар охири соли хониш чадвали боло аз тарафи раҳбари синф дар асоси меъёрҳои зерини баҳо пур карда мешавад:

| Нав | Ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуб | Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоби дарсӣ чӯдо нашудааст. Ҳамаи варақҳои ҳафт. нодарида, чӯдо нашида, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест. |
| Қаноатбахш | Муқова қач шудааст, қаноатбахш қоҳида, якҷанд хатҳо қашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ чӯдошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир шудааст. Варақҳои чӯдо шудааш аз нав таъмир шудааст, дар баъзе саҳифаҳо хат қашида шудаанд. |
| Ғайри-қаноатбахш | Муқова хат қашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ чӯдо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат қашида, ранг карда партофта шудааст, китоб барқарор карда намешавад. |

Рахимқориев А.Р. Геометрия 8: Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 8-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ /А.Р. Рахимқориев, М.А.Тухтаходжаева, наشري 4-ум .
-Т.: ХЭТН «O‘zbekiston», 2019. — 160 с.

I. 1,2. Ҳаммуаллиф.

ISBN 978–9943–25–816–7

УЎК: 154-222.8(075)
КБК 22.151.(5Тожд)я721

*ABDUVANOV ABDURAHMONOVICH RAHIMQORIYEV,
TOXTAXODJAYEVA MUYASSAR ABDUVANOVONA*

ГЕОМЕТРИЯ

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik
(tojik tilida)

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 4-nashr

ТОШКЕНТ — «MITTI YULDUZ» — 2019

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Мутарчим | А.Эшонқулов |
| Мухаррир | Ҷ.Эшонқулов |
| Мусаввир-дизайнер | Ш.Рахимқориев, Х.Абдуллаев |
| Мухаррири техникӣ | У. Ким |
| Саҳифабанд | Ҳ.Ходжаева |

Литсензия нашриёт АИ №185 от 10.05.2011.

Ба чопаш 23.08.2019 иҷозат дода шуд. Андозаи 70x90 ¹/₁₆ Кегли 11.

Гарнитураи “Times New Roman”. Бо усули офсетӣ чоп шудааст.

Ҷузъи чопии шартӣ 11,5. Ҷузъи нашрию ҳисоби 10.0.

Адади нашр 914 нусха.

Супориши № 19-131.

Макети оригинали китоби дарсӣ дар ҚММ «Mitti Yulduz» тайёр карда шудааст.
Тошканд, кўчаи Навоӣ 30.

Дар хонаи эҷодии таъбу наشري «O‘zbekiston»-и Оҷонсии иттилоот ва комуникатсияҳои оммавии назди Маъмурияти Президенти Республикаи Ўзбекистон чоп карда шуд.
100011, Тошканд, кўчаи Навоӣ 30.